

М. Ғ. ГАСЫМОВ

А.И. БИТКИЛЭРИН
МОРФОЛОГИЯ
В.Э
СИСТЕМАТИКАСЫ

1959

М. Ә. ГАСЫМОВ

581

709

723

АЛИ БИТКИЛӘРИН
МОРФОЛОКИЯ
ВӘ
СИСТЕМАТИКАСЫ

20939

М. Ф. АЗӘРБАЙҖАН АЛЫНА
Азәрбајҹан Республикасы
КНТ АБЛАНАСЫ

22064

Редактору
Г. АХУНДОВ

МҮГЭДДИМЭ

Өлкөмиздө зэймөткөшлөрин мадди тэлөбатынын максимум дэрэчедө тэмин эдилмэсине Коммунист партиясы во Совет һөкумәти даим бөйүк гайгы көстөрүрлөр. Бу, нөвбәдәккәнар ХХІ партия гурултайында, «1959—1965-чи илләрдә ССРИ халг тәсәррүфатынын инкишафына даир контрол рәгәмләр багтында» Н. С. Хрушшов йолдашын ма'рузәсиндә өз парлаг тәзаһүрүнү тапмышдыр. ХХІ партия гурултайы халгымызын мадди во мәнәви сәвийһәсини даһа да йүксәлтмәк мәгсәднә сәнае во кәнд тәсәррүфатынын элим во мәдәнийһәти, иншаат во нәглийят сәһәләрини инкишаф әтдирмәк үчүн гаршыя чох мүһүм вәзифәләр гоймушдур.

1959—1965-чи илләрдә ССРИ халг тәсәррүфатынын инкишафына даир контрол рәгәмләрдә көстөрүлмишдир ки, еддильийин ахырына гәдәр һәр илдә тахья истәһсалы 10—11 миллиард луда, әсас техника биткиләрин истәһсалы исә 1965-чи илдә аша-гыдакы сәвийһәйә чәтдирылмалыдыр: памбыг 5,7—6,1 миллион тона во я 1958-чи илә нисбәтән 30—40 фәиз артыг, шәкәр чүгүндуру 76—84 миллион тона, я да 40—55 фәиз артыг, яғлы биткиләрин тохумлары тәхминән 55,5 миллион тона, я да 10 фәиз артыг, кәтан лифи 580 миң тона, я да 1958-чи илә нисбәтән 31 фәиз артыг во и. а. истәһсал эдилмәлидир.

ХХІ партия гурултайынын гәрарларында кәнд тәсәррүфатынын ән мүһүм сәһәләриндән бири олан һейвандарлыг тәсәррүфатынын инкишаф әтдирмәк үчүн еи базасыни хейли мөһкәмләпдирмәк, артырмаг во ону ени еи чешидләря илә зәнкнләшдирмәк үчүн гаршыя бир сыра вәзифәләр гоймушдур.

Бунунда әлагәдәр олараг республикамызда памбыгчылыгын, тахыл тәсәррүфатынын, баг-бостан во тәрәвәз биткиләрянин, чайын, мөшә тәсәррүфатынын во с. инкишаф әтдирилмәси үчүн контрол рәгәмләр нәзәрдә тутулмушдур.

Юхарыда көстөрилән тэләбаты өдәмәк үчүн габагчыл элим-нәзәри во тәчрүби билкиләря снлаһланмаг лазымдыр. Али мөк-

табләр мукәмәл һазырлыглы вә бачарыглы элин-тәсәррүфат кадрлары һазырламаг үчүн Минчурин тәлимин әсасында тәртиб әдләмәш дәрәһкәләрдә тәмин әдилмәлидир. һәмкә дәрәһкәләр бир тәрәфдән ерли шәрәити вә онун таби сәрвәтләрини әкс әтдирмәли, дикәр тәрәфдән дә, ондан мүмкүн гадәр истифадә әдләмәсн йолларыны өйрәтмәлидир. Бәләһкә, али мәктәпләр үчүн ән мүһүм тәдريس китабларындан бири ботаника китабы сайылмалыдыр.

Бу вахта гадәр Азәрбайжан дилиндә Азәрбайжанын битки сәрвәтләрини әкс әтдирәчәк вә ондан истифадә йолларыны кәстәрәчәк морфолокия вә систематика китабы ярадылмамышдыр. һалбуки буна али мәктәпләрин вә ихтисас техникумларынын бәйүк әһтиячы вардыр. Бу әһтияч һәмкә китабын язылмасына сәбәб олмушдыр. Китабын тәртибиндә тәсвирләрә әз ер верилмәш, башлыча олараг биткиләрин хәлг тәсәррүфат әһәмийәти үзәриндә даянылмышдыр. Мисаллар әсас әтибарилә Азәрбайжандә биткән биткиләрдән күтүрүлүшдүр. Систематика һиссәсиндә битки группларынын филохенетик әләгәләриндән вә тәсвириндән башга, айры-айры биткиләрин Азәрбайжандә яшайыш шәрәити, яйылма саһәси, әһтияти, әһәмийәти, перспективалии, тәркибләриндәки хейрли вә зәрәрли мәддәләрдән истифадә әдилмәсн йоллары һагында әлдә олан мәлүмат верилмәшдир.

КИРИШ

Ботаника элин биткиләрин хусусийәтләрини һәртәрәfli өйрәнән вә инсан чәмийәтиникин хейри үчүн онларын ишәрә әдләмәсн йолларыны кәстәрән әлидир.

Ботаника юнәвчә «ботанә» сөзүндән күтүрүлүшдүр, мәнасы *койарти, тәрәвәз* дәмәклир. Гәдим дөврдән әтибарән биткиләр инсанын дитәтигә чәлб әтмишдир. Инсан әмәли мейвәләри, тохумлары вә көкләри ахтарыш, өзүнә мәнфәәтли вә зәрәрли биткиләр һагында мәлүмат топламага чалышмышдыр.

Гәдим юнан философу Әрәсту эрамыздән 384—332 ил гәбаг биткиләри чансыз табигәдән айыраг онларын «руһа» малик олдуларынын гәбул әтмишди. О бәлә тәсәввүр әдирди ки, инкишаф дәрәжәси әтибарилә биткиләр һейванлардан ашагы сәвийһәдә ер тутур, чүнки биткиләр ялынз бөйүмә вә гидаланма габиллийәтинә малик олдулары һалда, һейванлар бөйүмә вә гидаланмагдан башга бир дә һисс вә һәрәкәт габиллийәтинә маликдир. Анчаг һейванларла биткиләр арасында токман бу чүр сәрһәд таманнла сәйв вә идеалист мәһийәт дашыйыр. Гәдим заманда биткиләри өйрәнмәк иши башлыча олараг сәдә һалда табәгәт вә кәнд тәсәррүфат мәһийәти дашыйырды.

Феодализм дөврүнүн өзүндә дә дини фанатизм һәр бир сәрбәст мәфхурәни тәғиб әтдиһи үчүн әли инкишаф әдә билмирдн. Килсә, мәсчид вә ибәдәткәһларын көзләри кор әтмәси, кор-корна Әрәсту фәлсәфәсинә табелик, ботаника элиндә схоластик һал яратмышды.

Америка вә Австралиянын кәшфи янсанларда биткиләрини өйрәнәһкәснә мәрәг оятды, һәмкә дөврдән әтибарән тәсвир ботаника элин яранмага башланды.

Бир гәдәрдән сонра ботаника тәғйил янашмәг вә ону системә салмаг фикри оялды. Наһайәт. XVIII әсрдә Карл Линнейни сүн'и системә мейдана чыхды. Микроскопун кәшфи илк дөфә олараг биткиләрин даһили гурулуш хусусийәтләри илә танышыла-ға сәбәб олду вә бунуһла әләгәдәр олараг хырда организмләрин кәшф олунмасы башланды.

XVIII эсрин икинчи ярысында гидаланманын вэ тэнэффүсүн маһийәти айдынлашдырылды вэ беләликлә, ботаниканын әһәмийәтли һиссәләриндән бири олан битки физиолокиясынын әсасы гоюлду.

XIX эсрдә битки физиолокиясынын даһа да инкишафы битки аләминдә бир чох хүсусийәтин өйрәнилмәсинә сәбәб олду вэ нәтичәдә биткиләрин һәяты илә һейванларын һәяты арасында кәскин фәрг олмадығы мүйәйһәнләшди. Буна әсасән ботаника биолокия элминин бир һиссәси олараг кенишләнмәйә башлады.

Биткиләрин һейванлардан фәрги онларын гурулушларында вэ гидаланмаларындадыр. Лакин битки вэ һейванларын ибтидаи формалары арасында кәскин сәрһәд гоймаг мүмкүн дейилдир. Бу да ону исбат эдир ки, һәр ики чанлы групу бир көкдән әмәлә кәлмишдир. Мәсәлән, сүнкәр, полип, мәрчан вэ саир бу кими һейванлар битки кими бир ерә япышараг яшайыр. Дикәр тәрәфдән бир чох ибтидаи биткиләр, мәсәлән, бирһүчәйрәли вэ колония һалында олан йосунлар вэ али биткиләрин бәзиләри, һәятларынын мүйәйһән дөврүндә зооспорлар, сперматозоидләр әмәлә кәтириләр ки, онлар да фәал һәрәкәт эдә билән һәят кечирир.

Мәлумдур ки, бә'зи биткиләр мүхтәлиф тә'сирләрдән гычыгланараг һәрәкәт эдир. Һәшәрәтйәйән биткиләрин, күстүмотунун ярпагларынын һәрәкәтини, үмумийәтлә яшыл биткиләрин һавада күнәш ишығына тәрәф әйилмәләрини буна мисал кәстәрмәк олар.

Нәһайәт, бә'зи көбәләкләр вэ чичәкли паразит биткиләр (гызыл сармашыг, сүмүркәноту вэ с.) дә вардыр ки, онлар һейванлар кими үзви гида илә гидаланыр.

Биткиләр аләминин әксәрийәтини яшыл биткиләр тәшкил эдир. Бунлар гейри-үзви маддәләрдән үзви маддәләр һазырламаг габилыйәтинә малик олуб, һәмин маддәләрин һесабына яшадыгларына көрә, онлара автотроф, йә'ни мүстәгил гидаланан чанлылар дейилир.

Һейванлар вэ ибтидаи биткиләрин әксәрийәти яшыл биткиләрдә олан автотрофлуг габилыйәтинә малик олмадыгларына көрә онлара һеторотроф, йә'ни мүхтәлиф шәкилдә һазыр үзви маддә алараг башгаларынын һесабына гидаланан организмләр дейилир.

Гидаланманын мүхтәлифлийи, мәншәчә бир олан битки вэ һейван группларынын сонракы тәкамүлүндә айрымаларына сәбәб олмушдур. Аз һәчмли вэ чох потенциал энержийә малик олан үзви гида илә гидаланмаг һейван организмләринин сонракы тәкамүлүндә онларын гидаланма органларынын минимума гәдәр ихтисар олунмасына сәбәб олмушдур. Дикәр тәрәфдән үзви маддәләр әһтиятынын мөһдудлуғу гида маддәләри ахтармаг үчүн һейванларда һәрәкәт габилыйәтинин вэ хариҷи гычыгланманы һиссәдән органларын (синир системинин вэ башга һиссә органлары-

нын) инкишафына сәбәб олмушдур. Биткиләр һейванлара нисбәтән башга бир истигамәтлә инкишаф этмишдир. Гида маддәси һазырламаг үчүн гейри-үзви маддәләр (CO_2 , H_2O) вэ минерал дузлар әһтияты, демәк олар ки, һәр ердә вардыр. Бунлары гәбул этмәк үчүн мүһит илә даһа мөһкәм әлагә вэ кениш гәбуләдичи сәһә малик олмаг лазым иди ки, буну да биткиләрдә көрүрүк. Илк биткиләрин һәяты су мүһити илә әлагәдар иди. Бурада бүтүн организмләр әйни шәраитдә яшайырды, йә'ни биткиләр дә ибтидаи һейванлар кими бирһүчәйрәли иди.

Тәдричән колония һалында олан битки формаларынын әмәлә кәлмәси, организмләрин мүрәккәбләшмәси биткиләрин су ахынына гаршы давамлы олмасы үчүн илк аддым иди. Сонракы тәкамүл нәтичәсиндә чохһүчәйрәли организмләр әмәлә кәлмишдир. Чохһүчәйрәлиләр арасында ибтидаи шәкилдә галмыш биткиләрин айрымалары онларын гуруя чыхмамалары илә әлагәдардыр.

Йәгин ки, бә'зи йосунлар дәниз суларынын далғалары илә сәһилә атылмыш вэ ялһыз далғаланма нәтичәсиндә кәнара сычраян су дамчылары илә кифайәтләнәрәк, узун мүддәт әрзиндә тәдричән гуру мүһитинә уйғунлашмышдыр. Бу чүр уйғунлашма һүчәйрәләрин чох кәскин сурәтдә дифференсиациясына вэ ени гидаланма органларынын әмәлә кәлмәсинә сәбәб олмушдур. Су вэ минерал дузлар әсасән биткинин торпагда олан һиссәсинин һүчәйрәләри васитәсилә алыныр. Бу маддәләр биткинин ассимиляция органы ролуну ойнайа ерүстү һиссәләринә верилирди. Ерүстү һиссәләр бүтүн һүчәйрәләри ассимиляция мөһсулу илә тә'мин эдән орган олмушдур. Узун мүддәт давам этмиш тәкамүл просеси көк, көвдә, ярпаг кими гидаланма органларына вэ олдугча мүрәккәб чохалма органларына малик олан һазыркы биткиләрин әмәлә кәлмәсинә сәбәб олмушдур.

Али биткиләр торпагдан суда һәлл олмуш минерал маддәләр алмаг үчүн мүкәммәл көк системинә, һавадан CO_2 -ни алмаг вэ күнәш ишығындан яхшы истифадә этмәк үчүн ярпаглара, онларда хлорофилә, көкдән кәлән сую вэ минерал маддәләри ярпага, ярпагларда һазырланмыш үзви маддәләри исә көк вэ чаван будаглара апаран көвдәйә маликдир.

Битки организмләри өзүнүн тарихи инкишафы бою мүһитлә сыхы сурәтдә әлагәдар олмуш вэ узун сүрән тәкамүл дөврү һәмин мүһитдән истифадә этмәк үчүн биткийә бир сыра уйғунлашмалар газандырымышдыр.

Чох мүхтәлиф чоғрафи, торпаг вэ иглим шәраитинә уйғунлашмыш һәдсиз-һесабыз биткиләр вардыр. Инсан бир чох чәһәтдән (ейинти, кейинти, иншаат, яначаг, дәрман материаллары, оксиген илә тә'мин олунма вэ с.) биткидән асылы олмасына бахмаяраг, өзү дә биткиләр аләминин дәйишдирилмәсиндә бөйүк рол ойнайа әсас амилләрдәндир. Инсан, әл дөймәмнш чөлләри шумлаһыр, мешә золаглары салыр, кечилмәз мешәләри гырыр, батаг-

лыглары гурудур, сәһралары әкин саһәләринә чевирир, чылпаг ерләри яшыллашдырыр вә беләликлә тәбиәти дәйишдирир. Бә'зи мәнфәәтли биткиләрин артмасы үчүн әлверишли шәраит яра ыб, зәрәр верәнләрини исә тәләф әдир.

Бир чох биткиләр лап гәдимдән мәдәни һалда бечәрилмәйә башланмышдыр. Узун мүддәт әрзиндә сечилмә вә маяланма нәтичәсиндә биткиләр о гәдәр дәйишилмишдир ки, һазырда онларын чинс-башчыларыны тапмаг чох чәтиндир вә я һеч мүмкүн дейилдир.

Биткиләр әләминин дахили гурулушуну, онда кедән просесләри, харичи мүһит шәраитилә әлагәсини, гаршылыглы тә'сирини билмәдән ону истәнилән кими идарә этмәк олмаз. Һәр бир тәбиәт-шүнас биткинин гыдаланма шәраитини, онун торпаға, ишыға, һәрәтә, рүтүбәтә вә саир амилләрә олан мүнасибәтини билмәлидир. Һәр бир битки мүтәхәссиои, ени чешидләр әлдә этмәк үчүн биткиләрдә баш верән дәйишклиийин маһийәтини вә хүсусийәтини анламалы вә ону идарә этмәйи бачармалыдыр.

Ботаника әлминин сосялист кәнд тәсәррүфатында олдуғча бөйүк әһәмийәти вардыр.

Ботаника әлми, башга әлмләр кими, Совет Иттифагында чох ирәлидә кедән кәнд тәсәррүфаты илә сыхы әлагәдә олуб, өз мүвәффәгийәтләрини она верән бир әлмдир.

Өлкәмизин тәбии зәнкилийинин мейдана чыхарылмасы вә ондан истифадә әдилмәси мәсәләсинин һәлли ботаника әлминин әсас вәзифәләриндәндир. Габагчыл, прогрессив совет биолокиясы вә әлчә дә онун бир һиссәси олан ботаника әлминин инкишаф этдирилмәсиндә бөйүк рус халгы ичәрисиндән чыхмыш Тимирязев, Мичурин, Комаров кими бир чох алимләр олдуғча бөйүк рол ойнамышлар.

Ботаника әлминин кениш өйрәнилән әсас шө'бәләри: битки морфолокиясы, битки анатомиясы, битки систематикасы, битки физиолокиясы, битки биокимясы, битки чоғрафиясы вә эколокиясыдыр. Бу шө'бәләрин һәр бири мүстәгил бир әлм сайылмагла бәрабәр, бир-бирилә сых әлагәдә олуб, бири дикәрини тамамлайыр. Битки морфолокиясы биткиләрин харичи вә дахили гурулушларынын хүсусийәтиндән, битки анатомиясы (буна бир дә дахили морфолокия дейилир)—биткиләрин дахили гурулушларындан бәһс әдир. Битки систематикасы—тәкамүл принципи әсасында биткиләрин арасында готумлуг мүнасибәтләрини тә'йин әдәрәк онлары групплашдырыр. Битки физиолокиясы—биткиләрдә кедән һәяти просесләри вә онларын харичи мүһит шәраитиндән асылылығыны өйрәниб, һәмин хүсусийәтләри идарә этмәйин йолларыны айдынлашдырыр. Башга сөzlә, битки физиолокиясынын вәзифәси нәинки биткидәки һәяти һадисәләри айдынлашдырмаг, әйни заманда онларын инкишаф истигамәтини инсанын истәдийи тәрәфә йөнәлтмәйи өйрәдир.

Бөйүк рус алыми К. А. Тимирязев демишдир ки, физиолокия мүшаһидәчинин пассив ролу илә кифайәтләнә билмәз. О, тәврүбәчи олараг фәалдыр вә тәбиәти идарә әдәндир.

Битки биокимясы-битки физиолокиясы илә сых әлагәдардыр. Бунун вәзифәси битки организмдә кедән кимйәви просесләри өйрәнмәкдир. Битки чоғрафиясы (яхуд фиточоғрафия)—биткиләрин ер үзәриндә яйылмасыны, битки эколокиясы исә—биткиләр илә ону әһатә әдән мүһит шәраити арасындагы гаршылыглы әлагәни өйрәдир.

БИТКИЛЭРИН МОРФОЛОКИЯСЫ

БИТКИ МОРФОЛОКИЯСЫНЫН ТЭ'РИФИ ВЭЗИФЭСИ ВЭ ӨЙРЭНИЛМЭ МЕТОДЛАРЫ

Битки морфолокиясы¹ кениш мә'нада битки организмлеринин дахили вэ харичи формалары, гурулушлары вэ фэрди инкишафларынын тарихи һаггында, мәһдуд мә'нада исэ биткилерин һәм микроскопик, һәм дә макроскопик гурулушлары һаггында мә'лумат верир. Лакин, биткилерин дахили микроскопик гурулушундан ботаниканын хусуси саһәси олан битки анатомиясы даһа әтрафлы бәһс әдир. Дахили морфолокия (анатомия) илә харичи морфолокия арасында кәскин сәрһәд йохдур. Бунлары бир-бириндән фәрглендирән микроскопик вэ макроскопик тәдгигат методларыдыр.

Битки морфолокиясынын әсас вәзифәләри. Битки органларынын, мәсәлән, ярпагларын, будагларын, чичәк һиссәлеринин дүзүлүшлериндәки ганунауыгунлуглары айдынлашдырмаг, һабелә онларын бу вә я башга һиссәлеринин мәншәини тә'йин әтмәкдир.

Битки һиссәлеринин мәншәини вэ әйнийәтини мүәййәнләшдирмә, башлыча олараг биткилерин фәрди онтогенез² инкишафларыны өйрәнмә йолу илә мүмкүндүр. Мәсәлән, ярпаглы биткилердә тумурчуг ачылан заман айдын көрмәк олур ки, тумурчуг пулчуглары тәдричән әсл ярпаглара кечир. Бурадан белә бир нәтичәйә кәлмәк олар ки, пулчуглар инкишаф әтмәмиш вэ шәклини дәйишмәмиш ярпаглардыр. Битки морфолокиясы биткилерин һәр һансы һиссәлеринин һәгиги тәбиәтини, мәншәини өйрәндикдә макроскопик методла бирликдә айры-айры һалларда физиоложи вэ биокимйәви үсуллардан да истифадә әдир. Чо-халма органларынын истәр макроскопик, истәрсә микроскопик өйрәнилмәси морфолокия әлминә аиддир. Бурада апарылан микроскопик тәдгигатда мөгсәд һәмин органларын инкишафыны өйрәнмәкдир ки, бунула мүхтәлиф биткиләри мүгайисә әдәрәк, онларын мәншәини, тәбиәтини вэ тәкамүлүндәки дәйишикликләри айдынлашдырмаг мүмкүн олур. Векетатив органларын дахили

¹ «Морфе» юнанча форма, «логос» әлм демәкдир.

² «Онтос» юнанча һәгиги, доғрудан, «кенез» мәншә демәкдир.

микроскопик гурулушларыны өйрөнмөкдө мөгсөд биткинин һәятыны анламаг, онларын физиоложи везифэләрини изаһ этмәкдир ки, бу да анатомия аиддир. Битки морфолокиясынын әсас методу биткиләрин фәрди инкишафыны өйрөнмөкдән, нормал инкишаф этмиш биткинин үзәриндә мүшәһидә вә мүғайисә апармагдан ибарәтдир. Биткиләрдә олан аномаллыгдан, әйбәчәрликдән бәһс әдән хусуси морфолокия һиссәсинә тератолокия¹ дейилир ки, бу да бә'зән морфоложи мәсәләләрин һәллигә көмәк әдир. Мәсәлән, чичәк һиссәләринин бә'зән яшыллашмасы вә онларын яргаг формасына дүшмәси кими һал исбат әдир ки, чичәйин һиссәләри яргаглардан әмәлә кәлмишдир. Битки морфолокиясы биткиләри тәбии шәраитдә өйрөнмөкдәк башга, бир дә сүн'и шәраитдә тәчрүби үсул илә өйрәнир, белә ки, йүксәк вә ашағы дәрәчәли температура, рүтубәт, ишыг, яралама, гиданын дәйишмәси кими факторларла тәсир этмәклә мүәййән нәтичәләр әлдә әдилир.

Морфолокиянын биткиләрин филокенетик² инкишафынын изаһында да әһәмийәти вардыр. Филокения айры-айры битки группларынын, чинсләринин, нөвләринин тәкамүл нәтичәсиндәки инкишафындан бәһс әдир. Биткиләрин филокениясы башлыча олараг мүғайисәли морфоложи вә фитопалеонтоложик тәдгигатларә әсасланыр, филокения әйни заманда биткиләрдә әмәлә кәлән мүхтәлиф һиссәләрин мәншәини айдынлашдырмагә көмәк әдир.

Битки морфолокиясы биткиләрин харижи әләмәтләрини тәсвир этмәк зәрурәтиндән мейдана чыхмыш вә нәтичәдә морфолокия аид истилаһларын яранмасына сәбәб олмушдур.

Морфолокияда метаморфоз тә'лими һәр һансы бир битки органынын харижи шәраит тәсири нәтичәсиндә башга бир органа чеврилмәсини, онун сәбәбини, бундан башга мүхтәлиф битки группларынын фәрди инкишаф тарихинин өйрәнилмәси йолу илә биткиләрин инкишафындагы ганунауйғунлуғу айдынлашдырыр. Бу әлмин мүғайисәли морфолокия һиссәси бир битки группунун дикәр група кечә билмәси имканыны өйрәнир вә биткиләр әләминин тарихи инкишафынын әсасыны өйрәнмәклә мәшғул олур. Битки морфолокиясы бүтүн өз инкишафы мәрһәләләриндә битки систематикасы илә сыхы сурәтдә әлағәдардыр вә онун көмәкчиси.


БИТКИ ОРГАНИЗМЛӘРИНИН ФОРМАЧА МҮРӘККӘБЛӘШМӘСИ ВӘ ИНКИШАФЫ

Ер үзүндә әмәлә кәлән илк битки организмнин нә чүр олмасы бизә мә'лум дейилдир. Чох әһтимал ки, о, чох хырда вә бәсит шәкилдә имиш. Ән бәсит организм күрә шәкиллидир. Биз һазыр-

¹ «Terato» юнанча чинс, һал, гәрибә һадисә, әйбәчәр, «логос» әлм демәкдир.

² «Филон» юнанча нәсл, «кенезис» инкишаф, мәншә демәкдир.

да бир чох микроскопик хырда биткиләр таныйырыг¹. Онлардан бир чохунун организми күрә шәклиндәдир, мәсәлән: көк микроблары, хлорокок йосунлар вә и. а. (шәкил 1). Битки организмнин формасынын сонракы инкишафы онун гидаланмасы вә харижи мүһитин тәсири илә әлағәдардыр. Биткиләрдә формалашманын әсасы онларын организмләринин сәтһинин бөйүмәси йолу



Шәкил 1. Бир һүчәйрәли вә һүчәйрә гурулушлу олмаян йосунлар.

1—хлорокок; 2—батридиум; 3—каулерпа; шәкилдәкиләрдән (1—2 бөйүдүмүшләр; 3 исә кичилдәлмишдир).

илә кетмишдир ки, бу да гиданын чох олмасы илә әлағәдардыр. Беләликлә, тәдричән, күрәйә нисбәтән даһа кениш сәтһә малик олан мүхтәлиф формалы (силиндри, чубуг, лөвһә, сап шәкилли, будаглы вә с.) чанлылар әмәлә кәлмишдир. Буну һазырда яшаян бирһүчәйрәли бактерияларда, йосунларда вә көбәләкләрдә көрүрүк. Һүчәйрәнин һәчмчә бөйүмәси илә әлағәдар олараг бирһүчәйрәли битки формалары әмәлә кәлмишдир. Бунлар һүчәйрәләринин һәчми вә гурулушу әтибарилә ади һүчәйрәләрдән фәргләнир. Белә ири битки формаларынын сонракы тәкамүлү, һүчәйрәнин айры-айры һиссәләриндә везифә бөлкүсүндән ибарәтдир. Рүтубәтли торпагларда яшаян ботридиум йосунуну буна бир мисал кәстәрмәк олар. О, санчаг башы бойда күрәви шәкилдә олуп, торпағын ичәрисинә доғру рәнксиз сап шәклиндә чыхынтылар

¹ Әлбәтте, бунлар ер үзәриндә биринчи әмәлә кәлмиш организмләр һесабулуна билмәз, чүнки бир чохларынын һүчәйрә мөһтәвийятында дифференсия (айрылма) кетмишдир, гидаланмасы исә ихтисаслашмышдыр.


—ризоидлар верир. Ризоидлар торпагдан мѣлул Һалында минерал маддѣлѣр алыр вѣ кѣк вѣзифѣсини кѣрѣр (шѣкил 1, 2).

ДаҺа мѣрѣккѣб дифференсиасия дѣниз яшыл йосуну каулерпада кетмишдир. Бунун бѣ'зи нѣвлѣринин бирҺѣчѣйрѣли олмаларына бахмаяраг 30—100 см бѣйүклүйүндѣ олур. Бунлар дѣнизин дибиндѣ ерѣ сѣрилмиш Һалда яшайыр. Онларда цилиндр шѣкиндѣ кѣвдѣ ѣмѣлѣ кѣтирѣн Һиссѣлѣр олур ки, онларын да ашагы тѣрѣфлѣриндѣ сап шѣкиндѣ яланчы кѣклѣри (ризоидлѣри) вардыр. Бунлар субстрата япышмаг үчүн кѣкү ѣвѣз ѣдир. Каулерпа юхарыя доғру лѣвҺѣ шѣкиндѣ чыхынтылар верир вѣ бу чыхынтылар бир гѣдѣр ярпага бѣнзѣйир (шѣкил 1, 3).

Лакин биткилѣрин тѣкамүлү бирҺѣчѣйрѣлилѣрин (яхуд гѣйри Һѣчѣйрѣлилѣрин) сонракы инкишафы йолу илѣ давам ѣтмѣмиш-

дир. Кѣрүнүр ки, битки алѣминин Һѣлѣ илк инкишаф дѣврүндѣ тѣдричѣн тѣкҺѣчѣйрѣлилѣрдѣн чохҺѣчѣйрѣлилѣр ѣмѣлѣ кѣлмиш вѣ бунлардан да Һал-Һазыркы чохҺѣчѣйрѣли биткилѣр инкишаф ѣтмишдир. Һѣчѣйрѣлѣр бѣлүндүкдѣн сонра бир-бириндѣн айрылмамыш, харичи формалары бир олан вѣ ѣйни вѣзифѣ дашыян бир нечѣ, яхуд чох Һѣчѣйрѣдѣн ибарѣт олан колониялар ѣмѣлѣ кѣлмишдир (шѣкил 2).

Сонралар тѣкамүл колония Һѣчѣйрѣлѣринин арасында физиоложи вѣзифѣ бѣлкүсү йолу илѣ кетмиш вѣ бу да Һѣчѣйрѣлѣрин вѣзифѣ вѣ формача фѣрглѣнмѣсинѣ сѣбѣб олмушдур. Мѣсѣлѣн, биткини даяга (субстрата) бирлѣшдирѣн бир нечѣ Һѣчѣйрѣ хлорофилдѣн мѣһрум олмага бѣрабѣр бѣлүнмѣйѣ дѣгабил дейилдир. Биткинин бѣйүмѣсини тѣ'мин ѣдѣн Һѣчѣйрѣлѣр бой Һѣгтѣсинѣ топ-



Шѣкил 2. Калония вѣ чохҺѣчѣйрѣли йосунлар.

1—Сѣцѣдесмус; 2—плѣврокок; 3—улотрикс Һамысы бѣйүдүлмүшлѣр.

лашмышдыр ки, бунларын васитѣсилѣ кѣвдѣлѣр юхарыя, кѣклѣр исѣ ашагыя-доғру узанмышдыр. Биткилѣрдѣ харирик хусусийѣт тѣшкил ѣдѣн бу Һадисѣйѣ гүт блүк дейилир. Бу Һадисѣнин практики ѣҺѣмийѣти вардыр. ЧохҺѣчѣйрѣли битки формаларынын филокенетик инкишафлары, онларын будагланмасы, орган-

лары сѣтҺинин артмасы, Һѣчѣйрѣлѣрин мѣхтѣлиф истигамѣтлѣрдѣ чохалмасы, чох мѣрѣккѣблѣшмѣси органларда физиоложи вѣзифѣ бѣлкүсү илѣ изаҺ олунур. Сап шѣкилли организмлѣрин ян-яна бирлѣшмѣси вѣ я Һѣчѣйрѣлѣрин ики мѣстѣви үзрѣ бѣлүнмѣси нѣтичѣсиндѣ биртѣбѣгѣли лѣвҺѣ шѣкилли формалар ѣмѣлѣ кѣлмишдир. Йосунларда, кѣбѣлѣклѣрдѣ, шибѣйѣлѣрдѣ башлыча олараг сапларын бир-биринѣ Һѣрүлмѣси вѣ я, башга биткилѣрдѣ Һѣчѣйрѣлѣрин үч истигамѣтдѣ чохалмасы нѣтичѣсиндѣ чохҺѣчѣйрѣлилѣр вѣ үмумийѣтлѣ мѣ'лум олан мѣхтѣлиф битки формалары ѣмѣлѣ кѣлмишдир. Ибтидан биткилѣрдѣн бѣ'зи йосунларын, кѣбѣлѣклѣрин, шибѣйѣлѣрин, чийѣроту мамырларын бѣдѣнлѣри кими гурулуша малик биткилѣрѣ т а л л о м л и, яхуд тѣбѣгѣли (лайлы) биткилѣр ады верилмишдир. Сонракы тѣкамүл нѣтичѣсиндѣ биткилѣр тѣдричѣн су Һѣятындан чыхыб гуру Һѣятына уйғунлашараг, будагланан кѣвдѣ вѣ ярпаглар ѣмѣлѣ кѣтирмишдир. Белѣликлѣ, яшыл биткинин карбон газы вѣ ишыгдан истифадѣ ѣтмѣси үчүн уйғунлашмыш формасы ѣмѣлѣ кѣлмишдир. ѣввѣллѣр ер үзүндѣ ѣмѣлѣ кѣлѣн ибтидан биткилѣр субстрата инчѣ түклѣри илѣ япышырды ки, она да р и з о и д а д ы верилмишдир. Сонрадан биткилѣрин Һѣчмлѣринин артмасы вѣ гуруда ени саҺѣлѣр тутмалары илѣ ѣлагѣдар олараг, су вѣ минерал маддѣлѣри алмаг үчүн Һѣгиги вѣ мѣрѣккѣб гурулуша малик олан кѣклѣр инкишаф ѣтмишдир.


Биткилѣрдѣ кѣвдѣ вѣ ярпагларын ѣмѣлѣ кѣлмѣси факты, палеонтоложи материалын азлыгына кѣрѣ, нѣзѣри чѣҺѣтдѣн Һѣлѣ Һѣлл ѣдилмѣмишдир. Бѣ'зилѣри белѣ фѣрз ѣдирлѣр ки, ѣввѣлчѣ ярпаг шѣкилли органлар инкишаф ѣтмишдир, кѣвдѣ исѣ ярпаглары ѣзүндѣ бирлѣшдиричи орган олдуғундан, сонралар ѣмѣлѣ кѣлмишдир. Бѣ'зилѣри исѣ белѣ фѣрз ѣдирлѣр ки, куя ярпаг вѣ кѣвдѣ ѣйли заманда инкишаф ѣтмишдир вѣ бунларын Һѣр бири ѣйни галломдан хусуси бир орган олараг айрылмышдыр. НѣҺайѣт, бѣ'зилѣри дѣ белѣ фѣрз ѣдирлѣр ки, ѣввѣлчѣ кѣвдѣйѣ охшар орган инкишаф ѣтмиш вѣ бунун да үзѣриндѣ сонралар бир чыхынты кими ярпаглар ѣмѣлѣ кѣлмишдир. Бу яхынларда тапылан писилофитлѣрин галыглары үзѣриндѣ апарылан мүгайисѣли фитопалеонтоложи тѣдгигат бу ахырынчы нѣзѣрийѣнин доғру олдуғуну кѣстѣрир.

ѣСАС МОРФОЛОЖИ АНЛАЙЫШЛАР

Будагланма. Биткилѣрдѣ ѣсас ѣ'тибарилѣ үч чүр будагланма олур: 1) д и х о т о м и к¹ (чүт-чүт), яхуд яба шѣкилли будагланма, бу заман бой Һѣгтѣси ики ерѣ бѣлүнүр ки, бунларда Һѣр бири ѣйни дѣрѣчѣдѣ инкишаф ѣтмиш будаглар ѣмѣлѣ кѣтирир. Дихотомик будагланма: ѣсас ѣ'тибарилѣ ибтидан биткилѣрдѣ,

¹ «Дихотомик» юнанча икинчѣ бѣлүрѣм дѣмѣкдир.

йосунларын бир чохунда, бә'зи көбәләкләрдә, чийәроту мамырларында, плаунларда олур (шәкил 3, 1), 2) моноподиал¹, (тәк-тәк) вә я гейри-мүәййән будагланма; бурада көвдәниң әсас охунун бой нөгтәси узунуна инкишафдан галмыр вә бой нөгтәсинин ашағысындан ян будаглар әмәлә кәлир.



Шәкил 3. Будагланмаларын схемасы.

1—Дихотомик; 2—моноподиал; 3—симподиал. Әйни рум рәгәмләрлә әйни типли будаглар кәстәриламидир.

Типик һалларда бу будаглар әсас будаға нисбәтән зәиф олур (шәкил 3-2). Моноподиал будагланма йосунларда, бир чох көбәләкләрдә, ярпаглы мамырларда, гатыргуйругларында, тохумлу биткиләрдән йолкада, шамда, фыстыгда, ағчагайынларын вә отларын бә'зи нөвләриндә тәсадүф эдилир. Моноподиал будагланмада яланчы дихотомия әмәлә кәлә биләр, бу заман әсас охун үч нөгтәси инкишафдан галараг, онун дибиндән аз-чох бир-биринә битишик будаглар әмәлә кәлир, мәсәлән, бағабурчунда (ярым-паразит биткидир), ат шабалыдында (шәкил 4), ясәмәндә вә я диахазия адланан чичәк группларында олдуғу кими.


Чох тәсадүф олунан будагланмалардан бири дә симподиал² вә яхуд мүәййән будагланмадыр. Бу һәм дихотомиядан, һәм дә моноподиядан әмәлә кәлә биләр. Дихотомиядан әмәлә кәлдикдә будаглардан бири даһа чох инкишаф эдәрәк әсас охун истигамәтиндә яна узаныр вә беләликлә симподия әмәлә кәлир.

¹ «Монос» юнанча бир, «подос», аяг, тәкчә, будаг демәкдир.

² «Сим» юнанча бир ердә, янбаян.


Белә бир дихотомиядан әмәлә кәлмиш симподияны селакинелла плаунунда көрүрүк.

Моноподиядан симподия әмәлә кәлдикдә исә моноподиянын әсас оху даһа бөйүмүр вә я яна тәрәф мейл эдир, онун ерини үчун дибиндә әмәлә кәлән вә әсас ох истигамәтиндә инкишаф эдән будаг тутур; сонралар бу будаг да инкишафдан галараг яна мейил эдир вә ону да ени ян будаг әвәз эдир вә и. а. (шәкил 5). Белә моноподиядан әмәлә кәлмиш симподиялары бир чох ағач вә от биткиләриндә көрмәк олар, мәсәлән: чөкәдә, фындыгда, сөйүдә, гоз ағачында, говагда, габагчичәклиләрдә, бадымчанчичәклиләрдә, бир чох



Шәкил 4. Ат шабалыды биткисинин будағында яланчы һачаланма (дихотомия).

а) әсас көвдәниң бөйүмә нөгтәсинин изидир; с ағ вә солла дибиндә ярпаг изләри олан голтуғ тумурчугларыдыр; р—ярпаг вә тумурчуг пулчугларынын изләри.



Шәкил 5. Дихотомик будагланмадан (3) моноподиал будагланмаға кечид (1, 2).


тахыл биткиләринин көкәбәнзәр көвдәләриндә вә саирәдә олдуғу кими. Бу чүр будагланманы асан билмәк олар, чүнки мәншә әтибарилә ян тумурчугдан әмәлә кәлмиш будаглардыр. Бунлар ярпаг вә я пулчугларын голтуғунда ерләшир.

Будагланма формалары вә мигдары, будагларын истигамәти, ярпагланма дәрәчәси (хүсусән от биткиләриндә) вә ярпагларын хүсусийәти биткинин харичи көрүнүшүнү тәйин эдир ки, бунун васитәсилә дә биткини асан танымаг олур.

Кәстәрилән будагланма формаларына нәинки көвдәләрдә, һәтта биткиләрин чичәк группларында да тәсадүф эдилир. Ян будагларын вә я һәр һансы бир органын мүәййән истигамәтдә ардычыл бөйүмәси учдан дибә доғру кедирсә, буна акропетал

бөйүмө дейилир¹. Бунун аксинэ олараг бэ'зи биткилөрдө органларын бөйүмөси дибдөн уча доғру кедирсэ, буна да базипетал² бөйүмө дейилир, бу чүр бөйүмө йосунларын будагланмаларында, тохумлу биткилөрдө ярпагларын бөйүмөлөриндө мүшанидө олунур.

Симметрия һадисәси. Симметрия³ һадисәси тәбиәтдә кеңиш яйылмышдыр. Буна кристалларын, биткиләрин вә һейванларын гурулушунда чох тәсадүф эдилир. Биткинин һәр һансы бир органындан симметрик сәтһи кечирмәклә ону ики бәрабәр һиссәйә бөлмәк мүмкүн олурса һәммин орган симметрик гурулушлу һесап эдилир. Әкәр биткинин һәр һансы һиссәсиндән узунуна үч вә я үчдән артыг симметрия сәтһи кечирилә биләрсә, о заман белә гурулуша полисимметрик⁴, яхуд радиал⁵ актиноморф⁶ дейилир. Буна көвдәләр үзәриндә ярпагларын гаршыгаршыя дүзүлмәси, малдили биткиләриндә цилиндр вә күрә шәкилли көвдәләр, бир чох биткиләрин көвдә вә көкләринин анатомик гурулушу, бэ'зи чичәкләрин тачлары, итбурну, алма, лалә, кәләм, гәрәнфил вә саирәнин чичәкләри мисал ола биләр (шәкил 6—7).



Шәкил 6. Чичәк.


1—моносимметрик я да зигоморф; 2—полисимметрик я да актиноморф; 3—асимметрик.

Әкәр биткинин һәр һансы һиссәсиндән ялыз ики симметрия сәтһи кечирилә биләрсә, о заман бу биссимметрик⁷ адланыр, мәсәлән: ясты көвдәли малдили биткисинин көвдәси, замбаг биткисинин гылынч шәкилли ярпаглары вә и. а. Әкәр биткинин һәр һансы һиссәсиндән ялыз бирчә симметрия сәтһи кечирмәк мүм-

күн оларса, она, моносимметрик¹, яхуд садәчә симметрик дейилир. Бир сыра биткиләрин ярпаглары моносимметрикдир, чүнки онларын ярпагларынын ортасындан кечән әсас дамар ярпағы ики бәрабәр сағ вә сол һиссәйә бөлүр (шәкил 7, 1), һәмчинин бир сыра биткиләрин чичәкләри моносимметрикдир (шәкил 6, 1). мәсәлән, бөнөвшә, итағзы, нохуд, кичиткән вә саир биткиләрин чичәкләри кими. Белә чичәкләр зигоморф² адланыр. Әкәр биткинин көтүрүлән һиссәсиндән һеч бир симметрик сәтһи кечирмәк мүмкүн дейилдирсә, она асимметрик³, дейилир. Буна али биткилөрдә надир һалларда тәсадүф олунур, мәсәлән: гараағач вә дағдаған биткисинин ярпаглары (шәкил 7—2), канна, пишикоту биткисинин чичәкләри кими (шәкил 6, 3).

Көстәрилән симметрик гурулушлар арасында кечид формаларына да раст кәлмәк олар. Эйни орган мүхтәлиф чәһәтдән мүхтәлиф гурулуша малик симметрик ола биләр, мәсәлән, тахылларын көвдәләри, анатомик чәһәтдән полисимметрик вә ярпагларынын дүзүлүшү чәһәтдән бисимметрикдир. Биткиләрин горизонтал вәзиййәтдә дүзүлүшү һиссәләринин үст сәтһи илә алт сәтһи арасында чох фәрг олур ки, буна дорзовентрал⁴ гурулуш дейилир. Мәсәлән, аз-чох горизонтал вәзиййәтдә даынмыш ярпагларын әксәриййәтинин анатомик вә морфоложи гурулушлары дорзовентрал сайыла биләр.

Чох заман биткиләрин органларыны ортотроп⁵, планкиотроп⁶ ады илә ики група бөлүрләр. Ортотроп органлар дик дуранлара, планкиотроп исә горизонтал дуранлара дейилир. Биринчийә, әсас көвдә вә торпаға дүз кедән әсас (ана) көк мисал ола биләр. Горизонтал вә я чәп дуран планкиотроп органлара ибтидаи биткилөрдән бир чохларынын лентшәкилли вә я лөвһәшәкилли талломларыны мисал көстөрмәк олар. Бә'зән эйни ор-



Шәкил 7.

1—Моносимметрик ярпаг; 2—асимметрик ярпаг.

1 «Акрос» юнанча тәпә вә «пето» латынча истигамәт верирәм демәкдир.

2 «Базис»—диб демәкдир.

3 «Симметрия» юнанча тәнлик, тәнәсүблүк, уйғунлуг демәкдир.

4 «Полис» юнанча чох демәкдир.

5 «Радиус» юнанча ағач тәкәрин пәрләри демәкдир.

6 «Актис» юнанча шүә, «морф» форма демәкдир.

7 «Бис» юнанча боюндуруг (мәчағи мәнада ики симметрик гошгусу олан араба) демәкдир.

1 «Моно» юнанча тәк, ваһид, бир демәкдир.

2 «Зигос» юнанча чүт демәкдир.

3 «а» юнанча янкар шәкилчисидир.

4 «Дорзум» юнанча архадан, «вентал» гарын демәкдир.

5 «Ортос» юнанча дүз, «тропос» фырланма, истигамәт демәкдир.

6 «Плагнос», юнанча чәп, эниә демәкдир.

ган эвваллэр ортотроп олдуғу һалда, сонралар вэзиййэтини дәйишдиерэк плакиотроп һалыны алыр. Бу һал нормал вэ артыг инкишаф шэраитиндэ ола билэр, мәсәлә, дик галхан ортотроп будаглардан бирини кәссәк, она яхын будаглардан бири эввалтә һоризонтал вэзиййәтдә узанаһаг, сонрадан юхарыя доғру дик галһаһагдыр. Белә бир хуһсусиййәтин мейвәчилиһкдә, бәзәк ағачы биткиләринә форма вермәкдә әһәмиййәти вардыр.

МЕТАМОРФОЗ, ГОМОЛОКИЯ, АНАЛОКИЯ, РЕДУКСИЯ ВЭ АТАВИЗМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Чох муһтәлиф шәкилдә олан али биткинин үч әсас векеетатив органыны көстәрмәк олар: көк, көвдә вэ ярпаг. Бу органлар хариһи шэраитин дәйишилмәсиндән асылы олараг өз вэзифә вэ шәкилләрини тамаһилә дәйишир ки, буна метаморфоза¹ дейлир. Бу дәйишикликләр ирсән мөһкәмләнмиш төрәмәләр әмәлә кәтирир ки, бу төрәмәләрин дә һансы органдан әмәлә кәлдийини бә'зән тә'йин этмәк мүмкүн олур. Мәсәлә, чичәйин бүтүн һиссәләри—каса ярпағлары, ләчәкләр, әркәкчиһкләр, дишичиһкләр шәкили дәйишмиш ярпағлардыр. Ноһудун, мәрчинин бығчығлары ярпағын метоморфозудур, тәнәк, хияр вэ габағын бығчығлары исә көвдәнин метаморфозудур. Тиканлар, бә'зи биткиләрдә, мәсәлә, зәринчдә ярпағын, акасияда ярпагалтлығынын, нар, әзһил вэ көйәмдә көвдәнин метаморфозудур. Бундан белә нәтичә чыхыр ки, хариһи көрүнүшү илә бир-биринә охшар төрәмәләр муһтәлиф мәншәли ола биләр вэ битки организмнин әйни органлары тамаһилә башга төрәмәләрә чеврилә биләр. Мәсәлә, ярпағлар чичәйин һиссәләринә, тиканлара, бығчығлара вэ саирәйә чеврилә биләр. Әйни органдан әмәлә кәлиб, анһаг вэзифәсиндән асылы олараг муһтәлиф шәклә; гурулуша малик органлара һомоложи² органлар дейлир. Мәсәлә, зәринчин тиканлары, чичәйин каса ярпағлары, ләчәкләри, әркәкчиһкләри, дишичиһкләри муһтәлиф шәклә дүшмүш ярпағларын һомоложисидир (шәкил 8). Һомолокияны өйрәнмәклә муһтәлиф органларын вэ онларын һиссәләринин мәншәлини дүзкүн изаһ этмәк мүмкүн олур; бунун әйни заманда тәһамүл просесинин изаһында бөйүк әһәмиййәти вардыр.

Өз морфоложи мәншәли әтибарилә муһтәлиф органлардан әмәлә кәләрәк әйни вэзифә даһшыян вэ хариһи көрүнүшү бир олан органлара аналожи³ органлар дейлир (шәкил 9).


Аналоги органлара зәринч, әзһил, нар, күл, итбурнунун тиканлары мисал ола биләр; бу тиканлар зәринчдә ярпагдан, әзһил вэ нарда көвдәдән күл вэ итбурнунда көвдәнин өртүк тохумаларынын чыхынтысындан әмәлә кәлмишди.

¹ «Метаморфозис» юһанһа чеврилмә, дөнмә демәкдир.

² «Һомоложи» разылыг, һәмрә'йлиг демәкдир.

³ «Аналокиа» юһанһа муваһигһлик, уйғунлуғ демәкдир.

Хариһи көрүнүшү әйни олуб, муһтәлиф систематик группара мәнсуб олан биткиләрә конвергент¹ дейлир. Буна бизим шоран ерләрдә раст кәлән гараган биткиси вэ пәлпәтөйүнүн бә'зи




Шәкил 8. Ярпаг вэ онун һомоложи органлары.


1—Ноһудун ярпагалтлығылар илә бирлиһкдә ләләк шәкилли мүрәккәб ярпағы; 2—палыдын нормал ярпағы; 3—көкүмсов көвдәдә пулчуғлар; 4—күпәли биткидә күпәләр; 5—тарла ағбурһағы биткисиндә ярпагалтлығы вэ бығчыг; 6—һичәкдә каса ярпағлары, тәһ ярпағлары, әркәкчиһкләр вэ дишичиһ; 7—һатыр гуруғунун битишмиш ярпағлары; 8—зәринчдә тиканчығлар; 9—ротанга һалмасында ләләкшәкилли илишән ярпағлар; 10—тумурһуғ пулчуғлары. 11—күнһичәйи биткисиндә бир-биринә яһышмиш иһи (л) ярпағлар.

һөвләри мисал ола биләр. Бунлар әйни торпаг шэраитиндә (гураг, шоран) әмәлә кәлдийиндән, әтли ярпағлары илә бир биринә охшайыр, лаһин чичәкләринин гурулушуна көрә муһтәлиф систематик группара аиддириләр. Башга бир мисал олараг сәһраларда битән малдили вэ сүддийәни дә көстәрә биләрик (шәкил 10).

¹ «Кон» латынһа бир ердә, «веруерс» чалышмағ, мейл этмәк демәкдир.



Шәкил 9. Мүхтәлиф биткиләрнән аналогик органлары:
1—Алария йосунунун диньдәки ризоидләр; 2—каулерпа йосунунун ризоидләр; 3—эдогония йосунунун ашағы учундагы ризоидләр; 4—эмәкәмәчнәннән көкү; 5—синсефалис көбәләйиннән ризоидләр; 6—мамьрын ризоидләр; 7—салвиния биткисиннән ярпаг көкләри; 8—(чапан) фалиус көбәләйиндә митосис чыгыштылары.



Шәкил 10. Сағда сүддийән, солда малдыли биткиләрнән чичәклә һиссәләри вә мейвәләри.

Бир чох битки органларында редукция-ихтисар олуыма адланан һадисә мұшәһидә олунур. Бу һадисә узун мүддәт бу вә ядикәр органа әһтияч олмамасы нәтижәсиндә әмәлә кәлир. Белә бир һадисә, вахтилә яхшы инкишаф әтмиш мүрәккәб гурулушлу һәр һансы органын мөвчүд шәраитин дәйишмәси сәбәбилә инкишафдан галараг шәклини вә вәзифәсини итирмәси нәтижәсиндә баш верир. һәмин органа редукция әтмиш орган дейилир.

Редукция һадисәсинә бә'зи тохумлу биткиләрнән ярпаглары мисал ола биләр. Мәсәлән: гуланчарын, сүмүркәнин (паразит) вә картоф юмруларынын ярпаглары редукция уғрайаг сарым-тыл, гонур рәңкли пулчутлар һалыны алмышдыр. Бирләпәли биткиләрнән чохунун ана көкү редукция әтмишдир.

Бир сыра биткиләрдә мүйәйән органлар инкишаф әтмәйәрәк тамамилә теләф олур ки, буна һәмин һиссәнин итмәси дейилир. Бу һадисәни бир-биринә яхын олан нөвләри, мугайисә әтмәклә тәйин әтмәк олар. Редукция вә мә'лум һиссәнин итмәси һадисәләри чох вахт чичәйин янлыгында, әркәкчикләрдә вә чичәйин башга һиссәләриндә мұшәһидә олунур; мәсәлән: тахылларда әркәкчикләр 6-дан 3-ә вә я 1-ә гәдәр редукция әтмишдир, хаччәкчәклиләрдә чичәк группунун өртүк ярпаглары, гызыл сармашыгда исә ярпаглар инкишаф әтмәйәрәк итмишдир. Бә'зи һалларда редукциянын вә һиссәләрин итмәсинин сәбәби мә'лум дейилдир (мәсәлән бирләпәлиләрдә ана көкүн редукциячы кими). Дикәр һалларда исә органы редукциясы онларын лазым олмамасы илә (мәсәлән, паразит вә сапрафит биткиләрдә яшыл ярпаглар әһтияч олмамасы), һабелә тиданын азлыгы вә башга сәбәбләри илә изаһ олунур.

Чох вахт органын ибтидаи гурулушда олмасы вә я икинчи дәрәҗә садәлийә, редукция уғрамасы (мәсәлән, сөйүд, гоз, фындыг, чинар чичәкләрнән садә гурулушу, редукция вә я һиссә итирмә һадисәләри), сәбәбини мүйәйән әтмәк чәтинлик тәрәдир. Белә ки, бә'зи органларын гурулушунда олан садәлик, мүрәккәблилик вә тәкамүл инкишафы бир-биринә уйғун кәлмир. Бу һалда ән чох али биткиләрдә тәсадүф олунур. Чүнки онларда хариҗи шәраитдән асылы олараг мүрәккәбләшмә вә садәләшмәйә тез-тез тәсадүф әдилир. Әкәр садәлик биринчи әләмәт һесап олунарса, о заман сөйүд, гоз, фындыг, чинар кими чичәк гурулушу садә оланлар тәкамүл просесиндә чичәкләри яхшы инкишаф әтмиш гурдобағанлардан, тахыллардан, замбаг чичәкләрдән ашағыда олмалыдыр.

Бә'зән биткиләрдә һәмин нөвә дейил, онун әчдадына хас олан бир әләмәт әмәлә кәлир ки, буна да атавизм¹ дейилир. Мәсәлән: нормал һалда бирчинсли олан чичәкдә бә'зән икинчи

¹ «Атавус» латынча улу валидейн, узак әчдад демәкдир.

чинси орган эмәлә кәлмәси вә я гарғыдалы биткисинин эркәк чичәк группунда диши чичәкләрин эмәлә кәлмәси кими.


Атавизм илә әлагәдар олан бир дә биокенетик ганун вардыр. Бу гануна кәрә, һәр һансы организмн онтокенетик инкишафында, хусусән онун чаван дөврләриндә айры-айры органларынын филокенетик инкишафы гысача олараг вә аз-чох шәклини дәйишмиш һалда тәкрар олунур. Мәсәлән, биткиләрдән бир чохунун чаван чүчәртиләриндә эмәлә кәлән ярпаглар онун яхшы нөвләринин нормал ярпагларына охшамыр, анчаг она яхын олан нөвләрин вә онун әчдады фәрз олуналарын ярпагларына охшайыр. Һәрәкәт этмәйән йосунлардан бәзиләри илк инкишаф дөврләриндә зооспорлар эмәлә кәтирир (шәкил 11, 3), бу да онла-

рын гамчылары илә һәрәкәт әдән әчдаларындан инкишаф әтмәләрини кәстәрир.

Битки органлары арасында олан гаршылыглы мүнәсибәтә адәтән коррелясия дейилир. Бу һадисәнин практикк әһәмийәти вардыр.


Мәсәлән, ағачларын вә колларын голтуг тумурчугларындан жәләчәк илдә нормал инкишаф нәтижәсиндә будаглар эмәлә кәлир.

Анчаг онун янындакы ярпаглары вахтындан әввәм гопарсаг, һәмин илдәчә бу тумурчуглар инкишаф әдәр. Памбығын ана көвдәсинин вә ян бой (мейвә вермәйән) будагларынын башынын



Шәкил 12. Ики ләпәли биткиләрдә векетатив органларын вәзийәти схем.

а—көвдәнин тәпәси; б—рудимент ярпаглар; в—бәјүмә конусу; г—чаван ярпаг; д—чичәк верән зоғ; е—янбудак; з—ян тумурчуг; и—ярпаг; к—нәгләдичи тохума; л—ләпәләр; м—ләпәнин голтуғундакы тумурчуг; н—көкүн үч һиссәси; о—көк үскүйү; р—әмичи телләр.



Шәкил 11. Зооспорлар.

1—Улотрикс йосунунун векетатив сапындан бир парча; 2—һәмин сапта зооспорун эмәлә кәлмәси; 3—онун зооспору; 4—конферва йосунунун ики зооспору.

вурулмасы гита маддәләринин мейвә верән будагларә кетмәсинә сәбәб олур ки, бунун да нәтижәсиндә чичәкләр төкүлмүр вә гутучуглар тез етишмәклә мәһсул чохалыр. Яхуд түтүн кими бәзи мәдәни биткиләрин көвдәләри учларынын, хусусән чичәк группарынын вә я будагларынын гырылмасы ярпагларын ириләшмәсинә сәбәб олур. Парникдә бечәрилән говунун (емишин) эсас вә биринчи ян будагларынын дидилмәсилә юхарыдакы ян будагларда артыг

мигдарда мейвə верəн диши чичəклəрин инкишафына тə'сир этмəк олур. Əкилən шитиллəрдə ана кəкүн учуну кəсмəк ян кəклəрин тез вə яхшы инкишаф этмəснини тə'мин эдир.

ВЕКЕТАТИВ ОРГАНЛАР

Биткилəрдə фəрди яшайыша кəмəк эдən органлара веке-
татив органлар дейилир.

Али биткилəрдə кəк, ярпаг вə кəвдə веке-
татив органлардыр. Кəкүн вəзифəsi биткини субстрата бирлəшдирмəк вə ондан су вə минерал маддэлəр алмагдыр. Ярпагларын əсас вəзифəsi битки-
лəрə лазым олан ўзви маддэлəри һазырламаг, сую бухарландыр-
маг вə газ мұбадилəсини тə'мин этмəкдир.

Кəвдə, ўзəриндə ярпаглары элверилиши вəзиййəтдə сахлаян вə торпагдан алынган гита маддэлəринин ярпага, ярпагда һазыр-
ланан ўзви маддэлəри исə кəклəрə вə башга органлара кечирən
органдыр. Ярпаглары олан кəвдə һиссəсинə зə'ф дейилир. Бунлар
ағач вə кол биткилəриндə əсас кəвдə вə будаглардан фəрглənир.

Ибтидан биткилəрдə веке-
татив органларын вəзифəсини тал-
лома кəрүр. Бунларда биткинин бəдəни кəк, кəвдə вə ярпаг кими
органлара чох аз айрылыр.

КӨК

Кəкүн морфоложи тə'йини. Һəр һансы мұһитдə ярпаг вə
мүəййən гайда ўзрə дүзүлмүш тумурчуглардан мəһрум олан
битки органына кəк дейилир. Кəк, биткинин Һəр һансы һиссə-
синдən əмəлə кəлə билəр. Онларын учунда əксəрən кəк ўскүйү вə
я микориза олур. Кəк һəмишə морфоложи учдан бөйүйүр вə эн-
докен будагланма (дахилиндən төрəмə), хұсусиййəтинə маликдир.

Ана вə ян кəклəр. Кəк биткилəрин су һəятындан чыхыб гуру
һəятына алышмалары нəтичəсиндə əмəлə кəлмишдир. Гуруя кеч-
миш ибтидан биткилəрдən субстратын дəринликлəринə чох соху-
ла билəнлəр орада яхшы мəһкəмлəшəрəк рүтүбəти вə минерал
гита маддэлəрини чох ала билəнлəр ўстүнлүк газаныб һазырки
кəклү биткилəрин əчдадыны əмəлə кəтирмишдир. Һазырда яшаян
спорлу биткилəрдən гыжылар, гатыргуйруғлар, плаунылар вə
тохумлу биткилəрдə кəк яхшы инкишаф этмиш вə мурəккəб ана-
томик гурулуша маликдир.

Əсас э'тибарилə кəклəр торпагда олуб, биткинин ердə мəһкəм
даянмасыны, хұсусən торпагдан гита маддэлəри алмасыны тə'-
мин эдир. Адəтən икилəпəлилəрин рүшəйминдə олан кəк, тохум
чүчəрən заман харичə чыхыр, сонра инкишаф эдəрəк а н а к ə к ү
əмəлə кəтирир. Ана кəк илə кəвдə арасында олан һиссəйə кəк
б о г а з ы дейилир. Кəк боғазы илə кəвдə ўзəриндəки рүшəйм
ярпаглары (лəпəлəр) арасында галан һиссəйə л ə п ə л т ы д и з -
ч и к дейилир (шəкил 12).

Ана кəкүн будагларына я н к ə к л ə р дейилир. Бунлар тохум-
лу биткилəрдə эндокен¹ олараг кəкүн дахили һиссəсиндə перисикл-
дən əмəлə кəлир. Һəр ян кəк өз нəвбəсиндə биринчи, икинчи,
ўчүнчү вə и. а. дəрəчəдə будагланыр.

Əлавə кəклəр. Бир сыра биткилəрдə а н а вə ян кəклəрдən
башга ə л а в ə кəклəр дə əмəлə кəлир. Бу кəклəр гурулуш-
лары вə вəзифəлəри э'тибарилə а н а вə ян кəклəрдən фəрглənмир.
Əлавə кəклəр кəвдə вə ярпаглардан əмəлə кəлир.

Биткилəрин һəятында əлавə кəклəрин əһəмиййəти чох бөйүк-
дүр, онлар кəк системинин мигдарыны артырыр, а н а кəк вə ян
кəклəр олмаян биткилəрдə онлары əвəз эдир. Мəсəлən бир чох бир-
лəпəли биткилəрдə а н а кəк тез бир заманда инкишафдан галыр,
кəвдəнин ашағы һиссəсиндən əлавə кəклəр əмəлə кəлир. Икилəпə-
ли биткилəрдə исə əлавə кəклəр лəпəалты дизчик дə əмəлə кəлир.
Биткичиликдə əлавə кəклəрин инкишафыны сүр'əтлəндирмəк вə
кəк системинин мигдарыны артырмаг ўчүн биткинин дибини тор-
пагла долдурмаг əсас методдур. Əтрафына торпаг долдурмаг кəв-
дəдə əлавə кəклəр əмəлə кəтирмəклə биткинин механики тə'сир-
лəрə яхшы давамлы олмасыны вə яхшы гиталанмасыны тə'мин
эдир. Əлавə кəклəр сүрүнən кəвдəлəрдə (ярпагларын дибиндəки
дүйүнлəрдə) ералты кəвдə олан кəкүмсов кəвдəлəрдə, соғанаг
кəвдəлəрин дибчик һиссəсиндə вə саирəдə əмəлə кəлир.


Нəһайəт гейд этмəк лазымдыр ки, кəвдəлəрин, чичəклəрин,
соғанаглыларын, кəвдə юмуруларынын, ярпагларын əлавə кəк
вермəк габилыййəтинə малик олмасынын веке-
татив чохалмада бөйүк əһəмиййəти вардыр.

И. В. Мичурин кəстəрмишдир ки, тəбии шəраитдə əлавə кəк
əмəлə кəтирмəйən бир сыра биткилəр дə сүн'и сурəтдə əлавə кəк
əмəлə кəтиртмəк вə кəлəчəк нəсиллəрдə сүн'и əлавə кəк əмəлə
кəтиртмəни тəкрар этмəклə бу хұсусиййəти инкишаф этдириб
ирсилəшдирмəк олар.

Кəклəрин формалары вə характер хұсусиййəтлəри. Али бит-
килəрин əксəриййəтинин кəклəри торпағын ичəрисиндə олур ки,
бунлара е р а л т ы кəклəр дейилир. Ералты кəклəр форма
э'тибарилə əксəрən сап вə я кəндир шəкилли олур. Бундан башга,
кəклəр аз-чох ий-(конусшəкилли), турп шəкилли (шəкил 13),
юмру, узунсов, йоғунлашмыш (кəк гозалары) вə саир форма-
ларда олур. Узунлуғу вə йоғунлуғу э'тибарилə ян кəклəрдən
ўстүн олан кəкə а н а кəк дейилир. (мəсəлən, памбыг, нохуд вə
күнəбахан кəклəри кими) (шəкил 13, 4). Ана кəкү һеч инкишаф
этмəйən вə я зəйф инкишаф эдən кəклəрə с а ч а г л ы в ə я д ə с т ə
кəк дейилир (мəсəлən, тахыл вə соғанын кəклəри кими) (шə-
кил 13, 5). Кəкү кəвдəдən айыран хұсусиййəт, кəкүн учларында
кəк ўскүйүнүн олмасы вə нормал һалда кəкдə ярпаг вə тумурчуг-
ларын олмамасыдыр.


¹ «Эндо» юнанча дахил вə я дахили дəмəкдир.

Көкүн учундан (көк үскүйүндөн) бир гэдэр юхарыда сых түкләр олур ки, бунлара эми ч и т е л л ә р дейилир. Бу түкләр чаван көкүн үст габыг һүчейрәләринин узанмасындан эмәлә кәлән чыхынтылардыр. Буңлар торпағын һиссәләри арасына сохулараг онун дахили: тә олан сую вә суда һәлл олунмуш минерал маддә-



Шәкил 13. Мүхтәлиф көк формалары:
1—сап шәкилли; 2—ий шәкилли; 3—турп шәкилли;
4—вертикал; 5—сачаглы.

ләри алып, беләликлә дә эми ч и т е л л ә р биткиләрин субстратдан гидаланмасыны тәмин эдир. Көһнә эми ч и т е л л ә р адәтән гуруюб төкүлүр. Бу сәбәбдән көкүн чох һиссәси эми ч и т е л л ә рдән мәһрум олур. Эми ч и т е л л ә р көкүн сорма сәһнини бир нечә дәфә артырыр. Эми ч и т е л л ә р биткинин гидаланмасында бөйүк рол ойнадыгын-дан шитилин дартылыб ердән чыхарылмасы битки үчүн зияндыр, чүнки бу заман көкүн эми ч и т е л л ә ри олан һиссәси гырылыб тор-



Шәкил 14. Пентастемон (*Pentastemon*) биткисинин:
1—чөчәртис эми ч и т е л л ә ринә торпаг һиссәләри япышмыш һалы; 2—торпаг һиссәсиндән ююлмуш һалы; 3—эми ч и т е л л ә ри торпаг ичәрисиндә олан көкүн уч һиссәси (10 дәфә бөйүдүлмүшдүр); 4—торпаг һиссәләри илә бирләшмиш олан айры-айры эми ч и т е л л ә р; 5—көк үскүйү илә бир-ликдә көк учунун узунуна кәсийи (60 дәфә бөйүдүлмүшдүр).

пагда галыр. Шитилин гурумамасы вә эми ч и т е л л ә рин тәләф олмамасы үчүн шитил чыхарылан заман көкүн әтрафында бир гэдәр торпаг галмалыдыр (шәкил 14).

Бир чох паразит су биткиләринин көкләриндә, һабелә һава көкләриндә, эми ч и т е л л ә р олмур, чүнки онлара әһтияч йохдур. Торпагда күллү мигдарда эми ч и т е л л ә р эмәлә кәтирән биткиләр суда сүн'и сурәтдә бечәрилдикдә эми ч и т е л л ә р чох зәиф эмәлә кәлир вә я һеч эмәлә кәлмир.


Көк системинин инкишаф дәрәчәси. Биткинин тохуму чүчәрән заман көк системи ерүстү орган-ларындан даһа габаг инкишаф эдәрәк торпага сохулур. Мәсәлән: соғанын көкү 0,6 м дәринә, 60 см янлара, баш кәләмин көкү 1,4 м дәринә, 1,2 метрә гэдәр янлара, әркөкүнүн көкү 2 м-дән артыг дәринә, 1,5 м янлара, гангалын көкү 6 м-дән артыг дәринә кедир. Хүсусән гумлуг вә гаялыг ерләрин биткиләриндә көкләр чох дәр-инә кедир. Абшеронун гумлу вә чынгыллы тор-пагларындакы тәнәйин көкү 6 м-дән даһа чох дәринә вә 4 метрә гэдәр әтрафа узаныр.

Бүтүн мәдәни тахыл биткиләринин һәр би-риндә көкүн үмуми узунлуғу 500—600 м, бугда-нын эми ч и т е л л ә ринин үмуми узунлуғу 20 км, габаг биткисинин көкләринин үмуми узунлуғу 25 км гэдәр олур.

Көкүн дәринә вә янлара мүхтәлиф дәрәчәдә узанмасына бир тәрәфдән онун фәрди хүсусий-йәти, диһәр тәрәфдән дә торпаг шәраити—тор-пагдакы рүтубәтин мигдары, торпағын дәнәвәр-лийи вә бәрклийи, ондакы һаванын, гһда маддә-ләринин вә саир хүсусиййәтләр сәбәб олур (шәкил 15).

Көк системинин янлара ййылмасы вә узан-масына юхарыда кәстәрилән комплекс шәраит-дән башга бир дә, рүтубәтин бөйүк тә'сири вар-дыр. Көкүн узанма истигамәти чох заман суя доғру олур. Бир чох ағач, кол вә һәтта от бит-киләринин көкләри өртүлү су йолларына соху-луб орада шиддәтли инкишаф эдәркән суюн кә-силмәсинә сәбәб олур.

Ябаны биткиләрин көк системинин инкиша-фы мәдәни биткиләринкиңә һисбәтән чох фәрғли олур. Буғун сәбәби, мәдәни бит-киләр үчүн инсан тәрәфиндән торпагда әлверишли шәраит яра-дылмасыдыр. Ерин шумланмасы, юмшалдылмасы күбрәләнмәси, суварылмасы, алағлардан тәмизләнмәси, нөвбәли әкин системи-




Шәкил 15. Гум-лу сәһрада би-тән бир битки-нин көк систе-минин торпағын юхары вә аша-ғы һиссәләриндә будаглан-масы.

нан тэтбиг эдилмәси, башга сөзлә торпагын мәдәни һалда ишлән-
мәси көк системинин инкишафында бөйүк вә мүсбәт дәйишиклийә
сәбәб олур. Белә бир әлверишли шәрайт ярандыгда биткиләрин
көкләри һәм энинә, һәм дә узунуна артыгламасилә бөйүйүр. (шә-
кил 16). Бәзи мәдәни биткиләрин көкләринин дәринә кетмәси
(метр һесабилә) ашағыдакы чәдвәлдә көстәрилилр:

язлыг бугда	1,1—2,2
пайызлыг бугда	1,1—2,1
арпа	1,5—2,0
дары	0,8—1,0
Гарғыдалы	1,0—2,2
нохуд	0,8—1,5
чуғундур	0,8—2,8
күнәбахан	1,3—2,7
картоф	0,6—1,3
памидор	1,0—1,25
турп	0,3—0,5
лобя	0,6—0,80
гара йонча	1,00—3,00

Ағач көкләринин яйылдығы саһә будагларынын тутдуғу даирә-
дән 2—5 дәфә бөйүк олур. Йә'ни ян көкләрин ерләшдийи саһә



Шәкил 16. Көк системинин мүхтәлиф типләри.

будагларын тутдуғу даирәдән чох кәнара чыхыр; буна көрә дә
ағачларын диби, будагларынын тутдуғу даирәдән хейли кениш
саһә юмшалдылмалыдыр.

Көк юмрулары. Һавада газ һалында олан азот биткиләр
тәрәфиндән мәнимсәнилә билмир, азоту биткиләр аммоний вә
азот туршусу дузларынын торпагдакы сулу мәһлулундан алып.
Анчаг бәзи ибтидан организмләр һавада олан газ һалындакы
азоту алып азот бирләшмәләри һалына кечирә билир ки, һәм
бирләшмәләрлә дә али биткиләрин көкләри гидаланыр.

Белә ибтидан организмләрдән бири пахла биткиләринин көк-
ләриндә яшайн бактериялар (*Bacterium radicicola*) дыр. Бун-
лар торпагда пахла биткиләринин көкләринә әмичи телләр вәси-
тәсилә сохулур. Көкүн бактерия кирән ериндә әмәлә кәлән яра-
нын әтрафындакы паренхим тохумалары бөйүйәрәк шишкинлик-
ләр вә я юмручуглар әмәлә кәтирилр ки, бунлары ади көзлә көрмәк
олур. Һәмин юмручугларын һүчәйрәләриндә бактериялар яша-
йыр. Бу юмручугларда яшайн бактерияларын мәнимсәдикләри
атмосфер азотундан пахлалы биткиләр истифадә әдилр. Һәмин
бактерияларын бир гисми өлүр вә пахлалы биткиләр тәрәфиндән
орадакы азот мәнимсәнилр. Бундан башга, пахлалы биткиләр ве-
кетәсия заманы көкләри вәситәсилә торпаға азот бирләшмәләри
бурахырлар ки, һәмин азот бирләшмәләри вәдә биткиләр истифа-
дә әдилр. Көк юмрусу бактериялары бир һектар саһәдә орта һеса-
бла 150—200 кг атмосфер азотуну мәнимсәйлр, бунун $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ һиссә-
си пахла биткисинин мәһсулу көтүрүлдүкдән сонра ердә галыр.
Беләликлә пахлалы биткиләр торпағы азотла зәнкинләшдирилр.
Буна көрә дә пахлалы биткиләр нөвбәли әкин системиндә даһа
чох истифадә әдилр, чүнки онларын мәһсулу көтүрүлдүкдән сон-
ра торпагда галан көк юмурулары чүрүйүр вә беләликлә бакте-
риялар тәрәфиндән мәнимсәнилмиш атмосфер азоту минерал һа-
лында торпагда галыр. Одур ки, торпаг азот бирләшмәләрилә
зәнкинләшилр вә башга биткиләр тәрәфиндән истифадә олунур.
Белә бир торпаға әкилмиш биткинин мәһсулу чох артыр. Көк
юмурулары пахлалы биткиләрдән башга бир сыра башга битки-
ләрдә дә ола билр.

Микориза. Көкләрин көбәләклә шәрикли һәятына микор-
иза¹ дейилр. Бир чох ағач вә от биткисинин көкләриндә әмичи
телләрлә бәрәбәр көк үскүйү һиссәсиндә көбәләкләрә дә раст
кәлинилр. Бунлар хырда көбәләк типини олур көкүн паренхим тохума-
ларынын һүчәйрәләри дахилиндә, бәзән дә үстүндә олур. Көкү
харицдән, әһәтә әдән микоризалара эктотроф микориза-
лар² ады верилмишдилр. Микоризалар али биткиләрин көкләри-
нин торпагдан мәһлул һалында минерал маддәләр алмасына кө-
мәк әдилр. Бунлар торпагда олан геһри-үзви маддәләри сәрбәст
алыб али биткиләрә верилр. Әйни заманда али биткиләрин һазыр-
ладыглары үзви маддәләрдән микоризаны тәшкил әдән көбәләк-
ләр дә истифадә әдилр. Буна көрә микориза торадән көбәләкләр
али биткиләр илә симбиоз һәят кечирилр (шәкил 17).


Тәдгигат көстәрмишдилр ки, бир чох ағач нөөләринин көкүндә
микориза олмәзсә, битки тез тәләф олар.

Эктотроф микоризасы олан биткиләрә бунлары мисал көстәр-
мәк олар: ағчагайын (*Асеч*), палыд (*Quercus*), шам (*Pinus*),
сәрв (*Thuja*), тозагачы (*Betula*), чинар, говаг (*Populus*), фын-

¹ «Микос» юнанча көбәләк, «риза» көк демәкдилр.


² «экто»—харицдән, «трофе»—гидаланма демәкдилр.

дыг (*Corylus*), кавалы (*Prunus domestica*) вэ с. Эндотрофмикориза бир чох ағач вэ от биткилериндэ олур. Мәсәлән, тахыл биткилериндән түлкүгуйруғу (*Alopecurus*), тонгалоту (*Bromus*), вәләмир (*Avena*), гарамут (*Lolium*), арпа (*Hordeum*), човдар (*Secale cereale*), буғда (*Triticum*), гарғыдалы (*Zea mays*), чийәләк (*Fragaria*), гарайонча (*Medicago*), роз (*Juglans regia*), гут (*Morus*), үзүм (*Vitis vinifera*) вэ саирәни көстөрмәк олар. Эндотрофмикориза, (дахили микориза) олан биткилерин чаванян көкләри учдан көк үскүйү кими көбәләк һифләрилә әһатә олунур вэ бойларынын узанмасы даяныр, бунлардан кәнара айрылан вэ көбәләкләрлә учлары әһатә олунмаян ян көкләр исә узанараг кетдикчә торпағын дәринликләринә сохулур (шәкил 17, 18 вэ 19).



Шәкил 17. Эктомикориза

А—микоризасыз әминч телләри (h), көк үскүйү (c), В—шмал фысдығынын микоризалы көкү; Р—торпаг һиссәчикләри илэ битишән көбәләк һифләри; С—вәләс ағачы көкүнүн мәрчан кими будагланмыш бир һиссәси; Д—вэ Е—микориза илэ ертүлмүш вәләс ағачы биткиси көкүнүн бир һиссәсинин узунуна кәсилтиш; Г—көбәләк үскүйү.



Шәкил 18. Шам көкүнүн бир һиссәси
1—Микоризасыз; 2—микориза илэ.

Эктотрофмикоризалар әмәлә кәтирән көбәләкләр әсас мешә торпагларында кениш яйылмышдыр. Мешә золагларынын тәшкилиндә микоризаларын өйрәнилмәси вэ һәмин саһәләрин микориза әмәлә кәтирән көбәләкләрлә тәмин олунмасы ән әһәмиyyətли мәсәләдир.

Көкдә кеотропизм. Рүшейм чүчәрәндән сонра инкишаф эдән ана көк ерин чазибә гүввәсинин тәсирилә мәркәзә доғру мейл эдир ки, буна мүсбәт к е о т р о п и з м дейилир. Ана көкдән янла-

ра доғру узананлар һәм ин гүвәһинн тәсири алтында үфүги вәзий-
йәтдә узаныр. Буна үфүги (һоризонтал) кеотропизм дейи-
лир. Үчүнчү вә даһа йүксәк дәрәчәләрдән әмәлә кәлмиш ян көк-
ләр кеотропиклик табилийәти-
ни итирдикләриндән мүхтәлиф
иститамәтләрдә узана билир.

Көкләрин метаморфозлары.
Шәраит вә әһтияждан асылы ола-
раг көкләр башга шәкилләрә дү-
шә биләр ки, буна көкләрин
метаморфозу дейилир.

Көк метаморфозунун ашағыда-
кы нөвләринә раст кәлмәк олур:

а) *Көкүмейвәлиләр.* Бурая

башлыча оларак бир сыра икиил-
лик биткиләр аиддир. Бунларын
өмүрләринин биринчи илиндә, йә-
ни тохумдан чүчәрдикдән сонра
ана көкләри йоғунлашыр ки, она
«көкмейвә» дейилир. Белә
биткиләр һәм ин ил ярпаглардан
ибарәт көкәтрафы розет әмәлә
кәтирир. Бу ярпагларда фотосин-
тез нәтижәсиндә һазырланмыш
үзүм маддәләр әһтият гита маддә-
си һалында биткинин торпаг ал-
тында йоғунлашан көкләриндә




Шәкил 19. Учу кәсәтминн
палыд көкү.
Ян көкләриндә инкишаф
әтминн микориза илә

топланыр. Беләликлә, көк ади формасыны дәйишмиш олур ки,
буна көкүн метаморфозу дейилир. Белә метаморфоз, ана
көкдә олдуғу кими, ян көкләр вә әлавә көкләрдә дә ола биләр.
Икииллик биткиләрдә биринчи ил шәклини дәйишмиш көкләрдә
топланмыш әһтият гита маддәси икинчи ил өлмүш ярпагларын
голтуғундакы тумурчуглардан инкишаф әдән көвдә, чичәк вә мей-
вәнин әмәлә кәлмәсинә сәрф олунур вә һәм ин ил битки өз өмрүнү
битирир, мәсәлән: еркөкү, гырмызы турп, ағ турп, чуғундур вә с.

Бунларда көк адланан һиссә морфоложи чәһәтдән әсл көкдән
ибарәт дейилдир. Бунларын ярпаг бирләшән һиссәси башчыг,
онун алтындакы һамар һиссә-ләпәалты дизчик, онун да алтында
ян көкләри олан һиссә исә—әсл көкдүр. Чохиллик биткиләрдә дә
йоғунлашмыш ана көкләрә раст кәлмәк олур, мәсәлән касны
(*Cichorium*), емликләр(*Scorzonera*) вә саирә. Әһтият гита мад-
дәләри топланмасы үчүн амбар вәзифәсини жәрән йоғунлаш-
малар ян көкләр вә әлавә көкләрдән әмәлә кәлир. Бунлара юмру
көкләр вә я көк гозалары дейилир, мәсәлән: көрки чичәйи (*Dhal-
ia*), гуланчар (*Asparagus*), сәһләбләр (*Orchis*), батат (*Ipomoea ba-
tatas*) вә саирә (шәкил 20). Юмру көкләр чаван икән онларда
әмичи телләр вә көк үскүйү олур. Сонралар әмичи телләр


төкүлүрләр. Юмру көкләрин ералты юмру көвдәләрдән вә көкүм-
сов көвдәләрдән фәрги ондадыр ки, юмру көкләр көк мәншәли
олдуғлары үчүн һәтта пулчуг шәкилли рудимент ярпаглардан
белә мәһрум олур.

б) *Дартычы көкләр.* Чох-
иллик от биткиләринин бәзи-
ләриндә көкләр гысалыр вә бе-
лә көкләр биткинин торпаг
үзәриндә олан көкәтрафы ро-
зет ярпагларынын торпағын
сәһнинә гысылмасына сәбәб
олур. Бу ондан ирәли кәлир ки,
бәзи биткиләрин көкләриндә
олан әмичи телләр торпаг һис-
сәчикләринә артыг дәрәчәдә
сых бирләшдийиндән, биткинин
өрүстү органларыны торпағын
ичинә чәкир. Белә көкләрә
дартычы көкләр дейи-
лир. Зәфәран (*Crocus*), сы-
чан-соғаны (*Muscari*) вә дана
гыран биткиләринин соғанаг-
лары вә саирә буна яхшы ми-
сал ола биләр (шәкил 21).



Шәкил 20. Бататын (ширин картоф)
көк юмрулары.

в) *Ағачаяг көкләр.* Мүхтәлиф тропик ағач биткиләринин
көвдә вә будагларында һава көкләри әмәлә кәлир. Бунлар адәтән



Шәкил 21.

ерә санчыларак биткинин даяғы вә тидаландырычы органы вәзи-
фәсини көрүр. Белә көкләр көвдәнин ашағы һиссәләриндән әмәлә
калирсә вә ашағыя тәрәф чәпинә бөйүйүрсә, ағачаяг көкләр

адланыр. Ағачаяглар васитәсилә назик көвдәләр чохлу гол-будаг аяглары сөйкәнәрәк галыр. Башлыча оларат белә көкләр суда, даяз лилли дениз саһили көлләриндә, чайлары баш вә ашағы ахарларында битән ағачларда олур. Бу чүр биткиләре мангров а дейилир (шәкил 23). Ағачаяг көкләри эвләрдә бечәрилән монстера (*Mans-tera deliciosa*) биткисиндә көрмәк олар. Бәзи тропик ағач биткиләриндә минләрчә һава көкләри әмәлә көләрәк торпаға дахил олур. Бунлар сүтун шәкилли көкләр адланыр. Мәсәлән, Бенгал фикусу (*Ficus bengaliensis*) әввәлчә ири ағачларын көвдәсиндә гушлар тәрәфиндән кәтирилмиш тохумдан чүчәрир, сонралар горпагла бирләшиб сүтун шәкилли узун көкләр әмәлә кәтирир.



Шәкил 22. Биринчи ил векетасиясында ер үстү ярпаг розетти олан көкүмейвәли шәкәр чуғундуру.

көвдә көкләри илә яшамагда давам әдир. Яндан баханда о, хыр-да мешәйә охшайыр (шәкил 23).

Эпифит биткиләр. Башга биткиләрин көвдә вә будаглары үзәриндә яшаян вә онлардан ялныз бир даяг васитәси кими истифадә әдән биткиләре эпифит биткиләр дейилир. Эпифитләр автотроф олуб, ялныз өзләринин һазырладыглары гидадан истифадә әтмәклә яшайыр. Ағачларын үзәриндә яшаян шибийәләр, мамырлар, рүтубәтли тропикада вә субтропикада яшаян бир чох гыжылыр, хусусән тохумлу биткиләрдән олан сәһләбчичәклиләр фәсиләсинин бир чох нүмайәндәләри эпифитләре мисал ола биләр. Эпифитләрдә олан көкләрин бир гисми һава көкләридир (шәкил 24).

Һава көкләринин харичи тәбәгәси, бир вә я бир нечә гат мәсәли өлү һүчәйрәләрдән ибарәтдир. Бу һүчәйрәләр һавадакы су бухарындан вә яғынтылардан асанлыгла су алыр (шәкил 24).

Гроникада яшаян сәһләбчичәклиләрдән бәзи эпифитләрдә ясты лөвһә шәкилли көкләр олур. Онларын субстрата бирләшән сәһниндә әмичи телләр әмәлә кәлир. Бу биткиләр әмичи телләр васитәсилә субстратдан су вә минерал маддәләри алыр; бу көкләрин үст сәһни яшыл рәнкдә олур.




Шәкил 23. Мангрова (*Rhizophora*) биткисинин ағач-аяг көкләри.

Белә биткиләрин чохунда ярпаглар аз инкишаф әтдийиндән вә пулчуг шәклиндә олдуғундан фотосинтез просеси әсасән көкләрдә кедир.

Илишән көкләр. Бәзи дырмашан биткиләрдә нормал гиләландырычы көкләрдән башга, көвдәләрдә әләвә көкләр дә әмәлә кәлир ки, бунлара илишән көкләр дейилир. Бунларын васитәсилә битки даша, дивара, гаялара, әтрафында олан башга биткиләрин көвдәләринә вә саирәйә дырмашыр мәсәлән, мешә сармашығы (*Hedera*), ванил, бәзи фикуслар, (*Ficus radicans*, *F. sticticata*) вә с.

Тәнәффүс көкләри. Батаглыгларда вә оксикени аз олан торпагларда яшаян биткиләрин бәзиләриндә тәнәффүс көкләри әмәлә кәлир ки, бунлара пневматофорлар дейилир (шәкил 25). Бунлар торпағын алтындакы көкүмсов көвдәләрдән көкүн әкс истигамәтиндә инкишаф әдәрәк суюн вә я торпағын үстүнә чыхыр.

Паразит биткиләрдә әсә көк олмур, бунун әвезинә онларда яланчы көк әмзикләри әмәлә кәлир. Бунлар өз әмзикләрилә авто-троф биткиләрин тохумаларына сохулараг (гызыл сармашыг (*Cuscuta*) нөвләри вә сүмүр кәноту (*Orobancha*) паризитләри эт-дийн кими) һазыр һалда үзвн гнда маддәләри алырлар.



Шәкил 24.

1—һава көкләри олан сәһләб биткиси; 2—онун һава көкүнүн бир һиссәсинин әннә кәһийи; а—сую удан, әлмүш харичи тәбәгә һүчәйрәләри.

Көкдән истифадә. Бир чох биткиләрин, хусусән көкүмейвә биткиләрдән олан еркөкү, аг вә гырмызы турп, кәрөвүз, чуғундур, батат вә саир биткиләрин, көкләри инсан вә һейванларын гидаланмасына сәрф эдилир. Ябаны биткиләрдән чыр кәрөвүз (*Chaerophyllum bulbosum*), гозгырабын (*Bongardia chrysogonum*) керан (*Geranium dissectum*), фындыглы агбурчагы (*Lathyrus tuberosus*) юмру көкләриндән бир ейинти мәһсулу олага истифа-дә эдилир. Батат (*Ipomoea batatas*), ямс (*Dioscorea sativa*) кими биткиләрин юмруларындан нишаста алыныр. Көркиччәк (*Dhalia*), андыз (*Inula helenium*), касны (*Cichorium intibus*) көкүндән инулин алмаг үчүн, тау саггызы (*Scorzonera taussaghyz*), ләк-саггызы (*Taraxacum kok saghyz*) көкүндән ка-

учук алмаг үчүн, пишикоту (*Valeriana*), замбаг (*Iris germanica*) көкләриндән дәрман вә әтирли яғлар алмаг үчүн, гызыл бояг оту (*Rubia tinctorum*), алканна (*Alcanna tinctorum*) вә с. көкләриндән бояг алмаг үчүн, дашдөйән, гызылсаггал, чайыр, ирисүнбүл баготу биткиләринин көкләриндән, палтар, баш, аяг, диш, дырнаг шоткалары вә саирә һазырламаг үчүн истифадә эдилир.



Шәкил 25.

Зоғ вә бичләр. Үзәриндә ярпаг олан көвдәйә зоғ дейилир. Ярпагың зоға бирләшән еринә дүйүн дейилир, чүнки бир чох биткиләрдә һәммин ердә дүйүнә охшар шишкинлик олур. Ики дүйүн арасындакы көвдә һиссәсинә бугум дейилир. Ярпаг илә көвдә-нин юхары һиссәси арасында олан бучаға ярпагың голтуғу дейилир. Бугумлары гыса зоғлара гысалмыш зоғ дейилир, мәсәлән: алма, килас, нар, алча вә саир бир чох мейвә биткилә-ринин мейвә верән будаглары кими. Бу зоғларда дүйүнләр бир-биринә яхын олдуғундан ярпаглар бир нөгтәдән чыхмыш кими көрүнүр ки, буна юхары вә я тәпәрозети дейилир. Ярпагла-рын бу чүр дүзүлүшү бир чох биткиләринин көкү илә чичәк оху арасында да мүшәһидә эдилир ки, буна көкәтрафы розет дейилир, мәсәлән, зәнчироту, бағаярпагы, нәркиз чичәйи вә гу-

шәппәйинин көк әтрафындакы ярпагының дүзүлүшү кими (шәкил 26). Һәр зог тумурчугдан инкишаф эдир, тумурчуг зогун рүшейм һалыдыр. О, зәиф инкишаф әтмиш көвдәдән ибарәтдир, онун да үзәриндә рүшейм һалында бир-биринә яхын ярпаглар олур (шәкил 27). Тохумлу биткиләрин ярпаг голтугларында голтуг тумурчуглары олур (шәкил 28).



Шәкил 26.


Бә'зән биткиләрин буғумларында вә көкләри үзәриндә тумурчуглар әмәлә кәлир ки, белә тумурчуглар ала вә тумурчуг дейилир. Көкләрдә әлавә тумурчуглар, ян көкләр кими, көкүн дахили һиссәсіндән, йә'ни мәркәзи цилиндрдән әмәлә кәлир, сон-

ралар инкишаф әдәрәк торпаг үзәриндә ярпаглары олан зоглар верир ки, бунлара күчүк вә я б и ч дейилир, мәсәлән, әнчир, албалы, кавалы, акасия, ясәмән, зәринч, моруг, нар, килас, һейча, дәмәтиканы, кәкрә оту, ачыот, көйчичәк гангал, сарычичәк гангал, зәнчироту, биянлар вә и. а. Бу кими биткиләрин көкләриндән әмәлә кәлмиш бичләр веке- татив сурәтдә артыр.

Ана биткинин көкү үзәриндә әмәлә кәлән бичи көкүн бир һиссәсилә бирликдә кәсиб башга ерә әксәк, орала мүстәгил сурәтдә инкишаф әдәрәк ана битки кими мәһсул верәчәкдир.



Шәкил 27.



Шәкил 28.

а—голтуг тумурчугу үзәриндә пулчулар; б, в—ярпаг изи; г—мантарлашмыш ағызчыглар.

Әлавә тумурчуг бир чох зәрәрли алаг ютларында да әмәлә кәлир. Адәтән торпаг шум әдилән заман кәсилмиш көкләр әлавә тумурчуглар әмәлә кәтириб өз яшайыш габилийәтини мүһафизә эдир.

Тумурчуглар вә онларын инкишафы. Биткинин көвдә будаглары адәтән юхарыдан бой атыр, бунун сәбәби онларын тәпәләриндәки уч тумурчугларының инкишафыдыр. Үмумийәтлә көвдәнин бөйүмә истигамәти ялныз вертикал дейил, ятан вә я сүрүнән көвдәләрдә көрдүйүмүз кими, горизонтал истигамәтдә дә ола билир. Бу һал механики тохумаларын зәиф инкишафындан вә онларын дүзүлмәсіндән асылыдыр. Бә'зи биткиләрдә исә зоглар сары акасия (*Caragana*), салланан сөйүдләр вә саирәдә олдуғу кими салланмыш һалда олур.

шәппәйинин көк әтрафындакы ярпагларынын дүзүлүшү кими (шәкил 26). Һәр зоғ тумурчугдан инкишаф эдир, тумурчуг зоғун рүшейм һалыдыр. О, зәиф инкишаф әтмиш көвдәдән ибарәтдир, онун да үзәриндә рүшейм һалында бир-биринә яхын ярпаглар олур (шәкил 27). Тохумлу биткиләрин ярпаг голтугларында голтуг тумурчуглары олур (шәкил 28).



Шәкил 26.


Бә'зән биткиләрин бугумларында вә көкләри үзәриндә тумурчуглар әмәлә кәлир ки, белә тумурчугларә ә л а в ә т у м у р ч у г дейилир. Көкләрдә әлавә тумурчуглар, ян көкләр кими, көкүн дахили һиссәсиндән, йә'ни мәркәзи цилиндрдән әмәлә кәлир. сон-

ралар инкишаф әдәрәк торпаг үзәриндә ярпаглары олан зоғлар верир ки, бунлара күчүк вә я б и ч дейилир, мәсәлән, әнчир, албалы, кавалы, акасия, ясәмән, зәринч, моруг, нар, килас, һейча, дәмәтиканы, кәкрә оту, ачыот, көйчичәк гангал, сарычичәк гангал, зәнчироту, бияшлар вә и. а. Бу кими биткиләрин көкләриндән әмәлә кәлмиш бичләр вегетатив сурәтдә артыр.

Ана биткинин көкү үзәриндә әмәлә кәлән бичи көкүн бир һиссәсикә бирликтә кәшиб башга ерә әксәк, орада мүстәгил сурәтдә инкишаф әдәрәк ана битки кими мәһсул верәчәкдир.



Шәкил 27.




Шәкил 28.

а—голтуг тумурчугу үзәриндә пулчуклар; б, в—ярпаг ин; г—мантарлашмыш ағызчыглар.

Әлавә тумурчуг бир чох зәрәрли алаг отларында да әмәлә кәлир. Адәтән торпаг шум әдилән заман кәсилмиш көкләр әлавә тумурчуглар әмәлә кәтириб өз яшайыш габилыйәтини мүһафизә эдир.

Тумурчуглар вә онларын инкишафы. Биткинин көвдә будаглары адәтән юхарыдан бой атыр, бунун сәбәби онларын төпәләриндәки уч тумурчугларынын инкишафыдыр. Үмумийәтлә көвдәнин бөйүмә истигамәти ялныз вертикал дейил, ятан вә я сүрүнән көвдәләрдә көрдүйүмүз кими, горизонтал истигамәтдә дә ола билир. Бу һал механики тохумаларын зәиф инкишафындан вә онларын дүзүлмәсиндән асылыдыр. Бә'зи биткиләрдә исә зоғлар сары акасия (*Caragana*), салланан сөйүдләр вә саирәдә олдуғу кими салланмыш һалда олур.

Тәпә тумурчуғу көвдәнин үч һиссәсиндә бир-биринин үзәрини өртмүш ярпаглардан ибарәтдир. Һәмин хырда ярпаглар мұхтәлиф вә бир-биринә яхын дүйүмләрдән әмәлә кәлир. Һәлә рүшейм һалында оллуб инкишаф этмәмиш ярпагларын голтуғунда голтуғ тумурчуғларын вә ян тумурчуғлар әмәлә кәлир. Рүшейм һалында олан ярпаглар хариңи (алт) тәрәфдән сүрәтлә инкишаф этдикләри үчүн учдан әйилмиш олур ки, бу да бой нөгтәсини дибдән, янлардан вә учдан мұдафиә эдир. Ян тумурчуғларынның да турулушу үч тумурчуғларынның турулушу кими дир. Адәтән тәпә тумурчуғунун инкишафыннан әсас көвдә әмәлә кәлдийи һалда, ян тумурчуғлардан будаглар әмәлә кәлир. Ян тумурчуғларын һамысында будаглар әмәлә кәлмир, онларын бир писми узун мүддәт инкишафсыз галыр ки, бунлара ятмыш тумурчуғлар (көзчүкләр) дейилир. Бунлар әлверишли шәраитдә инкишаф эдиб будаглар әмәлә кәтир. Ятмыш тумурчуғдан юхарыда көвдәни кәсдикдә вә я мұхтәлиф амилләрин тәсирилә тәләф олдуғда, әлавә тумурчуғлар инкишаф эдиб онун ерини тутур. Ятмыш тумурчуғлардан чалаг ишләриндә чох истифада олунур. Бә'зи ян тумурчуғлардан будаг, бәзиләриндән исә чичәк (мейвә) әмәлә кәлир. Мейвә тумурчуғларын кирдә, көк, будаг тумурчуғларын исә чох вә узунсов олур (шәкил 29).



Шәкил 29.

1—Үзәриндә будаг тумурчуғу олан узанмыш бириллик дарангы зоғу; 2—үзәриндә 1 будаг вә 3 чичәк тумурчуғу олан 4-иллик дарангы зоғу; 3—алма ағачынның бириллик бой будағы; 4—алма ағачынның чохиллик гысалмыш мейвә будағы.

Тумурчуғларын үстүндә, диб ярпагларынның шәклинин дәйиш-

мәсиндән әмәлә кәлмиш сәрт, гәтранлы пулчуғлар олур ки, бунлар һәмин тумурчуғларын ғышын шахтасындан, исланмагдан, долудан, гушлардан, мұхтәлиф һәшәратдан горуюр вә бәрабәр сурәтдә бир-биринин үстүнү һәр тәрәфдән әһәтә эдир. Тумурчуғ бөйүдүкдән сонра пулчуғлар лазым олмадығындан төкүлүр.

Ярпаглар төкүлдүкдән сонра, ғышы сакит һалда кечирән тумурчуғларын алтында пайызда төкүлмүш ярпагларын ери галыр ки, буна ярпаг изи дейилир. Тумурчуғларын дүзүлүшү, формасы пулчуғларынның хусусийәти вә ярпаг изинин хусусийәти мұхтәлиф биткиләрдә мұхтәлиф олдуғундан һәмин әләмәтләрлә биткиләр ярпагсыз да таныныр.

Тумурчуғун пулчуғларын төкүлдүкдән сонра тумурчуғун дибиндәки көвдә һиссәсиндә әмәлә кәлән вә узун мүддәт давам эдән һәлгәйә тумурчуғ һәлгәси дейилир. О, ағач көвдәләринин һәр ил бөйүйән һиссәләри арасында сәрһәдд тәшкил эдир. Бу сәрһәддә дә көвдәнин яшыны тәйин этмәк олур.

Биткиләрдә үч вә ян тумурчуғлардан башга әлавә тумурчуғлар да олур. Әлавә тумурчуғлар биткиләрин һәят шәраити кәскин сурәтдә дәйишдикдә көк, көвдә вә ярпагларда әмәлә кәлир. Мәсәлән, тут ағачы, сөйүд, говаг, чөкә, көврүш, фындыг, гөз вә саирәдә көвдәләри кәсилән заман олдуғу кими. Надир һалларда ярпагларда гейри-мүнтәзәм шәкилдә әмәлә кәлән зоғлар әлавә тумурчуғлардан инкишаф этмиш олур.

КӨВДӘ

Көвдә вә онун вәзифәси. Һәр һансы мүнһитдә олурса-олсун (торпаг үстүндә, торпаг алтында, суда), үзәриндә нормал вә я метаморфозия уграмыш һалда олан, голтуғларында тумурчуғерләшән органа көвдә дейилир. Ерүстү көвдәнин вәзифәси; ярпагларын әлверишли бир сурәтдә дүзүлмәси вә биткинин бөйүк саһә тутмасыны тәмин этмәк, көк вә ярпаглар арасында һәрәкәт эдән маддәләри нәгл этмәк, чинси вә гейри-чинси чохалманы тәмин эдән органларын әмәлә кәтирмәкдән ибарәтдир. Көвдә биткиләрин зитият гита маддәләринин топланмасы үчүн әксәр һалларда амбар вәзифәсини, малдили, рускус, гуланчар вә саирәдә исә ярпаг вәзифәсини көрүр, бә'зи биткиләрдә (дәвәтиканы, көйәм, нар, емишан вә и. а.) көвдәнин бир һиссәси тикана чевриләрәк мұдафиә, дикәрләриндә (тәнәкдә, габагкимиләрдә) дырманма вәзифәсини көрүр (шәкил 30, 31).

Көвдәләр формаларына көрә мұхтәлиф олур. Әксәрән көвдәләр цилиндришәкилли олур, мәсәлән тахыл, йонча, памбыг вә саирәнин көвдәләри кими. Бәзиләриндә исә үчтилли вә дөрдтилли олур мәсәлән, чилләрдә, додагчичәклиләрдә олдуғу кими.

Чохтилли олан көвдәләр дә вардыр, мәсәлән, бә'зи малдили, күнәбахан, кәндалаш вә саирәдә олдуғу кими. Надир һалларда көвдә ясты олур, мәсәлән ясты малдилиндә олдуғу кими. Бир

сыра биткиләрдә көвдәләрин ичи бош олур, белә көвдәләрин дүйүнләриндәки сарғы онлара мөһкәмлик верир.

Биткиләр көвдәләринин яшама мүддәти вә типләринә кәрә бир нечә група бөлүнүр: от, ярымкол, кол вә ағач группалары. От биткиләри веке тасия мүддәтинин ахырында ерүстү органларынын тамам тәләф олмасы илә характеризә олунур, мәсәлән, тахыл вә тәрәвез биткиләри, ем отлары вә с. От биткиләри дә өз нөвбәләриндә үч ерә бөлүнүр: бириллик, икилик вә чохиллик отлар.

Бириллик биткиләр— бир ил мүддәтиндә тохумдан чүчәрән, тохум верән вә тәләф олан биткиләрдир. Бунларын көк боғазларында кечән илдән галмыш ярпаг изи олмур, торпагдан гырылмандан чыхыр, мәсәлән, буғда, арпа, дары, бадымчан, памидор вә с. Бириллик биткиләри көстөрмәк үчүн белә шәрти ишарә... гәбул олунмушдур.


Икилик от биткиләри биринчи ил тохумдан чүчәриб көкәтрафы розет әмәлә кәтирир вә гышы бу һалда кечирдикдән сонра икинчи ил тохум верән вә сонра тәләф олан биткиләрдир. Бунларын көк боғазы әтрафында кечән илин ярпаглары вә я онларын изи галыр, мәсәлән: турп, еркөкү, кәрөвүз вә с. Бунларын шәрти ишарәләри... гәбул олунмушдур.

Чохиллик от биткиләринин ерүстү һиссәләри һәр ил веке тасия дөврүндән сонра тәләф олан вә көк

боғазында һәмишә кечән илләрдән ярпаг изләри галан биткиләрдир. Бунлар дартылыб чыхарыланда көкләри (көкүмсов, соғанаг, юмру көвдәләр) олур вә һәр ил гышы кечирдикдән сонра язда һәмин ералты көвдәләриндән тәзә ерүстү көвдәләр әмәлә кәлир, мәсәлән, гарайонча, галмыш, гарғы, инчичичәйи, кәнда-лаш вә саирә. Бунларын шәрти ишарәси, 4 гәбул олунмушдур.


Гейд әтмәк лазымдыр ки, бир, ики вә чохиллик ады илә отлары фәргләндрмәк һисби вә шәртидир, чүнки шәраитдән асылы олараг бириллик отлар ики вә чохиллик ола биләр, мәсәлән: михәккүлү, түтүн, гурдағзы, памидор вә саирә.

Көвдәләринин ялныз диб һиссәси пробка илә өртүләрәк гышы тәләф олмандан кечирән биткиләрә ярымколлар дейилир. Бу биткиләрин үч һиссәләри гышда тәләф олур, мәсәлән, кәкликоту, дәрман адачайы, бәзи йовшанлар, гарағанлар, вә саирә.



Шәкил 30. Габагкимиләрдә быгчыг.

Коллар, бүтүн ерүстү көвдә вә будаглары пробка илә өртүлүш һалда гышы кечирән биткиләрә дейилир. Бунларын будагланмасы торпағын сәһиндән башланыр вә әсас көвдә будаглардан сечилмир. Бу хусусийәт коллары ағачлардан фәргләндрир. Колу билдрмәк үчүн белә шәрти ишарә гәбул олун-



Шәкил 31. Дәвәтиканы.

1—көкү; 2—тикана чеврилмиш будағы үзәриндә мейвәләри; 3—инчичичәйи үмуми көрүнүшү; 4—будағынын үмуми көрүнүшү.

мушдур. Коллара итбурну, бөйүрткән, гарагат, рус үзүмү, гаратикан вә сирә мисал ола биләр.

Ағачлар, бир гәдәр торпаг үзәриндә галхдыгдан сонра будагланан вә яхшы инкишаф этмиш чохиллик көвдәси олан биткиләрдир, мәсәлән, алма, армуд, тут, акасия, чинар, гарагач, чөкәкөврүш, ағчагайын вә с. Ағачлар үчүн белә шәрти ишарә гәбул олунмушдур. (½)

Көвдәләрин вәзиййәти. Ерүстү көвдәләр өз истигамәтләринә керә ашагыда көстәрилән бир нечә вәзиййәтдә олур.

Дикгалхан көвдәләр. Бунлар әлә көвдәләрди ки, һеч бир шейә сөйкәнмәйиб мүстәгил олараг дик галхыр, мәсәлән бир чох тахыл нөвләри, ағачлар вә с.

Әйилиб-галхан көвдәләр. Бу чүр көвдәләр көк боғазындан бир аз дик галхдыгдан сонра диз шәклиндә бир гәдәр әйилиб сонра енә дик галхыр, мәсәлән, кәкликоту, бә'зи емликләр, сүтдүйәнләр вә с.

Ятан вә сәрилән көвдәләр. Бунлар һеч бир васитә илә дик даяна билмәйән көвдәләрди, мәсәлән, Арктикада вә йүксәк дағларда яшайн ағач вә кол биткиләри кими (шәкил 32).

Сүрүнән көвдәләр. Бунлар да дик галха билмәйиб, бөйүдүкчә ер илә сүрүнән көвдәләрди. Бунларын әксәриййәти от олуб, дүйүнләриндә әләвә көкләр әмәлә кәлир. Одур ки, белә көвдәләрдә гоча һиссә тәләф олдугда ени әмәлә кәлән һиссә торпага көк салараг башга ерә кечир вә әтрафа яйылыр. Мәсәлән, сүрүнән гайтарма (*Potentilla reptans*), сүрүнән үчярпаг йонча (*Trifolium repens*), сүрүнән гурдбоған (*Ranunculus repens*) батат (*Ipomoea batatas*), чийәләк (*Fragaria*) вә с.


Дырмашан көвдәләр. Бунлар мүхтәлиф васитәләрлә әләвә көкләр, тиканлар, бығчыгларла, әтрафында олан даяға санчыла-раг юхарыя күнәшә тәрәф галхан көвдәләрди, мәсәлән, үзүм тәнәйи, меңә сармашыгы, габаг вә с.

Сарынан көвдәләр. Бунлар өз көвдәсини янындакы мүхтәлиф даяглара сарыяраг галхан көвдәләрди.

Дырмашан вә сарынан көвдәли биткиләре л и а н л а р¹ дейлир. Лианларын 2000-ә гәдәр нөвү вардыр. Лианларын ән чоху тропик вә субтропик ерләрдә битир. Лианлар ССРИ-ни һисбәтән исти вә рүтубәтли ерләриндә: Азәрбайчанын Гах, Загатала, Балакән, Ләнкәран районларында, Гәрби Загафгазиянын Гара дәниз әтрафы районларында вә Узаг Шәргин, хусусән, чәнуб дәнизләри саһилләриндә битир.

Лианлар ағач вә я от ола билир. Лианларын көвдәләри зәиф, тез узанан вә узун буғумлу олур. Механики тохумаларын лазыми гәдәр инкишаф этмәмәси вә көвдәнин тез узанмасы лианларын даяға әһтиячы олмасына сәбәб олмушдур. Сарынан көвдәли лианлар даяға мүхтәлиф формада сарыныр; бә'зән солдан саға


¹ «Лиан» франсызча багламаг, сарымаг, сарынмаг демәкдир.



Шәкил 32 Арктика сөйүдү

1—биткиши көрүнүшү; 2—эрәк чинкәләрән ибарәт сырганы; 3—мәйвәләрән ибарәт сырганы.

сарыныр, мәсәлән, хамырмай (*Humulus lupulus*), сарынан гараба-
шаг (*Polygonum convolvulus*). Дикәрләри саҗдан сола сарыныр,
мәсәлән, чөл сармашығы (*Con-
volvulus arvensis*), лобя (*Phaseo-
lus multiflorum*) вә с. Бәзиләри
исә һәр ики истигамәтдә сарыныр.




Ағач шәкилли лианлардан
бәзәк биткиси кими бечәрилән
глисинияны (*Wistaria chinensis*),
күйәмәни (*Periploca graeca*) көс-
тәрмәк олар.

Бәзи лианларда әлавә көкләр
әмәлә кәлир вә онун васитәсилә
дырмашыр, мәсәлән, мешә сар-
машығы (*Hedera*). Белә бит-
киләр бәзән даягы тамамилә бү-
рүйүр вә даяг чанлы битки олдуҗ-

Шәкил 33. Сүрүнән көвдәләр

да тамамилә тәләф олмаға башлайыр (шәкил 34).



Шәкил 34. Мүхтәлиф лианлар.

Лианлардан бәзиләринин йоғунлуғу бир нечә сантиметр, узун-
луғу исә 200—300 метрә гәдәр олур.

Көвдәләрин һүндүрлүйү, йоғунлуғу вә өмрү. Дүняда ән йүксәк
ағач Австралия эвкалиптидир (*Eucalyptus amygdalina*). Онун
һүндүрлүйү 155 м-ә гәдәр олур. Тохумдан чүчәрмиш битки әлве-
ришли шәраитдә 7 ил мүддәтиндә 19 м һүндүрлүйә чатыр вә
йоғунлуғу 1,5 м-ә гәдәр олур. Эвкалиптдән бир гәдәр ғыса ма-
монтағачыдыр (*Sequoia gigantea*). Онун һүндүрлүйү 142 м-ә
гәдәр, йоғунлуғу исә тәхминән 10 м-ә чатыр. ССРИ-дә битән ағач-
лардан йолка—50 м, шам—40—50 м, палыд—40 м, ағчагайын—
25 м һүндүрлүйә чатыр.


Бәзи ағачларын йоғунлуғу боюна нисбәтән чох олур,
мәсәлән, баобаб (*Adansonia digitata*) Өмр әтибарилә сәрвләр
(*Cupressus fastigata*) 3000 ил, шабалыт (*Castanea sativa*)
2000 ил, саплаглы палыд (*Quercus pedunculata*) 2000 ил, йол-
ка (*Picea excelsa*) 1200 ил, чөкә (*Tilia grandifolia*) 100 ил,
говаг (*Populus alba*) 300 ил яшайыр.

Тахылларда колланма. Тахыл-
ларда көвдәнин дибиндән бир
сыра әлавә зоғлар әмәлә кәлир
ки, буна колланма дейилир.
Көвдәсинин ералты һиссәсиндәки
дүйүмләрдән әлавә зоғлар вә көк-
ләр әмәлә кәтирән тахылларда
буғумлар яхшы инкишаф этмиш
олур. Бу тип колланма нәтичә-
синдә сейрәк кол әмәлә кәлир ки,
бунлара сейрәк коллу та-
хыллар дейилир (шәкил 35).

Тахылларын бәзиләриндә исә
әлавә зоғлар көвдәнин дибә яхын
ерүстү һиссәсиндәки дүйүндән
әмәлә кәлир. Бунларда дүйүмләр
бир-биринә чох яхын олдуғундан
араларындакы буғумлар демәк
олар ки, бир-бириндән сечилмир
вә бүтүн векеҗәсия дөврүндә ғы-
салмыш һалда галыр. Бу тип кол-
ланма нәтичәсиндә әмәлә кәлмиш
зоғлар бир-биринә чох яхын олдуғундан нәтичәдә сых кол әмә-
лә кәлир ки, бунларда сых коллу тахыл дейилир (шә-
кил 36).

Сых коллу тахылларда колланма дүйүмләриндән бир сыра
әлавә көкләр вә дүйүн үзәриндәки ярпағын голтуғунда олан
тумурчугдан исә ерүстү зоғлар әмәлә кәлир.

Ерүстү зоғларда буғумлар яхшы инкишаф этмиш олдуғундан,
кифайәт гәдәр һүндүр ерүстү көвдәләр әмәлә кәтирир.




Шәкил 35. Сейрәк колланан
тахылларда колланма схеми:

а—Биринчи, б—икинчи, в—үчүнчү
сыра дүйүмләр; г—үчүнчү, д—дөр-
дүнчү, е—бешинчи сыра көкләр; ж—
торпағын сәтһи.

а-биринчи сыра колланма дүйүнү;
б-в-г-д-е икинчи, үчүнчү вэ ш. а.
сыра зоғларын ардычыл колланма дү-
йүнлөрү; һәр зоғун олава көкү вардыр;
ж-торпарын сөтһү.

Академик Вилямс торпагы
үзвн маддэлэрлэ зэнкинлэшдир-
мэк вэ дэнэвэр олмаян торпагы
дэнэвэр гурулушлу торпага че-
вирмэк мэгсэдилэ нөвбөли экин
системиндэ чохиллик тахыллар-
дан сейрэк вэ сыхколлу тахыл-



а—тохум; б—иккинчи көктөр (биринчи көк ликишаф этмир); в—биринчи бугум;
г—биринчи вэ икинчи (сралты) бугум; з—көкүмсов көздө бугумларынын ярпаг
гыңлары; колланма дүйүнлөрүндөн эмэлэ кэлэн вэ гыса будагланап элавэ көктөр;
к—торпанын сатһи.

Векетасия заманы соғанаглы биткиләрдә әтли яarpaгларын
ичи бошалыр, анчаг бунлардан бәзиләри чүчәриб ерин үстүнә

чыхараг ерүстү ярпаглары эмәлә кәтирир. Чох вахт бу ярпагларын голтуғунда тумурчуглар олур вә онларын инкишафындан элавә соғанаглар эмәлә кәлир. Бунлар эмәлә кәлдикләри или нисбәтән сакит кечириб, ялныз кәлмәк ил элзеришли шәраитдә ерүстү органлар эмәлә кәтирир. Белә голтуғ соғанагларына



Шәкил 38. Юмру көвдәләр.


1—җәш кәлмәнин ерүстү юмрусу; 2—эпифит сәһләбләрнин ерүстү юмрулары; 3—картофун ералты юмрулары.

балачыглар дейилир, мәсәлән, хорузкүлүндә (*Tulipa*), сарымсагда (*Allium sativum*). Бунлары ана соғанаглардан айыраг бечәрирләр. (шәкил 39).

Бә'зи биткиләрдә ералты көвдәләр соғанаг илә юмру көвдә арасында кечид формасыдыр, йә'ни һәм соғанаға, һәм дә юмру ералты көвдәйә охшайыр, зәфәранларын (*Crocus*), гарға соғанынын (*Gladiolus*) вә саирәнин ералты көвдәләри буна бир мисал ола биләр (шәкил 40). Бунлар да дибчик һиссәдә эһтият гита маддәси топландығындан юмруя охшайыр. Торпаг-үстү һиссәләрдә дә, ярпагларын голтуғунда шәклини дәйишмиш көвдәләр шәклиндә юмрулар вә соғанаглар эмәлә кәлир, мәсәлән, картофун ерүстү көвдәси голтуғларында хырда яшыл рәнкли юмрулар эмәлә кәлмәси, яхуд сарымсағын чичәк группунда бә'зи чичәкләрнин соғанаға чеврилмәси (шәкил 39), я да ем отларындан тахыл фәсиләсинә мәнсуб олан дишәнин (*Poa bulbosa*) хырда тумурчугларынын юмруларә чеврилмәси кими.


Соғанагда ики чүр тумурчуг олур. Бунларын бириндән ярпаг, чичәк вә мейвәверән ерүстү көвдә, дикәриндән исә көһнә соғанагы

әвәз эдән ени соғанаг эмәлә кәлир. Әкәр ерүстү көвдә соғанағын уч тумурчугундан, ени соғанаг исә ян тумурчугдан эмәлә кәләрсә, бу чүр соғанаға симподиал, я да мүәййән будагланан соғанаг дейилир, мәсәлән, хорузкүлүндә, ади соғанда вә ит соғанында (*Allium rubellum*) олдуғу кими, әксинә соғанағын уч тумурчугундан ени соғанаг вә ян тумурчугундан ерүстү көвдә эмәлә кәлдикдә, һәмин соғанаг гейри-мүәййән вә я моноподиал будагланан соғанаг адланыр (нәркиз чичәйиндә олдуғу кими).



Шәкил 39.

1—Сүсәнин пулчуг соғанағы; 2—Ябаны соғанын чичәк группундакы соғанчыглар.




Шәкил 40.

1—Зәфәранын соғанаг юмрусу; 2—онун узунуна кәсийи.

Соғанаглы биткиләрдән бир чоҳу яз эфемерләрдир (мөвсүм биткиләридир). Бунлар язын башланғычында тез чүчәрир, тезликлә чичәк ачыр, тохум верир вә ерүстү һиссәләри тәләф олур, мәсәлән, данагыранлар (*Merendera*), вахтсыз чичәк (*Colchicum*), ит соғаны (*Allium rubellum*) вә с. Бунларын ерүстү органларындан бир әсәр галмыр, ералты һиссәләри (соғанаглары) исә узун мүддәт сакитлик дөврү кечирәрәк, кәлән язын әввәлләриндә енә дә чүчәрир.


Көкүмсов көвдә. Бу, ералты будагдыр ки, чоҳ вахт көкә охшайыр. Көкүмсов көвдә көк дейилдир, көвдәдир, чүнки онда көкдә олдуғу кими көк үскүйү йохдур, әксинә бунларын үзәриндә рудимент, метаморфоз этмиш чоҳ хырда, пулчуглар вә я пәрдәчикләр шәклиндә ярпаглар вардыр. Һәмин ярпагларын голтуғунда тумурчуглар олур. Бу тумурчугларын бир гисми ерүстү, бир гисми дә ералты көвдәни эмәлә кәтирир. Көкүмсов көвдәләр дә ерүстү көвдәләр кими симподиал вә моноподиал будагланыр. Көкүмсов көвдәләрин үзәриндә элавә көкләр олур. Моноподиал (гейри-мүәййән) будагланан көкүмсов көвдәдә уч тумурчугдан арды кәсилмәдән ералты көкүмсов көвдә эмәлә кәлир, ян тумурчугдан исә ерүстү көвдәләр инкишаф эдир, мәсәлән, сүрүнән айрыг (*Agropyrum repens*), новрузчичәйи (*Primula*) вә саирәдә олдуғу

кими. Симподиал будагланан көкүмсов көвдөдө, экинчө, уч тумурчугдан ерүстү көвдө, ян тумурчугдан исе ералты көвдөлөр инкишаф эдир (шәкил 41, 42).



Шәкил 41. Ерүстү зоглары олан тахыл биткисинин моноподиал көкүмсов көвдөсү.

Ерүстү көвдөлөрин метаморфозу. Көвдөлөрин юхарыда көс-тәрилмиш ералты метаморфозундан башга бир дө ерүстү метаморфозу олур. Мәсәлән, суккулентләр, тиканлар, кладодиялар, быгчыглар вә саир бу кими метаморфозлар чөл-лөрдә, сәһраларда, гуру тропик вә субтропик ерлөрдә күлли мигдарда яйылмыш хусуси битки группларында мүшәһидә эдилер. Көвдә вә ярпаглары чох әтли, йоғун вә сулу олан белә биткиләрә суккулентләр дейилир.



Шәкил 42. Той чичәйи (*Polygonatum*) биткисинин симподиал көкүмсов көвдөсү.

а—кәләчәк илин ерүстү зогунун тумурчугу;
б—бу илин зогу; в, г—кечмиш иллөрин зоглары-
нын илләри.

олмасынын сәбәби, көвдөлөриндә чохлу су әһтиятынын олмасы-
дыр. Илин яғмырлы фәсилләриндә битки су әһтияты топлайыр

вә беләликлә гураглыг вахтларда яшайышыны давам этдирә-
билир. Шиддәтли бухарланманын гаршысыны алмаг үчүн
ярпаглары тикана чеврилир, беләликлә һәм биткинин сәһни
кичилир, һәм дө һейванлар тәрәфиндән ейилмәкдән горунур, яр-
паг вәзифәсини исе көвдә көрүр. Ярпаг шәклини алараг онун вә-
зифәсини ифа әдән көвдөләрә вә будагларә гла до д и я вә ф и л-
л о к л а д и я дейилир, мәсәлән, гуланчар (*Asparagus*), рускус-
(*Ruscus*) биткиләриндә олдуғу кими (шәкил 43).



Шәкил 43. Филлокладиялар:
1—Рускуса; 2 вә 3—Филлантусда.

Бәзи биткилөрдә будаглар быгчыгларә чеврилир, мәсәлән
тәһәкдә (*Vitis vinifera*), чыр үзүмдә (*Ampelopsis quinquefolia*)
вә я гүввәтли сәрт вә ити тикан шәклини алыр вә һәтта бу тикан-
лар будагланыр, мәсәлән, шейтан ағачында (*Gleditschia*)
үчярпаг ябаны лимонда (*Poncerus trifoliata*) олдуғу кими. Бә-
зи чырармудлардан (*Pyrus elagnifolia*), ағтикандә (*Hippophae
rhamnoides*), емишан нөвләриндә (*Crataegus*), әзкилдә (*Mespilus
germanica*) вә с. Белә тиканлы биткилөрдән чох яхшы чанлы
чәпәр салмаг олур.

ЯРПАГ

Автотроф вә я мүстәгил гыдаланан биткиләрдә көзә чарпан яшыл һиссә ярпаглардыр. Ярпаг биткиләрин яшайышында фотосинтез, тәнәффүс вә транспирация (бухарланма) үчүн әсас органдыр. Ярпагда үзви маддәләр әмәлә кәлир ки, бунларын һесабына битки өз органларыны гурур вә бир гисмини дә әһтият гыда һалында мүәййән органларда топлайыр. Ярпаг әйни заманда нормал шәкилдә вә я метаморфоз эдәрәк чохалмада иштирак эдир. Белә ки, ярпагларын әлавә көкләр әмәлә кәтирмә хусусийәтиндән истифадә эдәрәк биткиләри векетатив сурәтдә чохалдырлар (бегония, әтиршаһ, шамданкүлү, чийәләк вә с.). Ярпагларын метаморфозундан әмәлә кәлмиш чичәк чинси чохалма үчүн көмәкчи органдыр.

Ярпагын әсас вә көзә чарпан һиссәси онун көһнәлмиш һиссәсидир, буна ярпаг аясы дейлир. Ярпаг дедикдә онун аясы нәзәрдә тутулур, бу һиссә ярпагын ән бөйүк вә көркәмли һиссәсидир. Биткиләрин чохунда ая, дибиндән даралмыш бир һиссә васитәсилә көвдәйә бирләшир ки, буна ярпагын саплагы дейлир. Саплагын вәзифәси аяны ишыға гаршы әлверили вәзийәтдә тутмаг вә шиддәтли яғыш, күләк кими механик тәсирләрдән горумагдыр. Саплагы олан ярпаглар саплаглы, саплагсыз ярпаглар исә отураг ярпаглар дейлир.

Бә'зи биткиләрин ярпагларында аянын вә я саплагын көвдәйә бирләшән ери кенәләрәк көвдәни нов кими әһатә эдир ки, буна гын дейлир. Бу чүр гынлы ярпаглар тахыллары, чилләри, замбагчичәклиләри, чәтирчичәклиләри мисал кәстәрмәк олар (шәкил 44). Гын голтуг тумурчуғуну вә тахылларда чаван буғумлары муһафизә эдир. Бә'зән гын көвдәнин мөһкәмлийини артырыр. Бә'зи биткиләрдә диб ярпагларынын бүтүн аясы, бә'зиләриндә ялныз ярпаг аясынын диб һиссәси редукция эдәрәк, гын һалында галыр, мәсәлән чашыр (*Ferula longifolia*) биткисиндә олдуғу кими. Биткиләрин бир чохунда ярпагын дибиндә чыхынты олур ки, она ярпагалтлыгы дейлир. Бунлар бә'зән пәрдәчик, пулчуг, гылчыг, тиканчыг (гараткинада, ағ акасияда) шәкилдә, бә'зиләриндә исә (нохудда, дөвәрәкөз бөнөвшәдә, бояг биткисиндә) ярпагчыг шәкилдә олур (шәкил 45).

Тахылларда ярпагларын гын һиссәси илә аясы арасында пәрдә вә я түк шәкилдә чыхынты олур ки, буна дилчик дейлир. Дилчик, яғыш дамчыларыны вә паразитләри гына дүшмәйә гоймур. Биткиләрдән бир чохунда ярпаглар тумурчутда икән ярпагалтлыглары ярпаға нисбәтән бөйүк олуб ярпаглары муһафизә эдир, мәсәлән, алмада, армудда, чөкәдә, палыдда вә саирәдә. Бунлар тумурчуг ачылан заман я төкүлүр, я да ярпагын өмрүнү ахырына гәдәр галыр. Тикана чеврилмиш ярпагалтлыглары горуючу вәзифәсини көрүр. Ярпаг шәкилини алмыш ярпагалтлыгла-

ры исә, әсл ярпаг зәиф инкишаф этдикдә, онун вәзифәсини көрүр. Ярпаг аялары формада чох мүхтәлиф олур.


Әсас әтибарилә ярпаглар бәсит вә мүрәккәб олмагла ики група айрылыр. Бәсит ярпаглар әлә ярпаглара дейлир ки, онларын бир саплагы үзәриндә ялныз бирчә аясы олсун вә ярпаг төкүлән заман ая илә саплаг биркә төкүлсүн. Ярпаг аясы бир нечә ярпагчыгдан ибарәт олуб, төкүлән заман әввәлчә ярпагчыглары, сонра да саплагы төкүлән ярпаға мүрәккәб ярпаг дейлир.

Бәсит ярпаглар аяларынын формасына көрә адландырылырлар, хәтвари — тахылларда; нешдәршәкилли — сөйүдләрдә; ийнәшәкилли — шамларда; эллипсшәкилли — фикусларда; юмурташәкилли — алмаларда; даирәви — гызылағачда; үчбучагшәкилли — чинарда; ромбшәкилли — пәнчәрдә, чинчилиmdә; гылынчшәкилли — сүсәндә; күрәкшәкилли — пәлпәтөйүндә; пазшәкилли — новрузчичәйиндә вә и. а.

Бәсит ярпаглар аяларынын дибләринә көрә: үрәкшәкилли, бөйрәкшәкилли, охшәкилли, галханшәкилли ола биләр (шәкил 46).


Аяларынын учларына көрә ярпаг, күт учлу, шиш учлу, шишләшмиш ити учлу ола биләр. Ярпаглар аяларынын кәнарларынын дишләшмәсинә көрә; там кәнарлы, мишар дишли, тиканлы, ярымдаирәви, кәмирилмиш, кәсилмиш шәкилдә олур. Дишләр дүз оларса, кәнары дишли; дишләрин учлары чәпинә оларса, кәнары мишарлы; дишләр күт оларса, кәнары ярымдаирәви; дишләр тиканла гуртарарса, кәнары тиканлы; кәнарлар дәрин олмаян ни-

замсыз кәсилмишсә, кәмирилмиш ярпаглар дейлир.



Шәкил 44. Гын:
1—тахылы ярпагында; 2—чәтирчичәкләрин ярпагларында.

Кəнары дишли, мишарлы, ярымданрэви яarpaгларын ири дишлэри үзэриндэ эйни гайда илэ икинчи дэрэчэли хырда дишлэр эмэлэ кəтəрсə, онлара кəнары икинчи дэрэчэли дишли, кəнары икинчи дэрэчэли мишарлы, кəнары икинчи дэрэчэли ярымданрэви яarpaглар дейилир (шəкил 47).




Шəкил 45. Яarpaгaлтлыглары:

1—сəйүлдə; 2—дəвəрəкəз бəнəвшəдə; 3—үчяarpaг йончада; 4—пoxулда; 5—aг бурчагда; 6—aг акəсияда.

Бəсит яarpaглар кəнарлары кəсийинин дəринлийи дэрэчəсинə кəрə үч əсac типə бəлүнүр ки, бунларын һər биринин дə ики формасы олур (бармагшəкилли вə лəлəкшəкилли). Əкəр яarpaг аясынын кəнар кəсийинин дəринлийи аянын энинин 1/4-дəн дəрин дейилсə, она дилимли яarpaг, кəсийини һər һиссəсинə исə дилим дейилэр. Дилимли яarpaглар ики чүр олур: бармагшəкилли дилимли, лəлəкшəкилли дилимли: бармагшəкиллийə памбыг яarpaгы, лəлəкшəкилли дилимлийə палыд яarpaгы мисал олə билэр.

Əкəр яarpaг аясынын кəнар кəсийинин дəринлийи аянын энинин 1/3-дəн дəрин олмзсə, белə яarpaглар кəсийиниш яarpaг-




Шəкил 46. Бəсит яarpaгларын аяларынын формалары вə диблəринə кəрə нєвлəри:

1—айнəшəкилли; 2—нəштəршəкилли; 3—үчү шини нəштəршəкилли; 4—əллипсəшəкилли; 5—юмурташəкилли; 6—дaнрəви; 7—бəйрəкшəкилли; 8—сəйшəкилли; 9—ишəшəкилли; 10—үрəкшəкилли; 11—ромбшəкилли; 12—үчбұчагшəкилли.

лар дейилир. Бу да ики чүр олур: бармагшəкилли кəсийиниш, лəлəкшəкилли кəсийиниш яarpaг, əнчирин, зəнчиротунун яarpaглары кими. Кəсийиниш яarpaгларын һиссəлəринə сəгмєнт дейилэр.

Əкəр яarpaг аясынын кəнар кəсийинин дəринлийи аянын энинин 1/2-ни тəшкил əдəрсə, элə яarpaглар бəлүнмүш вə лəлəкшəкилли бəлүнмүш яarpaг дейилир. Бəлүнмүш яarpaгларын ири парчалары илэ хырда парчалары нєвбəлəшир. Белə яarpaглар а р а в ə р ə н я р п а г л а р дейилир ки, бу да əн чox лəлəк шəкиллидə олур, мəсəлən, картофун, пaмидорун яarpaглары кими (шəкил 48 вə 49). Бə'зəн лəлəкшəкилли бəлүнмүш яarpaгларын диблəкилəри хырда олур, лəкин юхарыя кəтдикчə ирилəширлэр ки, белə яarpaглар л и р ə ш ə к и л л и я р п а г л а р дейилир, мəсəлən, турпун, харда-лын диб яarpaглары кими.

Бə'зəн лəлəкшəкилли бəлүнмүш бəсит яarpaгын аясы бир вə я бир нєчə дəфə бəлүнə би-тир. Əкəр һər парчанын үзəриндə икинчи дэрэчəли парчалар эмэлə кəлəрсə, белə яarpaглар икинчи дэрэчəли лəлəкшəкилли бəлүнмүш, əкəр бу ахырынчылар үчүнчү дəфə лə-




Шəкил 47. Яarpaг аяларынын кəнар-лары.

1—мишарлы; 2—икинчи дэрэчə мишарлы; 3, 4—дишли; 5—гиканты; 6—ярымданрэви; 7—дaнрəви; 8—кəмирилмиш; 9—шaггаланмиш.

лэж шәкилиндә бөлүнәрсә, о заман үчүнчү дәрәчәли лә-
лэкшәкилли бөлүнмүш ярпаглар адланыр.

Чәтирчәклиләрдә, мәсәлән шүйүт, разяна, зирә, көк вә саи-
рәдә ярпаглар әксәрән чох дәрәчәли ләлэкшәкилли бөлүнмүш
олур. Биткиләрдә ярпаг аяларынын бир нечә дәфә парчаланмасы
кениш сәһә тутмаг вә хариҗи механики гүввәләрә яхшы мугави-
мәт кәстәрмәк үчүндүр (күләйин тәсири алтында ярпаг аясынын
гырылмасыны суда исә су ахынынын асанлыгга кечиб кетмәсини



Шәкил. 48. Кәнарлары мұхтәлиф дәринликдә кәсилмиш
ярпаглар.

1—ләлэкшәкилли дилимли; 2—бармагшәкилли дилимли; 3—бармагшәкил-
ли кәсилмиш; 4—бармагшәкилли бөлүнмүш; 5—лирәшәкилли.


тәмин әдир). Мәсәлән, су гурдбоғанынын суалты ярпаглары чох
дәрәчәли бөлүнмүш сап шәклиндәдир, суусту ярпаглары исә бар-
магшәкилли дилимлидир (шәкил 50).

Йәгин ки, тәбиәтдә бөлүнмүш бәсит ярпаглар тәкамүл әдәрәк
парчаларынын мүстәгил ярпагчыг шәклини алмасы нәтичәсиндә
мүрәккәб ярпаглар әмәлә кәлмишдир; бунларда да сонралар мү-
рәккәбләшмә кетмиш вә онун нәтичәсиндә икинчи дәрәчәли мү-
рәккәб ярпаглар әмәлә кәлмишдир. Мүрәккәб ярпагларда ярпа-
ғын аясы бир чох ярпагчыглардан ибарәт олур.


Мүрәккәб ярпаглар әсас әтибарилә үч типдә олур: бармаг-
шәкилли, ләлэкшәкилли вә үчәр мүрәккәб ярпаглар, бармаг-
шәкилли мүрәккәб ярпаг бармагшәкилли бөлүнмүш ярпаг парча-
ларынын мүстәгил ярпагчыг шәклини алмасы нәтичәсиндә әмәлә
кәлмишдир, мәсәлән, ат шабалыдынын ярпаглары. Бармагшәкил-
ли мүрәккәб ярпагда ярпагчыглар үчдән артыг олуб, саплағын
тәпәсиндә шүавари отуруп (шәкил 51).

Ләлэкшәкилли мүрәккәб ярпаг, ләлэкшәкилли бөлүнмүш яр-
паг парчаларынын мүстәгил ярпагчыг шәклини алмасы нәтичә-

синдә әмәлә кәлмишдир. Бунлар икинчи, үчүнчү вә и. а. дәрәчәдә
мүрәккәбләшә биләр. Белә ки, икинчи дәрәчәли мүрәккәбләшмәдә
бир дәрәчәли ләлэкшәкилли мүрәккәб ярпағын айры-айры ярпаг-
чыглары әвәзиндә икинчи дәрәчәли саплаглар әмәлә кәлир вә һә-
мин саплагларынын үзәриндә ярпагчыглар отурмуш олур, үчүнчү
дәрәчәлидә үчүнчү саплаг әмәлә кәлир вә и. а.



Шәкил 49. Картофун ара верән ярпағы.



Шәкил 50. Су гурдбоғанынын
суалты вә суусту ярпаглары.


Ләлэкшәкилли мүрәккәб ярпагларда аяны тәшкил әдән ярпаг-
чыглар саплағын бою узуну дүзүлүр. Ләлэкшәкилли мүрәккәб
ярпаглар ики чүр: тәк ләлэкшәкилли вә чүт ләлэкшәкилли олур.
Тәк ләлэкшәкилли мүрәккәб ярпагда саплағын тәпәси тәк ярпаг-
чыгла гуртарыр, мәсәлән, күл, гоз, ағ акасия ярпаглары кими
(шәкил 52).

Чүт ярпагчыгларла гуртаран ярпаға чүт ләлэкшәкилли
мүрәккәб ярпаг дейилир (шәкил 53). Ләлэкшәкилли мүрәккәб
ярпаглардан бири дә бармагвари ләлэкшәкилли мүрәккәб ярпаг-
дыр, мәсәлән күстүмотунун ярпағы.

Үчәр мүрәккәб ярпаг, йәгин ки, тәк ләлэкшәкилли вә я бармаг-
шәкилли мүрәккәб ярпагчыгларынын ярпагчыгларынын үчә гәдәр
азалмасы нәтичәсиндә әмәлә кәлмишдир, мәсәлән, чийәләйил,
йончанын ярпаглары кими (шәкил 53, 1).

Үчәр мүрәккәб ярпаглар да икинчи вә үчүнчү дәрәчәдән мү-
рәккәбләшә биләр. Әкәр икинчи дәрәчәдән мүрәккәбләшәрсә, она
икинчи дәрәчәли үчәр мүрәккәб, үчүнчү дәрәчәдән мүрәккәблә-
шәрсә, үчүнчү дәрәчәли үчәр мүрәккәб ярпаг дейи-
лир (шәкил 54).

Төк ләләкшәкилли вә чүт ләләкшәкилли мүрәккәб ярпаглар иккинчи вә үчүнчү дәрәчәдән мүрәккәбләнә биләр (шәкил 55, 1,3). **Һетерофилия.** Эйни битки үзәриндә бүтүн ярпаглар бир-бирини эйни олмур. Буна һетерофилия вә я мүхтәлиф




Шәкил 51. Аф акасияның бармагшәкилли мүрәккәб ярпаглары вә онларын төкүлмәси.

ярпаглылыг дейилир. Мәсәлән, әнчир ағачының бир будагында ашагы ярпаглар там олдуғу һалда, орта ярпаглар дилмил, үч ярпаглар исә кәсилмиш вә я бөлүнмүш олур, һәм дә һәм әтибарилә араларында фәрг олур. Австралия эвкалиптләринин бәзиләриндә чаван будагларда ярпаглар гаршы-гаршыя дүзүлмүш, отураг, эллипс шәкилли, үфүти вәзийәтдә олдуғлары һалда, гоча будагларда ярпаглар нөвбәли дүзүлмүш, ғылынч формалы вә ашагы салланмыш олур (шәкил 56).

Әсасән биткиләрдә үч нөв ярпаг олур: диб, орта вә үч ярпаглар. Бунларын һәр үчү көвдәләрин үзәриндә тумурчуглардан инкишаф әдир вә чох вахт кечид формалары илә әлагәдар олур.

Диб ярпаглар чох заман гонур, сары, ачыг-яшыл рәнкли пулчугдан вә я ғындан ибарәт олур. Диб ярпагларына от биткиләринин ерүстү көвдәләринин дибиндәки пулчуглар вә я инкишафдан талмыш ғыншәкилли ярпаглар, соғанагларын вә көкүмсов көвдәләрин үзәриндәки пулчуглар, ерүстү көвдәләрдә исә тумурчуглары харицдән әһәтә әдән пулчуглар вә тохумлардакы ләпәләр мисал ола биләр.

Ләпә, рүшеймин илк вә диб ярпагларына дейилир. Бунлар тохумун рүшеймин үзәриндәки ярпаглардан даһа артыг инкишаф әтмиш һалда олур. Ләпә һәм чылпаг, һәм дә әртүлүтохумлу битки-



Шәкил 52. Аф акасияның (*Robinia pseudo-acacia*)

төк ләләкшәкилли мүрәккәб ярпагы вә ярпагалтыгларының тикана метаморфозу.




Шәкил 53. Мүрәккәб ярпаглар:

1—чыйәләйин үчәр мүрәккәб ярпагы; 2—чүт ләләкшәкилли мүрәккәб ярпагы; 3—күлүн төк ләләкшәкилли мүрәккәб ярпагы.

ләрин тохумларында вардыр. Әртүлүтохумлу биткиләрдән бир-ләпәли биткиләрин тохумунда инкишаф әтмиш бирчә ләпә вардыр ки, буна әндәсперм дейилир; икиләпәлиләрин тохумунда исә ики ләпә олур (мәсәлән, пахлалыларын, күлчичәклиләрин, хаччичәклиләрин вә саирәнин тохумлары кими). Чылпагтохумлуларын тохумунда 2-дән 15-ә гәдәр ләпә олур. Ләпәләрдә рүшеймин инкишафы үчүн әһтият гита маддәләри топланыр. Ләпәләр тохумун ичәрисиндә икән әксәрән ағ рәнkdә олур. Тохум чүчәрән заман бәзи биткиләрин (алманын, армудун, бадымчанчичәклиләрин, әмәкәмәчиләрин, памбығын, габагчичәклиләрин) тохумларының ләпәләри торпағын үстүнә чыхыр. һәмчә бөйүйүр вә яшыллашараг бөйүмәkdә олан биткинин биринчи ярпагларыны тәшkil әдир. Бунлар өз садәликләрилә онлардан сонра әмәлә кәлән әсл ярпаглардан фәргләнир вә ярпагалтыгсыз олур. Тахыл-

ларда, палыда, нохудда, мәрчидә ләпәләр тохум чүчәрән заман торпағын ичиндә галыр.

Биткидә характер ярпаглар орта ярпаглардыр. Одур ки, бир биткинин ярпагларындан бәһс эдилдикдә онун орта ярпаглары нә-



Шәкил 54.

1—үчәр жүрәккәб ярпаг; 2—иккинчи дәрәжәли үчәр жүрәккәб ярпагларын схеми; 3—үчүнчү дәрәжәли үчәр жүрәккәб ярпагларын схеми.



Шәкил 55.

1—иккинчи дәрәжәли ләләкшәкилли мүрәккәб ярпаг; 2—араверән мүрәккәб ярпаг; 3—үчүнчү дәрәжәли ләләкшәкилли мүрәккәб ярпаг.


зәрдә тутулур. Газ мүбадиләси вә транспирация просеси башлыча олараг бу ярпагларда кедир. Бә'зән диб ярпаглар (ләпәләр) илә орта ярпаглар арасында кечид тәшкил эдән вә садәлийи илә орта ярпаглардан фәргләнән ярпаглар да олур (шәкил 57).

Тәпә вә уч ярпаглар көвдәнин учларында чичәкләр вә чичәк группу олан ерләрдә әмәлә кәлир. Онлар зәиф инкишаф этмәләри, хырдалыглары вә бә'зи биткиләрдә башга рәнкә боянмалары илә



Шәкил 56. Гетерофилия вә я мүхтәлиф ярпаглылыг һадисәси:

1—тут ағачы будағында; 2a—Австралия эвкалиптинин гоча будағында; 2b—Һәмил эвкалиптин чаван будағында.



Шәкил 57. Ләпәләрден орта ярпаглар кечид:

1—чифләкдә; 2—хашхашда; 3—дәмиротунда; (хашхаш вә дәмиротунда тилик орта ярпаглар даһа чох парчаланмыш олур); с—ләпәләрди.

орта ярпаглардан фәргләнир. Онлара чичәкалтылыгы, чичәк группуларынын сарғысы, чичәк өртгүйү, чичәйин һиссәләри мисал ола биләр (шәкил 58).

Шәкил 58. Инчи чичәйи (*Convallaria majalis*) биткисиндә.

а—диб; о—орта; т—тәпә (уч) ярпаглары.

Ярпаглaрын бөйүклүйү вэ өмрү. Ярпаглaрын бөйүклүйү чох мүхтәлиф олур. Бэ'эн биткиләрдә ярпагын узунлуғу бир нечә миллиметр олдуғу һалда (мәсәлән, сәрвләрдә), бэ'зиләриндә 10—20 метр олур, мәсәлән (*Raphia vinifera*) адлы палманын ярпагы 15 метрдир, бизим биткиләрден ән ири ярпагы оланлары балдырган (*Heracleum*) нөвләридир.

Ярпаглaрын сәтһи бөйүк бир саһә тәшкил эдир. Бу васитә илә дә биткиләр һавадан гидаланма үчүн чохлу мигдарда карбон газы вэ тәнәффүс үчүн, оксикен газы ала билир. Фотосинтез процессинин биткини гита илә тә'мин эдә билмәси үчүн мәһз белә бир кениш сәтһ лазымдыр.

Бир гырмызы йонча биткисинин ярпаглaрынын тутдуғу саһә 70 квадрат метр, гара йонча биткисинин ярпаглaрынын тутдуғу саһә 230 квадрат метрдир. Бир һектар гарғыдалынын ярпаглaрынын тутдуғу саһә 12 һектар, гырмызы йончананкы 25 һектар, буғдананкы 25 һектар, картофунку 40 һектардыр вэ с.


Биткиләр, хусусән ағач вэ коллар, шәрти олараг, һәмишәчаван вэ ярпаглaрыны гышда төкәнләр ады илә ики група бөлүнүр. Үмүмийәтлә ярпаглaрыны төкмәйән битки йохдур. Һәмишә яшыл биткиләр дә ярпаглaрыны төкүр, лакин онлар бир тәрәфдән ярпаглaрыны төкүрсә дә, дикәр тәрәфдән тәзә ярпаглар әмәлә кәтирир вэ онларда ярпаглaрын төкүлмәси о гәдәр тәдричи олур ки, бирдән-бирә көзә чарпмыр. Тропик өлкәләрдә белә биткиләрин ярпаглaрынын төкүлмәси даһа айдын мүшәһидә эдилир.

Бизим биткиләрин әксәриндә ярпагын өмрү бир нечә айдан артыг олмур. Ярпаглaрын төкүлмәсинин сәбәби, ярпагын көвдәйә бирләшдийи ердә айырычы пробка һүчәйрәләри әмәлә кәлмәсидир. Тез өлән бу һүчәйрәләр ярпагы көвдәдән айырдығындан ярпаг дүшүр. Пайызда торпагын истилийи азалдығы үчүн көк системн биткини гидаландыра билмир вэ су алмаг имканы олмур. одур ки, сую бу бухарландырычы орган олан ярпагы атмаға мәчбур галыр. Беләликлә, битки өзүнү тәләф олмагдан мүһафизә эдир. Гураглыг заманы да биткиләр ярпаглaрыны төкүр.

Ярпаглар төкүлдүкдән сонра онларын изи галыр ки, она ярпаг изи дейилир. Пайызда ярпаглар тәдричән я саралыр вэ я гызарыр, чүнки бу заман хлорофил парчаланыр, ярпагда союға давамлы олан ксантафил вэ башга пигментләр үстүнлүк кәстәрир вэ бунлардан асылы олараг ярпаг мувафиг рәнж алыр. Һәмишәчаван биткиләрдә ярпаглар 1,5—5 илә гәдәр яшая билир, ялныз чох аз биткиләрдә ярпаг 15 илә гәдәр өмүр сүрүр.

Ярпаглaрын инкишафы мүддәтиндә онларын айры-айры һиссәләриндә мүхтәлиф дәйишикликләр ола биләр. Мәсәлән саплаг һәмишә аядан сонра бөйүйүр, ярпагалтлыглары чох заман саплагдан габаг инкишаф эдир, гын демәк олар ки, ярпагалтлыглар илә бир заманда инкишаф эдир вэ бэ'зән гын кәнарлары васитәсилә бирләшмиш олур (мәсәлән, чилләрдә вэ бэ'зи тахылларда).

Бэ'зән ярпагалтлыглары ярпагын саплагы илә янбаян бирләшир (йонча, күл) вэ я бир бирилә тамамилә бирләшәрәк бору әмәлә кәтирир, мәсәлән әвәликчичәклиләрдә (*Polygonaceae*). Бэ'зән дә ярпагын диб дилимләри бир-бирилә бирләшәрәк дешилмиш ярпаг әмәлә кәтирир, мәсәлән, чәтирчичәклиләрден довшангулагы (*Bupleurum*) чинсиндә, хаччичәклиләрден чыр вәзәри (*Lepidium perfoliatum*), марал чичәйи (*Lonicera caprifolium*) биткисиндә гаршы-гаршыя отурмуш ярпаглар дибләрилә бир-биринә битишир. Бэ'зи ярпагын аясы көвдәдән гачыр, мәсәлән, мүрәккәбчичәклиләрден Күләвәр (*Centaurea Fischeri*) биткисиндә (шәкил 59,4).




Шәкил 59. Отуран ярпаглар:
1—көвдәни гучагламыш ярпаг; 2—дәлинмиш ярпаг; 3—гаршы-гаршыя битишмиш ярпаг; 4—көвдәдән гачан ярпаг.

Палмаларын ярпаглaры әввәлчә там олур, сонралар ярпагын аясы гармон кими параллел бүзмәләр әмәлә кәтирир вэ даһа сонра онлар парчаланыр. Әв бәзәк биткиләриндән *Monstera deliciosa*-нын ярпаглaры илк заманлар там олур, сонралар исә аянын бэ'зи һиссәләриндә тохумаларын өлмәси нәтичәсиндә ая парчаланыр.

Ярпаглaрын көвдә үзәриндә дүзүлүшү. Тохумлу биткиләрин ярпаглaры көвдә үзәриндә мүәййән ганунла дүзүлүр. Биткиләрин чохунда һәр дүйүнә бир ярпаг бирләшир ки, буна нөвбә илә дүзүлүш вэ я бурғувари дүзүлүш дейилир, чүнки нөвбә илә дүзүлүш ярпаглaрын арасыны бир сап илә бағласаг, бурғу шәкилли хәтт алынар. Бир дүйүнә гаршы-гаршыя дуран ики ярпаг бирләшәрәсә, гаршы-гаршыя дүзүлүш ярпаглар дейилир. Гаршы-гаршыя дүзүлүш ярпаглар перпендикуляр вә зиййәтдә даяныр ки, бир-бирини кәлкәләндирмәсин, мәсәлән, додагчичәклиләрдә, гәрәнфилчичәклиләрдә олдуғу кими (шәкил 60, 1). Әкәр бир дүйүнә икидән артыг ярпаг бирләшәрәсә, белә дүзүлүшә дәстәвари дүзүлүш дейилир, мәсәлән, эло-

деяда, ардычда, сөйүдкүлү биткисиндө, гатыргуйруғунда вә саирәдә олдуғу кими. Белә бир дүзүлүшдә юхарыдакы ярпаглар ашағыдакылары көлкәләндирмир (шәкил 60, 2).




Шәкил 60. Ярпагларын дүзүлүшү:
1—гаршы-гаршыя дүзүлүш; 2—дәстәвари дүзүлүш.

Эйни будағын үзәриндә бир истигамәтдә даянмыш ики ярпағын арасында чох заман башга бир истигамәтдә даянмыш ики ярпағын арасында дикәр ярпаглар да олур. Эйни истигамәтдә даянмыш ики ярпағын арасында бир вә я бир нечә бурғу ола биләр. Буну кәср илә ифадә этсәк, сурәти, бир истигамәтдә олан ики ярпағын арасында эмәлә кәлмиш бурғунун нечә дөфә дөвр этдийини, мәхрәчи исә, һәмин бурғу һиссәси үзәринә дүшән ярпагларын мигдарыны кәстәрир. Мәсәлән бирләпәли биткиләрдән тахылларда, замбагларда, икиләпәли биткиләрдән чөкәдә, вәләсдә, фысдыгда бу кәср $1/2$ -дир. Бу о демәкдир ки, бурғу бир даирә тәшкил этмишдир вә һәмин бурғу үзәриндә 2 ярпаг даянмышдыр; башга сөзлә, биринчи ярпағын истигамәтиндә 3-чү вә икинчи ярпағын истигамәтиндә 4-чү вә и. а. ярпаглар даянмышдыр. Эн чох тәсадүф олуан ярпаг дүзүлүшүнүн формулалары $1/2$, $1/3$, $2/5$, $3/8$, $5/13$ вә саирәдир. Мәсәлән, гызылағачда, фындыгда, тәнәкдә, чилләрдә $1/3$ -дир, палыдда, киләнарда $2/5$ -дир, моругда, армудда, чинарда, зәринчдә, $3/8$ -дир, бадамда, агтиканда $5/13$ -дир вә и. а. (шәкил 61).

Көвдә үзәриндә ярпагларын мүййән гайда илә дүзүлүшүнүн бөйүк эколожи әһәмийәти вардыр. Әкәр көвдәнин буғумлары гы-


са исә, ярпаглар чох заман гыса вә хырда олур, әксинә, буғумлар узун исә, ярпаглар да ири вә узун олур. Ярпаглар сых вә мүрәккәб дүзүлдүкдә, әсл вә характер ярпаг дүзүлүшү ганунундан



Шәкил 61. Мүхтәлиф биткиләрин зоғлары үзәриндә ярпагларын дүзүлүшү схеми:
1—нөвбәли (бурғу үзәрә) дүзүлүш; 2—ағчагайында гаршы-гаршыя дүзүлүш; 3—сөйүд күлүндә дәстәвари дүзүлүш.

кәнара чыхыб, бир-бирини сыхышдырараг ишыгдан истифадә этмәк үчүн әлверишли вәзиййәт алыр. Бир сыра һалларда ашағыдакы ярпагларын саплаглары узун вә аялары ири олур, әксинә юхарыдакылары саплаглары гыса вә аялары хырда олур. Хырда ярпаглар илә ири ярпаглар нөвбәләшир.

Ярпагларын аяларынын кэнарлары киринтили вэ чыхынтылы исэ, чох вахт гоншу ярпагларын чыхынтысы янындакы ярпагын киринтисинэ уйгун даянмыш олур. Белэликлэ, бүтүн ярпаглар өзлэрини һэртэрэфли ишыға чевирэрэк яшыл саһэ эмэлэ кэтирир ки, буна ярпаг-бэзэйи дейилир (шэкил 62).




Шэкил 62. Ярпаг бэзэйи:

1—этиршаһ *Geranium pyrenaicum*) биткисинин ярпаглары розети; 2—даш-дэлән (*Saxifraga*) ярпаглары розети; 3—зэнкчичэйи (*Campanula*) биткисинин ярпаглары розети.

Ярпагларда дамарланма. Дамарлар ярпагын нэглийят системидир. Онлар көклэрин торпагдан мөһлул һалында алдыглары минерал маддэлэри вэ сую ярпатлара вэ ярпагларда фотосинтез мөһсулу олараг һазырланан үзви маддэлэри көвдэйэ вэ көкө нэгл едэн гида боруларындан ибарэтдир. Дамарлар ярпаға мөһкәмлик верир вэ онлары чырылмагдан мұһафизэ эдир.

Ярпагларда дамарланма үч чүр олур: параллел вэ я гөвсшэкилли, бармаг я лэлэкшэкилли вэ торшэкилли (шэкил 63).

Параллел вэ я гөвсшэкилли дамарланма бирлэпэли биткилэрин ярпагларында (тахылларда, занбагчичэклилэрдэ, гамышда, гарғыда вэ и. а.) олур. Бунларда чох заман ана дамар ян дамарлардан фэргләнмир. Торшэкилли дамарланма ики чүр олур: лэлэкшэкилли будагланан вэ бармагшэкилли дамарланма. Бүчүр дамарланмаларда ана дамар вэ я мэркөз дамар олур.



Шэкил 63. Ярпагларын дамарланмалары. 1—параллел дамарланма; 2—гөвсшэкилли дамарланма; 3—бармагшэкилли дамарланма; 4—лэлэкшэкилли вэ я торшэкилли дамарланма; 5—дихотомик дамарланма.


Шэкил 64. Ярпаглары тикана чеврилмиш вэ гөлтүгунда нормал ярпаглары гысалмыш зоғлары олан зэринч будағы.

Ана дамар аянын ортасында, нисбэтән йоғун олур, бундан янлара икинчи, үчүнчү вэ и. а. дэрэчэдэ будагланан дамарлар айрылыр. Бунлар я аянын кэнарында гуртарыр, я да аянын кэнарына чатмадан бир-биринэ янашы дуран ики дамар бирлэшэрэк илжэк эмэлэ кэтирир. Бунлардан биринчилэрэ м ү к ө м м ө л, икинчилэрэ исэ г е й р и-м ү к ө м м ө л дамарланма дейилир. Һэмин дамарлар аяда лэлэкшэкилли тор эмэлэ кэтирир. Бармагшэкилли дамарланмада ярпагын дибиндэн янлара бармагшэкилли бир

нечә ана дамар айрылыр вә бунларын һәр бири өз нөвбәсиндә биринчи, икинчи вә и. а. дәрәжәдән будагланан дамарлар әмәлә кәтирир, мәсәлән кәнәкәрчәйин, ағчагайынын, чинарын (*Platanus orientalis*) ярпаглары кими. Торшәкилли дамарланма башлыча оларак икиләпәли биткиләрдә олур. Су занбағынын (*Victoria regia*) галхан шәкилли ярпаг аясында дамарланма галхан-шәкиллидир.

Бә'зи гыжыкимиләрдә вә гәдим чылпагтохумлулардан олан кинголларда һача дамарланма (дихотомик дамарланма) олур (шәкил 63,5).

Ярпагларын метаморфозу. Ярпаг да башга органлар кими хариши шәраитдән асылы оларак бир шәкилдән башга бир шәклә дүшә билир ки, буна ярпагларын метаморфозу дейилр. Ярпаг метаморфоза уградыгда онун я һамысы, я да бир һиссәси шәклини дәйишир.



Шәкил 65. Зәринч биткисинин ади ярпағынын тәдричән тикана чеврилмәси.

Бу һал функционал вәзифәләрин дәйишилмәсилә әләгәдар оларак мейдана чыхыр. Бир чох фәсиләләрдә ярпағын мүйәйән һиссәси вә я һамысы тикана чеврилмишдир. Чох вахт ярпагларын кәнарына вә я учуна чатмыш дамарларын гуртарачағы тикан кими чыхынты әмәлә кәтирир, мәсәлән, бир чох гангал нөвләринин ярпагларында тәсадүф эдилр. Зәринч биткисиндә узанмыш бойзоғлары 3—7 бөлүмлү тикана чеврилмишдир (шәкил 64 вә 65).

Гаратиканда (*Paliurus spina—Christi*) ағ акасияда (*Robinia pseudoacacia*) ярпагалтлыглары тикана чеврилмишдир. Үмүмийәтлә тиканлар биткинин һейванлардан мұһафизә олунамасына көмәк эдир.

Бәсил ярпагларда ярпағын бүтүн һиссәләри вә я мүрәккәб ярпагларда ярпагчыгларын бир гисми, я да ярпагалтлыглары быгчыглара чеврилр, мәсәлән нохудда тәк ләләкшәкилли мүрәккәб ярпағын бир нечә уч ярпагчыгы, азырпаг күлүлчәдә (*Lathyrus aphaca*) бүтүн аясы, мәрөвчәдә (*Smilax excelsa*)

ярпагалтлыгы, әкилән нохудда (*Pisum sativum*) уч ярпагчыглар быгчыглара чеврилмишдир (шәкил 66 вә 67).

Австралия акасияларындан бир чохунда ярпағын аясы инкишаф әтмир, анчаг саплаг кенәләрәк ая шәклини алыр ки, буна филодия дейилр (шәкил 67 а).

Биткиләрдәки метаморфозун биткиләр әләминин инкишаф тарихини изаһ әтмәкдә вә бу инкишафын йолуну изләмәкдә бөйүк әһәмийәти вардыр.

Үмүмийәтлә биткиләрин һәр һансы органларындакы метаморфоз һәммин органларын вәзифәсиндән асылы оларак дәйишмәси демәкдир. Лакин һәммин дәйишмәнин ону әһәтә эдән шәраитдә сыхы сурәтдә әләгәдар олмасы нәзәрдә тутулмалыдыр. Метаморфоз һадисәси мүхтәлиф битки группларында мүхтәлиф йолларда кетмишдир. Шоранлыгларда битән өлдүркән (*Anabasis aphylla*), шоранот (*Salsola*) кими биткиләрин ярпаглары редуксия нәтичәсиндә гын шәклини аларак көздәни әһәтә әтмишдир. Бунун сәбәби биткинин шоран торпагдан сую чәтин алмасыдыр. һабелә, дәмәтиканы (*Alhagi pseudoalhagi*) биткисинин ярпагсыз олмасы вә ярпаг вәзифәсини көвдә көрмәси торпагдан сую чәтин алмасыдыр.

Һәшәратйәйән биткиләрин ярпагларындакы метаморфозлар сонрадан тәкамүл нәтичәсиндә мейдана чыхмыш биткиләрдир. Бунларын ярпаглары һәшәраты тутмаг вә ондан лазым олан гита маддәләрини чәкмәк үчүн уйғунлашмышдыр. Һәшәрат ейән шәһ биткиси (*Drosera rotundifolia*) ийнәярпаг мешәләрдә мамырларла өртүлмүш рүтүбәтли торпагларда яшаяраг, ортасындан аз көркәмли хырда чичәкли чичәк оху әмәлә кәтирир. Биткинин ярпагларында түкәохшар бир чох чыхынты вардыр, һәр чыхынтынын учунда бир гәдәр йоғунлашмыш башчыг вардыр, онун да әтрафында шәһә охшар япышганлы парлаг мае олур (шәкил 68).

Шәһ биткисинин ярпағы үзәринә һәшәрат дүшдүкдә, һәммин япышганлы сүрүшкән маддәйә илишир. Бу заман чыхынтылар япышганлы башлары илә һәшәратын үстүнә әйилр вә шәһ маддәси һәшәратын тәнәффүс йолларыны долдурдуғу үчүн һәшәрат боғулуб өлүр. Һәшәрат шәһ биткисинин ярпағы үзәринә дүшдүкдә ярпағын сәһиндә зүлали маддәләри һәлл әтмәк габилийәтинә малик олан ширә ифраз олунар. Һәммин ширәнин тәсирилә һәлл олмуш зүлали маддәни битки соруб гуртардыгдан сонра яр-



Шәкил 66. Азырпаг күлүлчә (*Lathyrus aphaca*) биткисиндән ярпагалтлыглары инкишаф эдиб ярпағы әвәз эдир, ярпағын галан һиссәләри исә быгчыга чеврилмишдир.

пағын чыхынтылары еңе дик галхараг һәшәратын һәзм олмайыб артыг галан һиссәсини кәнара атыр. Шей биткиси ярпағынын һейван мәдәси кими һәзмәдичи мае ифраз этмәси, чанлылар аломинин бир-бирилә нә дәрәчәдә дәрин гоһум олдуғуну көстәрир.



Шәкил 67. Әкилән нохуд. Уч ярпагчылар бығчыға чеврилмишдир.

Дарвин шей биткиси үзәриндә мушаһидә апарараг мүййән этмишдир ки, ярпағын үзәринә һәшәрат дүшдүкдә ярпаг, өз үзәриндәки чыхынтыларын учларындакы маеи һәшәрат олан ерә мейл этдирир. Әкәр чүчү хырда олуб ярпағын кәнарына дүшәрсә, о заман чыхынтылар ялныз башларыны һәмин ерә әйир.

Һәшәрат ири олуб ярпағын ортасына дүшдүкдә исә ярпағын бүтүн чыхынтылары онун үзәринә әйилир. Әкәр ярпағын айры-айры һиссәләринә ики эт парчасы гойсаг о заман һәр парчанын этрафындакы чыхынтылары әйилиб башчыглары илә әтин үзәрини гапаячагдыр.

Дарвин белә бир тәчрүбәни апардыгдан сонра языр: «Белә тәсәввүр этмәк олар ки, бизим гаршымызда өз овуну әлләри илә тутан ибтидаи турулушлу һейван даянмышдыр»¹. Шей биткисиндә мухтәлиф маддәләр вә гычыгламаларла апарылап тәчрүбәләр чох мараглыдыр.

Мәсәлән, шей биткиси үзәринә кағыз вә шүшә парчасы гоюлдугда чыхынтылар әйилмиш, лакин ярпаг һәзмәдичи ширә ифраз этмәмишдир. Ярпағын мәркәзи чыхынтыларына ийнә илә тохундугда вә я харичи чыхынтылары бир нечә дәфә чөп вурдугда да әйни һал мушаһидә әдилмишдир. Чыхынтыларын далбадал тәрпәдилмәси вә ярпағын үзәринә яғыш дамалары дүшмәси һеч бир тәсир көстәрмир. Белә олмасайды, о заман шей биткиси тез гүввәдән дүшәр вә иш габилийәтини итирәрди. Чох тәәччүблү орасыдыр ки, ән хырда чисим белә шей биткисинә тәсир әдир. Мәсәлән, Дарвинин тәчрүбә үчүн көтүрдүйү 0,203 мм узунунда вә 0,0000822 миллиграм ағырлығында түк шей биткисинин ярпағына тәсир көстәрмишдир.

Әкәр шей биткиси ярпағынын үзәринә кичик зүлал, әт вә я азот бирләшмәләриндән ибарәт башга бир маддә гойсаг, чыхынтылар һәнки тез әйилир, һәтта һәзмәдичи мае ифраз әдилмәси дә мушаһидә олунур.

Дарвинин мухтәлиф тәркибли маддәләрин дамалары илә апардығы тәчрүбә олдуғча диггәтәләйигдир. Дарвин шей биткисинә дәмлә һалында шәкәр мәнлулу, чай дәми вә чахыр кими маддәләрлә тәсир этдикдә биткисинин бунлара лагәйд галдығыны



Шәкил 67а. Австралия акасиясы чөчәртисиндә ләләкшәкилли мүрәккәб ярпагдан филлокладия кечид.


¹ Б. А. Келлер—Ботаника, русча, сәһ. 212, 1935-чи ил.

вә һәтта чыхынтыларыны белә әймәдийини мүшәһидә этмишдир. Әксинә, азотлу маддәләрдән сүдә, зүләлә, союг чий әт суюна гаршы ярпаг бөйүк һәссаслыг кәстәрмишдир. Шей биткиси аммоний дузларына гаршы һәддән артыг һәссаслыг кәстәрир. Торф мамырларынын әмәлә кәтирдийи торф батаглыгларында яшәян шей биткисинин азотлу маддәләр алмасы мүмкүн олмәдығындан (чүнки батаглыгларда азот бирләшмәләри аз олур),

битки азот бирләшмәләрини һәшәрәтдан алмаға мәчбур олмушдур. Шей биткиси азот бирләшмәләриндән башга бир дә һәшәрәтдан фосфорлу вә башга бирләшмәләр дә алыр.

Бу алынған маддәләрин доғрудан да шей биткисинин өзүнә сәрф олдуғуну Дарвин тәчрүбә илә исбат этмишдир.

Шей биткиләри үзәриндә апарылан тәчрүбәләрлә исбат әдилмишдир ки, бунларын сулу карбонлара әһтиҗлары йохдур, чүнки өзләри бөйүк мүвәффәгийәтлә буну һазырлайыр. Лакин марағлы чәһәт одур ки, шей биткиләриндә һейвани гита ассимлясия энерҗисини артырыр. Белә мәлүм олур ки, шей биткиси механики вә кимйәви ғычыгландырмалара гаршы чох һәссасдыр, буна кәрә дә инсан кими һисс әтмә вә




Шәкил 68. Шей биткиси (*Drosera rotundifolia*)
1—биткинин үмуми көрүнүшү; 2—4 түкләри ачылмыш вә йырымш ярпаглары (схематик шәкилдә); 5—везили түкүн узунуна кәсийи.

дадбилмә габилыйәтинә маликдир. Шей биткиләриндә мүшәһидә олуған ғычыгланма һадисәсиндә мәгсәдә уйғунлуг көрүнүр.

Бу мәгсәдәуйғунлуг шей биткиләри организмдә адәтәм хариҗи мүһит тәрәфиндән газанылмышдыр (шәкил 68).

Һәшәрәтйәән биткиләрдән бири дә говуглу биткидир. (*Utricularia vulgaris*). Бу бизим дурғун суларда, көлләрдә (Кировабәд, Ләнкәран районларында) битән су биткисидир. Бу биткинин су ичәрисиндә узун голбудағлы һиссәси вардыр. Әлвәришли дөврдә һәмин һиссәдән юхарыя доғру чичәк охучыхыр ки, онун да учунда ири сары рәнкли чичәк олур. Бу биткинин көкү йохдур, су алтындакы һиссәләриндә түк шәклиндә күлли мигдарда инчә ярпаг әмәлә кәлир, һәмин ярпагларын да үзәри говугларла долу олур. Бу говуглар суда олан бир чох чүчүләри тутмағ үчүндүр (шәкил 69).




Шәкил 69. Говуглу битки (*Utricularia vulgaris*)

Говугларын ичәрийә тәрәф ачылан гапаглары вардыр. Говугун киришиндә түкләрлә өртүлү яхалығы вардыр. Бундан башга кириш хариҗдән дә түкләрлә өртүлмүшдүр. Судакы чүчү түкләрә тохундугда ғычыгланма нәтиҗәсиндә говуг удгунмая охшар һәрәкәт әдир, говугун диварлары кенәлир; о, сую өзүнә чәкир, гапаг ичәри доғру ачылып, чүчү ачылмыш дешийә кирир. Сонра говуг енә дә бир гәдәр йығылып вә ағзы гапаныр. Беләликлә, чү-

чү говугун ичиндә галыр. О, бурада богулуп өлдүкдөн сонра чүрүмәйә башлайыр. Говуглар, бу заман үзүи маддәләри өзүнә алып.

Һәмин биткинин һейвани гида илә гидаланмасы онун гүввәт-ли инкишафына сәбәб олур.

Бу тип биткиләрдән бири дә чибинтутан (милчәктутан) битки-дир (*Dionaea muscipula*). Чибинтутанын ярпаг аясынын ики тайы вардыр. Һәр ики тайын кәнарлары дишлидир вә һәр биринин ор-тасында үч әдәд һәссас гын вардыр. Бу тайларын үзәринә чүчү дүшдүкдә тайлар гапаныр вә онларын кәнарларындакы дишләр бир-биринә кечир. Беләликлә, ая тамамилә гатланмыш олур (шәкил 70).




Шәкил 70.

1—чибинтутан битки; а—онун ачылмыш ярпагы; б—йығылмыш ярпагын схематик кәсйи.

Чүчүләрин һәлл олунмуш һиссәси битки тәрәфиндән сорул-дугдан сонра ярпаг аясынын тайлары ачылып.

Һәшәратһейән биткиләрин башга бир нөвү күпәлиләр (*Nepenthes*) чинсинин нөвләридир (шәкил 71).

Күпәли битки ярпагынын айры-айры һиссәләринин мүхтәлиф вәзифәси вардыр. Ярпагын ашағы һиссәси кенәлмиш вә яшыл рәнkdә олуп, ая кими ассимилясия үчүндүр, ярпагын юхарысы гапаклы күпә шәклиндәдир вә һәшәрат тутмаг үчүн тәлә вәзифәси ни көрүр. Ярпагын һәмин көстәрилмиш һиссәләринин арасы сап



Шәкил 71. Күпәли битки—непентес.

шәклиндә даралмыш бығчыглардан ибарәтдир. Битки бу бығ-чыглары илә әтрафдакы ағачлара илишир вә илишдийи ағачын будагларындан өзүнүн күпә шәкилли говугларыны асыр. Бу күпә-ләрин диварларында олан чәһрайы рәнкли харичи дамарлар, лә-кәләр вә күпәнин гапакынын әлван рәнки ону узагдан чичәйә охшадыр. Күпәнин кәнарларындан вә гапакындан ширии дамла-лар ифраз олунур ки, бунлара да һәшәрат чәлб олунур. Күпәнин ағзынын ич дивары мум илә һамарланмышдыр. Һәшәрат бу сү-рүшкән диварла асанча күпәнин дибинә дүшүр. Күпәнин ағыз

тərəфиндә бә'зән шиш учлары илә күпәнин дибинә йөнәлмиш ики сыра түк олур. һәмин түкләр һәшәратын кери гайытмасына им- кан вермир. Күпәнин ичәрисиндә зүлалли маддәни һәлл әдән фер- мент ифраз олунур. Бу маддә васитәсилә һәшәратын һәлл әдилән зүлалли маддәсиндән битки истифадә әдир.

Күпәли биткиләрин һүндүрлүйү 35 см-ә гәдәр вә йоғунлуғу 8 см-ә гәдәр олур. Бунлар Асиянын тропик мешәләриндә яшаян һәм типли дырманан биткиләрдир.

ТРИХОМАЛАР ВӘ ЭМИРКЕНСИЯЛАР

Битки органларыны харичдән әһәтә әдән өртүчү тохума чы- хынтыларына трихома дейилир. Бу чыхынтылар түк, зийил, пулчуг, гыл, вәзили түк, негтарлыг вә саир шәкилләрдә ола би- лир. Трихомадан башга бир дә эпидермисин дәрин һиссәсиндә, әмәлә кәлмиш эмиркенсия адлы чыхынтылар вардыр, мә- сәлән, кичитканын яндырычы түкләри, шәһлиләрдә вәзили түк- ләр, хамырмай биткисиндә санчылан сәрт түкләр, күлүн, итбур- нунун, бөйүрткәнин көвдә вә ярпагларындакы тиканлар, шабалы- дын, батбатын мейвәләри үзәриндәки тиканлар кими. Трихома илә эмиркенсия арасында бә'зән кечид формалары олур. Трихома вә эмиркенсиялар анатомик мәншәләрилә фәргләнмәкдән башга, бир дә органлар үзәриндә низамсыз дүзүлмәләри илә дә фәрг- ләнир.

Фыр вә я һалло. Һәшәратын паразитлик тә'сири нәтичәсин- дә бир сыра биткиләрин мүхтәлиф органларында шишкинликләр әмәлә кәлир ки, буна фыр вә я һалло дейилир. Бу фырлар битки кәнәләри вә я башга онурғасыз һейванлар тәрәфиндән бит- ки органларынын мүәййән һиссәсинин тохумасыны яралама нә- тичәсиндә әмәлә кәлир. Һәмин яраланмыш һиссә аномал һалда бөйүйүр вә бә'зән әйбәчәр бир һал алыр. Көрүнүр, һейванлар биткини яраладығлары заман, яраланмыш ерә элә маддә ифраз әдирләр ки, һәмин маддә битки тохумасы тәрәфиндән сорулур. Мүәййән һейванлар мүәййән биткиләрдә сабит формада фырлар әмәлә кәтирир. Одур ки, фырын хусусийәтинә вә формасына ба- хараг һансы һейван тәрәфиндән әмәлә кәтирилдийини мүәййән әтмәк олар.

Фырлар я үзәриндә бөйүмүш һәшәратын яшадығы органда, я да бөйүмүш һәшәратын тохумалар арасына юмурта төкмәси нә- тичәсиндә әмәлә кәлир. Юмуртадан чыхмыш сүрфәләр вә я бөйү- мүш һәшәрат чох вахт олдуғлары органын паренхим тохумала- рыны ейәрәк яшайыр.

Фырларын харичи көрүнүшләри мүхтәлиф олур (шәкил 72).

Фырларын ади формалары мәхмәр кими олур. Чох вахт фыр- лы ярпаглар эшилиб бүкүлүр вә көврәкләшир, рәнкләри исә са- ралмыш вә я гызармыш олур; бүкүлмүш ярпаглар гырышығлы бир чох патдан ибарәт олур (алмада, чинарда, әзкилдә). Бә'зән

ярпагларда вә көвдәләрдә, зийил, сүтун вә я күрәви формаларда фырлар олур, мәсәлән палыдын, гараағачын ярпағында, итбурну- нун мейвәсиндә вә саирәдә олдуғу кими. Чох заман бунлар бир



Шәкил 72. Ярпагларын үзәриндә мүхтәлиф фырлар.

1—сөйүд ярпағы үзәриндә фыр; 2—онун ачылышы; 3—күл үзәриндә мүхтәлиф фырлар; 4—гараағач ярпағы үзәриндә фыр; 5—палыд ярпағында фыр; 6—онлардан биринин кәсийч; 7—һолка ярпағында фыр.

ерә топланараг пулчуглардан ибарәт юмаг тәшкил әдир, мәсәлән, хаччичәктиләрдән дағ турпунун, вәзәриләрин вә саирәнин чичәк группларында тәсадүф олундуғу кими. Белә һалларда чичәкләр әй- бәчәрләшир, бәзән садә чичәкләр топа һалыны алыр, я да яшыл-

лашыр. Бу чүр фырлар көклөрдө да эмалә кәлә билир (мәсәлән пахлаы биткилерин көкләриндә азот бактериялары тәрәфиндән эмалә кәлмиш юмрулар). Фырлар, паразит көбөлөкләр вә фыр нематодлары тәрәфиндән да эмалә кәлә биләр, мәсәлән, кәләмин вә башга тәрәзә биткилеринин көкләриндә, кавалынын, алчанын мейвәси етишмәздән эввәл эмалә кәлә эйбәчәр ичи бош мейвәләри вә сирә кими. Ярпагларда эмалә кәлән фырлар, чох вахт биткинин нормал һәятына тәсир этмир.

Ярпағын морфоложи тәйини. Али битки ярпагларынын нормал формаларыны вә мүхтәлиф метаморфозларыны нәзәрә аларга демәк лазымдыр ки, ярпаг көвдә үзәриндә харичдән (экзоген) чыхынты оларга эмалә кәлир, мүййән ганунла көвдәнин үзәринә дүзүлүр, диби илә бөйүйүр, мөһдуд бой атыр, чох заман аз өмүрлү олур вә өз үзәриндә башга бир ярпаг эмалә кәтирмир. Анчаг гыжыларда ярпаг илбиз шәклиндә гыврылмыш учу васитәсиз бир нечә ил бөйүмәкдә давам эдир. Гыжылары ярпаглары бу хусусийәтләринә көрә көвдәйә охшайыр вә ярпаг дейил, в а й адланыр. Ярпаг көвдәнин ян чыхынтысы оларга эмалә кәлир вә чох аз һалларда көвдәнин уч һиссәсиндә чыхыр. Көвдәнин учунда эркәкчикләр вә мейвә ярпагларында ибарәт олан дишчикләр эмалә кәлир. Бунлар шәклини дәйишмиш уч ярпаглардыр. Ярпағын голтуғунда һәмишә тумурчуг олмалыдыр. Ярпаг метаморфозунун бир формасы да онун чичәк һиссәләринә чеврилмәсидир. Экәр мүййән шәраитдә чичәйини һиссәләри яшылланырса, онларында голтуғунда тумурчуг эмалә кәләр.

ОРГАНИЗМ ВӘ МҮҢИТ

Ф. Энкелс һәятә белә тәриф вермишдир: «Һәят зүдәли маддәләрин яшама үсулудур, онлары эһатә эдән харичи тәбиәтлә даими маддәләр мүбадиләси бу үсулун мүһүм чәһәтидир»¹. Һәр бир организм харичи мүһитдән мүхтәлиф маддәләр алыр, онлары мүрәккәб кимйәви үсулла, башга маддәләрә чевирир ки, онлар да һәмин организм тәшкил эдән маддәләр олур вә бунларын һесабына өз бәдәнини гурур. Бу просеса а с с и м и л я с и я дейилдир. Организмин һәят фәалийәти нәтижәсиндә бәдәни тәшкил эдән маддәләрин бир чоху парчаланыр вә бир сыра аралыг мәрһөләләр кечдикдән сонра ән ахырда бәсит маддәләрә чеврилиз. Һәмин маддәләр мүхтәлиф органлардан вә я организмдән харич эдилдир, я да парчаланма нәтижәсиндә эмалә кәләрәк гайыда билмәйән бир маддә кими организмдә галыр. Бунун нәтижәсиндә энерги һасил олур ки, организмн бүтүн һәят просесләри да бу энерги һесабына кедир. Һәмин парчаланма просесинә д и с с и м и л я с и я дейилдир.

¹ Ф. Э н к е л с. Тәбиәтин диалектикасы, русча, сәһ. 246, 1948-чы ил.

Белә икитәрәfli маддәләр (эләчә да энерги) мүбадиләси һәяти сәчийәләндирән вә маддәнин хусуси һәрәкәт формасы сайылан башлыча хусусийәтдир.

Ассимиляция вә диссимиляция кими бир-биринә гаршылыгы бағлы олан вә эйни заманда бир-биринә зидд олан хусусийәтләр һәят просесинин диалектик вәһдәтини тәшкил эдир.

Харичи мүһитдән организмә дахил олан вә организм тәрәфиндән ассимиляция олунан гыда беләликлә, «харичдән» «дахилә» кечир. Эйни заманда һәмин дахил олан маддә башга һүчәйрәләрин вә чанлы организмн маддәләрилә мүбадиләйә кирәрәк онларга гыдаландырыр. Одур ки, организмә харичдән дахил олан маддә һәмин организм үчүн «харичи» һесап олунур. Гыда маддәләри илә бәрабәр һәрәкәт, ишыг кими харичи факторлар да биткиләрә тәсир эдәрәк, онларда физиоложи, биокимйәви, морфоложи, дәйишчиклик эмалә кәтирир. Һәмин факторлар да биткиләр тәрәфиндән ассимиляция олунур вә беләликлә, харичи шәраит дахилә кечир. Биткиләр онлары эһатә эдән харичи мүһит илә айрылмас сурәтдә әлағәдардыр: харичи мүһит биткиләрә тәсир эдир вә онларын арасы кәсилмәдән енидән гурулмасына сәбәб олур. Эйни заманда биткиләр да арасы кәсилмәдән харичи мүһитә тәсир эдир вә ону дәйишдирир: торпағын кимйәви тәркиби, физики гурулушу, рүтубәти дәйишир. Биткиләр бир ердә битдикдә бир-бирләринә да мүййән тәсир кәстәрир.

Беләликлә, организм илә онун яшадығы мүһит арасында бир вәһдәт вардыр. Буна көрә да онларә һәмишә бирликдә бахылмалыдыр. Һәлә 1861-чи илдә бөйүк рус физиологу И. М. Сеченов белә язмышдыр: «Организмн әлми сурәтдә мүййәнләшдирдикдә она тәсир эдән мүһит да мүтләг дахил эдилмәлидир, чүнки мүһитсиз организмн варлыгы мүмкүн дейилдир»¹.

Беләликлә, һәр битки организмнин инкишафында дахили вә харичи мүһитин бир-биринә тәсиринин, онларын гаршылыгы әлағәләринин, диалектик вәһдәтини көрүрүк.

Һәяти формалар вә эколожи типләр. Чичәкли вә тохумлу биткиләр яшайыш шәраитиндән асылы оларга мүхтәлиф йолла инкишаф этдийиндән мүхтәлиф гурулушлу векетатив органлар эмалә кәтирир вә нәтижәдә мүхтәлиф һәяти формалар мейдана чыхыр, мәсәлән, палмалар, сағсаул, ири малдилиләр вә и. а. Бунларын һамысы ағач формасында олмасына бахмаяраг бир-бириндән кәскин сурәтдә фәргләнир. Исти өлкәләрдә битән палмаларын сүтүн кими будагланмаян көвдәси олур, тәпәләриндә аз мигдарда ири вә гүввәтли ярпағы вардыр. Бу ярпаглар бир нечә ил төкүлмәдән галыр. Көвдәсинин ашағы һиссәсиндә кәндир кими дәстә һалында әләвә көкләр эмалә кәлир. Торпаға вертикал кәдән ана көкдән янларә чохлу гол айрылыр.

¹ В. В. Маховка, П. В. Макаров, К. Ю. Кострюкова. Умуми биология, русча, сәһ. 23, 1950-чи ил.

Орта Азиянын гүмдү сәһраларында битән сагсаул ағачы (*Haloxylon ammodendron*) ярпагсыз кими жөрүнөн яшыл чубуглардан ибарәт будаглы ағач мешәләри әмәлә кәтирир. Лакин һәмнин будагларын үзәриндә пулчуг шәкилли вә бир-бирилә битишәрәк көвдәнин бою узуну бору тәшкил әдән ярпаглары вардыр.

Ағачшәкилли малдилинин (*Cereus*) ярпаглары йохдур вә онларда ялныз габарыглар үзәриндә хырда чыхынтылар галмышдыр ки, һәмнин чыхынтыларын үзәриндә тиканлар отурмушдур.

Бунун әтли көвдәси ярпаг вәзифәсини көрүр. Бу яшыл көвдәнин ичәрисиндә әһтият сую сахлаян тохумалар инкишаф әтмишдир.

Көстәрилән дөрд һәяти форма арасында харичи формадан башга дахили хусусийәтчә дә бөйүк фәрг вардыр. Бунлар харичи мүнһитин тәсиринә гаршы уйғунлашдыглары кими һәмнин мүнһити дә дәйишдирир. Йәһни харичи мүнһитлә гаршылыглы сыхы әлагәдәдир (шәкил 73, 74).

Биткиләрин гураглыға уйғунлашмасы. Сәһраларда, ярымсәһраларда, чөлләрдә битән биткиләр гураглыға уйғунлашма хусусийәтләрилә башга мүнһитин биткиләриндән фәргләнир. Мәсәлән, малдили биткиләри сәһраларда битдийинә жөрә, ярпаглары хейли кичиләрәк тикана чөврилмишдир, әксинә, онларын су әһтияты тохумалары инкишаф әтмиш вә ярпагларын ассимлиясия вәзифәси әтли, йоғун көвдә васитәсилә апарылыр. Бунлар торпагдан чыхарылдыгдан сонра айларта тәләф олмур, чүнки онларда су әһтият чохдур, бухарланма ағызчыглары исә аздыр.

Гураг чөлләрдә битән дөвәтиканы (*Alhagi*) биткисинин көкләри чох дәринә кәдыр. Битки һәмнин көкләр васитәсилә торпагын дәринликләриндәки ералты сулардан истифадә әдир. Одур ки, чәгинликлә алынган суя гәнаәт әтмәк үчүн онларда ярпагларын мигдары аздыр, ярпагын вәзифәсини яшыл көвдәләр көрүр.


Гураглыг биткиләринин әксәрийәти өзләрини сусузлугдан горумаг үчүн ярпагларынын үзәриндә түк вә я пулчуг кими чыхынтылар әмәлә кәтирир. Бәзи түк вә пулчуглар һава илә долу олур. Бунлара һава нәгл әдәнләр дейилир. Абшеронун дәниз кәнары гүмларында битән боз сармашыг (*Convolvulus persicus*) биткисинин бүтүн ерүстү органлары күмүшү, ағымтул рәнкли бу чүр түкләрлә сых өртүлмүшдүр. Һәмнин түкләр бир тә-



Шәкил 73. Ағачшәкилли һәяти формалардан бири олан палма.

рәфдән күнәшин шиддәтли ишығыны әкс әтдирир, дижәр тәрәфдән суюн бухарланмасына мане олур. Бизим ярымсәһраларда вә аранларда яй фәслинин гызгын күнләриндә бүтүн биткиләрин ағымтыл рәнкдә көрүнмәсинин сәбәби, онлары ағ кечә кими түк басмасыдыр. Буну аран йовшанлыгларында (*Artemisia*) яхшы көрмәк олар.

Түкләр өз шәкилләри вә гурулушлары әтибарилә чох мүхтәлиф олур (шәкил 75).




Шәкил 74. Ағачларын мүхтәлиф һәяти формалары: 1—сагсаул, 2—кактус (малдили).

Гидаланмасындан асылы олараг биткиләр харичи шәрантә уйғунлашдығы кими, гидаланма үсулундан вә маддәләр мүбадиләсиндән дә асылы олараг уйғунлашырлар.

Эпифитләр. Рүтубәтли тропик мешәләрдә бәзи отлар ири вә бөйүк ағачларын көвдәләри, будаглары вә һәтта ярпаглары үзә-

риндә өзләрине элверншли шэрант тапараг яшайыр. Белә битки-
лэрэ э п и ф и т б и т к и л э р дейилыр.

Паразитлэр вэ ярымпаразитлэр. Паразит биткилэр яшыл
биткилэр кими өзлэри гида назырлая билмэйиб, үзви гиданы на-
зыр-налда башгасындан алыр. Ярымпаразитлэр исэ гида назыр-
ламаг габилыйтине малик олмаларына бахмаяраг, назырладыг-
лары гида онлары тэмин этмэднийндэн башга биткидэн дә үзви
гида алыр.




Шәкил 75. Нава нәгл эдән мұхтәлиф түк формалары
вэ пулчуглары.

Паразитлик вэ ярымпаразитлик мүйейән тәкамүл йолу илә
инкишаф нәтичәсиндә мейдана чыхмышдыр. Паразит һалда
яшаян чичәкли биткиләрден бири, гызыл сармашыгдыр. Онун

нөвләри мэдәни вэ ябаны отларын, бә'зән дә ағачларын үзәриндә
паразит һалда яшайыр. О, ябаны биткиләрден—кичитка-
нын, кәндәлашын, дөвәтканын, мэдәни биткиләрден—соғанын, га-
райончанын, ағачлардан—сөйүдүн, дарангынын, ағчагайынын,
и. а. үзәриндә раст кәлир.

Паразитин ағымтыл-сары, сары вэ я гонур рәнкли сап шәкил-
ли көвдәси башга биткинин көвдә вэ будагларына һәр тәрәфләп
сармашыр вэ хусуси әмзикләрини онун гида боруларына баты-
рараг гидаланыр (шәкил 76). Чыхынты шәклиндә олан әмзикләр



Шәкил 76. Кичиткан үзәриндә гызыл сармашыг паразити:

1—гызыл сармашыг чичәйинин узунуна кәсипини; 2—үзәриндә гызыл
сармашыг олан кичитканын үмуми көрүнүшү; 3—гызыл сармашыгын
тохумунун чүчәрмәси; 4—сайибинин бөдәнинә бурахдыгы әмзикләрин
дахили көрүнүшү.

паразитин биткийә тохунан ериндә әмәлә кәлир. Паразити бит-
кидән айырмаг чәтин олмур. Паразити биткидән айырдыгда, го-
нарылмыш ердә әмзикләрин әмәлә кәтирдийи яра айдын көрү-
нүр. Гызыл сармашыг паразити өз әмзийини биткийә батырдыгы
ердән нәинки үзви гидалары, һәтта сую вэ башга маддәләри дә
алыр.

Паразитин яшайышы илә әлагәдар олараг өз бөдәнинин гол-
будагланмасына әһтиячы олмур. Яшыл биткиләрдәки ярпаг әвә-
зиндә паразитдә олдугча хырда, рәнксиз, пулчуглар шәклиндә
ярпаглар әмәлә кәлир. Көкләри чох зәиф олур вэ я һеч олмур.
Үмумийәтлә паразитин торпагла һеч бир әлагәси галмыр. Уза-
ныр, о тәрәф бу тәрәфә бурулараг паразит һәят кечирмәк үчүн
битки ахтарыр. Гәрибә бурасыдыр ки, чүчәрдийи заман яхынлы-
ғындакы гурумуш биткиләрә дейил, ялныз чанлы биткиләрә са-
рыныр. Гызыл сармашыгын тохумлары ялныз торпагын үзәриндә
чүчәрир, торпагын алтында чүчәрдикдә гида ала билмәдийи үчүн

мәһв олур. Одур ки, бунларла мүбаризә этмәк үчүн торпағы дәрин шум этмәк لازمдыр.

Әкәр бу паразит биткийә сарына билмәзсә, о заман дахилиндә хлорофил әмәлә кәтирмәклә бир мүддәт мүстәгил гидаланыр. Бурадан белә нәтичә чыхармаг олар ки, паразитләрин әчдады яшыл вә мүстәгил яшаян биткиләр олмуш, сонралар паразитлийә алышмышдыр. Чичәкләри рәнксиз вә я чәһрайы олуб көвдә үзәриндә юмаг шәклиндә топланмыш чичәк групу әмәлә кәтирир.

Чох яйылмыш чичәкли паразит биткиләрдән бири дә с ү м ү р к ә н (*Orobanche*) биткисидир. Онун нөвләри һәм ағач, һәм дә от биткиләринин көкләри үзәриндә паразит һалда яшайыр. Бу паразитдән ән чох зәрәр чәкән мәдәни биткиләр күнәбахан, түтүн, бә'зи тәрәвәз биткиләри вә мешә ағачларыдыр.

Паразит тохумундан сап шәклиндә чүчәрти әмәлә кәлиб, саһибинин көкүнә янашыр вә әмзийи васитәсилә она сохулур. Саһибинин көкү үзәриндә һәмин ердә бир габарыг әмәлә кәлир. Бу заман паразит яранын әтрафындакы тәзә тохумалара сохулур. Һәмин габарыгдан паразитин көвдәләри чыхыб ер үзәринә яйылыр. Көвдәләрин үзәриндә пулчуглар шәклиндә гейри яшыл ярпагчыглар олур. Көвдәнин учунда салхымшәкилли, кирли абы, яхуд сарымтыл рәнkdә чичәк групу әмәлә кәлир. Бу биткинин бүтүн ерүстү органлары сарымтыл гонур рәнkdә олур.

Сүмүркән биткиси векетатив чохалма заманы саһибинин көкү үзәриндә отурдуғу ердә әмичи телләрдән вә көк үскүйүндән мәһрум олан көкләр әмәлә кәтирир. Бу көкләр саһибинин ени көкүнә гәдәр узанараг әмзик васитәсилә онун ичәрисинә кирир. Бу заман һәмин ерин чөлүндә габарыг әмәлә кәлир.



Бә'зи паразитләр чохиллик биткиләр үзәриндә 2—3 ил яшайыр вә гышы саһибинин көкүндә кечирир.

Сүмүркән паразити чох вахт мәдәни биткиләри әлә бир һала салыр ки мәдәни битки тамам тәләф олур.

Бә'зән дә паразитлә саһибни арасында мүбаризә нәтичәсиндә паразит тәләф олур. Белә һалларда паразитин саһибин органына сохулдуғу ердә һүчәйрәләр артыб чохалараг паразити һәр тәрәфдән сыхышдырыб тәләф әдир.

Паразитләрдә башга хусусийәтә дә тәсадүф әдилир: мәсәлән бир паразит мүәййән саһибә уйғунлашыр вә ялныз һәмин нөв биткидән истифадә әдир, анчаг сүмүркәндә белә бир ихтисаслашма мүшәһидә әдилмәмишдир. Бә'зи паразит һеч гоһум олмаян биткиләрдән истифадә әдир, мәсәлән әйни паразитә мүрәккәбчичәклиләрин, бадымчанчичәклиләрин, чәтирчичәклиләрин нүмайәндәләринин көкләриндә раст кәлмәк олур.

Бир-биринә чох яхын олан битки сортлары паразити гәбул этмәк чәһәтдән бир-бириндән кәскин сурәтдә фәргләнир. Бә'зиләри паразитин һүчумуна гаршы яхшы давамлы олур. Йә'ни иммуни-




Шәкчл 77. Күнәбаханын сүмүркән паразити.
1—сүмүркән паразитинә гаршы давамсыз олан күнәбахан сортунун көкү;
2—һәмин паразитә давамлы сортун көкү.

тетлик көстәрир вә хәстәлийә тутулмур, дикәрләри исә, әксинә, иммунитетсиз олуб тамамилә хәстәлийә тутулур (шәкил 77).

Иммунитетли сортлар сечилмәсинин тәсәррүфат үчүн бөйүк әһәмийәти зардыр. Чүнки беләликлә, паразитлә мүбаризә мәсәләси һәлл әдилмиш олур.

Паразитләрин дә өз араларында мүхтәлиф сортлары вардыр. Онларын һәр бири өзүнә мәхсус паразитлик гүввәсилә саһибинә һүчум әдир, одур ки, мәдәни биткиләрин иммунитетли сортларыны сечән заман паразитләрин бу хүсусийәти дә нәзәрә алынмалыдыр.

Паразитләрдән бири дә ағач сүмүркәни вә я Петров крест (*Lathraea erecta*) биткисидир. О, чох заман торпаг алты һәят кечирир вә ән чох мешәләрдә ағач вә кол биткиләринин көкләринә сохулараг яшайыр. Әксәрән фындығын, гы-



Шәкил 78. Мешәләрдә ағачларын көкү үзәриндә ағач сүмүркәни паразити (*Lathraea erecta*).


зылағачын, алма ағачынын көкләриндә олур. Язда торпағын үзәриндә кирли абы рәнkdә чичәк групу әмәлә кәтирир, торпағын алтында исә ағымтыл рәнkdә будагланмыш көвдәси әмәлә кәлир

ки, онун да үзәриндә пулчуглар шәклиндә йоғун вә яшыл рәнkdән мәһрум ярпаглар олур. Бу ярпаглар чохлу нишаста әһтият амбары вәзифәсини көрүр. Һәммин паразитин көк соручулары саһибинин көкләриндә су вә я гида йолларына сохулараг орадан гидаланыр.

Ағач сүмүркәни паразитинин тохумунда гида маддәси илә зәнкин чыхынты олур. Азач сүмүркәни тохумлары торпағын ичинә вә я ерә төкүлмүш ярпагларын алтына топлашырлар. Бурада онлар әлверишли шәрантдә саһибинин көкү янында чүчәриб онун көкләринә сохулур. (шәкил 78).

Өксәоту Бағабурчу (*Viscum album*) паразити торпагла һеч бир әлагәси олмаян вә ағачларын будағында яшаян яшыл биткидир. Буна ән чох алма, армуд, говаг ағачларында, аз һалларда әзкил, ағ акасия, сөйүд вә емшанләрдә тәсадүф әдилир. Бу паразит ағачлар үзәриндә узагдан ири гуш ювасына бәнзәйир. Бунун әмзикләри—«көкләри»саһибин көвдәсинин габығы илә одунчаг һиссәси арасында яйылмыш олур (шәкил 79).

Бу битки яшыл ярпаглары вә будаглары васитәсилә һавадан карбон газыны алыб үзви маддәләр һазырладығына көрә куман әдирләр ки, «көкләрини», әмзикләрини саһибинин көвдәсиндән кечән су йолларына батырараг орадан су вә мәһлул һалында минерал маддәләри алыр, одур ки, буну ярымпаразит һесаб әдирләр. Белә бир фикир һәләлик мүбаһисәлидир. Бунларда мүхтәлиф саһиб үзәриндә мүхтәлиф тәркибли маддә олур. Һәммин биткидән ган тәзийгинин артмасынын мүаличәси үчүн истифадә әдирләр. Өксәотуну һейванлар һәвәслә ейир, бу заман һейванлар һәм көкәлир вә һәмдә яғлы сүд верирләр.



Шәкил 79. Өксәоту (*Viscum album*) паразити ағач көвдәсиндә.

Ярымпаразитләр. Тәкамүл чәһәтдән ярымпаразитләр, автотроф биткиләрә әсл паразитләр арасында кечид тәшкил әдир. Паразитләрә нисбәтән ярымпаразитләрдә векетатив органлар (ярпаг, көк) яхшы инкишаф этмишдир, одур ки, ярымпаразитләр гейри-үзви маддәләрдән үзви маддәләр һазырлая билир вә онун һесабына яшайыр. Лакин бунларда әсл автотроф биткиләрә нисбәтән көк системи чох зәиф инкишаф этмишдир. Ярымпаразит-

ларин көклери автотроф биткилерин көклеринэ япышараг һәм ин биткилерин чох инкишаф этмиш көклери илэ торпагдан алдыглары су вэ минерал маддэлэрдэн истифадэ эдир. Үзви маддэлери исэ, көрүнүр онларын өзлери һазырлайыр. Ярымпаразитлэр үзриндэ апарылан тэдгигат көстөрмишдир ки, һәм ин яшыл биткилэр һэгигэтэн ассимиляция вэ үзви маддэ һазырламаг габилий-йэтинэ маликдир, бир гэдэр паразитликлеринин сәбәби исэ, су илэ лазымынча тәмин олунмамаларыдыр. Бунларын әксәриййәти гурдағзычичәклилэр фәсиләсиндәндир, мәсәлән, гарабуғда (*Melampyrum*), битоту (юваоту) (*Pedicularis*), көзоту (*Euphrasia*) вэ с.

Бу көстәрилән ярымпаразитләрин чогу чәмәнләрдә раст кәлән алат отларыдыр. Бунлар отлағларын ем отлары арасында ән пис вэ ейилмәйәни олмагла бәрабәр, дәйәрли ем отларыны да сыхышдырыб арадан чыхарыр. Һәтта элэ ола билир ки, ярымпаразит өз нөвүндән олан гоншу ярымпаразитин көкүнә япышыр. Гурдағзычичәклилэр (*Scrophulariaceae*) фәсиләсиндә автотрофдан башлайыб та паразитләрә гэдәр кечид нүмайәндәләринә раст кәлмәк олур, мәсәлән ағач сүмүркәни (*Lathraea erecta*) адланан там паразит һәм ин фәсиләдәндир.

Сапрафитләр элэ биткиләрди ки, һейван вэ битки галығлары кими чүрүнтүләрдән үзви маддэлери һазыр һалда алыр. Али биткиләр арасында һеч бир сапрафит нүмайәндә йохдур. Спрафитләр хлорофилдән мәрһум олдуғларындан өзлери үзви маддә һазырлаа билмир. Одур ки, бунларын бәдәнлери көк вэ ярпаг кими органлара айрылмамышдыр. Бу ахырынчы хүсүсиййәтләринә көрә онлар паразитләрә охшайыр. Спрафитләр башлыча олараг бактериялар вэ көбәләкләр кими битки группалары арасында чох кениш яйылмышдыр.

БӨЙҮМӘ ВЭ ИНКИШАФ

Биткилерин бөйүмәси вэ инкишафы бир-биринин эйни дейилдир. Бөйүмә битки органларынын күтләсинин артмасына дейилдир. Башга сөзлә бөйүмә биткинин кәмийәтчә дәйишмәсидир. Биткилерин инкишафы исэ, тохум сәпиләндән ени тохумлар етишәнә гэдәр битки һүчәйрәлери ичәрисиндә лазымы кейфиййәт дәйишикликлери вэ кенератив орган әмәләкәтирмә просесләри баш вермәк үчүн биткинин кечирдийи һала дейилдир.

Бөйүмә биткинин инкишаф хассәләриндән биридир. Бөйүмә хассәси биткинин тәбиәтиндән, онун әтрафында олан харичи мүнһит шәраитиндән, һәмчинин биткинин инкишаф мәрһәләсиндән асылы олараг мүнһәлиф дәрәчәдә ифадә олуна биләр. Биткиләрдә инкишаф ардычыл сурәтдә кедән бир сыра мәрһәләләрдән ибарәтдир. Бу мәрһәләләр бир-биринин ардынча ганунауйғун сурәтдә кедир. Бөйүмә вэ инкишаф айры-айры һадисәләр олса да, бир-биринә мұвафиг тәрздә эйни заманда кедә биләр. Тәбиәтдә хүсүсән бириллик биткиләрдә бөйүмә просеси илэ бәрабәр бүтүн

инкишаф мәрһәләлери дә давам эдәрәк, мейвә әмәлә кәлмәси илэ нәһайәтләнир. Лакин бөйүмә вэ инкишаф просесләри айры-айры йолларла кедә биләр. Мәсәлән, пайызда әкилмәйиб язда әкилмиш пайызлыг буғда, бүтүн яй узуну, та шахта дүшүнчәйә гэдәр күтләсини бөйүдәчәк вэ ени-ени зоғлар әмәлә кәтирәрәк колланачагдыр, анчаг баш чыхармаячагдыр (чичәк көвдәси әмәлә кәтирмәйчәкдир). Башга сөзлә, буғда бөйүйчәкдир, анчаг инкишаф этмәйчәкдир. Йәгин ки, бу һалда белә бир биткидә биринчи инкишаф мәрһәләси яровизасия битмәдийинә көрә, сонракы инкишаф мәрһәләләринин дә кетмәсинә вэ биткинин там инкишафына мане олачагдыр. Дикәр тәрәфдән, биткидә мүййән мүддәт әрзиндә бөйүмә даяна биләр, инкишаф исэ нормал һалда һәрәкәтини давам этдирәр.

Академик Лысенко тәрәфиндән ики инкишаф мәрһәләси мүййән әдилмишдир: бири яровизасия мәрһәләси, икинчиси ишыг мәрһәләси. Һәр мәрһәләнин кечирилмәси үчүн мүййән шәраит яратмаг лазымдыр, мәсәлән, пайызлыг биткиләрдә яровизасия мәрһәләсини кечирмәк үчүн биткиләрә ашағы дәрәчәдә һәрарәт, мүййән рүтубәт, һава ахыны вэ и. а. кими харичи факторлар шәраити лазымдыр. Ишыг мәрһәләсини кечирмәк үчүн биткийә ишыг шәраити лазымдыр. Битки бир инкишаф мәрһәләсини кечириб гуртармадан о биринә кечә билмәз, йәни бөйүйәр, анчаг мейвә кәтирмәз.

Лысенко көстөрмишдир ки, бир будағы бою узуну көтүрсәк, онун мүнһәлиф һиссәлери эйни инкишаф мәрһәләләриндә олмаячагдыр.

Тохумлары сәпәркән, рүшеймләрин биринчи инкишаф мәрһәләси кечирмәсинә яровизасия дейилдир. Яровизә әдилмиш тохум яровизә әдилмәмиш тохумдан харичи көрүнүшү илэ һеч фәргләнмир, анчаг торпаға сәпилдикдән сонра чүчәрәндә бир-бириндән кәскин сурәтдә фәргләнир. Язда әкилән пайызлыг биткиләр һеч бир заман көвдә әмәлә кәтирмәдиклери һалда, Лысенконун тәчрүбәси илэ яровизә әдилмиш пайызлыг битки тохумлары язда әкилдикдә көвдәләр әмәлә кәтириб, чичәк ачмыш вэ мейвә вермишдир. Векетасия дөврү узун олан һәгиги язлыг биткилерин тохумларыны сәпиндән табаг яровизә этмәклә онлары чох тез етишән биткиләрә чевирмәк олар. Яровизә әдилмиш биткиләр һәм ин ени газанмыш хүсүсиййәти ирсән нәслдән-нәслә кечирмир вэ икинчи ил һәм ин тохумлары енә тәзәдән яровизә этмәк лазым кәлир. Лысенко көстәрдийи кими, яровизасия мәрһәләсинин ахырында ашағы һәрарәти йүксәк һәрарәтлә әвәз этмәклә биткилерин тәбиәтини дәйишмәк, пайызлыг тахыл биткилерини язлыг тахыл биткилеринә чевирмәк мүмкүн олур. Яровизасия мәрһәләсинин ахырында харичи шәраити дәйишдирмәклә пайызлыг буғдадан язлыг вэ язлыг буғдадан пайызлыг буғда алына биләр.

ГИБРИДЛЭШМЭ

Инсанлар биткилэрн башлыча оларат мейвэ вэ тохум алмаг үчүн бечэрирлэр. Буна көрэ дэ онлар йүксэк кейфийэтли мейвэли вэ тохумлу биткилэр элдэ этмэйэ чалышмалыдырлар. Бу мэгсэди тэ'мин этмэк үчүн биткичиликдэ мүхтэлиф үсуллардан истифадэ эдилир. Нэмин үсуллардан башлычасы гибридлэшдирмэди.

Өз хүсусийэтлэринэ көрэ аз вэ я чох фэрглэнэн мүхтэлиф организмлэрин чинси үсул илэ вэ я векетатив органларыны бир-биринэ чаламаг йолилэ бирлэшдирилмэсинэ гибридлэшдирмэ, бунун нэтичэсиндэ алынан ени организмэ исэ гибридейилир. Гибридлэшдирмэ мүхтэлиф сортлар, чинслэр, нөв мүхтэлифлийн (вариантлар), формалар вэ бир фэсилэйэ аид олан ики чинс арасында ола билэр.

Бэ'зи фэсилэлэр, чинслэр, нөвлэр арасында гибридлэшмэ габилыйэти чох, бэ'зилэриндэ исэ аздыр. Гибридлэшдирмэ проблемини Минчурин даһиянэ сурэтдэ эсасландырмыш вэ һэлэ этмишдир.

БИТКИЛЭРДЭ ЧОХАЛМА

Чохалма чанлыларда эсас биоложи хүсусийэтдир. Чохалмада организмлэрин фэрди инкишафлары (онтогенезлэри) онларын эчдадлары илэ (филогенезлэрлэ) сыхы сурэтдэ элагэдардыр. Чохалма нэтичэсиндэ фэрдлэрин мигдары артыр вэ нөвүн яшамасынын давамы тэ'мин олунур. Лакин бэ'зэн биткилэр өмүрлэриндэ ялыыз бир дэфэ чохалыр, бэ'зилэри исэ узун мүддэт чохалмада давам эдир. Мэсэлэн, бириллик биткилэр бир дэфэ тохум эмэлэ кэтирмэклэ өз яшайыш дөврүнү баша чатдыраар, бир индивид кими тэлэф олур, бир нөв кими онун яшайышыны сонракы нэсиллэр давам этдирир. Икниллик биткилэрдэ мейвэ икинчи илдэ эмэлэ кэлир вэ битки тэлэф олур. Чохилликлэрдэ чинси чохалма һэр ил давам эдир вэ битки тэлэф олмур (мэсэлэн ағачларда вэ чохиллик отларда олдуғу кими).

Мейвэ эмэлэ кэтирмэлэри чөһөтдөн биткилэри ики ерэ бөлмэк олар: монокарплар вэ поликарплар. Монокарплар элэ биткилэрэ дейилир ки, яшадыглары бүтүн мүддэт эрзиндэ ялыыз бир дэфэ мейвэ эмэлэ кэтириб тэлэф олсун. Бурая бүтүн бириллик, икниллик вэ надир һалларда чохиллик биткилэр дахилдир. Бу ахырынчыя лифли юкка (*Jucca filamentosa*), ағава (*Agave*) вэ бэ'зи бамбуг нөвлэри мисал ола билэр.

Поликарп биткилэр элэ чохиллик биткилэрэ дейилир ки, онлар бүтүн яшайыш мүддэтиндэ дэфэлэрлэ чичэклэйиб мейвэ версин.

Биткилэрдэ үч чүр чохалма вардыр: векетатив, гейри чинси вэ чинси чохалма.

Векетатив чохалма элэ чохалма нөвүнэ дейилир ки, биткинин һэр һансы органындан айрылмыш һиссэ битэрэк тамамилэ мүстэгийл яшай билсин, мэсэлэн, көвдөниң, көкүн, ярпағын вэ я чанлы тохуманын кэсилмиш бир һиссэсиндэн бөйүсүн вэ инкишаф этсин. Биткилэрдэ һэр һансы һиссэни бэрпа этмэк габилыйэтинэ рекенерасия вэ я рэститусия дейилир. Биткилэрдэ кениш яйылмыш олан бу хүсусийэт векетатив чохалманын эсасыны тэшкил эдир. Бир чох биткилэр векетатив үсулла чохалыр. Мэсэлэн, тэнэк, сөйүдлэр, чинарлар вэ саирэ чиликлэр васитэсилэ, ачыот—көклэри васитэсилэ, бегония, чийэлэклэр—ярпаглары васитэсилэ дэ чохала билир.

Гейри-чинси чохалма башлыча оларат ибтидан биткилэрдэ спорлар вэ я зооспорлар васитэсилэ олур. Спор вэ я зооспор тэк-тэк һүчейрэлэрдир. Онлар протопласт илэ бир вэ я ики нүвэдэн ибарэт олур. Зооспор су мүнитиндэ яшай билдийиндэн һэрэкэт үчүн бир вэ я ики, бэ'зэн дэ чох гамчылы олур; спор исэ гамчысы олмадығындан актив һэрэкэт эдэ билмир. Бунунла да зооспордан фэрглэнир. Бундан башга зооспорда бэ'зэн хромотофор (хлорофил) вэ я башга пигментлэр олур. Бу ахырынчы хүсусийэт йосунларын зооспорларына аиддир. Көбэлэклэрин зооспорларында хлорофил олмур.

Биткилэрин чохунда спорлар фэрди инкишафларынын мүййән дөврүндэ эмэлэ кэлир. Етишмиш спорлар сонралар ана биткидэн айрылараг элверишли шэраитэ дүшдүкдэ чүчэриб һэмин битки нөвүнүн башланғычыны эмэлэ кэтирир.

Чинси чохалма эйни нөв организмдэн айрылмыш вэ физиоложи чөһөтдөн мүхтэлиф хассэли ики һүчейрэниң вэ я һиссэниң мөһтэвийятларынын бир-бирини ассимиляция этмэси нэтичэсиндэ мейдана чыхан һүчейрэ васитэсилэ олур. Бу һүчейрэниң бири физиоложи эркэк, дикэри диши хасийэтини дашыйыб һамета адланыр. Ниссэлэрин гаршылыгы ассимиляциясындан эмэлэ кэлэн маяланмыш һүчейрэ зигота адланыр. Чинси чохалмада индивид енидэн фэрди һэята башлайыр.

Бир сыра биткилэрдэ, мэсэлэн, бактерияларда вэ көй яшыл йосунларын чохунда чинси артма йохдур, онлар гейри-чинси йол илэ, даһа доғрусу, бэсит бөлүмнө васитэсилэ чохалыр. Бактериялар спор эмэлэ кэтирилэрсэ дэ, һэр бактериянын эмэлэ кэтирдийи спордан ялыыз бир бактерия эмэлэ кэлдийиндэн буна чохалма кими бахылмыр. Лакин гейд этмэк لازمдыр ки, бу көстэрилэн чохалма нөвлэри арасында кэскин фэрг йохдур вэ бунларын һамысынын эсасында маддэлэр мүбадилэси дурур.

ВЕКЕТАТИВ ЧОХАЛМА

Мейвэчиликдэ, мешэчиликдэ, тэрэвэчиликдэ вэ хүсусэн гибрид мейвэ ағачларынын чохалдылмасында векетатив чохалмадан кениш истифадэ эдирлэр. Умумийэтлэ мейвэ ағачларындан тез мөһсул алмаг үчүн векетатив йол илэ чохалтмаг тохум васитэсилэ чохалтмагдан даһа элверишлидир, чүнки ағач биткилэри

тохумларла чоҳалдыгда мәнсул вермәси үчүн узун мүддәт ләзым кәлир. Векетатив чоҳалмада индивидин яшайышынын арды давам этдийи һалда, кенератив чоҳалмада ени һәят башланыр.

Бә'зи биткиләр өзләриндән мүәййән һиссә айырыр вә һәмийн һиссәләр айрылдыгдан сонра мүстәгил бир организм кими яшайыр, мәсәлән, май көбәләкләринин, чийәротлары мамырларынын, бә'зи тропик гыжыларын әмәлә кәтирдикләри тумурчуглар кими. Бир сыра биткиләр көк бичләри, будаглары, соғанлары, юмру көвдәләри, көкүмсов көвдәләри илә артыб чоҳалыр.

Бә'зи биткиләрин көкүндән әмәлә кәлән бичләри ана биткидән айыраг башга ердә әкирләр ки, буна бичләр вә я күчүкләр васитәсилә чоҳалтма дейилир. Бә'зи биткиләрин торпаға яхын будагларыны әйиб үзәрләринин торпагла өртдүкдән сонра оңларын дүйүн һиссәләриндә әләвә көкләр әмәлә кәлир. Белә будаглары кәсиб анадан айыраг башга бир ердә әкирләр. Бә'зән бу һал тәбии олараг өз-өзүнә кедир вә беләликлә, биткиләр гыса мүддәтдә әтрафа яйылыр, мәсәлән чийәләкләрдә, бөйүрткәнләрдә олдуғу кими. Белә биткиләр будаглары илә торпаға тохундугда торпагла өртүлмүш дүйүнләриндә әмәлә кәлән әләвә көкләр һәмийн буадаглары гыда илә тәмин эдир. Белә будаглар анадан айрылараг мүстәгил яшайыр. Беләликлә, биткиләр тәбиәтдә арасы кәсилмәдән артыр. Бир чоҳ ситрус биткиләринин (лимон, портахал, нарынч вә с.) ерүстү будагларынын габыг һиссәсини үзүк һәлә

гәси кими кәсиб кәтүрдүкдән сонра ичи торпагла долу күлдән ичәрисинә салараг, бир гәдәрдән сонра бу будағын торпаг ичәрисиндә галмыш һиссәсиндән кәкләр әмәлә кәләчәкдир, белә бир будағы ана биткидән айырыб ени мүһитдә әтдикдә мүстәгил яшай билир.

Бә'зән соғанлыглы биткиләрин соғанаглары әтрафында әмәлә кәлән балалары (дишләри) айырыб әкмәклә артырылыр (мәсәлән, сүсәнләр, зә'фәран, сарымсаг вә саирә).

Картофлары ералты юмру көвдәләрлә, көрки чичәйини (*Dahlia*) вә бататы юмру көкләрлә артырырлар. Тәбиәтдә көкүмсов көвдә васитәсилә чоҳалма бир чоҳ ябаны от биткиләри арасында кениш яйылмышдыр. Мәдәни биткиләрдән бә'зи замбаглар (*Iris*), инчи чичәйи (*Convallaria majalis*), нанә (*Mentha piperita*), бамбуг (*Bambusa*) кими биткиләри көкүмсов көвдәләри васитәсилә артырырлар. Алаг отларындан чайыр (*Cynodon dactylon*), гаяоту (*Agropyrum repens*), ачыот (кәкрә) (*Acroptilon repens*) вә с. көкүмсов көвдәләри васитәсилә сүр'әтлә артыр.

Чилик васитәсилә чоҳалтма.

Чилик васитәсилә чоҳалтма үсулундан тәчрүбәдә чоҳ кениш истифадә эдилир вә онун бөйүк әһәмийәти вардыр. Чилик сүн'и олараг будагдан вә башга органлардан кәсилмиш зоғ һиссәсинә дейилир ки, бу һиссә торпагда вә я башга әлверилиш мүһитдә көк әмәлә кәтирир вә нәтичәдә мүстәгил бир битки кими яшамаг игтидарына малик олур. Чиликдән әмәлә кәләрәк мүстәгил яшамаға башлаян битки гүтбләшмә һадисәси әсасында бөйүйүр, йә'ни будаглар һәмийнә зоғун морфоложи юхары һиссәсиндән, көкләр исә онун әкси олан учдан, йә'ни морфоложи ашағы һиссәсиндән әмәлә кәлир. Әкәр тез көк верән биткиләрдән (мәсәлән, сөйүдүн) морфоложи юхары һиссәсини ашағы, морфоложи ашағы һиссәсини юхарыя доғру (рүтүбәтли һавасы олан ердә) ассаг, о заман морфоложи юхары һиссәсиндән юхарыя доғру будаглар вә морфоложи ашағы һиссәсиндән ашағыя доғру көкләр әмәлә кәләчәкдир (шәкил 81).

Көвдәни хырда һиссәләрә бөлүб әксәк, гүтбләшмә өзүнү кәстәрәчәкдир. Һәтта айры-айры һүчәйрәләрдә дә бир-биринә әкс гүтблүлүк хүсусийәти вардыр. Торпаға әкилмиш чилийә әлверилиш шәраит ярадыларса, бир гәдәрдән сонра көк әмәлә кәтирәчәк вә онун торпагүстү һиссәсиндә әмәлә кәлән тумурчуглардан зоғлар инкишаф этмәйә башлаячагдыр.

Биткиләри векетатив чоҳалтмаг үчүн будаглардан, яраглардан вә көкләрдән чиликләр һазырланыр.

Әч чоҳ истифадә эдилән чилик будаглардан алынән чиликләрдир ки, бу да ики чүр олур: 1) гыш чилийи (ярагсыз), 2) яй чилийи (яраглы, яшыл). Гыш чиликләриндә көк рүшәйми



Шәкил 80. Торпаглы күлдән кечирилмиш будаглар васитәсилә чоҳалтма.



Шәкил 81. Гаранлыг вә рүтүбәтли ердә асылы һалда көйәрдилмиш ики сөйүд гәләми (чилиийи)

1—нормал вәзийәтдә; 2—тәрсинә вәзийәтдә (тәпәс ашағы); 3—зоғлар; к—әләвә көкләр; н—гәләмләр (чиликләр) асылан саплар.

олур ки, бунлардан элверишли шэрайтдэ элавэ көклэр инкишаф эдир. Гыш чилийн элдэ этмэк үчүн 1, 2, 3-иллик зоғлардан истифаде эдирлэр. 2, 3-иллик зоғларда көк рүшейминин чох олмасына бахмаяраг тэчрүбэдэ бириллик зоғлардан чох истифаде олунур. Векетатив чохалма үчүн назырланан чилийн узунлуғу 5—15 см йоғунлуғу 0,5—2 см олмалыдыр. Гыш чиликлэри яза гэдэр гумда янакы вэзиййэтдэ сахланмалы вэ язда торпаға экилмэлидир.

Яй чиликлэри битки ярпаг ачандан сонра кэсилэрэк алыныр, бу заман, зоға чох чидди яра вурулмуш олур, һәмин кэсийин үзэриндэ пэрдэ кими пробка тэбэгэси эмэлэ кэлир ки, бунунла битки харичи хэсталиклэрдэн өзүнү горуюр. Бу пэрдэнин алтында һүчейрэлэр сүр'этлэ бөлүнэрэк пробка камбиясы эмэлэ кэтирир ки, онлардан да пробка тохумалары эмэлэ кэлир. Бурада тез бир заманда һалга шэклиндэ габарыг эмэлэ кэлир ки, буна к а л л ю с дейилир. Бунун эмэлэ кэлмэсиндэ камбия, икинчи габыг, өзэк шуалары, одунчаг һиссэси, паренхим иштирак эдэ билэр. Каллюсда тэдричэн нэглэдики тохумалар эмэлэ кэлир. Чилийн морфоложи ашағы һиссэсиндэки камбияда көклэрин рүшейми эмэлэ

кэлир. Чилийн морфоложи юхары учунда да каллюс эмэлэ кэлэ билэр ки, бэ'зэн бурада бир чох тумурчуғун рүшейм-лэри ерлэшмиш оулр. Каллюсун ашағы һиссэси һэмишэ гүв-вэтли олур. Каллюсун кифайэт гэдэр инкишафы нэтичэсиндэ тумурчуғлар инкишаф эдэрэк чохлу зоғ верир. Ади һалда зоғлар ян тумурчуғлардан эмэлэ кэлир. Чичэклэрдэ элавэ тумурчуғлар олмур.

Чиликлэрдэ элавэ көклэрин эмэлэ кэлмэсини сүр'этлэндир-мэк үчүн а у к с и н, яхуд б о й м а д д э с и адланан васитэлэрдэн истифаде эдирлэр. Бу чүр маддэлэр биткинин өзүндэ дэ назырланыр. Бой маддэсинин мейвэчиликдэ, үзүмчүлүкдэ, мешэчиликдэ, чичэкчиликдэ вэ саирэдэ тэтбигинин бөйүк әһәмиййэти вардыр. Чиликлэр васитэсилэ чохалмада адэтэн чалышырлар ки, каллюс чилийн көк эмэлэ кэтирэн ашағы һиссэсиндэ олсун, будаглар исэ

Шәкил 82. Ярпаглардан көк эмэлэ кэлмәси.

зоғун голтуг тумурчуғларындан инкишаф этсин. Чиликдэ элавэ көклэрин эмэлэ кэлмэси, һәр шейдэн әввэл, чилийн көвдэ һиссэ-

синин әһтият гита маддэлэри илэ тә'мин олунма дәрәчәсиндән асылыдыр. Бә'зи биткилэр мәсәлән, замбағлар, инчичичәйи көкүмсов көвдэлэри васитәсилә чохалдылыр.

Ярпаг чилийн васитәсилә чохалма. Ярпаг вә һәтта онун бир парчасы битмэк габилыййәтинә малик олдуғундан, биткилэри бу васитә илэ дэ чохалтмаг мүмкүндүр. Мәсәлән, бегония, бағчи-чәйи, фикус вә бир сыра башга биткилэр бу гайда илэ чохала билир. Бунларын ярпагларыны нәм гума әкдикдэ, элавэ көклэр вә элавэ тумурчуғлар эмэлэ кәтирэрэк ени битки алмаг олур. Әкәр аясында ири дамарларын будагландығы ердә кәсиклэр эмэлэ кәтирсәк, һәмин кәсиклэрдән элавэ көклэрин вә элавэ тумурчуғларын эмэлэ кәлмәси сүр'әтләнәр (шәкил 82).

Көк чиликлэри васитәсилә чохалма. Бә'зи биткилэрин ян көклэрини ана көкдән кәсиб айырдыгдан сонра онларда эмэлэ кәлән элавэ тумурчуғлардан ерүстү көвдә чыхыр. Беләликлэ, бир биткидән бир чох битки һасил этмэк мүмкүн олур. Көк чиликлэри васитәсилә албалыны, кавалыны, фындығы, бә'зән алмалары, гарайончаны, күллэри, каучук биткилэрини вә бу кими бир чох биткилэри чохалтмаг олар. Көк чиликлэринин узунлуғу 10—20 см олмалыдыр. Әкилмэк үчүн чиликлэр пайыздан назырланараг гумда сахланмалы вә язын әввәллэриндэ торпаға экилмэлидир.

Чалаглар.

Үзэриндэ бир вә я бир нечә тумурчуғу олан бир битки һиссэсинин, көкү торпагда олан биткинин һиссэсилә битишдирилмәсинә ч а л а г дейилир. Бунлардан биринчиси гәләм, икинчиси исэ көтүк адланыр. Чалаг һәм али биткилэрдэ, һәм дэ гатлаглы (таллофит) биткилэрдэ ола билэр. Чалаг, әсасән, биткилэрин нөв вә я сортуну яхшылашдырмаг үчүн вурулур. Гәләмин өзүнә мөхсус көкү олмадығындан, су вә минерал маддэлэри көтүйүн көкү васитәсилә алыр, көтүк исэ гәләмдэ назырланан үзви маддэлэрлэ гидаланыр.

Башлыча олараг элэ биткилэр чалаг васитәсилә чохалдылыр ки, чилик васитәсилә чохалтдыгда элавэ көклэри чәтинликлэ эмэлэ кэлир вә я тохумла чохалтдыгда ана биткийә охшар битки эмэлэ кәтирмир. Биткилэрин чалаг үсулу илэ артырылмасы башлыча олараг бағчылыгда тэтбиг олунур. Назырда йүздән артыг чалаг үсулу мә'лумдур.

Ади һалларда чалаг үчүн пейвәнддән бир нечә тумурчуғлу зоғ кәсилир ки, буна гәләм дейилир, я да көвдәнин үзэриндэ бир тумурчуғу олан габығы одунчаг һиссэсилә бирликдэ кәсилиб көтүрүлүр ки, буна көз ч ү к дейилир. Бунларын һәр икиси көтүклә эйни гайдада бирлэшдирилир. Бунлардан биринчийә гәләм чалағы, икинчийә исэ көз ч а л а г ы дейилир. (шәкил 83а).

Ағачлара гышын ахырларында вә я язын әввәллэриндэ бирил-лик зоғдан кәсилмиш гәләмлә чалаг эдилир. От биткилэрийи исэ яйда чалаг этмэк олар.

олур ки, бунлардан элверишли шэрайтдэ элавэ көклэр инкишаф эдир. Гыш чилийн элдэ этмэк үчүн 1, 2, 3-иллик зоғлардан истифаде эдирлэр. 2, 3-иллик зоғларда көк рүшейминин чох олмасына бахмаяраг тэчрүбэдэ бириллик зоғлардан чох истифаде олунур. Векетатив чохалма үчүн назырланан чилийн узунлуғу 5—15 см йоғунлуғу 0,5—2 см олмалыдыр. Гыш чиликлэри яза гэдэр гумда янакы вэзиййэтдэ сахланмалы вэ язда торпаға экилмелидир.

Яй чиликлэри битки ярпаг ачандан сонра кэсилэрэк алыныр, бу заман, зоға чох чидди яра вурулмуш олур, һәмин кэсийин үзэриндэ пэрдэ кими пробка тэбэгэси эмэлэ кэлир ки, бунунла битки харичи хэсталиклэрдэн өзүнү горуюр. Бу пэрдэнин алтында һүчэйрэлэр сүр'этлэ бөлүнэрэк пробка камбиясы эмэлэ кэтирир ки, онлардан да пробка тохумалары эмэлэ кэлир. Бурада тез бир заманда һалга шэклиндэ габарыг эмэлэ кэлир ки, буна к а л л ю с дейилир. Бунун эмэлэ кэлмэсиндэ камбия, икинчи габыг, өзэк шуалары, одунчаг һиссэси, паренхим иштирак эдэ билэр. Каллюсда тэдричэн нэглэдици тохумалар эмэлэ кэлир. Чилийн морфоложи ашағы һиссэсиндэки камбияда көклэрин рүшейми эмэлэ

кэлир. Чилийн морфоложи юхары учунда да каллюс эмэлэ кэлэ билэр ки, бэ'зэн бурада бир чох тумурчуғун рүшейм-лэри ерлэшмиш оулр. Каллюсун ашағы һиссэси һәмишэ гүв-ветли олур. Каллюсун кифайэт гэдэр инкишафы нэтичэсиндэ тумурчуғлар инкишаф эдэрэк чохлу зоғ верир. Ади һалда зоғлар ян тумурчуғлардан эмэ-лэ кэлир. Чичэклэрдэ элавэ тумурчуғлар олмур.

Чиликлэрдэ элавэ көклэрин эмэлэ кэлмэсини сүр'этлэндир-мэк үчүн а у к с и н, яхуд б о й м а д д э с и адланан васитэлэр-дэн истифаде эдирлэр. Бу чүр маддэлэр биткинин өзүндэ дэ назырланыр. Бой маддэсинин мейвэчиликдэ, үзүмчүлүкдэ, мешэчиликдэ, чичэкчиликдэ вэ саирэдэ тэтбигинин бөйүк әһә-миййәти вардыр. Чиликлэр ва-ситэсилэ чохалмада адэтән ча-лышырлар ки, каллюс чилийн көк эмэлэ кэтирэн ашағы һис-сэсиндэ олсун, будаглар исэ

Шәкил 82. Ярпаглардан көк эмэлэ кэлмәси.

зоғун голтуг тумурчуғларындан инкишаф этсин. Чиликдэ элавэ көклэрин эмэлэ кэлмэси, һәр шейдән әввэл, чилийн көвдэ һиссэ-

синин әһтият гйда маддэлэри илэ тә'мин олунма дәрәчәсиндән асылыдыр. Бә'зи биткилэр мәсәлән, замбағлар, инчиичәйи кө-күмсов көвдэлэри васитэсилэ чохалдылыр.

Ярпаг чилийн васитэсилэ чохалма. Ярпаг вә һәтта онун бир парчасы битмэк габилиййәтинә малик олдуғундан, биткилэри бу васитэ илэ дэ чохалтмаг мүмкүндүр. Мәсәлән, бегония, бағчи-чәйи, фикус вә бир сыра башга биткилэр бу гайда илэ чохала би-лир. Бунларын ярпагларыны нәм гума әкдикдэ, элавэ көклэр вә элавэ тумурчуғлар эмэлэ кәтирэрэк ени битки алмаг олур. Әкәр аясында ири дамарларын будагландығы ердә кәсиклэр эмэлэ кә-тирсәк, һәмин кәсиклэрдән элавэ көклэрин вә элавэ тумурчуғла-рын эмэлэ кәлмәси сүр'әтләнәр (шәкил 82).

Көк чиликлэри васитэсилэ чохалма. Бә'зи биткилэрин ян көк-лэрини ана көкдән кәсиб айырдыгдан сонра онларда эмэлэ кәлән элавэ тумурчуғлардан ерүстү көвдэ чыхыр. Беләликлэ, бир би-гидән бир чох битки һасил этмэк мүмкүн олур. Көк чиликлэри васитэсилэ албалыны, кавалыны, фындығы, бә'зән алмалары, гарайончаны, күллэри, каучук биткилэрини вә бу кими бир чох биткилэри чохалтмаг олар. Көк чиликлэринин узунлуғу 10—20 см олмалыдыр. Әкилмэк үчүн чиликлэр пайыздан назырланараг гумда сахланмалы вә язын әввәллэриндэ торпаға экилмелидир.

Чалаглар.


Үзэриндэ бир вә я бир нечэ тумурчуғу олан бир битки һиссэси-нин, көкү торпагда олан биткинин һиссэсилэ битишдирилмәсинә ч а л а г дейилир. Бунлардан биринчиси гәләм, икинчиси исэ көтүк адланыр. Чалаг һәм али биткилэрдэ, һәм дэ гатлаглы (таллофит) биткилэрдэ ола билэр. Чалаг, әсасән, биткилэрин нөв вә я сортуну яхшылашдырмаг үчүн вурулур. Гәләмин өзүнә мэх-сус көкү олмадығындан, су вә минерал маддэлэри көтүйүн көкү васитэсилэ алыр, көтүк исэ гәләмдэ назырланан үзви маддэлэрлэ гидаланыр.

Башлыча олараг элэ биткилэр чалаг васитэсилэ чохалдылыр ки, чилик васитэсилэ чохалтдыгда элавэ көклэри чәтинликлэ эмэ-лэ кэлир вә я тохумла чохалтдыгда ана биткийә охшар битки эмэлэ кәтирмир. Биткилэрин чалаг үсулу илэ артырылмасы баш-лыча олараг бағчылыгда тэтбиг олунур. һазырда йүздән артыг чалаг үсулу мә'лумдур.

Ади һалларда чалаг үчүн пейвәнддән бир нечэ тумурчуғлу зоғ кәсилир ки, буна гәләм дейилир, я да көвдэнин үзэриндэ бир тумурчуғу олан габығы одунчаг һиссэсилэ бирликдэ кәсилиб көтүрүлүр ки, буна көз чүк дейилэр. Бунларын һәр икиси кө-түклэ эйни гайдада бирлэшдирилир. Бунлардан биринчийә гәләм чалағы, икинчийә исэ көз ч а л а г ы дейилир. (шәкил 83а).


Ағачлара гышын ахырларында вә я язын әввәллэриндэ бирил-лик зоғдан кәсилмиш гәләмлэ чалаг эдилир. От биткилэрийи исэ яйда чалаг этмэк олар.

Чалаг нөвлөрүндөн бири дэ ч э п ч а л а г д ы р. Бу заман гэлэм-лэ кетүк эйни йоғунлугда олмалыдыр. Бу чалаг үсүлүндә кетүк вә гэләм мүвафиг сурәтдә чәпинә кәсиләрәк, һәр икисинин һамар



Шәкил 83. Мүхтәлиф чалаг үсүлләри.

сәтһи үст-үстә гоюлуб сых бағланьр вә я хусуси бағбан япышганы илэ япышдырылыр. Бу үсулла чалаг этдикдә чалышмаг лазымдыр ки, кетүк илэ гэләмин камбия тәбәгәләри үст-үстә дүшсүн. Адәтән кетүк илэ гэләм арасында сары-тонур рәнkdә бир тәбәгә әмәлә кәлир ки, һәммин тәбәгә дә көвдә яраланан заман әмәлә кәлмиш өлү һүчәйрәләрдән ибарәт олур. Бунлар тәдричән



Шәкил 83-а. Көз чалағы.

сорулма йолу илэ арадан галхыр вә бунун әвәзиндә паранхим һүчәйрәләри әмәлә кәләрәк бир-бирилә бирләшир. Бу бирләшдиричи һүчәйрәләр башлыча олараг камбия һүчәйрәләридир. Сонралар бу һүчәйрәләрә су боруларынын һүчәйрәләри бирләшир. Ағачларда гэләм илэ кетүйүн бирләшдийи ердә харичи фыр (калус) әмәлә кәлир ки, бунун васитәсилә дә гэләм кетүк илэ бирләшир.

Габығалты чалаг. Кетүк гэләмдән йоғун оларса, о заман гэләмин ашағы һиссәси чәпинә кәсилир, кәсийин габығ һиссәси исә сахланьр, кетүйүн габығ һиссәси гэләмин кәсик һиссәси узунлугда кәсилир вә гэләмин кәсик һиссәси һәммин габығын алтына гоюлур. Беләликлә, гэләмин одунчаг һиссәси (кәсийи) кетүйүн одунчаг һиссәси үзәринә гоюлуб бағланьр (шәкил 83).

Ярма чалаг. Бурада кетүйүн габығы «Т» шәклиндә кәсилир. Пейвәнд биткидән габыгла бәрабәр кетүрүлмүш тумурчуг һәммин

«Т» шәклиндә кәсилмиш габығын ичәрисинә ерләшдирилиб бағланьр (шәкил 84). Тумурчуг гүввәтли зордан кетүрүлмәлидир. Мейвәчиликдә чалаглардан ән әлверишлиси көз чалағыдыр, чүнки техники чәһәтдән тез баша кәлир, битки аз яраланьр, кетүк дә тез битишир.

Чалағын мүвәффәгийәтли олмасында һәммин нөвләрин систематик (филокенетик) гоһумлуғу чәтин тутмасынын сәбәби нәгләдичи су вә гида бочох бейүк рол ойнайыр. Бирләпәлиләрдә чалағын русу топаларынын низамсыз дүзүлмәси вә камбиянын олмамасыдыр. Икиләпәлиләрдә чалаг әдилән биткиләр бир-биринә яхын гоһум олдугча, чалаг да мүвәффәгийәтли олур. Нөвләр арасында чалаг әтмә асандьр, чинсләр арасында—нисбәтән чәтиндир, фәсиләләр арасында исә—чох чәтиндир. Гейд әдилмәләдир ки, бу ахыр заманларда мүхтәлиф фәсиләләр арасында чалаг әтмәк мүмкүн олмушдур. Мәсәлән, мүрәккәбчичәклиләрдән олан ағкирпий, бадымчанчичәклиләрдән олан гушүзүмүнә, пәлпәтөйүнү—малдилиңә чалаг әтмәк вә саирә мүмкүн олмушдур. Чалаг үсүлунун әһәмийәти бир дә орасындадыр ки, бу васитә илэ тез мәһсул алмаг, шахтая вә гурағлыға давамлылығы артырмаг, мәһсулу кәмийәт вә кейфийәтчә йүксәлтмәк мүмкүндүр. Бәзи һалларда икиәвли биткиләрдә (әркәк биткинин будағларыны диши биткийә чаламагла) чарпаз тозламаны асанлашдырмаг, сынмыш будағлары әвәз әтмәк вә мүхтәлиф бәзәк формалары вермәк мүмкүн олур. Чалаг ишинин мүвәффәгийәтли баша чатмасында ана биткинин фәрди хусусийәтләринин, чалаг үчүн кетүрүлмүш гэләм көзчүкләринин, ана битки үзәриндә чалаг еринин вә биткинин яшынын бөйүк әһәмийәти вардыр.

Гэләм вә көзчүкләр мәһсул верән сағлам биткиләрдән кетүрүлмәлидир. Биткинин бүтүн будағлары вә көзчүкләри эйни олмайыб, һәр биринин битки үзәриндәки ериндән асылы олараг, фәрди хусусийәти вардыр. Онлар һәммин хусусийәтләри узун мүддәт өзләриндә мүһафизә әдирләр. Биткинин чичәк ачмыш ериндән кетүрүлмүш гэләм вә көзчүкләр, адәтән, чохлу чичәк верир, векетатив будағлардан кетүрүлмүш көзчүкләр исә, сүр'әтлә инкишаф әдиб бой атыр, лакин аз чичәк верир. Гэләм вә көзчүкләрин кейфийәти ана биткинин вә будағын яшындан вә онун инкишаф мәрһәләсиндән, йә'ни Т. Д. Лысенконун мәрһәләли инкишаф нәзәрийәсинә көрә һансы инкишаф мәрһәләсиндә олмасындан асылыдыр.

КӨТҮК ИЛӘ ГЭЛӘМИН БИР-БИРИНӘ ГАРШЫЛЫГЛЫ ТӘСИРЛӘРИ

И. В. Мичурин биткиләр үзәриндә апардығы тәчрүбәләрә әсасән сүбүт әтмишдир ки, кетүк гэләмә, гэләм дә кетүйә гаршы-



Шәкил 84.

лыглы тә'сир эдәрәк бир-биринин ирси тәбиәтләрини дәйишди-
р. Нәтичәдә ирсийәт йолилә кечән дәйишклийә сәбәб олур.

Мичурин демишдир ки, узун илләр боюнча апардыгым тәдги-
гата әсасән көтүйүн гәләмә тә'сир әтмәсини инкар әдән бир чох
әчнәби тәдгигатчыларына гәти исбат әдәчәйәм ки, белә бир тә'сир
вардыр вә ени мейвә чешидләри һасил әтдикдә бағбанлар бу-
нунла һөкмән һесаблашмалыдырлар. Мичурин гәләмин дә көтүйә
тә'сирини исбат әтмишдир. Буна әсасән дә Мичурин ментор (тәр-
бийәчи) нәзәрийәсини ирәли сүрмүшдүр. О, һәмин нәзәрийә-
синдә көстәрмишдир ки, биткичи тохумдан чүчәрмиш чавап
мейвә биткисинин хассәләри вә кейфийәтини истәдийи истига-
мәтдә тәрбийә әдиб дәйишдирә биләр, йә'ни онун яхшы хусусий-
йәтләрини инкишаф әтдириб, пис хусусийәтләрини исә ләғв әдә
биләр.

Мичурин белә дейир: «Фәрз әдәк ки, бизим тохумдан чүчәр-
миш алты вә я едди иллик һибридләримиз вардыр вә бунлар һәлә
мейвә кәтирмир. Анчаг бизә мә'лумдур ки, мәчбур әдәчәк олма-
саг бунлар һәлә он илдән сонра бар верәр (бу һал валидейнлә-
риндә 20 илдән сонра мәһсул кәтирмәк хасийәти олан һибрид-
ләрдә мүшәһидә әдилир). Әкәр бунларын ашағы будагларынын
дибинә бара кирмиш чешиддән көтүрүлмүш үч-дөрд гәләм чалаг
әтсәк, һәмин ментор гәләмләрин тә'сири нәтичәсиндә биткинин
бар вермәси мүддәтини сүрәтләндирәр вә бир-ики илдән сонра
мейвә кәтирәр. Әкәр гәләмин башга хусусийәтләринин һибридә
кечмәси арзу олунмурса, о заман чалаг әдилмиш гәләмләри кәсиб
атмаг лазымдыр, чүнки һәмин гәләмләрин арзу олунмаян тә'сири
тохумдан чүчәрдилмиш биткийә кечәр вә бир нечә илдән сонра
онда гәләмин хусусийәти мөһкәмләшиб галар. Әкәр гәләмдә олан
хусусийәтләрин һибрид чешидинин мейвәсинә кечмәси арзу олу-
нурса, о заман онлары биринчи 3—4 ил сахламаг лазымдыр ки,
һибридлә бирликдә мейвә әмәлә кәтирсин. Белә бир мүддәт, һиб-
риддә гәләмин хусусийәтләринин мөһкәмләnmәси үчүн кифайәт
әдәр. Мейвәкәтирмәни сүр'әтләндирмәк үсулу тәрәфимиздән бир
нечә дәфә йохланылмыш вә һәр дәфә яхшы нәтичәләр әлдә әдил-
мишдир...».

Сонра Мичурин языр: «Юхарыда дедикләримдән үмумийәтлә
айдын олур ки, чалаг әтмәк үсулу ялныз ағачын тез бар вермәси
габилиийәтини сүр'әтләндирмәклә гуртармыр, көрүнүр һибридлә-
рин башга хусусийәт вә кейфийәтләрини дә дәйишдирмәк үчүн
чалаг үсулундан истифадә әтмәк олар, мәсәлән бу үсулдан исти-
фадә әтмәклә ағачларын даһа чох бар вермәсинә, ири мейвә кә-
тирмәсинә, мейвәләринин көзәл рәнкли олмасына, гышда тәзә
һалда галмасына, әт һиссәсиндә шәкәрин мигдарынын артма-
сына, шахтая давамлы олмасына вә саир бу кими хусусийәтләр
газанмасына наил олмаг олар».

Гәләм көтүк үчүн ментор ола билдийи кими, эйни заманда
көтүк дә гәләм үчүн ментор ола биләр. Көтүкдә арзу әдилмәйән

бә'зи хусусийәтләр олдугда, онун гәләмә тә'сирини арадан гал-
дырмаг үчүн гәләмдә сүн'и көк әмәлә кәтирилир. Сонра да гәләми
кәсиб көтүкдән (ментордан) айырараг торпаға әкирләр. Бу үсул
илә Мичурин «Краса Севера» адлы ени албалы чешидини ал-
мышдыр.

Көтүклә гәләмин бир-биринә тә'сири проблемини өйрәнмәк
һазырда ән вачиб мәсәләләрдәндир. ССРИ-дә бу мәсәләйә даир
Мичурин тә'лиминдән кениш истифадә әдилир.

ГЕЙРИ-ЧИНСИ ЧОХАЛМА.

Гейри-чинси чохалмада битки мүхтәлиф спор вә зооспорлар
васитәсилә чохалыр. Бунлар бир һүчәйрәли олуб, бир-бирилә вә
я башга бир һүчәйрә илә гаршылыглы ассимлә әтмәдән, әлвә-
ришли шәраитдә мүстәгил инкишаф эдәрәк биткини әмәлә кәти-
рир. Спорлар вә зооспорлар васитәсилә чохалма ибтидан битки-
ләр арасында чох кениш яйылмышдыр.

Спорларын әмәлә кәлмәси йоллары бүтүн биткиләрдә эйни
олмадығы кими, онларын формалары да эйни дейилдир. Шәраит
әлвәришли олмадыгда бактерия мәһв олмасын дейә спор һалына
кечир. Бу заман һүчәйрәнин бүтүн мөһтәвийяты бир юмаг һалы-
ны алыб харичдән сәрт габыгла өртүлүр. Әлвәришли шәраит
ярандыгда бу табыг дағылыр вә спордан әввәлкинә охшар бакте-
рия әмәлә кәлир. Сөз йох ки, бу чүр спорларын әмәлә кәлмәси
чохалма дейил, харичи мүһитә уйғунлашмагдыр. Бактериялар
бәсит бөлүмә йолу илә чохалыр.

Бирһүчәйрәли вә чохһүчәйрәли йосунларын әксәрийәтиндә
гейри-чинсли чохалма заманы зооспор әмәлә кәлир. Бирһүчәй-
рәлиләрдә зооспор әмәлә кәлмәсинә һүчәйрәнин бүтүн мөһтәвий-
яты сәрф олунур, чохһүчәйрәлиләрдә исә зооспорлар бә'зи һү-
чәйрәләрин мөһтәвийятынын парчаланмасындан әмәлә кәлир ки,
бу чүр һүчәйрәләрә дә зооспоранкия дейилир.

Зооспорлар, зооспоранкияда әмәлә кәлдикдә һүчәйрәнин мөһ-
тәвийяты бир нечә һиссәйә бөлүнүр вә һәмин һиссәләрин һәр бири
хусуси гамчылары олан мүстәгил һүчәйрә олур. Онлар һәмин гам-
чылар васитәсилә актив һәрәкәт әтдикләринә көрә зооспор ад-
ландырылмышдыр. Зооспорлар етишдикдән сонра зооспоранкия-
нын гилафы селикләшиб партлайыр, беләликлә, орадакы зоос-
порлар харичә чыхыр, суя дүшдүкдә мүстәгил үзмәйә башлайыр,
бир гәдәрдән сонра судакы субстрата япышыр, гамчыларыны
итирир, үзәри галын габыгла өртүлүр вә сонралар чүчәриб ени
йосун әмәлә кәтирир. Зооспор нәинки йосунларда, һәтта су мү-
һитилә әлагәдар олан көбәләкләрдә дә әмәлә кәлир. Гуру мүһит-
дә көбәләкләрин бә'зиләри споранкия ичиндә спорлар әмәлә кә-
тирир ки, онлар да адәтән күләк васитәсилә әтрафа яйылыр.
Бунлар гейричинси чохалмая бир мисалдыр.

**ЧИНСИ ЧОХАЛМА, НӘСИЛЛӘРИН НӨВБЭЛӘНМӘСИ
ВӘ НҮВӘ ФАЗАЛАРЫНЫН ДӘЙИШМӘСИ.**

Биткиләрин әксәрийәти мүййән инкишаф дөврүндә чох вахт дахили физиоложи хусусийәтләри вә харичи мүнһитин тәсири илә әлагәдар олараг әркәк вә диши чинси һүчәйрәләр—һаметалар әмәлә кәтирир ки, бунларын да бир-бирини ассимилясия этмәсиндән зигота әмәлә кәлир. Зигота бир мүддәтдән сонра чүчәрәрәк биткинин башланғычыны әмәлә кәтирир ки буна чинси чохалма дейилир. Һаметалар, зооспор вә я спорлар кими тәкликдә, йә'ни мүстәгил олараг инкишаф эдиб ени битки организми әмәлә кәтирә билмәз. Чинси әлагә просесинин мәншәи индийә гәдәр тамам айдышлашдырылмыш олмаса да, һәр һалда чинси чохалма тәкамүл үчүн бөйүк амилдир. Чинси чохалма хусусән чохһүчәйрәли йосунларда кениш өйрәнилмишдир. Йосунларын әксәрийәтиндә бә'зи һүчәйрәләр (зооспоранкиялар) гейри-чинси артма нәтичәсиндә зооспор әмәлә кәтирдикләри һалда, һәмин йосунун бә'зи һүчәйрәләри (һаметанкиялары) һаметалар әмәлә кәтирир. Һаметанкияларда чинси чохалманы тәмин эдән һаметалар әмәлә кәлир. Онларда харичи хусусийәтләри илә бир-бириндән, демәк олар ки, фәргләнмир. Онларда да зооспорлар кими һәрәкәт этмәк габилыйәти вардыр. Әркәк һамета харичи хусусийәтләри илә диши һаметадан, демәк олар ки, фәргләнмир. Буна көрә белә һаметалара изоһаметалар (бәрабәр һаметалар) дейилир. Анчаг онларын мүхтәлиф чинси хусусийәтләри (әркәк, диши) бир-биринә олан мүнәсибәтләриндә үзә чыхыр. Һаметаларын һаметанкиядан чыхдыгдан сонра бир-бирини ассимилә этмә мейли һисс олунур, нәтичәдә онлар бир-бирини ассимилә эдәрәк зигота әмәлә кәтирир. Эйни биткинин мүхтәлиф ана һүчәйрәләриндән вә я эйни нөвлү башга организмин һүчәйрәсиндән әмәлә кәлмиш һаметалар бир-бирини ассимилә эдә биләр.

Мүййән бир йосун эйни заманда һәм һаметанкия, һәм дә зооспоранкия әмәлә кәтирә билир. Мәсәлән, яшыл йосунлардан улотрикс, харичи шәраитдән асылы олараг, зооспор вә я һамета әмәлә кәтирир. Зооспорлар ири вә дөрдгамчылы олдулары һалда, һаметалар нисбәтән хырда вә икигамчылы олур. Әркәк һаметалары диши һаметаларындан фәргләнән йосунлар да вардыр. Диши һамета ♀ даһа ири олуб, әркәк һаметая (♂) нисбәтән аз һәрәкәтлидир, онда кәлчәк зиготаны бәсләмәк үчүн кифайәт гәдәр гита олур. Мүхтәлиф һаметаларын бирләшиб зигота вермәсинә анизоһамея вә я һетероһамея дейилир. Яшыл йосунлардан эвдаринанын чохалмасы буна мисал ола биләр (шәкил 85).

Нисбәтән даһа йүксәк тәкамүл этмиш яшыл йонсунларда вә көбәләкләрдә ооһамея кими чинси чохалма мүшәһидә олунур. Бурад ада диши һамет аэрәкәк һаметая нисбәтән даһа ири вә аз мүтәһәррик олур. Диши һаметая «юурта» (юурта һүчәйрәси),

әркәк һаметая исә сперматозоид дейилир. Юурталар адәтән аз, сперматозоидләр исә хейли чох әмәлә кәлир.

Битки аләминдә чинси нәсиллә гейри-чинси нәслин нөвбәләшмәси һадисәси мүшәһидә эдилир. Бу һадисә мамырларда даһа айдын көрүнүр.


Мамырларда һаметанкия вә споранкия чохһүчәйрәлидир. Әркәк һаметанкияларда спермакән тохума әмәлә кәлир ки, онун да һүчәйрәләри әрәкәк һаметалар (сперматозоидләр) үчүн башланғыч олур. Споранкия ки, онларын да һүчәйрәләриндән спорлар да исә спорокән тохумалара әмәлә кәлир инкишаф эдир. Мамырларын спорлары олверилиш мүнһитә дүшдүкдә чүчәриб, будагланмыш йонсунабәнзәр сапшәкилли чүчәрийилир. Протонеманын йосуна охшамасы ти әмәлә кәтирир ки, она протонема деисбәт эдир ки, мамырлар йонсулара јхын гоһум олуб, онларын тәкамүлүндән әмәлә кәлмишдир. Протонеманын торпаға дахил олмуш һиссәси хлокофилис олуб ризоид әмәлә кәтирир, торпаға юхарыда галан сапын тумурчугларындан көвдә инки шаф эдир, көвдәниндә үзәриндә ярпаглар әмәлә кәлир; көвдәнинбиринин учунда ярпагларын арасында антеридиялар, дикәринин учунда архегония инкишаф эдир.

Архегониялар чохһүчәйрәли олдуларына әсасән йосунлардан фәргли олуб диши һаметаны әмәлә кәтирмәк үчүн диши чинси органыдыр. О, бутулка шәклиндә олуб, боғаз һиссәси бир гат һүчәйрәдән ибарәтдир, диб һиссәсиндә исә һүчәйрә гатлары чохдур.

Онун кенәлмиш гарынчыг һиссәсинин алтында юурта һүчәйрәси, ондан үстдә гарынчыг канал һүчәйрәси, ондан да юхарыда боғаз һиссәсинин бою узуну бир сырая дүзүлмүш боғаз канал һүчәйрәләри олур.

Антеридиялар гыса саплар үзәриндә даянмыш узунсов кениш кисәчикдән ибарәтдир. Кисәнин дахилиндә хусуси һүчәйрәләрдән сперматозоидләр инкишаф эдир.

Архегония етишдикдә канал һүчәйрәләри селикләшәрәк канал васитәсилә юурта һүчәйрәсинә сперматозоидин кәлмәси үчүн имкан ярадыр. Бу заман дикәр көвдәчикдәки антеридия етишәрәк учундан ачылыр вә сперматозоидләр харичә чыхыр. Сперматозоидләрин һәрәкәт этмәси вә архегониянын каналындан ичәри кириб юурта илә ассимилясия этмәси үчүн һөкмән су лазымдыр. Шәһ вә яғыш сую бу имканы яратмаг үчүн кафидир. Беләликлә, протонемадан башлаяраг та маяланмая гәдәр олан дөвр чинси нәсл дөврүдүр. Буна сәбәб исә һәмин дөвр ичәрисиндә битки үзәриндә архегония вә антериди кими чинси органлар әмәлә кәлмәси, бунларын да ичәрисиндә һаметалар (юурта һүчәйрәси вә




Шәкил 85. Эвдарина кими йосунда анизоһаметанын маяланма йолу.

сперматозонд) инкишаф этмәсидир ки, буна һа м е т о ф и т н ә с и л дейилир. Али биткиләрдә дә һаметофит нәсил спордан инкишаф эдир. Ана биткиһиннн спорокен тохумасынын һүчейрәләри редуксия үсулилә бөлүнәрәк һаплоид спор әмәлә кәтирир. Буна әсасән һәмнн спордан инкишаф этмиш биткиһинн бүтүн һүчейрәләри һаплоид нүвәли олур. Буна көрәдир ки, һаметофит нәсл (йә'ни спор чүчәрәндән та маяланмая гәдәр), һа п л о ф а з а адланыр. Һаметалар, әлчә дә спорлар һәмншә һаплоиддир. Бүтүн али биткиләрдә гаметалар митоз васитәсилә спермакен һүчейрәләрдән әмәлә кәлир. Маяланмадан сонра әмәлә кәлән зигота диплоид, йә'ни там мигдарда (2х) хромозомлу олур.

Мамырда һәмнн зигота архегониянын ичиндә олур, бу маяланмыш юурта мөһкәм габыгла өртүлүр, бир мүддәтдән сонра дағылмыш архегониянын ичәрисиндә зигота чүчәрмәйә башлайыр. Яшыл мамырын көвдәси учунда зиготанын инкишафындан әмәлә кәлмиш бир биткичик чүчәрир. Бир саплагдан ибарәт олан бу биткичийнн учунда тәпәси галпагчыгла өртүлмүш гутучуг олур. С п о р о г о н адланан бу биткичик хлорофилсиз олуб гәһвәйи рәнкләдир. Спорогонун ичиндә һаметофитин дәрин һиссәсинә сохулмуш һаусториялар (әмзикләр) яшыл биткидән гита маддәләри алыр, даһа доғрусу спорогон һаметофитдән паразит кими истифадә эдир. Спорогонун тәпәсиндәки гутучуг споранкиядан ибарәтдир ки, онун дахилиндә спорокен тохумалар инкишаф эдир. Гейд этмәлийик ки, споранкиянын бүтүн һүчейрәләри зиготадан әмәлә кәлмишләр, одур ки, булар д и п л о и д д и р. Споранкиянын спорокен тохумларынын һүчейрәләри дә диплоиддир. Бу һүчейрәләр спорларын ана һүчейрәләрини тәшкил эдир. Һәмнн һүчейрәләр мүййән замандан сонра редуксия үсулилә бөлүнәрәк спорлар әмәлә кәтирир. Бу спорлар юварлаглашараг сәрт габыгла өртүлүр, етишдикдән сонра исә гутучугдан хүсуси васитәләрлә харичә атылыр.

Беләликлә, споранкиянын әмәләкәлмә дөврүнә хромозомларынын сайы илә әлагәдар олараг д и п л о ф а з а дейилир. Споранкияда спорлар һасил олдуғуна көрә бу дөвр с п о р о ф и т в ә я г е й р и - ч и н с и н ә с л д ө в р ү адланыр. Етишмиш спорлар әлвәришли мүһитә дүшдүкдә инкишаф әдәрәк енидән һаметофит нәсл әмәлә кәтирир. Бу һадисәләрә бирликдә н ә с л и н н ө в б ә л ә ш м ә с и дейилир. Һәмнн һадисә нүвә фазаларынын дәйишмәсилә әлагәдардыр. Бурада чинси нәсл һаполид нүвәли олдуғуна көрә һа п л о ф а з а адланыр. Бу фаза спорларын әмәлә кәлмәсилә башлайыб, һаметаларын әмәлә кәлмәсилә гуртарыр ки, онлар дә һаметофит нәсл адланыр. Икинчи нәсл гейри-чинси нәсл олуб д и п л о ф а з а адланыр. Һәмнн фаза зиготанын әмәлә кәлмәсилә башлайыб спорларын ана һүчейрәләриннн әмәлә кәлмәсилә гуртарыр ки, онлар да с п о р ф и т н ә с л адланыр. Бир-бириннн ардынча кедән бу һадисәләрдән биринә һаметофит, я да чинси нәсл, дикәринә исә с п о р ф и т, я да г е й р и - ч и н -

Шекл 86. Фууария мамырында нәслин нөвбәләшмәси схемасы.



1 — зигота; 2 — дикотила вә антөфиза әмәлә кәтирән һаметофит; 3 вә 2а — дикотила етишмиш юурта һүчейрәси олан архегония; 3 вә 3а — тәпәсиндән бир чох сперматозонд чыхан антеридия; 2 вә 2а — юурта һүчейрәси; 3 вә 3а — сперматозонд; 4 вә 4а — сперматозонд илә юурта һүчейрәсиннн ассиляциясында әмәлә кәлмиш зигота; 5 вә 5а — зиготадан спорогонун инкишафы; 6 вә 6а — чаван спорогон; 7 вә 7а — етишмиш спорогонлу спорофит; 8 вә 8а — спорогонун гутучуғунда археспор һүчейрәләриннн әмәлә кәлмәси (спор әмәлә кәтирән тохума); 9 вә 9а — спор әмәлә кәтирән ана һүчейрә; 10 вә 10а — ана һүчейрәни редуксия йолу илә бөлүмәси; 11 вә 11а — спорун әмәлә кәлмәси; 12 вә 12а — спор; 13 вә 13а — спордан чүчәриш протонеманын инкишафы; 14 вә 14а — һаметофити әмәлә кәтирән тумурчуглу протонема.

си нәсл дейлир. Бурада нәслин нөвбәләшмәси гапалы даирә үзрә дейил, бурғу үзрә кедир (шәкил 86).

Гыжыларда гейри-чинси вә я спорофит нәсл гыжынын өзү-дүр (шәкил 87).



Шәкил 87.

1—етишмиш әркәк гыжы (*Dryopteris filix mas*) 2—үзәри өртүклә өртүлмүш соруслары олан «ярпағынын» бир һиссәсинин алдан көрүкшү; 3—споранкиялары вә өртүгү олган сорусун энинә кәсһин.

Чох вахт һәгиги гыжынын ералты көкүмсов көвдәләри, онларын үзәриндә яхшы инкишаф этмиш һәгиги көкләри, торпагдан юхарыда исә яхшы инкишаф этмиш ири «ярпаглары» олур. Һүчәйрәләринин нүвәси диплоид хромозомлудур. Ярпагларынын алтын-да споранкиялар инкишаф этмишдир. Онлар ики тәрәфдән басыг гутучуглардан ибарәт олуб, хусуси аягчыглар үзәриндә даянмыш


вә дәстә һалында хусуси ювалара топлашмышдыр. Бу споранкия юваларына соруслар дейлир. Споранкиянын дивары бир тәбәгәлидир. Дахилиндәки спорокен тохуманын Һүчәйрәләри (археспорлар) редуксия үсулилә бөлүндүкдән сонра, онлардан бир чох спор әмәлә кәлир. Һәмин спорлар гыжынын гейри-чинси чохалмасыны тәмин эдир. Етишмиш спорларын һәр бири әлвәришли шәраитдә инкишаф эдәрәк үрәкшәкилли яшыл рәнкдә чүчәрти әмәлә кәтирир. Бу илк чүчәртия протал дейлир. Онун торпаға бахан алт сәтһиндән яланчы көкләр (ризоидләр) чыхыр. Чүчәрти бу яланчы көкләр васитәсилә торпаға илишәрәк, орадан мүстәгил сурәтдә мөһлул һалында алдығы минерал маддәләрлә гидаланыр.

Проталын Һүчәйрәләри һаплоид хромозомлудур. Протал, гыжынын чинси нәсли вә я һаметофитидир, чүнки һәмин проталын үзәриндә чинси органлар антеридия вә архегониялар әмәлә кәтирир.

Проталын ризоидләри чыхан һиссәсиндә антеридиялар, чөкәк еринә яхын олан һиссәсиндә исә архегониялар әмәлә кәлир. Архегониялар хырда олуб, дивары бир гат Һүчәйрәдән ибарәтдир. Антеридияларын ичиндә бурғушәкилли вә бир учунда дәстә һалында гамчылары олан хырда сперматозоидләр әмәлә кәлир. Архегониялар исә бутулкая охшайыр. Онларын кенәлмиш диб һиссәләри проталын тохумалары дәринлийиндәдир, боғаз һиссәси исә чөлә чыхмышдыр. Архегониянын гарынчыг һиссәсиндә бир юмурта Һүчәйрәси, ондан юхарыда гарын канал Һүчәйрәси, боғаз һиссәсиндә исә бир-биринә гарышмыш бир нечә боғаз канал Һүчәйрәси олур. Архегония етишән заман канал Һүчәйрәләринин бурахдығы сүрүшкән маддә архегониянын боғаз һиссәсинин тәпәсиндә ачылан дешикдән харицә ифраз олунур. Һәмин маддәйә сперматозоидләр чөлб олунараг архегония дахил олур. Бу маддә васитәсилә сперматозоид юмурта Һүчәйрәсинә чатыр вә гаршылыглы асимилисия олунур. Нәтицәдә маяланмыш юмурта Һүчәйрәсиндә хромозомларын мигдары ыкигат артыр. Маяланмыш юмурта Һүчәйрәсиндән әсл битки—гыжы инкишаф этмәйә башлайыр ки, онда да һәгиги көк (көкүмсов көвдә) вә «ярпаглар» әмәлә кәлир (шәкил 88).

Мамырлардакы кими гыжыларда да нәслин нөвбәләшмәси спирал хәтт үзрә кедир. Гейри-чинси спорофит нәсл диплоид нүвәли Һүчәйрәләрдән тәшкил олунмушдур. Спорлардан әмәлә кәлән проталын Һүчәйрәләри һаплоид, онларын вердикләри һаметалар да һаплоид нүвәли олур. Лакин һаплоид һаметаларын гаршылыглы асимилисиясындан әмәлә кәлән зигота вә ондан да инкишаф эдән спорофит нәсл—әсл биткинин Һүчәйрәләри диплоид нүвәли олур. Беләликлә, чинси нәсиллә, гейри-чинси нәсл бир-бирилә нөвбәләшир. Бунларын мамырлардан фәрги анчаг орасындадыр ки, гыжыларда һаметофит вә спорофит нәсл тамамилә мүстәгилдир вә һаметофит нисбәтән чох хырда олуб аз мүд-

дэт яшайыр, спорофит, йэ'ни эсл битки олан гыжы исэ чох өмүр-
лүдүр (шэкил 89). Мамырларда, эксинэ, һаметофит нэсл узун,
спорофит нэсл исэ азөмүрлү олур. Бундан башга спорофит нэсл
һаметофитин үзәриндә паразит һалда яшайыр.




Шэкил 88. Эркэк гыжы. (*Dryopteris filix mas*)

1, 2—чаван проталы; 3—һәмнн биткини етишмнш проталы-
нын алтдан көрүнүшү; 4—ачылмамыш архегониясы; 5—ачыл-
мыш архегониясы; 6—сперматозонд; 7—ачылмыш антеридия;
8—оптик кәскидә ачылмамыш антеридия; 9—протал үзәриндә
чүчәрмнш чаван гыжы.

Бүтүн чанлылар аләминдә вә һәр бир организмин фәрди инки-
шафында олдуғу кими, нәслин нөвбәләшмәси ашағыдан юхарыя
доғру бурғу үзрә кедир, чүнки нәслин нөвбәләшмәси организмин
мүәййән инкишаф мәрһәләсидир. Һәмнн мәрһәләдә организм,
харичи мүһит шәраитинин тә'сири алтында ени хусусийәтләр
кәсб эдир вә бу хусусийәтләр организмдә топланарағ, бир мүд-
дәтдән сонра бирдән-бирә кәскин дәйишиклийә сәбәб олур. Һеч
бир заман организм өз валидейнинин (әчдадынын) дүз вә ме-
х а н и к и т ә к р а р ы дейилдир.

Шэкил 89. Һәгнн гыжы-
да (*Polypodium vulgare*)
нөвбәләшмәси схеми

1 вә 1а—көкүмсөв көлдән
чыккыш ярпагларын алтынча
спорофит нәсл, эсл битки; 2
вә 2а—спорангия; 3 вә 3а—
спор эмәлө көтирән ана һу-
чәйрә; 4 вә 4а—тетрадаларын
эмәлө кәлмәси; 5 вә 5а—бир
ана һучейрәдән эмәлө кәл-
мнш спорлар; 6 вә 6а—спор-
ларын чүчәрмәси; 7 вә 7а—
антеридия вә архегонияны
протал; 8 вә 8а—антеридия;
9 вә 9а—сперматозонд; 10 вә
10а—архегония; 11 вә 11а—
көмүртә һучейрәси; 12 вә
12а—эмәлө кәлмнш анта;
13 вә 13а—инготанн чүчәр-
мәси; 14 вә 14а—спорофитин
эмәлө кәлмәси.



Чылпаг тохумлуларда нэслин нөвбэлэшмэси

Гыжылардан сонра яхшы инкишаф этмиш биткилэр—ағач вэ кол һалында олан чылпагтохумлу биткилэрдир. Элми тэдгигатларын нәтижэлэри кәстәрир ки, чылпаг тохумлуларын мәншәлэри тохумлу гыжылардан башламышдыр вэ тохумлары васитәсилә артыб чохалыр. Тохум чохһүчәйрәли олуб, мүрәккәб гурулушлудур, бунунла да о, бирһүчәйрәли спорлардан чох фәргләнир. Чылпагтохумлуларын тохуму ичәрисиндә рүшейм—чаван биткичик, эндосперм—эһтият гида маддәси илә әһатә эдилмиш вэ тохум хариңдән габыгла өртүлмүшдүр. Габығын вәзифәси тохумун дахили һиссәсини хариңи тәһсиләрдән горумагдыр.

Чылпагтохумлуларын диши гозалары пулчуглардан ибарәтдир. Онлар бир ох үзәриндә, чох заман спирал шәклиндә дүзүлмүшдүр вэ һәр пулчугун голтуғунда (мәсәлән, шам ағачында) бир чүт тохум әмәлә кәлир. Бу пулчуглар макроспор ярпаглар вэ я макроспорофил адланыр. Онлар тохуму һәр тәрәфдән әһатә этмәдийиндән тохум ачыгда әмәлә кәлир, буна көрдә һәммин биткиләрә чылпагтохумлулар дейилир.

Тохумлу биткиләрин тохумлуғу макроспоранкиядыр. Макроспоранкия әввәлчә интегумент адланан өртүклә өртүлү олур, онун ичиндә дә нутселлус ерләшир (нутселлус—тохумлуғун чохһүчәйрәли мәркәзи һиссәсидир). Интегумент, макроспоранкиянын дивар һүчәйрәлериндән ибарәтдир. Чылпагтохумлу биткиләрдә интегумент ени тәкамүл мәһсулудур вэ она чылпагтохумлулардан габагкы биткиләрдә тәсадүф эдилмир. Интегумент нутселлусун учунда бир йол әмәлә кәтирир ки, она тохум йолу вэ я микропилия дейилир. Бура я дүшмүш тоз һүчәйрәси (микроспор) чүчәрәрәк ичәрийә доғру тоз борусу узадыр. Нутселлусун үстүндәки һүчәйрәдән архоспор адланан һүчәйрә әмәлә кәлир ки, о да редуксия йолу илә ики дәфә бөлүнәрәк дөрд әдәд һаплоид хромозомлу һүчәйрә әмәлә кәтирир. Онларын үчү тәләф олур, ялчыз бири инкишаф эдиб мегаспору әмәлә кәтирир. Һәммин мегаспор чинси нөгтейн-нәзәрдән һаплоиддир, ону әмәлә кәтирән мегаспоранкия вэ әсл биткинин бүтүн органлары исә диплоид хромозомлу һүчәйрәләрдән ибарәтдир. Бурада мегаспор гейри-чинси нәслдән айрылмаяраг онун юмуртачығы ичиндә галыб инкишаф эдир, нәтижәдә мегаспорун габығы ичәрисиндә чохһүчәйрәли, мүрәккәб гурулушлу тохумлуғ әмәлә кәлир.

Тохумлуғ диши чинси нәсл һесаб олунур вэ гыжылардакы протала охшайыр. Чылпагтохумлуларда бу протала эндосперм дейилтир.

Бир мүддәтдән сонра һәммин протал микропилейә, йә'ни тохум йолуна яхын ериндән редуксия әдәрәк архегонияны әмәлә кәтирир. Архегонияда боғаз канал һүчәйрәли, гарын канал һүчәйрәли вэ юмурта һүчәйрәси олур; бурада эндосперм (протал вэ архегониялар һаплоид һүчәйрәли чинси нәсли тәшкил эдир.

Протал—(гаметофит)—диши чинси нәсл һаплоид хромозомлу һүчәйрәләрә малик олур вэ сәрбәст яшамаг габилийәтини итирәрәк, диплоид хромозомлу әсл биткинин (спорофитин) гейри-чинси нәсли үзәриндә паразит һалында яшайыр.

Чылпагтохумлу биткиләрдә микроспорофилләр гоза әмәлә кәтирир, бунлардакы микроспоранкиялар (тоз кисәләри) эркәкчик адланыр. Тоз кисәләриндә (микроспоранкияларда) тоз һүчәйрәли (микроспорлар) редуксион бөлүнмә йолу илә әмәлә кәлир. Һәр бир микроспор әввәлчә тәкһүчәйрәли олуб, сонра ики һүчәйрәйә бөлүнүр. Бу ики һүчәйрәдән хырдаһи енә 3—4 һүчәйрәйә бөлүнүр. Һәммин һүчәйрәләрдән ән учдакына антеридия дейилтир. Микроспорун биринчи бөлүнмәсиндән алыннан ири һүчәйрә чүчәрәрәк тоз борусу әмәлә кәтирир. Һәммин тоз борусу микропилиядан архегонияларын гарын һүчәйрәлеринә гәдәр узаныр. Бу заман тоз борусунун дахилиндә кенератив һүчәйрәләрин (антеридиянын) бөлүнмәси нәтижәсиндә ики сперм әмәлә кәлир. Онлар бору васитәсилә архегониянын юмурта һүчәйрәсинә чатыр вэ спермләрдән бири һәммин юмурта һүчәйрәси илә гаршылыглы ассимиля олунур. Әмәлә кәлмиш зигота сакит даянмаяраг бөлүнүр вэ рүшейми әмәлә кәтирир.


Маяланма просесиндә микроспордан әмәлә кәлән тоз борусу эркәк, мегаспордан әмәлә кәлән рүшейм кисәси исә диши проталыдыр. Тохумун рүшейми эндоспермин ортасында ерләшир, интегумент исә анчаг тохумун габығыны әмәлә кәтирир.

Чылпагтохумлуларда спорофит (гейри-чинси) нәсл, йә'ни әсл битки яхшы инкишаф этмишдир. Бунларын мега-вэ микроспору редуксия этмиш проталларә—һаметофитләрә чеврилир. Чылпагтохумлуларда һаметофит нәсл спорофит үзәриндә паразит һәят кечирир. Нәтижә э'тибарилә чылпагтохумлуларда да нәслин нөвбәләшмәси мүшәһидә олунур, лакин бунларын инкишафы дөврүндә спорофит нәсл үстүн кәлир, һаметофит исә чох редуксия этмишдир (шәкил 90, 91, 92).




Шәкил 90.

1—эркәк (э) вэ диши (д) чичәк гозалары олан шам булагы; 2—маяланмадан сонра инкишаф этмиш гоза; 3—эркәкчик; 4—ян-дан көрүнүшү; 5—алтдан көрүнүшү; 6—ики тохумлуғу олан диши гозанын пулчугу; 7—етишмиш гозанын икитохумлу тохум пулчугу; 8—һаһаллы тохум; 9—тохумун узунуна кәһийн вэ эндоспермдә рүшеймин көрүнүшү.



Шәкил 91.

1—шаман эркәк чичәйинин узунуна кәсийн; 2—шаман микроспорофитин узунуна кәсийн; 3—онун эңнә кәсийн (тоз кисәсннн мөйтәвийяты); 4—тозчуг; 5, 6 вә 7—тозчугун чүчәрмәси; а—антеридия һүчәйрәси; в—тоз чүчәрмәсинин вегетатив һүчәйрәси; н—антеридиянын аягыгы һүчәйрәси; г—проталлы галыгы.



Шәкил 92.

1—кукнарын (йолканын) тохумлуғунун ортадан узунуна кәсийн; 2—тохумлуғун өртүйү; н—нүтселлус; зм—эндосперм (протал) илә долу рүшәйм кисәси (мегаспор); ар—архегониянын гарын кисәси; бо—онун боғаз кисәси; нү—юурта һүчәйрәсинин нүвәси; 2—киархегониялы рүшәйм кисәсннн тәпәдән узунуна кәсийн; нү—юурта һүчәйрәсинин нүвәси; в—юурта һүчәйрәсинин вакуолу; гн—гарын канал һүчәйрәси.

Өртүлүтохумлу биткиләрдә чинси чохалма

Өртүлүтохумлу вә я чичәкли биткиләрин чылпагтохумлулардан фәрги орасындадыр ки, өртүлү тохумларда мегаспорофилларин (мейвәярпагларынын) кәнарларынын бирләшмәси нәтижәсиндә дишичик адланан орган әмәлә кәлмишдир ки, онун да ичиндә бир вә я бир нечә мегаспоранкия (тохумлуг) олур. Маяланмыш

дишичийин юмурталыг һиссәсиндән мейвә әмәлә кәлир, онун да дахилиндә тохумлар олур. Тохумлар маяланмадан сонра мегаспоранкиядан инкишаф эдир. Тохумлар гапалы мүһитдә әмәлә кәлдийиндән, һәмин биткиләрә өртүлүтохумлулар дейилир. Демәк олар ки, бүтүн өртүлүтохумлуларда спорофилларин (микро- вә мегаспорофилларин) әтрафы тәпә (уч) ярпаглары илә әһатә олунмушдур. Бу ярпаглар чичәкянлыгы вә я чичәк өртүйү дейилир. Чичәкянлыгы спорофилларлә бирлидә чичәк адланыр. Чох заман чичәйә чинси чохалма органы дейилир, һәгигәтдә исә чичәк чинси чохалмада анчаг көмәкчи органдыр, чүнки чичәйин бүтүн һиссәләри диплоид нүвәли һүчәйрәләрдән әмәлә кәлмиш вегетатив органларын метаморфозу мәнсулудур.

Демәли, чичәк спорофит нәслин мүәййән бир инкишаф дөврүдүр. Чичәкдә чинси нәсл дөврү, ялыз маяланма заманы һәмәтофитларин (эркәк вә диши проталларын) әмәлә кәлдийи дөврүдүр. Һәмин бу дөвр өртүлүтохумлу биткиләрдә чох аз давам эдир вә һәмәтофит нәсл чох азалмыш олур.

ЧИЧӘК ВӘ ОНУН ҺИССӘЛӘРИ

Чичәк уч ярпагларын вә көвдәнин метаморфозундан әмәлә кәлмишдир, башга сөзлә о, будатланмадан соғдур. Чичәкдә шәклинн дәйишмиш ярпагларын бирләшдийи ерә чичәк ятагы дейилир. Бу, көвдә һиссәси олуб, габарыг, дүз вә я чөкәк һалда ола биләр. Ондан ашағыда чичәйи биткинин будағына бирләшдирән һисбәтән инчә һиссә олур ки, она чичәк саплагы дейилир, һәмин һиссә бәзән биткиләрин чичәкләриндә чох тыса олур, я да һеч инкишаф этмир. Бу чүр чичәкләрә саплагсыз вә я отураг чичәк дейилир. Бәзән чичәйин будаға бирләшмиш ериндә мүхтәлиф шәкилдә чыхынтылар әмәлә кәлир ки, онлара чичәкалтлыгы дейилир. Чичәкалтлыгы бирләпәлиләрдә адәтән бир, икиләпәлиләрдә исә ики олур. Бирләпәлиләрдә чичәкалтлыгы чичәк саплагы тәрәфдән әсас оха чеврилмиш һалда олур, икиләпәлиләрдә исә чичәк саплагынын сағ вә солунда ерләшир.


Чичәкалтлыгынын олуб-олмамасы бүтүн фәсилә, чинс вә нөв үчүн характер хусусийәт сайылыр. Там чичәкдә касачыг, таччыг, эркәкчик вә дишичик олмалыдыр.

Касачыг—*Kalyx* сөзүндән олуб «К» илә ишарә олунур, о хырда, чох вахт яшыл рәнкли, сәрбәст вә я аз-чох битишмиш ярпагчыглардан әмәлә кәлмишдир. Касачыгы тәшкил эдән ярпагчыглар к а с а я р п а г л а р ы дейилир. Һәмин ярпаглар адәтән чичәйи харичдән әһатә эдир.

Таччыг „*Corolla*“ сөзүндән олуб «С» вә я «Со» илә ишарә олунур. Бу, касачыға һисбәтән ири, чох вахт әлван рәнкләрә боянмыш, сәрбәст вә я битишик ярпагчыглардыр. Тачы тәшкил

эдэн ярпагыг лара т а ч я р п а г л а р ы дейлир. Нэмин ярпаглар касачыгдан ичэридэ ерлэшир. Тач ярпаглары битишик исэ, онун ағыз хиссэсинэ—сэрбэст кэнар, ашағы хиссэсинэ—бору-чуг вэ сэрбэст кэнары илэ бору арасына эснэк дейлир. Сэрбэст тач ярпагынын кениш хиссэси ая, дар хиссэси исэ дыр-нагчыг адланыр (шэкил 93).

Чичэйин каса вэ тач хиссэси бирликдэ чичэжянлыгы вэ я чичэйин өртүйү адланыр. Бу хиссэлэрин икинчи дэрэчэли эһэмийэти вардыр. Онларын вэзифэси чичэйин мүһүм хиссэлэ-рини харичи тэсирлэрдэн го-румаг вэ тозланма үчүн һэ-шэраты өзүнэ мэлб этмэк-дир. Чичэйин мүһүм хиссэ-лэриндэн бири «эркэкчик-лэр» — «микроспорофиллэр-дир». Бунлара бирликдэ а н-д р о с е й дейлир вэ «А» илэ ишарэ олунур. Нэр эркэк-чик эсас э'тибарилэ үч хис-сэдэн ибарэтдир: ашағыда инчэ сап хиссэси ,юхарыда бир чүт кисэ вэ тоз кисэлэ-рини саплаға бирлэшдирэн хиссэ. Бунлардан биринчиси-




Шэкил 93.

1—тач ярпагы (лэчэк); д—дырнагы; ая—аясы; 2—битишкелэчэки тач; б—тачын борусу; ск—сэрбэст кэнары; а—эснэйн (бо-разы).

нэ эркэкчик сапы, икин-чисинэ—тоз кисэлэри вэ я тоз луглар, үчүнчү-сүнэ исэ — бэнд дейи-лир. Бэ'зэн тоз кисэлэри саплагсыз олараг билаваситэ чичэк ята-гы үзэриндэ отурмуш олур ки, онлара о т у р а г э р к э к ч и к л э р дейлир. Эркэкчиклэр бир-биринэ саплагы васитэсимэ битишмиш вэ я сэрбэст ола билэр. Мэсэлэн, күлдэ, алмада, соғанда, зам-багда эркэкчиклэр сэрбэстдир, памбыгда, эмэкөмөчидэ исэ бити-шикдир. Эркэкчиклэрдэн дахилдэ, чичэк ятагынын ортасында вэ я тэпэсиндэ «дишичик» ерлэшир. Ону эмэлэ кэтирэн шөклини дэйишмиш ярпаглар м е й в э я р п а г л а р ы дейлир.

Дишичик бир вэ я бир нечэ мейвэ ярпагындан эмэлэ кэлэ билэр. Онлар да я тамамилэ бир-бирилэ битишмиш вэ я сэрбэст олур. Дишичийн эмэлэ кэтирмиш мейвэярпагларына бирликдэ к е н и с е й дейлир вэ «С» илэ ишарэ олунур. Дишичик эсас э'тибарилэ үч хиссэдэн ибарэтдир. Дишичийн диб хиссэси ю м у р т а л ы г адланыр. Юмурталынын үстү чох заман дарал-мыш инчэ бир хиссэ тэшил эдир. Бу хиссэйэ с ү т у н ч у г дейи-лир. Сүтунчуғун тэпэ хиссэси ағызчыг адланыр. Сүтунчуг инкишаф этмэдикдэ ағызчыг юмурталынын үстүндэ васитэсиз отурмуш олур ки, она о т у р а г ағызчыг дейлир (мэсэлэн, лалэдэ, хашхашда, хорузкүлүндэ олдуғу кими).


Юхарыда сайдығымыз хиссэлэрдэн касачыгы, тачы, эркэк-чийн вэ дишичийн олан чичэйэ т а м ч и ч э к, нэмин хиссэлэрдэн нэр һансы бири олмаян чичэйэ исэ г е й р и т а м ч и ч э к дейлир (шэкил 94).



Шэкил 94.

1—там ики чинсли чичэк; 2—чох эркэкчикли вэ ики дишичикли леон чичэйинин узунуна кэсийи; 3—чичэйин айры-айры хиссэлэри (схеми); у—чичэк ятагы; г—каса ярпаглары; л—лэчэклэр; з—эркэкчиклэр, д—дишичик.

Чичэжянлыгыны тэшил эдэн ярпагларына һамысы бир рэнкдэ олан чичэйэ бэсит зэ я биргатянлыглы чичэк дейилэ-рэк (*Peregonium*) «Р» илэ ишарэ олунур, мүхтэлиф рэнкдэ олана исэ икигатянлыглы чичэк дейлир. Касачыг вэ таччыг ярпагларына бирликдэ ч и ч э ж я н л ы г ы дейлир. Чичэжянлыгы бэсит вэ икигатянлыглы ола билэр. Экэр чичэжянлыгы яшыл рэнк-дэ (касачыг рэнкиндэ) исэ, она бэситянлыглы каса шэ-ж и л л и ч и ч э к дейлир (шэкил 95).




Шэкил 95. Бэсит янлыглы (биргат янлыглы) чичэклэр.

1—асырғалда; 2—инчи чичэйиндэ; 3—гарағачда.

Мэсэлэн, кичитканын, чэтэнэнин, уннучанын, эвэлийин вэ бир сыра башга биткилэрин чичэклэри кими. Ялныз спорофиллэрдэн «эркэкчик» вэ «дишичик»дэн ибарэт олуб, һеч бир өртүйү олмаян чичэклэрэ чылпаг вэ я чичэжянлыгы олмаян чичэк дейлир, мэсэ-лэн, сөйүд, көврүш, дарангы, говаг вэ саирэ кими.

Истәр бәситянылыгы, истәрсә дә икигәтәянлыгы чичәкләрдә чичәкянлыгыны тәшкит эдән яргаглар бир форма вә бөйүклүкдә оларса, элә чичәйин үзәриндән бир нечә симметрия оху кечирмәк олар. Беләликлә, һәр дөфә кечирилмиш ох ону бәрабәр һиссәйә бөләчәкдир. Белә чичәйә мүн тәзәм вә я актиноморф («*» шәрти ишарәси илә көстәрилир) чичәк дейилир. Буна хаш-хашын, алманын, алчанын, памбыгын вә саирәнин чичәкләри мисал ола биләр (шәкил 96, 2).



1—гейри-мүнтөзөм-зигоморф; 2—мүнтөзөм-актиноморф; 3—асимметрик чүчөклөр.

Чүнकि зигоморфлуг вә ассиметриклик чарпаз тозланманы тәмин этмәк үчүн чүчүләрә керә уйғунлашмагдыр. Актиноморф чичәкләрин тәкамүлүндән сонра тәдричән зигоморф вә ассиметрик чичәкләр әмәлә кәлмишидир.

120


Чичәкләрнн тачлары мұхтәлиф формаларда олур, о чүмләдән борушәкилли тач (сучичәйиндә), зәнкшәкилли тач (зәнкчичәйи, дағыстанчайы биткисиндә), мыхшәкилли тач (ясәмәндә), тәкәршәкилли тач (картоф, бадымчан, памидор биткиләриндә), ики-додаглы тач (додагчичәклиләр фәсиләсинин нүмайәндәләриндә), дилшәкилли тач (зәнчироту биткисиндә), кәпәнәкшәкилли тач (кәпәнәкчичәклиләр ярымфәсиләсинин нүмайәндәләриндә) вә с.

Бә'зи биткиләрдә бирчынли чичәкләр биткинин башга-башга ерләриндә әмәлә кәлир. Белә биткиләрә бир э в л и б и т к и л ә р дейлир, мәсәлән, хияр, гарпыз, гаргыдалы, кәнәкәрчәк, гоз, фын-дыг вә с.

Мүхтәлиф биткиләрин чичәкләриндә эркәкчикләрин мигдары мүхтәлиф олур. Эркәкчикләрин чохунда сап яхшы инкишаф этмишдир. О, адәтән цилиндрик, ясты, лөвһәшәкилли, йоғун вә әтли олур (шәкил 97). Тоз кисәләри дә шәкилчә чох мүхтәлиф-дир вә һәр битки нөвүнүн чичәйиндә хусуси формададыр. Бә'зи биткиләрин эркәкчикләри чылпагдыр, бә'зиләрининки исә башдан-баша вә я анчаг бир һиссәси түклүдүр я да үзәрләриндә чыхынтылар вардыр. Бу хусусийәт битки систематикасында чинс вә нөвләрин тә'йининдә нәзәрә алыныр.

Биткиләрин чохунун тоз кисәләриндә аракәсмәләр васитәсилә айрылмыш тозчуг ювалары олур. Һәмин юваларда тоз һүңейрәләрн ерләшир. Беләликлә, һәмин ювалар споранкиянын, тозчуглар исә микроспорларын гаршылығы һесап олунур. Биткиләрдән бир чохунун тоз кисәси етишән заман узунуна партлайыр. Партлайыш юваларын ортасындан баш верәрәк һәр ики юванын ачылмасына сәбәб олур. Тоз кисәләринин ачылмасы да айры-айры биткиләрдә мухтәлиф олуб, систематикада истифадә эдилән әләмәтләрдән биридир. Бир-биринә яхын олан чинс вә нөвләрдә

бу хусусийят нисбәтән сабит әламәт сайылыр. Эркәкчикләр бир-бирилә саплаглары васитәсилә бирләшдикләри кими, чичәйин тачы илә дә бирләшә билір. Мәсәлән, инчичичәйиндә, сармашыг чичәйиндә вә бир сыра башга биткиләрдә эркәкчикләр илк нәзәрдә тачын үзәриндә әмәлә кәлмиш кими көрүнүр. Бә'зән дә эркәкчикләр дишичийин сүтунчуғу илә (сәһләбчичәклиләрдә олдуғу кими) вә я тоз кисәләри васитәсилә бир-бирилә бирләшиб сүтунчуғун әтрафында бору шәклини алыр (мүрәккәбчичәклиләрдә олдуғу кими).



Шәкил 97. Мүхтәлиф шәкилли эркәкчикләр.

Бә'зи биткиләрдә эркәкчикләрдән бири вә я бир нечәси тозчуг әмәлә кәтирмәк габилийәтини итирир. Онлара сәмәрәсиз эркәкчикләр вә я стаминодия дейилир. Онлар сап вә я чыхынты шәклиндә, я да тачярпаглы олур. Стаминодиялар бә'зән өзләриндән шәкәрли маддә ифраз әдән вәзиләрә чеврилир. Белә һалларда онлара нектарлыг дейилир.

Чичәкянлыглары зәиф инкишаф әтмиш чичәкләрдә бә'зән эркәкчикләрин саплагы вә я тозлуглары әлван рәнкләрә боянараг (мәсәлән, мимозаларда, күләбришиндә— *Albizia julibrissi* олдуғу кими), чүчүләри чәлб әтмәк ишиндә чичәкянлығыны әвәз әдир.

Топа чичәкләр

Ләчәкләрин мигдары анормал һалда чохалмыш чичәкләрә топа чичәкләр дейилир. Эркәкчикләрин, бә'зән дә мейвәярпагларынын ләчәкләрә чеврилмәси нәтичәсиндә топа чичәкләр әмәлә кәлир; гызыл күлләрин, хашхашын, гурдбоғанын, әсбәчичәйинин, михәккүлүнүн, вә бир сыра башга биткиләрин чичәкләриндә буна тәсадүф әдилир. Бә'зи биткиләрдә топа чичәкләр ләчәкләрин парчаланмасы нәтичәсиндә әмәлә кәлир, мәсәлән, сырғачичәйиндә (фуксияда), бә'зиләриндә исә онлар эркәкчикләрин парчаланыб ләчәкләрә чеврилмәси нәтичәсиндә әмәлә кәлир. Мүрәккәбчичәклиләр фәсиләсинин бә'зи нүмайәндәләриндә топа

чичәк группунун әмәлә кәлмәси, сәбәтчийин ортасындакы борушәкилли чичәкләрин дилшәкилли чичәкләрә чеврилмәси нәтичәсиндә әмәлә кәлир, мәсәлән, кәпәнәк чичәйиндә (астрада), корки чичәйиндә (кеоркина), бә'зән күнәбаханда, зирә чичәйиндә (хризантемада) вә саирәдә олдуғу кими. Әксәрийәтлә топа чичәкли биткиләр бәзәк биткиси кими бечәрилир. Топа чичәкләр нормал чичәкләрә нисбәтән анормал олуб, әйбәчәрлийә доғру мейл әтмишдир.

Эркәкчикләрин гурулушу вә тозчуглары инкишафы (микроспорогенез)


Чичәк инкишаф әдән заман эркәкчикләр чичәк ятағы үзәриндә хусуси габарыг шәклиндә әмәлә кәлир. Тоз кисәләри әмәлә кәлмәйә башладыгдан сонра эркәкчийин сапы инкишаф әдир ки, онун да васитәсилә эркәкчийин дикәр һиссәләринә доғру су вә гига борулары кедир вә һәммин боруларла верилән гига илә эркәкчик гигдаланыр. Эркәкчийин бүтүн өртүчү тохумасында (эпидермисиндә) ағызчыглар олур. Чаван эркәкчик паренхим һүчәйрәләриндән ибарәтдир. Эркәкчийин тоз кисәләринин үст габығы (эпидермиси) алтындакы гатына субэпидермис дейилир. Мүәййән дөврдә эркәкчийин тозлуглары дөрд ювая бөлүнүр. Бу юваларын арасындакы субэпидермис гатынын һүчәйрәләри тез бөйүйүр вә танкентал аракәсмәләр васитәсилә харичи вә дахили тәбәгәйә айрылыр.

Дахили тәбәгәнин ич һүчәйрәләриндән тозчуглары әмәлә кәтирән археспорлар һасил олур. Харичдәкиләрин бир гисминдән тоз кисәсинин дивары, бир гисминдән дә тозчуглары гигдаландырычы һүчәйрәләр әмәлә кәлир. Һәммин харичи гатын һүчәйрәләри мәркәзә доғру бир нечә танкентал аракәсмәли һүчәйрәләр әмәлә кәтирир. Онлардан харичдәкиләр вә эпидермисдән алтда оланлар фиброз-эндотеси тәбәгәсини әмәлә кәтирир ки, о да тозлугун (тоз кисәсинин) ачылмасына көмәк әдир.

Фиброз—эндотест тәбәгәсиндән алтдакы тәбәгәдә олан хырда һүчәйрәләр сонралар сыхышдырылыб дағыдылыр вә кәләчәк тоз һүчәйрәләринин гигдаланмасына сәрф олунур. Археспор һүчәйрәләри исә бөлүнәрәк тоз һүчәйрәләринин ана һүчәйрәләрини әмәлә кәтирир. Бу ахырынчылар да дөрд ерә бөлүнүр вә һәрәсиндән дөрд әдәд тоз һүчәйрәси (микроспор) әмәлә кәлир. Бу һүчәйрәләр мигдарча чох мүхтәлиф олур. Кәнч тозчуглар тозлуг юваларында гаты гига маддәси дахилиндә олур вә онун һесабына бөйүйүр.


Биткиләрин чохунда тоз һүчәйрәләринин дахили вә харичи тәбәгәси гаты гига маддәсинин һесабына галынлашыб нәтичәдә ики габыг әмәлә кәтирир. Дахили габыг инчә вә селлүлоз маддәсиндән ибарәт олуб, интина, харичи галын вә гисмән рәнкли габыг исә экзина адланыр (шәкил 98, 99, 100).

Тозчуглар һачм. шәкил вә рәнк э'тибарилә чох мұхтәлиф олур (шәкил 101). Тоз һүчәйрәсинин ичиндә гаты ситоплазмада яғ. иишаста, шәкәр кимн эһтият гита маддәси олур. Там гурулуш-



Шәкил 98. Тоз юваларынын инкишафы.

э—эпидермис тәбәгәси; с—субэпидермис тәбәгәси; энд-фибрөз-эндотеси; вс—өртүчү тәбәгә; а—археспор.




Шәкил 99. Археспорлары олан бир тозчуг ювасы.

э—эпидермис; энд—эндотеси; вс—өртүчү тәбәгә.

ду тоз һүчәйрәсинин мөһтәвийяты (нүвәси, ситоплазмасы вә н. а.) икийә бөлүнүр, ләкин онлар бир-бириндән хусуси гыфла айрылмыр. Бунлардан бөйүк һүчәйрәйә вә кетатив, кичийинә исә кенератив һүчәйрә дейилр. Бунлардан биринчи тоз

борусуну инкишаф этдирәрәк маяланмада иштирак этмир. Кенератив һүчәйрә исә икийә бөлүнүр вә әмәлә кәлән һиссәләрин һәр икиси маяланмада иштирак этдийи үчүн сперм адланыр.



Шәкил 100. Ачылмыш тозлуг (тоз кпсәси).



Шәкил 101. Мұхтәлиф биткиләрин тозчугларынын формалары.

Беләликлә, тоз һүчәйрәси (микроспор) маяланмая һазырла-шаркән дишичийин дахилиндә чүчәрәрәк, тоз борусу адланан вә чох ихтисара уграмыш эркәк һаметофитини әмәлә кәтирир. Чи-


чәкли биткиләрдә вегетатив һүңейрә спорлу биткиләрдә көрдү-йүмүз проталлары әвәз әдир. Спорлу биткиләрин әркәк һаме-таларынын—сперматозоидләринин бурада гаршылығы исә кенератив һүңейрәләрдир (спермләрдир).

Дишичик

Дишичийи (кенесейи) әмәлә кәтирән ярпаглара мейвәярпаг-лары вә я мегаспорофиллар дейилир.

Дишичийи ағызчыгы мұхтәлиф биткиләрдә әйни гурулушда дейилдир. Ағызчыгын вәзифәси тозлары тутмаг олдуғу үчүн, чох заман киринтили-чыхынтылы олур вә өзүндән япышганлы маддә ифраз әдир (шәкил 102).

Дишичийи әмәлә кәтирән мейвәярпаглары бир-бирилә бир-ләшмәмишсә, белә дишичийә апокарп кенесей дейилир,



Шәкил 102. Үч мейвәярпағындан әмәлә кәлмиш мұхтәлиф дишичикләр.

1—апокарп; 2—4 мейвәярпаглары мұхтәлиф дәрәҗәдә битишмиш синкарп дишичикләр; а—юмурталыг; от—сүтунчуг; г—ағызчыг.

мәсәлән, бөйүрткан, моруг, гүрдбоған вә саирәнин дишичийи бу типлидир. Мейвә ярпаглары бирләшә-рәк бир дишичик әмә-лә кәтирдикдә исә, она синкарп ке-нисей дейилир. Ал-ма, армуд, хорузкү-лү, соған ччәкләри-нин дишичийи буна мисал ола биләр. Мейвәярпагларынын


бирләшмәси процесси, адәтән, юмурталыгдан башлайыб, ағызчыга доғру кедир. Онлар мұхтәлиф дәрәҗәдә бирләшир. Бә’зән юмурта-лыг һиссәси тамамилә бирләшир, сүтунчуг вә ағызчыг һиссә-ләри исә сәрбәст галыр (шәкил 102, 2) я да юмурталыг вә сүтун-чуг һиссә бирләшир, ялныз ағызчыг һиссәси сәрбәст галыр (шә-кил 102, 3) нәһайәт бүтүн һиссәләри бирләшмиш олур (шәкил 102, 4).

Дишичик ағзынын дилимләринин, сүтунчуғлары вә юмурталы-ғын юваларынын сайына әсасән дишичийи әмәлә кәлмәсиндә нечә мейвәярпағынын иштирак этдийини мүййән әтмәк олур.

Юмурталыгы әмәлә кәтирән мейвәярпаглары бир-бирилә мұхтәлиф гайдада битишир, мәсәлән, бир мейвә ярпагы дикәри-нин кәнары илә вә я айры-айры мейвәярпаглары өз кәнарлары илә, я да һамысы бир ердә битишир (шәкил 103).

Тохумлуғлар (мегаспоранкиялар) юмурталыгын дахилиндә онун һәр һансы һиссәсиндән әмәлә кәлә биләр. Юмурталыгда тохумлуғлар мүййән ерә битишмиш олур ки, һәмин ерә дә то-хумкәтирән саһә (пласента) дейилир. Бир мейвәярпағын-

дан әмәлә кәлмиш юмурталыгдакы тохумлуғлар мейвәярпагла-рынын я әсас дамары, я да онларын битишдийи ерин боюнча дү-зүлмүш олур. Бунлара паритетал пласентлар дейилир, мәсәлән пахлалыларда, дәмрочичәйиндә вә хаччичәклиләрдә.




Шәкил 103.

ю—юмурталыг; ст—сүтунчуг; аг—дишичик ағзы.

Бә’зи тохумлуғлар юмурталыгын дибиндән юхарыя доғру узан-мыш сүтуна битишир, бунлара да ох боюнча дүзүләнләр дейилир. Буна гәрәнфилчичәклиләрдә вә бадымчанчичәклиләрдә раст кәлирик. Бә’зи тохумлуғлар да чох ювалы юмурталыгын ортасындан узанан сүтунун әтрафына дүзүлмүш олур ки, онлара да мәркәздә топлананлар дейилир.


Тохумкәтирән (пласент) саһә илә тохумлуғ арасында тохум-луғун аягчыгы олур. Тохумлуғун аягчыгла бирләшдийи ерә халазә дейилир. Тохумлуғлар юмурталыгын дахилиндә мұх-тәлиф вәзийәтләрдә даянар, бә’зи биткиләрдә дүз вә я атроп (шәкил 105, 1), бә’зиләриндә исә-әйилмиш вә анатроп (шә-кил 105, 2), аз-аз һалларда исә бүкүлмүш вә я комплатроп (шә-кил 105, 3) вәзийәтдә олур. Тохумлуғун нутселлусу аягчыг илә әйни истигамәтдә ерләшдикдә дүз тохумлуғ адланыр, мәсә-лән, әвәликчичәклиләр, кичиткан, гара истиот фәсиләләриндә олдуғу кими.

Тохумлуғ дүз тохумлуғдакынын әксинә олуб онун узун аяг-чығындан салланмышса, тәрс тохумлуғ адланыр. Белә то-



Шәкил 104. Мүхтәлиф мигдарда мейвәярпағындан әмәлә кәлмиш юмурталыгларын схематик әннә кәсикләри.

1—2—тохумкәтирәнләрн диварларда оланлар (2-дә яланчы аракәсмә әмәлә кәлмишдир); 3—5 тохумкәтирәнләрн мәркәздә оланлар; 6—8 тохумкәтирәнләрн яланчы оха бирләшәнләр; 9—там олмаян вә 10—там олан аракәсмәли юмурталыгларда тохумлуғларын аракәсмә бәжәндә дүңдәмәси.



Шәкил 105. Тохумлуғларын инкишаф схемләри вә узунуна кәсикләри (схематик оларар).

1—дүз тохумлуғ; 2—тәрс тохумлуғ; 3—бүкүлмүш тохумлуғ.


хумлуғун бир тәрафи аягчыға битишмиш олур, нуселлус исә вәзиййәтини дәйишир.

Тохумлуғун мүхтәлиф һиссәләри мүхтәлиф дәрәчәдә инкишаф әтмиш оларса, о заман онун чох инкишаф әтмиш һиссәсиндә бүкүк әмәлә кәлир вә нуселлус бүкүлүр, микропилия халазая яхын олур, мәсәлән гәрәнфилчичәклиләрдә вә хаччичәклиләрн бә'зиләриндә олдуғу кими. Бу кәстәрилән үч әсас тохумлуғ типиндән башга онларын араларында кечид формалары да олур (шәкил 105).

Юмурталығын вәзиййәти чичәйин башга һиссәләринә нисбәтән мүхтәлиф олур. Үмумийәтлә, чичәкләрдә юмурталыг юхары, ашағы вә ярымашағы олмагла үч вәзиййәтдә олур; юмурталығы габарыг вә я дүз чичәк ятағында сәрбәст отуран вә юмурталығын дивары ялныз мейвә ярпагларындан әмәлә кәлмиш чичәкләре юхары юмурталыглы чичәк дейилир. Белә чичәкләрдә чичәйин башга һиссәләри юмурталығын дибинә битишдийи үчүн онлара бир дә дишичикалты чичәк дейилир, мәсәлән: лимон, бөйүрткан, магнолия, әтиршаһ, гәрәнфил вә саирә (шәкил 106,1).

Бә'зән юхары юмурталыглы чичәкдә чичәк ятағы гәдәһ кимн чухур олур вә онун дибиндә юмурталыг чичәк ятағынын дивары илә бирләшмәдән сәрбәст отуруп, чичәйин башга һиссәләри исә гәдәһшәкилли чичәк ятағынын кәнарларына бирләшмиш олур. Белә чичәйә дишичикяны чичәк дейилир, мәсәлән, әрик, шафталы, кавалы, алча, итбурну, килас вә саирәнин чичәйи бу типлидир (шәкил 106, 2, 3).

Дишичийи чөкәк чичәк ятағынын ичәриндә олуб, юмурталығынын диварлары чичәк ятағы илә бирләшмиш чичәкләре ашағы юмурталыглы чичәк дейилир. Бу чүр чичәкләрдә чичәйин башга һиссәләри юмурталыгдан юхарыда бирләшдийинә кәрә онлара дишичикүстү чичәк дә дейилир, мәсәлән алма, армуд, әзкил, һейва, емишан вә саирәнин чичәкләри (шәкил 106,4).



Шәкил 106. Мүхтәлиф чичәкләрдә юмурталығын вәзиййәти:

1—юхары юмурталыг яхуд дишичикалты чичәк; 2—3—юхары юмурталыглы яхуд дишичикяны чичәк; 4—чичәк ятағы вә мейвә ярпагларындан әмәлә кәлмиш ашағы юмурталыг яхуд дишичикүстү чичәк; 5—ярымашағы юмурталыглы яхуд ярымдишичикүстү чичәк.

Чичәк ятагы юмурталыгы ярысына гәдәр әһәтә эдән вә онун дивары илә бирләшән чичәкләрә ярым ашагы юмурталыгы чичәк дейлир. Бу чүр чичәйин башга һиссәләри юмурталыгын тәхминән орта һиссәсинә бирләшдийинә көрә, она ярым дишичкяны чичәк дейлир, мәсәлән, кәндалашда, шүйүтдә, балдырганда, маралчичәйиндә вә саир чичәкләрдә олдуғу кими. Бу чүр чичәкләрә тәбиәтдә аз тәсадүф эдилир (шәкил 106,5).

Юмурталыгын бу вә я дикәр вәзийәти нисбәтән ирси сабит әләмәт олдуғу үчүн систематик әһәмийәтә маликдир. Филокено-тик нөгтейи-нәзәрән юхары юмурталыглы чичәк ибтидаидир, ашагы юмурталыглы чичәк исә даһа чох тәкамүл этмишдир. Ярымашагы юмурталыглы чичәк бунларын арасында кечид тәшкил эдир.

Бә'зән тохумлугда бир нечә рүшейм кисәси әмәлә кәлир, лакин онлардан бири инкишаф эдир. Үмумийәтлә тохумлуг мегаспоранкиядан башга бир шей дейилдир. Онун аяг һиссәси мегаспоранкиянын аягы, нуселлусу мегаспоранкиянын диварыдыр, археспория ана һүчәйрәдир, рүшейм кисәси мегаспордур, тохумлугун әтрафындакы өртүк исә тохумлу биткиләрә аид олан вә гыжыларда олмаян, ени әмәлә кәлмиш бир органдыр.

Бә'зән археспория бирдән-бирә мегаспора (рүшейм кисәсинә) чеврилир. Белә һалларда хромозомларын редуксиясы мегаспор әмәлә кәләндә дейил, юмурта һиссәси инкишаф этдийи заман башланыр (көрмәкдә, занбаг фәсиләсиндә вә саирәдә олдуғу кими).

Ади һалларда мегаспор (рүшейм кисәси) әмәлә кәләндән сонра ики һиссәйә бөлүнүр; сонра бу һиссәләрин һәр бири енә дә ики ерә бөлүнүр. Бу дөрд һиссә енә ики ерә бөлүнүр, нәтичәдә рүшейм кисәсиндә 8 һүчәйрә әмәлә кәлир. Бунлардан дөрдү рүшейм кисәсинин бир учуна, о бири дөрдү дә дикәр учуна, йә'ни рүшейм кисәсинин гүтбләринә чәкилир; һәр ики гүтбүн һәр бириндән бир һүчәйрә рүшейм кисәсинин орта һиссәсинә кәлиб бир-бирилә ассимилә эдиләрәк рүшейм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәсини әмәлә кәтирир.

Беләликлә, микропилия яхын олан гүтбәки үч һүчәйрәдән бири даһа ири олур ки, она юмурта һүчәйрәси вә я диши һүчәйрә дейлир. Онун янындакы ики хырда һүчәйрә синеркидләр вә я көмәкчи һүчәйрәләрдир. Рүшейм кисәсинин микропилиясынын әкс гүтбүндә әмәлә кәлән 3 һүчәйрә антипод адланыр. Гүтбләрән ортая кечмиш вә ики һүчәйрәнин гаршылыглы ассимиляциясындан әмәлә кәлән һүчәйрәйә рүшейм кисәсинин икинчи һүчәйрәси вә я мәркәзи һүчәйрәси дейлир. Маяланмадан сонра рүшейм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәсиндән эндосперм, диши һүчәйрәсиндән рүшейм (кәләчәк биткичик) әмәлә кәлир. Синеркид вә антиподлар исә өз гылафларыны итирәрәк рүшейм кисәсинин ситоплазмасынә гарышыр.

Нектарлыглар вә онларын әһәмийәти

Өртүлү тохумлу биткиләрин чичәкләринин һәятындан бөйүк ролу олан һиссәләрдән бири дә некторлыгдыр ки, о да өзүндән шәкәрли маддә ифраз эдән вәзидән ибарәтдир. Онун ифраз этдийи ширин маддәйә нектар дейлир. Нектарлыглар чичәкдә, чичәкянлыгында, касачыгда, тачда, эркәкчик саплаында вә я онларын чыхынтыларында, стаминодияларда, юмурталыг үзәриндә, сүтунчуғун дибиндә, чичәкятагы үзәриндә һалга вә чыхынты һалында олур. Онларын шәкли, мигдары вә дүзүлүшү нөвләр үчүн нисбәтән сабит ирси әләмәт олдуғундан, битки систематикасында ондан кениш истифадә эдилир. Нектарлыглар чох вахт чичәйин дәрин һиссәсиндә олур. Онларын ифраз этдикләри нектар маддәси чичәкләрдә чарпаз тозланманы тәмин эдән мүхтәлиф һәшәраты чичәйә чәлб эдир. Ондан истифадә эдән чүчүләр чичәкдәки эркәкчикләрин тозлугларына тохундугда тозчуғлар онларын бәдәнинә япышыр вә орадан башга чичәйә кечдикдә онун чарпаз тозланмасыны тәмин эдир. Әсбәчичәйи, бәнөвшә вә бә'зи башга биткиләрин чичәкләриндә тач вә я касачыгдан хүсуси чыхынты әмәлә кәлир ки, орая нектар маддәси топланыр, һәмин чыхынтыя маһмыз дейлир. Нектар сахароза, глюкоза, фруктоза чох аз мигдарда азот вә минерал бирләшмәләрдән ибарәтдир. Арылар нектары топлаяраг бал һасил эдир.

Чичәк һиссәләринин дүзүлүшү

Биткиләрин чичәк һиссәләри адәтән бир гайдада дүзүлмүр. Чичәйин һиссәләри әсас әтибарилә үч типдә дүзүлүр. Бурғу үзрә вә я асиклик, даирәви вә я сиклик, гарышыг вә я һемосиклик.

Магнолияда, гурдбоғанда, күлулда (*Adonis*), шахтаотунда (*Helleborus*) вә саир биткиләрдә чичәйин һиссәләри чичәк-ятагы үзәриндә бурғу шәклиндә дүзүлмүшдүр. Бу чүр чичәкләрә асиклик чичәкләр дейлир.

Өртүлүтохумлу биткиләрин әксәрийәтиндә, о чүмләдән замбагда, соғанда, гәрәнфилчичәклиләрдә, әтиршаһчичәклиләрдә чичәйин һиссәләри чичәкятагы үзәриндә бир-биринин ардынча даирәләр үзрә дүзүлүр. Буна даирәви вә я сиклик дүзүлүш дейлир.

Бурғу үзрә дүзүлмүш чичәкләрлә (асиклик) даирәви (сиклик) дүзүлмүш чичәкләр арасында кечид формасы тәшкил эдән, йә'ни һиссәләри гарышыг бир һалда дүзүлән чичәкләр вардыр ки, онлара һемосиклик чичәкләр дейлир; белә чичәкләрин әксәрийәтиндә чичәйин харичи һиссәси (каса вә ләчәкләри) сиклик вә я даирәви, дахили һиссәләри (эркәкчик вә дишичикләри) исә бурғу дүзүлүшлү олур, мәсәлән, гурдбоған, батаглыг гурдбоғаны (*Caltha*), бөйүрткан, моруғ, бағлычаоту вә саирәдә олдуғу кими.

Биткиләрдә чичәйин һиссәләринин дүзүлүшү хүсусийәти, нисбәтән сабит әләмәтләрдән биридир вә битки систематикасында

ондан кениш истифадә эдилір. Тәкамүл ә'тибарилә ән гәдим чичәк-асиклик гурулушлу, ән чаваны, йә'ни тәкамүл әтмиш чичәк исә-сиклик дүзүлүшлү чичәкләрдир.

Чичәкләрин формулалары вә диаграмлары

Чичәйин һисәсләри ярпаг дүзүлүшү ганунуна табедир. Чичәйин гурулушуну ғысача ифадә әтмәк үчүн хусуси формуладан истифадә эдилір. Формулада чичәйин айры-айры һәр һиссәсини кәстәрмәк үчүн һәммин һиссәнин латынча адынын баш һәрфи шәрти ишарә гәбул эдилмишдир. Мәсәлән, касачыг латынча *Kalyx* адландығындан «K» илә, тач *Corolla* «C» илә, әркәкчикләр *Androceum* «A» илә, дишичийи тәшкил әдән мейвәярпаглары *Gynaeceum* «G» илә, һәр бир даирәдәки үзвләрин мигдары рәгәмләрлә ифадә эдилір. Әкәр онларын мигдары чох вә я мүййән дейилдирсә, о заман чохлуг ишарәси олан ∞ илә ифадә олунур. Әкәр әйни һиссә бир нечә даирә үзрә дүзүлмүшсә, о заман һәр даирәдәки мигдары кәстәрән рәгәмләр арасында + ишарәси гоюлур. Һәр һансы һиссә бурғу үзрә дүзүлмүш олдугда, һәммин һиссәни кәстәрән мигдарын үстүндә «⊙» ишарәси гоюлур; әкәр чичәкдә бу вә я башга бир һиссә йохдурса, о заман һәммин һиссәни ифадә әдән һәрфин габагына «O» ишарәси гоюлур; әкәр мүййән һиссәнин үзвләри өз араларында битишибсә, һәммин һиссәни ифадә әдән мигдар мөтәризә ичәрисинә алыныр. Чичәк юхары юмурталыглы олдугда юмурталыглы кәстәрән рәгәмин алтындан, ашағы юмурталыглы олдугда исә рәгәмин үстүндән хәтт чәкилир. Чичәйин мүнтәзәмлийи (актиноморфлуғу) * ишарәси вә я ичәрисиндә бир-биринә перпендикуляр чызылмыш хәтт олан даирә ⊕ илә ишарә олунур. Чичәйин геһри-мүнтәзәмлийи, йә'ни зигаморфлуғу ох † илә, я да ики кәнарына негтә гоюлмуш хәтт † илә ифадә олунур. Бирчинсли әркәк чичәк ♂ илә, бирчинсли диши чичәк ♀ илә, икинчисли чичәк исә ♂ илә ифадә олунур.

Бәсит вә я биргат янлыглы чичәк латынча *Perigonium* адландығындан бу чүр чичәкләрин чичәкянлыгы «P» һәрфи илә ишарә олунур.

Бә'зи чичәкләрин формулалары

Сүсән * ♂ $P_{3+3}, A_{3+3}, G (3)$

Замбаг * ♂ $P_{3+3}, A_{3+0}, G (3)$

Гурдбоған * ♀ $K_5, C_5, A_{\infty}, Ig_{\infty}$


Гушәппәйи * ♀ $K_{2+2}, C_4, A_{2+2}, G (2)$

Кичиткан анасы † ♂ $K(5), C(5), A_4, \overline{G} (2)$


Касны † ♂ $K_0, C(5), A(5), G (2)$

Армуд * ♂ $K_5, C_5, A_{\infty}, G (5)$

Магнолия * ♂ $P_{\infty}, A_{\infty}, G_{\infty}$




Шәкил 107. Чичәйин схематик диаграмы.
кл—өртүчү ярпаг; п—чичәкалтлыглары.



Шәкил 108. Мүхтәлиф чичәкләрин диаграмлары.

1—асиклик; 2—һемосиклик (мейвәярпаглары бир даирә тәшкил әтмишдир); 3—сиклик; 3—бешдаирәли бешүзүлү актиноморф; 4—дөрддаирәли бешүзүлү актиноморф; 5—тачы актиноморфдур, ләкин бүтүн чичәйин бир симметриясы вардыр; 6—зигморф; (чичәкалтлыгынын ери негтәләрлә кәстәрилмишдир).

Чичэйин диаграмы, формуласына нисбәтән онун гурулушу һаггында даһа айдын тәсәввүр ярадыр, чүнки бурада чичәк һиссәләринин бир-биринә олан мүнәсибәти вә дүзүлүшү даһа айдын ифадә эдилір. Чичэйин диаграмы, чичәкләрин энинә кәсикләри әсасында дүзәлдилір. Бир чичэйин диаграмы һәммин чичэйин бүтүн һиссәләриндән кечән кәсийин мүстәви үзәриндә схематик проекциясыдыр. Диаграмын юхарысында,—чичэйин отурдуғу әсас ох гара даирә илә, ашағыда—өртүчүк ярпағы гөвс илә көстәрилир. Каса ярпаглары габыргалы гөвс илә, ләчәкләр исә—садәчә гөвсләрлә көстәрилир. Эркәкчикләр тоз кисәсинин энинә кәсийи шәклиндә вә кенесей юмурталығын энинә кәсийи формасында көстәрилир. (шәкил 107, 108). Чичэйин нисбәтән даһа әһәмийәтли хүсүсийәтләринин диаграмда көстәрсәк, о заман һәммин биткинин һәинки систематикадакы мөвгеи, һабелә филогенетик вәзийәти дә айдынлашар.



Шәкил 109. Гурдбоған (гаймаг-чичэйин) биткини, чичэйинин инкишаф мәрһәләләри.

эр—эркәкчик; диш—дишчик;
кя—каса ярпағы; ла—ләчәк.

Чичэйин мүхтәлиф диарәләринин әмәлә кәтирән һиссәләр сайча я бәрабәрди, я да бири о бириндән бир нечә дәфә артыг вә я әксикди (чичәкләрин юхарыда көстәрилмиш формулаларына бах). Мәсәлән, әтиршаһчичәклиләрдә каса ярпаглары—5, эркәкчикләр—10 вә дишчик—5 мейвәярпағындан әмәлә кәлмишди. Һиссәләрин сайынын аз вә я чохлау редукия вә я парчаланма илә әлагәдардыр. Бир даирәнин һиссәләри, адәтән о бири даирәнин һиссәләрилә нөвбәләшир. Чичәк һиссәләринин дүзүлүшүндә ганунауйғунлуғун позулмасы чох вахт мүйәйән даирәдәки һиссәләрин редукиясы нәтичәсиндә баш верир. Редукия әтмиш, я да рудимент һалында олан органлар диаграмда хач ишәрәси илә көстәрилир.

Чичэйин һиссәләри дә ярпагда олдуғу кими экзокен чыхынтылар һалында инкишаф эди. Бәзән ләчәкләр эркәкчиләрә вә һәтта дишчикә (кенесейә) нисбәтән инкишафда кери галыр. Инкишаф эдән эркәкчикләрин тозлуға вә саплаға айрылмасы сонралар баш верир. Гейд әтмәлийик ки, әввәлчә саплаг, сонра

исә тозлуғ әмәлә кәлир. Битишикләчәкли тачын битишикярпагчыгы касачығын вә бәсит битишикянлыгы чичэйин инкишафы мүхтәлиф биткиләрдә айры-айры шәкилләрдә кедир. Бәзиләриндә чичәк даирәләринин һәр бири әввәлчә айрыча габарчыг шәклиндә олур. Сонралар онларын дибиндә там һалға әмәлә кәлир ки, онун да үзәриндә габагча әмәлә кәлмиш габарчыглар йүксәлир. Бу там әмәлә кәлмиш һалға—тачын, касачығын вә биргатянлыгы чичэйин бору һиссәсини, әввәлчә әмәлә кәлмиш габарчыглар исә—мүйәйән даирәдәки һиссәләрин сәрбәст саһәләрини тәшкил эди.

Бәзи биткиләрдә чичәкятағы узанараг чичәк һиссәләринин даирәләрини бир-бириндән айырыр. Мәсәлән, тач касачыгдан, эркәкчикләр тачдан, эркәкчикләр дишчикдән тамамилә айры олур (шәкил 109).

ЧИЧӘКЛӘМӘ (ЧИЧӘКАЧМА)

Биткиләр инкишафларынын мүйәйән дөврүндә чичәкләйир. Чичәкләнмә үчүн биткидә мүйәйән гәдәр гита маддәси топланмалыдыр. Одур ки, әкилдикләри биринчи ил чичәкләйән биткиләр 20—30 күндән сонра вә векетасия дөврүнүн ортасында чичәк ачыр. От биткиләринин әксәрийәти бир, ики, үч илдән вә я бир нечә илдән сонра, ағачларын әксәрийәти исә бир нечә он илдән сонра чичәк ачыр. Чичәк ачмаға һәммин битки нөвүнүн ирсән мөһкәмләнмиш хүсүсийәтләри тәсир көстәрмәкдән башға харичи амилләр дә бөйүк тәсир көстәрир. Көтүкдән, көкдән вә я гәләмдән әмәлә кәлмиш ағачлар тохумдан чүчәрмишләрә нисбәтән даһа тез чичәк ачыр, чүнки биринчиләр мүйәйән-инкишаф мәрһәләләрини артыг кечирмиш олур. Тәк битән ағачларда чичәкләмә сых әкилмиш ағачлара нисбәтән тез башланыр, чүнки сых әкилмиш ағачларда инкишаф тәдричи кедир.

Биткинин һәддән артыг азот күбрәси алмасы вә сүр'әтлә бой атмасы чичәкләмәсини ләнкиди. Фосфор вә калиум күбрәләри, шиддәтли күнәш ишығы, гуру һава, гуру торпаг вә биткидә сулу карбонларын (башлыча олараг шәкәрләрин) топланмасы адәтән чичәкачманы сүр'әтләндирир.

Биткинин дахили вә харичи шәраитини дәйишмәклә онун һәятында мүнүм рол ойнаян чичәкачма просесинә мүйәйән тәсир көстәрмәк олар. Т. Д. Лысенконун мәрһәләли инкишаф нәзәрийәсинә көрә, биткинин чичәк ачмасы просесиндә онун габагчадан мүйәйән инкишаф мәрһәләсини кечмәсинин бөйүк әһәмийәти вардыр.

Чичәк тумурчуглары (гончалары) формалашан заман каса ярпаглары вә ләчәкләрин ашағы һиссәләри харичи тәрәфдән сүр'әтлә бөйүйүр, бунун да нәтичәсиндә гонча гапалы галыр. Чичәкләрин ачылмасы каса ярпаглары вә ләчәкләрин ашағы һиссә-

лэринин дахилдэн сүр'этлэ бөйүмэси нэтичэсиндэ баш верир. Бу заман чичэйин һэмин һиссэлэринэ чохлу мигдарда су ахдыгындан гончанын бүрүшмүш вэ гырышмыш һиссэлэри, хүсүсөн лэчэкклэр һамарланараг ачылыр.

Бэ'зи тропик биткилэр, мәсэлэн, һинд гозу вэ саирэ бир дөфэ чичэк ачдыгдан сонра, арасы кәсилмэдэн бүтүн һэяты боюнча чичэк ачмагда давам эдир. Биткилэрин әксәриййәти мүййән фәсилдә—язда, яйда, пайызда чичэк ачыр.

Бэ'зи битки нөвлэринин чичэйи ачылдыгдан сонра та солунчая гэдэр даһа гапанмыр, бэ'зиләриндә исә, күн әрзиндә һәрәрәтин вэ саирәнин дәйишмәсиндән асылы олараг, мүййән заман ачылыр вэ я гапаныр. Бу һадисә, һэмин биткиләрдә ачылмыш чичэйин һиссэлэринин бөйүмәкдә давам әтмәси илә әлагәдардыр. Биткиләрдән бир чохунда бу бөйүмә харичи шәраитдән асылы олараг чичэйин каһ дахилиндә, каһ да харичиндә даһа сүр'әтлэ кедир.

ЧИЧЭК ГРУПУ

Хашхашда, лаләдә, хорузкүлүндә вэ дикәр иричичекли биткиләрдә чичекклэр тәк-тәк олур. Үмүмийәтлэ бир чох хырда чичэйи олан биткиләрдә чичекклэр дәстә-дәстә олур. Онлара чичәк групу дейилир. Чичәк групу әмәлә кәтирән чичәк зоғларында нормал инкишаф әтмиш ири ярпаглар олмур. Онларын янында өртүк ярпағы вэ я чичәкалтлыгы ярпағы олур.

Чичәк группары әсасән ики типдә олур: гейри-мүййән—моноподиал вэ мүййән—симподиал чичәк групу.

Моноподиал вэ я гейри-мүййән чичәк группарынын әсас хүсүсиййәти ондан ибарәтдир ки, онларда әсас ох ян оха нисбәтән даһа чох инкишаф әтмишдир. Чичәкләр охун дибиндән учуна доғру тәдричән ачылыр. Бунун нәтичәсиндә һәмишә охун ашағысында гоча чичәкләр, тәпәсиндә исә ачылтмамыш тонча һалында чаван чичәкләр олур. Бэ'зи чичәк группарында (мәсэлән, башчыг, сәбәтчик, чәтир вэ с.) чичәкләр харичдән дахилә вэ я әтрафдан мәркәзә доғру ачылыр. Олур ки, бу чүр чичәк группунун әтраф чичәкләри гоча, мәркәз чичәкләри исә чаван олур. Моноподиал чичәк группары өз нөвбәсиндә ики ярымгрупа бөлүнүр: 1) бәсит моноподиал чичәк групу вэ 2) мүрәккәб моноподиал чичәк групу.

Бәсит моноподиал чичәк группарынын әсас оху садә вэ будагланмамыш олдуғу һалда, мүрәккәб моноподиал чичәк группарынын будагланмыш олур.

Бәсит моноподиал чичәк группарындан ашағыдакылары кәс-тәрмәк олар:

1. Бәсит салхым—белә чичәк группунда әсас ох узанмыш вэ чичәкләр бәрәбәр саплаглар үзәриндәдир. Онлардан бэ'зилә-

ринин чичәк саплагларынын дибиндә чичәкалтлыгылары олур, мәсэлән, инчичичэйи вэ үскүкчичэйи биткиләриндә олдуғу кими. Бэ'зиләриндә исә чичәкалтлыгылары олмур, мәсэлән, хач-чичәклиләр фәсиләсинин нүмайәндәләриндә олдуғу кими. Бәсит салхымлар да ики чүр олур: биртәрәфли бәсит салхым вэ икитәрәфли бәсит салхым (шәкил 110, 1, 2).

2. Бәсит сүнбүл—бунун салхымдан фәрги ондадыр ки, әсас охун үзәриндәки чичәкләр саплагсыздыр, мәсэлән, бағаярпағы вэ сәһләбчичәклиләрдә олдуғу кими (шәкил 110, 3).

3. Тохмагчыг—бунун да сүнбүлдән фәрги әсас охунун йоғун олмасыдыр (бэ'зән әтләшмәсидир), мәсэлән, гарғыдалынын диши чичәк групу, данааяғынын эркәк вэ диши чичәк групу кими (шәкил 110, 4).

4. Галханчыг—салхыма охшайыр, анчаг салхымдан фәрги ондадыр ки, охун ашағы чичәкләринин саплаглары узундур вэ юхарыя кетдикчә чичәкләрин саплаглары гысалдыгындан чичәкләрин һамысы әйни сәвиййәдә даяныр, мәсэлән, армуд, алма, емишан вэ саирәдә олдуғу кими (шәкил 110, 5).

5. Сыргачыг—әсас әтибарилә сүнбүлә охшайыр, ләкин әсас оху зәйф олдуғундан чичәкләйәндән сонра чичәк групу бирлиждә дүшүр. Мәсэлән, сөйүдүн, чинарын, фындығын, гозун эркәк чичәк группары кими.

6. Бәсит чәтир—онун әсас оху чох гысалмышдыр, буна кәрәдә чичәк саплаглары, демәк олар ки, бир нөгтәдән шүавари чыхмыш кими көрүнүр, мәсэлән, соған, албалы, нәркизчичэйи вэ саирәдә олдуғу кими (шәкил 110, 6).

7. Башчыг—гысалмыш вэ бир гэдәр йоғунлашмыш әсас охун үзәриндә чичәкләр саплаглы вэ я саплагсыз отурур, мәсэлән, үчярпағйончада олдуғу кими (шәкил 110, 7, 8).


8. Сәбәтчик—әсас ох гысалмыш вэ нәлбәки шәклиндә кенәлмишдир; чичәкләр онун үзәриндә саплагсыз отурур.

Чичәкалтлыгы ярпагларынын әвәзиндә әсас охун харичи һиссәсиндә мүхтәлиф шәкилли сәбәтчийи харичдән әһәтә әдән ярпагчыглар олур ки, онлара сарғы дейилир, мәсэлән, зәнчироту, касны, күнәбахан вэ саир мүрәккәбчичәклиләр фәсиләсинин нүмайәндәләриндә олдуғу кими (шәкил 110, 9).

Мүрәккәб моноподиал чичәк группары:

1. Сүпүркә вэ я мүрәккәб салхым—бурада әсас ох үзәриндә икинчи дәрәчәли, нисбәтән гыса охлар әмәлә кәлир ки, онларын да үзәриндә чичәкләр саплаглары васитәсилә отурур, мәсэлән, ясәмән, йовшан, үзүм, чәлтик, дары, гамыш, вәләмир, суданоту, шәкәр гамышы вэ саирәдә олдуғу кими (шәкил 110, 10).

2. Мүрәккәб сүнбүл—бунун бәсит сүнбүлдән фәрги орасындадыр ки, әсас охун үзәриндә айры-айры чичәкләр әвәзиндә икинчи дәрәчәли, нисбәтән гыса охлар әмәлә кәлир, бу ахырынчыларын да үзәриндә чичәкләр саплагсыз олараг отурур, мәсэлән,



Шәкил 110.

1—биртәрәфли салхым; 2—икитәрәфли салхым; 3—сүнбүл; 4—тохмагчыг; 5—галханчыг; 6—чәтирчик; 7 вә 8—башчыглар; 9—сәбәтчик; 10—мүрәккәб салхым вә я сүпүркә; 11—мүрәккәб сүнбүл; 12—мүрәккәб чәтир; 13 вә 14—гыврыглар; 15 вә 16—буруглар; 17—дихазия; 18—плейхазия.

буғда, арпа, човдар вә тахыл фәсиләсинин бир чох башга нүмайәндәләринин чичәкгуруппу кими (шәкил 110, 11).

3. **Мүрәккәб чәтир**—гысалмыш әсас охун үзәриндә чичәкләр әвәзиндә шүавари, бир нөгтәдән чыхмыш, икинчи дәрәчәли охлар әмәлә кәлир ки, онларын да һәр биринин учунда бир нөгтәдән чыхмыш саплаглы чичәкләр топа-топа отуруп, мәсәлән, чәтир чичәкләрдән шүйүт, балдырған, еркөкү вә саирәдә олдуғу кими (шәкил 110, 12).

Моноподиал чичәк группларында узанмыш вә я гысалмыш һәтиги әсас ох үзәриндә ян будаг шәкиндә чичәкләр әмәлә кәлир. Бу ян будаглар да өз нөвбәсиндә узанмыш вә я гысалмыш олур.

Симподиал чичәк группларында әсас ох олмур вә чичәкләр тәпәдән дибә доғру ачылып. Чаван чичәкләр адәтән ашағыда, гоча чичәкләр исә юхарыда олур. Һәм дә чичәкләр дахилдән хариңә доғру ачылып. Онлар ашағыдакы типләрә бөлүнүр:

1. **Монохазия**—әсас саплаг бир чичәклә гуртары; чичәкдән алтда икинчи дәрәчәли саплаг әмәлә кәлир вә әсас саплаға бирләшәрәк кеч ачылан чичәклә гуртары. Икинчи чичәйин саплагы үзәриндә үчүнчү саплаг әмәлә кәлир, о да икинчийә нисбәтән даһа кеч ачылан чичәклә гуртары. Бу саплаглар биртәрәфли әмәлә кәлдикдә гыврыг (шәкил 110, 13, 14), нөвбә илә һәр ики тәрәфдә әмәлә кәлдикдә исә буруг адланыр (шәкил 110, 15, 16).

2. **Дихазия**—бурада биринчи тәк чичәклә гуртаран әсас саплагын үзәриндә вә чичәкдән бир гәдәр алтда гаршы-гаршыя икинчи саплаглар әмәлә кәлир. Бунларын да һәр бири тәк чичәклә гуртары, һәм дә үзәрләриндә чичәкдән бир гәдәр алтда енә гаршы-гаршыя үчүнчү саплаглар әмәлә кәлир вә тәкрарән һәр бири әлавә чичәклә гуртары; бу гайда илә дөрдүнчү вә и. а. саплагларын әмәлә кәлмәси давам әдир, мәсәлән гәрәнфилчичәклиләрдә (шәкил 110, 17).

3. **Плейхазия**—биринчи саплаг чичәклә гуртары. Онун дибиндә дәстә һалында икидән артыг саплаг әмәлә кәлир вә онларын да һәр бири чичәклә гуртары. Бу ахырынчыларын һәр бириндә енә һәммин гайда илә дәстә һалында үчүнчү саплаг әмәлә кәлиб һәр бири бир чичәклә гуртары, мәсәлән, сүдләйәндә, кәндалашда олдуғу кими (шәкил 110, 18).

Симподиал чичәкләрдә дә чичәкалтлыглары ола биләр. Хырда чичәкләрин чичәк группларына топланмасынын башлыча сәбәби, ири лөвһә әмәлә кәтириб узагдан һәшәрәтә көрүнә билмәси чәдидир.

ТОЗЛАНМА

Етишмиш эркәкчийин тоз һүчәйрәләринин дишичийин ағзына дүшмәсинә тозланма дейилир. Тозланма әсасән ики чүр олур: 1) өз-өзүнә тозланма, 2) чарпаз тозланма.

Әкәр икинчисли чичәйин тоз һүчәйрәси һәм ин чичәйин дишичийи ағзына дүшәрсә, она өз-өзүнә тозланма дейилір. Бир вә икиэвли биткиләрдә чарпаз тозланма олур, йә'ни дишичийин ағзына башга чичәйин эркәкчийинин тозу дүшүр.

Биткиләрдә икиэвлилик, чарпаз тозланманы тәмин этмәк үчүн уйғунлашмадыр. Анчаг икинчисли чичәкләрдә дә чох вахт чарпаз тозланма үчүн мүхтәлиф уйғунлашмалар олур. Чарлз Дарвин тәчрүбә йолилә исбат этмишдир ки, чарпаз тозланма нәтичәсиндә гүввәтли вә чох тохум верән нәсил әмәлә кәлир, әксинә, өз-өзүнә тозланма нәтичәсиндә зәиф, аз тохум верән, бә'зән дә һеч нәсил вермәйән биткиләр алыныр.

Тозчуглар бир чичәкдән башга бир чичәйә су, күләк, һәшәрат вә гушлар васитәсилә апарыла биләр. Бу чүр тозланма тәбиий тозланма дейилір. Бунлардан башга, хусуси мәдәни биткиләрин тозланмасында инсан бөйүк рол ойнайыр. Инсан тәрәфиндән апарылан тозланма сүн'и тозланма дейилір.

Юхарыда кәстәрилдийи кими, чарпаз тозланманын битки һәятында бөйүк әһәмийәти вардыр. Чарпаз тозланмада ики тәбиий амил әсас рол ойнайыр. Бунлардан бири күләк, икинчиси исә һәшәратдыр. Күләк васитәсилә тозлананлар анемифил биткиләр дейилір. Чичәкли биткиләрин тәхминән 10%-и анемофилдир. Мәсәлән, бүтүн тахыллар, чилләр, ғамыш, гарғы; ағачлардан палыд, фысдыг, даранғы, ачагайын, тозағачы, гоз, тут, пүстә вә саирә бурая дахилдир.

Анемофил биткиләрдә тозланманы тәмин этмәк үчүн мүхтәлиф уйғунлашмалар әмәлә кәлир. Онлар чох вахт күтләви һалда битир, чичәкләри хырда, көркәмсиз вә ийсиз олур, чичәк янлығлары биргәт янлығлы вә касашәкилли олур, рәнкли тачлары олмур, тозчуглары исә гуру, хырда вә күлли митдарда әмәлә кәлир. Мәсәлән, фындығын бир сырғачығында 4 миллион гәдәр, гарғыдагыны бир сүпүркәчийиндә 5 миллион гәдәр тозчуг олур. Бу гәдәр тозчуг әмәлә кәлмәсинин сәбәби күләйин тозланмада бир амил кими чох да әтибарлы олмамасыдыр. Тозчуглар чох олдуғда, нә гәдәр тәләф олсалар да, һәр һалда бир нәчәсинин дишичийин ағзына дүшмәси әһтималы вардыр.

Тахылларда, әвәликдә, бағаярпағларында вә саирәдә тоз ки-сәләри узун саплардан салланмыш һалда чичәкдән чөлә чыхыр. Буна көрә һәтта зәиф күләк белә онлары һәрәкәтә кәтирир. Биткиләрдән бир чохунда эркәк чичәк групплары салланмыш һалда олур, буна көрә онлар зәиф һава ахымынын тәсирилә титрәмәйә, әсмәйә башлайырлар, мәсәлән фындығын, гозун, даранғынын, чинарын, палыдын, шабалытын вә бир сыра башга биткиләрин эркәк чичәк групплары буна мисал ола биләр. Анемофил биткиләрин дишичикләринин сүтунчуглары вә ағызчығлары түклү, узун вә чичәкдән хейли харичә чыхмыш олур. Бу онларын тозчуглары тутуб сахлая билмәси үчүндүр. Буну биз гарғыдагыда, фындыгыда вә саирәдә көрүрүк.

Анемофил биткиләрин чохунда чичәкләр, битки ярпағ ачыңчая гәдәр вә я ярпагла бир заманда ачылыр. Онларын өз-өзүнә тозламаларына көмәк әдән амилләрдән бири дә эйни чичәкдә эркәкчикләрлә дишичикләрин бир вахтда етишмәсидир.

Һәшәрат васитәсилә тозланан биткиләрә энтомофил биткиләр дейилір. Энтомофил биткиләрдә чичәкянлығы хусусән тачы түнд рәнкли вә көзә чарпачаг шәкилдә олур, занбаг, хорүзкүлү, лалә, һейва, эскил вә саирәдә олдуғу кими, онлар узагдан һәшәраты өзүнә чәлб әдир. Әкәр чичәкләр күнәбаханын, гангалын, шүйүтүн, балдырғанын, соғанын, акасиянын вә саирәнин чичәкләри кими хырда исә, о заман бир ердә топланараг чичәк группу әмәлә кәтирир. Бә'зи биткиләрин чичәк группларынын кәнардагы чичәкләриндә эркәкчик вә я дишичик рудимент һалда олур, я да һеч олмур. Бу чичәк группунун ортасындагы чичәкләрдә эркәкчик вә дишичикләр яхшы инкишаф этмиш олур. Биринчиләрин вәзифәси һәшәраты чәлб этмәк вә бу йолла тозланманы тәмин этмәкдир. Демәли, чичәк группунун чичәкләри арасында да чарпаз тозланманы тәмин этмәк үчүн вәзифә бөлкүсү кетмишдир. Бә'зән кәнардагы чичәкләрин бир рәнkdә, ортадагыларын исә башга рәнkdә олмасы чичәк группунун даһа ярашығлы көрүнмәси вә чәзбәдичи олмасына сәбәб олур.

Чичәк янлығларынын чүрбәчүр рәнкә боянмасындан башга онларын әтирли олмасынын да бөйүк ролу вардыр. Чичәкдән айрылан әтирли яғлар чичәйин һәшәраты чәлб этмәсинә сәбәб олур. Бә'зи чичәкләр хошийли олмайыб чәмдәк вә я гоһуян балығ ийи верир, һәтта бә'зиләринин чичәк янлығлары да гоһуян әт рәнkinдә олуб чох пис ий верир. Белә чичәкләр мүхтәлиф чибинләри, милчәкләри вә сәртганадлылары чәлб әдир ки, онларын васитәсилә тозланма кедир. Бә'зи чүчүләр чичәйә дүшмәндән кизләнмәк үчүн гонур вә енә дә тозланма көмәк әдир.


Бә'зи һәшәрат чичәйин тоз вә нектар маддәсилә гидаланыр вә юмурталарыны чичәйин ичинә төкүрләр. Юмуртадан чыхан сүрфә чичәйин дишичийинин юмурталығына сохулараг онунла гидаланыр. Тозлары илә һәшәраты гидаландыран биткиләр о гәдәр дә чох дейилдир. Онлардан хашхашы, лаләни, итбурнуну вә саирәни кәстәрмәк олар. Онларын тозу бал арысы, ит арысы, эшшәк арысы вә саир һәшәрат тәрәфиндән ейилір. Бал арылары һәм ин тозу шана гатыб әһтият олараг ғыша сахлайыр. Гидаланмаг, кизләнмәк вә саир мәгсәдилә чичәйин ичәрисинә сохулан һәшәрат эркәкчийә вә дишичийә тохунараг чарпаз тозланманы тәмин әдир.

Чичәкләрин парлаг рәнкли олмасы, ий вермәси вә нектар маддәси әмәлә кәтирмәси һәшәрат үчүн уйғунлашмалардыр. Биткиләрин чарпаз тозланмалары нәтичәсиндә ени-ени һибридләр вә дәйишмиш биткиләр әмәлә кәлмишдир ки, онларын да мүһитә уйғунлаша биләнләри ғалмышдыр. Беләликлә, мүхтәлиф рәнкли, ийли вә формалы чичәкләр мейдана чыхмышдыр.

Тропик өлкәләрдә бә'зи чичәкләр хырда гушлар васитәсилә тозланыр ки, буна орнитофил тозланма дейлир. Орнитофил биткиләрин чичәкләри чох вахт ачыг-гырмызы рәнkdә олур. Гушлар нектарла гыдаландыглары заман эркәкчикләрин тозлары онларын түкләринә япышыр вә дикәр чичәйә яхынлашдыгда өzlәри илә кәтирдийи тозу онун үзәринә сәпир. Беләликлә, чарпаз тозланма баш верир.

Биткиләрин аз бир гиоми су васитәсилә тозланыр ки, онлара гидрофил биткиләр дейлир.

Өз-өзүнә тозланмая мане олмаг үчүн икичинсли чичәкләрин эркәкчик вә дишичийи мүхтәлиф вахтларда етишир ки, буна дигогамия дейлир. Дихогамияда эркәкчийин тоз кисәләри дишичик ағзынын тозу гәбул этмәйә һазыр олмасындан габаг ачылыр ки, буна протероандрей вә я протандрей дейлир. Әксинә, дишичик ағзы тозу гәбул этмәк үчүн һәмин чичәкдәки эркәкчикләрин тоз кисәләринин ачылмасындан габаг һазыр оларса, буна протерокиней вә я протокиней дейлир (шәкил 111).



Шәкил 111

1—2—даг чирәсинин (*Pimpinella saxifraga*) протандрей чичәйи;
3—4 гаяоту (*Parietaria officinalis*) протокиней чичәйи.

Дихогамия ялыыз икичинсли чичәкләрдә дейил, һабелә ики-эвли биткиләрдә дә мүшәһидә эдилир. Биткиләрин әксәрийәтиндә протандрейә протокинейдән даһа чох тәсадүф едилир. Эйни битки мүәййән шәраитдә протоандрей, башга бир шәраитдә исә протокиней ола биләр.

Эркәк вә дишичикләри эйни вахтда етишән чичәкләрә һомогам дейлир.

Элә битки нөвләри вардыр ки, онларын бә'зи фәрдләринин чичәйиндә эркәкчикләр дишичикдән, бә'зиләриндә исә, әксинә, дишичик эркәкчикләрдән узун олур. Бунларда эркәкчик вә дишичикләр эйни вахтда етишмәйиб, бири габаг, дикәри исә сонра етишир. Нәтичәдә биринин тозлары илә дикәринин дишичийи тозланыр ки, буна да һетеростилия дейлир, мәсәлән, новрузкүлү чичәйи, гарабашаг чичәйи вә саирә бу гайда илә тозланыр (шәкил 112).

Бә'зи чичәкләрдә чарпаз тозланмаы тәмин этмәк үчүн даһа мүрәккәб уйғунлашмалар олур. Мәсәлән, мәрйәмоту вә я сүйүрвә

(*Salvia*) биткисинин чичәйи икидодаглы тачдан ибарәтдир ки, онун да дахилиндә бир дишичик вә ики эркәкчик вардыр.

Сүйүрвә чичәйиндә эркәкчикләрин саплары дибиндә әмәлә кәлән манизела арыларын ичәрийә кәлмәсинә мане олур. Ары чичәйин алт додағына гондугда эркәкчийин тоз кисәси арынын үстүнә энир вә манизеланы итәләйир, беләликлә дә эркәкчийин тоз кисәси арынын үстүнә энир вә тозлары онун белинә сувайыр.

Ары учуб башга чичәйә гондугда арыхасында кәтирдийи тоз етишмиш вә ашағыя энмиш дишичийин ағызчығына дүшүр вә ону тозландырыр. Ары вә саир һәшәрат мүхтәлиф битки нөвләринин чичәкләринә гонараг онлары тозландырыр, беләликлә дә мүхтәлиф гибриdlәрин әмәлә кәлмәсинә сәбәб олур (шәкил 113).


Әнчир чичәйинин чарпаз тозланмасы чох мараглыдыр. Бу биткинин чичәкләри армуд шәклиндә олан чичәк охунун ич ди-варларында чичәк группу әмәлә кәтирмишдир. Чичәк группунун юхарыдан бир деши-йи вардыр. Бә'зи әнчирләрдә чичәк группунун һамысы диши чичәкләрдән ибарәт олур. Онларын бәсит чичәкянлығы зәиф инкишаф этмишдир вә дишичийинин юмур-талығында бир әдәд узун вә учу әйри сү-тунчуғу вардыр. Бә'зи әнчирләрдә исә чи-чәк группунун дешийинә яхын һиссәсиндә эркәк чичәкләр ерләшир. Чичәкянлығы бәсит олан бу чичәкләрдә 3 эркәкчик олур. Дешикдән ашағыда мейвә вермәйән гыса сүтунчуғлу диши чи-чәкләр ерләшир.

Әнчирин эркәк чичәк группу ичәрисинә кирмиш һәшәрат ора-дан чыхыб нормал инкишаф этмиш узун сүтунчуғлу диши чичәк-ләри олан вә мейвә верән чичәк группуна кирдикдә, биринчи чи-чәкдән кәтирдикләри тозларла икинчинин дишичийини тозланды-рыр, нәтичәдә нормал мейвә инкишаф эдир (шәкил 115).

Бә'зи икичинсли чичәкләри олан биткиләр дә өз эркәкчийинин тозлары илә өз дишичийини тозладыгда тохум әмәлә кәлмир; бунлара гысыр чичәкләр дейлир.


Өз-өзүнү тозлаган биткиләрдә эйни чешиддән олан башга битки тозчуғларынын әһәмийәти.

Мәһсулдарлығын йүксәлмәси вә биткиләрдә нәслин биоложи давамлылығы үчүн өз-өзүнү тозлаган биткиләрдә академик Лы-сенко чешиддахили, чарпаз тозланма апарылмасыны мәсләһәт




Шәкил 112. Мүхтәлиф биткиләрин чичәкләриндә һетеростилия

1—2—новрузкүлүндә 3—4 гарабашагда



Шәкил 113. Сүйрүвәдә (мәрийәмотунда) чарпаз тозланма.
1—тозлуугу арынын белинә төрөф әйилмәси; 2—арыачыгы нисбәтән ашары әйилмиш чичәк арынын тоз кәтирмәси; 3—5—тозлуугу ашары энмәси мөхәннәми.

көрүр, чүнки бу заман нисбәтән мүхтәлиф шәраитдә әмәлә кәлмиш организмләрин һәмәталары маяләнмада иштирак этдийиндән гүввәтли нәсил әмәлә кәлир вә биткинин мәһсулдарлығы артыр. Биткиләрдән бир чохунда чичәкләмәнин ахырында өз-өзүнү тозлама кедир. Бә'зән биткиләр чичәк ачан заман һаванын пис әлмәсы нәтичәсиндә онларын чичәкләри тамам ачылмыр, белә һалларда енә дә өз-өзүнә тозлама кедир.




Шәкил 114.

1—бәнәвшәнин клейстогам чичәйиндән әмәлә кәлән мейвә; 2—һәмин бәнәвшәнин клейстогам чичәйи; 3—кнчиткананасынын (даламазын) нормал чичәйи; 4—онун клейстогам чичәйи; 5—һәмин клейстогам чичәйин узунуна кәсийи.

Бәнәвшәдә, мешә хынасында, туршәнкдә вә бир чох ябаны тахылларда чичәкләр торпарын ичинә сохулмуш олур, орада өз-өзүнү тозлама кедир, нәтичәдә нормал мейвә вә тохум әмәлә кәлир. Бу чүр чичәкләрә клейстогам чичәкләр дейилир. Онларын бә'зиләринин тохумундан әмәлә кәлән битки ялныз клейстогам чичәкләр верир (шәкил 114). Клейстогам чичәкләрдә тозчуллар аз мигдарда әмәлә кәлир вә онлар дишичийин ағзына тохунан тоз кисәләриндә икән чүчәрир. Бә'зи биткиләрин нормал чичәк ачмәсына бахмаяраг, онларда чичәк ачынчая гәдәр өз-өзүнү тозлама кедир. Буна көрә дә белә чичәкләрдә чарпаз тозланма яхшы нәтичә верир. Мәсәлән, арпа, бугда, вәләмир, дары, чәлтик, нохуд вә саирә белә биткиләр сырасына анддир.

Онлардан бир чохунда ири вә элван чичәкянлыгларына даһа эһтияч галмамасы, онларын чарпаз тозланан формалардан эмәлә кәлдийини көстөрп.



Шәкил 115. Юмурталарыны чичәкләрә төкән һәшәрәтәни тозчуглары дашымасы:

1—юкканын (*Jucca filamentos*) чичәк групп; 2—чичәкянлыларындан учу кәсплмиш вә күвә гонмуш бир юкка чичәй; 3—юкканын дишичйинин ағзы; 4—*Pronuba luteatella* чүчүсү; 5—*Pronuba*-нын тозчугларла өртүлүш башы; 6—*Ficus pumila* энчиринин будағы үзәрнидә чичәк группуну узунуна кәсий; 7—һәмни энчирин диши чичәй; 8 вә 9—һәмни энчирин бир эркәкчйи; 10—ади энчирин *Ficus carica* чичәк групп вә чичәйинин юмурталыгында *Blastophaga* чүчүсүнүн инкишафы; 11—һәмни энчирин чичәк групп ичинә кирмәкдә олан *Blastophaga* чүчүсү; 12—эркәк чичәк; 13—узун сүтунчуглу диши чичәк; 14—гыса сүтунчуглу диши чичәк; 15—юмурталыгдан *Blastophaga* чүчүсүнүн чыхмасы; 16—*Blastophaga grossorum* чүчүсүнүн көрүнүшү 17—һәмни чүчүсүнүн бөйүдүлүш шәкли. (Кернерә көрә).

Академик Т. Д. Лысенко Дарвинә әсасланараг белә бир нәтичәйә кәлмишдир ки, өз-өзүнә тозланма йолилә чохалан мәдәни биткиләр тәдричән чырлашыр. Өз-өзүнә тозлаянларын эркәк вә

диши чинси һүчәйрәләри эйни ирси хусусийәтә малик олмагдан башга бир чичәкдә вә эйни харичи шәраитдә инкишаф эдир. Белә һүчәйрәләрин гаршылыгы ассимиляциясы нәтичәсиндә эмәлә кәлән битки эйни хусусийәтли ата вә ана ирсийәтинә малик олачаг вә нәтичәдә харичи шәраитә уйғунлашмасы мәһдудлашчагдыр. Мә'лумдур ки, харичи шәраит һәтта бир әкин саһәси дахилиндә белә һәр ердә эйни олмур. Одур ки, өз-өзүнә маяланма нәтичәсиндә эмәлә кәлән аз пластик биткиләр, чарпаз тозланма нәтичәсиндә эмәлә кәлән даһа пластик биткиләрә нисбәтән, пис инкишаф эдәчәк вә өз-өзүнә тозлама нәтичәсиндә эмәлә кәлән чечид тәдричән өләчәкдир.

Т. Д. Лысенкоя көрә, табиятдә өз-өзүнә тозлаян биткиләрин һеч олмәсә аз бир фанзи-чарпаз тозланыр. Бунун нәтичәсиндә эмәлә кәлән биткиләр бөйүк уйғунлашма имканына малик олуә табии сечмә нәтичәсиндә яшәя билир.

Гейд олуанларә әсасән Т. Д. Лысенко белә төклиф әтмишдир ки, өз-өзүнә тозлаян мәдәни биткиләрин (мәсәлән, бугданын) эйни чешидләри арасында чешид дахили тозландырма адаланан үсулла күтләви чарпаз тозландырма апарылмалыдыр. Бу заман мүхтәлиф шәраитдә битәрәк тамам эйни олмаян биткиләр бир-бирини маялаячагдыр. Онларын чинси һүчәйрәләри бир гәдәр мүхтәлиф олдуғундан, аз-чох тәзәләнмиш, һәятә даһа давамлы, чырлашмаян нәсил эмәлә кәләчәкдир. Һәмни үсул тәчрүбәдә өзүнә тамамилә доғрултмушдур вә һазырда ССРИ-нин селекция стансияларында, селекция вә тохумчулуг саһәләриндә кениш сурәтдә тәтбиг олунамагдадыр.

МАЯЛАНМА

Ики мүхтәлиф чинси һүчәйрәнин (эркәк вә диши һәмәталарын) бир-бирини гаршылыгы ассимиляция әтмәси просесиә м а я л а н м а дейилир.

Гейд эдилмәлидир ки, маяланмая мүхтәлиф физиоложи хусусийәтли ики һүчәйрәнин (эркәк вә диши һүчәйрәләрин) бир-биринә бирләшмәси кими бахмаг олмәз, чүнки гарышма вә я бирләшмә физики аңлайыш олдуғундан маяланма просеси аңлайышына тәтбиг олуна билмәз. Маяланма просесиндә эркәк вә диши һүчәйрәләр арасында мүрәккәб физиоложи просес кедир вә мүхтәлиф физиоложи хусусийәтли ики һүчәйрә бир-бирини гаршылыгы сурәтдә ассимиляция эдир.

Маяланма просеси, тоз һүчәйрәләринин дишичйинин ағзына дүшдүйү андан башланыр вә мүхтәлиф биткиләрдә мүхтәлиф мүддәтләрдә, мәсәлән, көксаггызда 30 дәгигәдә, памбыгда 18—20 саатда гуртарыр, бә'зи биткиләрдә бир нечә күн, бир нечә ай вә һәтта бир ил давам эдир. Тоз һүчәйрәсинин маяланмая һазырланмасы дишичйин ағзына дүшүнчәйә гәдәр давам эдир. Тоз һү-

чейрәси дишичийин ағзына дүшәндән сонра орада чүчәрмәйә башлайыр, онун экзина (харичи) тәбәгәси партлайыр, интина (дахили) тәбәгәси һүчәйрәнин мөһтәвийяты илә бирликдә харичә доғру узанмаға башлайыр вә тоз борусу әмәлә кәтирир. Башга сөzlә десәк, тоз һүчәйрәсинин чүчәрмәсиндән әмәлә кәлмиш тоз борусу дишичийин сүтунчуғу ичәрисиндә юмурталыға доғру узаныр. Бу тоз борусунун мүйәйән истигамәтдә узанмасы, көрүнүрки, сүтунчуғун вә тохумлуғун ифраз этдийи хусуси маддәнин тәсири нәтижәсиндәдир. Тоз һүчәйрәсинин мөһтәвийяты, йә'ни веке-татив вә кенератив һүчәйрәләр, тоз борусу инкишаф этдикчә уңа доғру һәрәкәт эдир. Тоз борусунун учуна доғру һәрәкәт әдән ве-кетатив һүчәйрә, һәмин бору рүшәйм кисәсинә чатынчаядәк һәлл олуб гуртарыр, кенератив һүчәйрә исә бөлүнәрәк ики сперм әмәлә кәтирир.

Ахыр заманларда бир сыра совет алимләри, башлыча олараг Киев шәһәринин битки эмбриологлары олан Финн, Кострюкова, Чернояров, Бенеская вә башгалары исбат этмишләр ки, спермлар тәкчә бир нөв олмайыб, ади һалда узунсов һүчәйрәләрдән ибарәтдир. Бу мәсәләнин чох бөйүк принципиал әһәмийәти вардыр. Бунунла исбат олунур ки, маяланмада эркәк һүчәйрәнин ялныз бирчә нүвәси дейил, бәлкә дә һамысы иштирак эдир, йә'ни эркәйин ирси хусусийәтләри ялныз нүвә илә дейил, ситоплазма вә саир һиссәләрлә дә верилир.

Тоз борусу юмурталыға чатдыгдан сонра тохум йолу (микрoпилия) васитәсилә тохумлуға кирир. Биткиләрин чохунда тәсадүф олунан бу һала прогамия вә я акрогамия дейилир. Аз-аз һалларда тоз борусу тохумлуғун дибиндән халаза васитәдүф олунан бу һала прогамия вә я акрогамия дейилир. Белә бир маяланма хусусийәти С. Г. Навашин тәрәфиндән тоз ағачы, ғызылагач, вәләс, фындыг вә гөз ағачларында гөйд эдилмишдир. Гарағач вә говаг кими биткиләрдә исә халазогамия илә прогамия арасында кечид формаларына тәсадүф эдилир ки, буна мезогамия дейилир. Бу ахырынчы һалда тоз борусу халаза илә микрoпилия арасындан тохумлуғун өртүйүнү дешәрәк ичәри кириб рүшәйм кисәсинә янашыр.

Тоз борусу рүшәйм кисәсинә чатдыгдан сонра үч тәрәфдән ачылараг өз мөһтәвийятыны рүшәйм кисәсинә төкүр. Етишмәмиш һалда рүшәйм кисәси бир ири һүчәйрәдән ибарәт олур. Маяланмаға һазырланан заман онун мөһтәвийяты үч дәфә бөлүнәрәк 8 һүчәйрә әмәлә кәтирир. Бунун 4-ү рүшәйм кисәсинин микропилия мугабил гүтбүндә, 4-ү исә микропилия тәрәф олан гүтбүндә олур. Сонра һәр гүтбдән бир һүчәйрә рүшәйм кисәсинин тәхминән ортасына гәдәр кәләрәк бир-бирини гаршылыглы ассимилә эдир. Она рүшәйм кисәсинин икинчи һүчәйрәси дейилир. Микропилия экс истигамәтдә галмыш 3 һүчәйрәйә антиподлар, микропилия яхын олан 3 һүчәйрәдән биринә диши һүчәйрәси, икисинә синеркидләр дейилир.

Тоз борусунда әмәлә кәлмиш сперм адланан эркәк һүчәйрәләриндән бири юмурта һүчәйрәсинә говушуб онунла о бири һүчәйрә исә рүшәйм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәси илә гаршылыглы ассимилә олунур; беләликлә, икигат маяланма һадисәси кедир. Һәмин спермлар һәм морфоложи, һәм дә биокимйәви хусусийәтләри илә бир-бириндән фәргләнир. Буна көрә дә онлардан бири ялныз рүшәйм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәси илә, диқәри исә юмурта һүчәйрәси илә гаршылыглы ассимилә олунур.


Икигат маяланма һадисәси ялныз өртүйүтохумлулара аид олуб, чылпагтохумлуларда мүшәһидә эдилмир. Маяланмыш юмурта һүчәйрәсиндән рүшәйм (эмбрион) инкишаф эдир, рүшәйм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәсиндән дә рүшәймин гидаланмасына сәрф олунан эндосперм әмәлә кәлир; синеркидләр вә антиподлар исә һәлл олур.

Чичәкли биткиләрдә икигат маяланма 1898-чи илдә рус алыми С. Г. Навашин тәрәфиндән кәшф эдилмиш вә бу адла адландырылмышдыр (шәкил 116, 117).

Лакин индийәдәк ишләдилән бу термин чох да дәгиг дейилдир, чүнки бурада әсл һәгигәтдә икигат дейил, бирчә дәфә маяланма кедир. Мә'лум олдуғу кими, маяланмада мүхтәлиф физиоложи хусусийәтләри олан һаплоид нүвәли ики чинси һамета (сперм вә юмурта һүчәйрәси) гаршылыглы ассимилә эдилир, нәтижәдә әмәлә кәлән диплоид нүвәли зиготадан рүшәйм инкишаф эдир. Рүшәйм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәси исә һәмин кисәдә редуксион бөлүнмәдән сонра әмәлә кәлмиш гүтб һүчәйрәләринин гаршылыглы ассимилясиясы мәнсулудур, йә'ни диплоид хромозомлу һүчәйрәдир. Рүшәйм кисәсинин диплоид хромозомлу бу мәркәзи һүчәйрәси илә спермин гаршылыглы ассимилясиясындан алынан триплоид хромозомлу һүчәйрәдән һеч заман кәләрәк организмин башланғычы олан рүшәйм әмәлә кәлә билмәз. Диқәр тәрәфдән мә'лумдур ки, һәмин триплоид һүчәйрәдән эндосперм әмәлә кәлир ки, о да тохумун рүшәйми үчүн гида мүһитидир вә она һеч заман икинчи рүшәйм кими бахмаг олмаз. Одур ки, маяланма заманы рүшәйм кисәсиндә кәдән бу һадисәни әсл мә'нада икигат маяланма адландырмаг дүзкүн дейилдир.

И. В. Мичуринин ишләри әсасында сон заманлар Т. Д. Лысенко, Д. А. Долгушин, Г. А. Бабачанян вә башгалары мәдәни биткиләрин маяланмаларындакы сечичилик хусусийәтинә бөйүк әһәмийәт верирләр. Дишичийин ағзына сну маялая билән бир чох тозчуг дүшә биләр. Лакин индишә адыны чәкдийимиз алимләр бу саһәдә апардыглары ишләр илә исбат этмишләр ки, мүйәйән нөвүн вә я һәтта эйни чешидин тозлары һәмин нөвүн дишичийини маяламыр, маяламада анчаг элә тозчуглар иштирак эдир ки, онларын маяланмасы даһа яхшы нәтижә версин вә битки үчүн әлверишли олсун. Маяланмада дишичийин сечичилик хусусийәтиндән ССРИ-дә мәдәни биткиләрин чүтләшдирилмәси са-

Һәсиндә чох кениш истифадә әдиләр. Әйни заманда мүййән әдилмишдир ки, човдарын вә чарпаз тозланан башга тахыл биткиләри чешидләринин сафлығыны сахламаг үчүн онларын чичәкләрини кисәләрә салмагла тәчрид әтмәйин әһәмийәти йохдур. Мүхтәлиф чешидләрин бир-бир битмәси вә сәрбәст әлавә тозланма нәтичәсиндә онларын мәһсулдарлығы артыр вә чешидин сафлығы позулмур.




Шәкил 116.

1—5—тоз борусунун бөйүмәси вә спермларин формалашмасы (схематик оларак); 6—сүсәндә (*Iris*) майланма; 7—күнә баһанда (*Helianthus cultus*) майланма; 8—онун спермларин; кһү—кәнератив һүчәйрә; вһү—векетатив һүчәйрә; сп—спермлар; с—синеркидлар; ю—юмурта һүчәйрәси, ант—антиподлар.

И. В. Мичуринин вә бә'зи мичуринчи биологларын ишләри мәдәни биткиләрин тозланмасында бир чох марағлы чәһәтләри айдынлашдырмаға имкан вермишдир. И. В. Мичурин пис чүтләшән ики нөвү чүтләшдирмәк үчүн ата биткинин тозчугларыны ана биткинин ағызчығына әлавә әтмиш вә нәтичәдә әзкә тозчугла тозланмая мүвәффәг олмушдур. Тозланманын мүвәффәгийәтли олмасы үчүн тозчугларын мигдарынын да әһәмийәти аз дейилдир. Бә'зи биткиләрдә тәк-тәк чүчәрән тозчуглар груп һалында чүчәрән тозчуглара нисбәтән зәиф чүчәрир, һәтта бә'зән һеч чүчәрмир.

Тозланманын мүвәффәгийәтли олмасы үчүн тозчугларын мигдары тохумлуғун мигдарындан дәфәләрлә артыг олмалыдыр. Чох әһтимал ки, белә һалларда тозчуглар тәрәфиндән мүййән маддә ифраз әдилмәси мейвәләрин илк инкишафына тә'сир кәс-тәрир.



Шәкил 117. Өртүлүтохумлу биткиләрдә майланма (схематик оларак).

т—тозчуг; тб—тоз борусу; с.һ—сәккизһүчәйрәли рүшәйм кисәси; р.к.һ—рүшәйм кисәсинин мәркәзи һүчәйрәси; синсинеркидлар; д.һ—дипли һүчәйрәси; н.б—нәгдәли бору дәстәси; ант—анти-подлар.

Майланмадан сонра рүшәйм кисәсиндә эндосперм әмәлә кә-лир. Өртүлүтохумлу биткиләрдә эндоспермин ролу тохумда рү-

шейм халында олан биткичийн гидасыны тәшкил этмәсидир. О, чыплагтохумлуларын эндосперминә охшайыр, лакин чыплагтохумлуларын эндосперм һүчейрәләри һаплоид нүвәли (һаметофит) проталдыр, өртүлүтохумлуларын эндосперми исә, юхарыда кестәрилдийн кими, триплоид нүвәли һүчейрәләрдән ибарәтдир. Өртүлүтохумлуларын эндоспермининин чыплаг тохумлуларынкындан фәргләндрмәк үчүн онлара икинчи эндосперм, чыплагтохумлуларда исә биринчи вә я илк эндосперм дейилир.

Эндоспермин һүчейрәси бөлүндүйү заман маяланмыш диши һүчейрәси бир гәдәр сакит дөвр кечирдикдән сонра бөлүнәрәк чохһүчейрәли рүшейм әмәлә кәтирир. Әввәлләр о, даирәви, юмуртавари вә я цилиндр формасында олур, тохум чүчәрәнә гәдәр онда бүтүн органлар, ләпәләри, ләпәалты дизчийи, көвдәнин бой нөгтәси вә көкүн башлангычы әмәлә кәлир. Паразитләрдә, о чүмләдән гызыл сармашыгда (*Cuscuta*), сүмүркәндә (*Orobanche*) вә саирәдә тохум тамам етишәнә гәдәр рүшейм органлары айрылмашы, йә'ни дифференсиация этмәмиш һалда олур.


Автотроф биткиләрдә етишмиш рүшейм көкчүкдән, көвдәчикдән, көвдәчийин тәпәсиндән, рүшейм халында олан яргагылардан вә рүшейм халында олан тумурчуглардан ибарәт олур. Һәмин тумурчуглар рүшейм халындакы көвдәчийин тәпәсиндә яргагыларла әһәтә олунмуш вә рүшейм халындакы будагылардан ибарәтдир.

Рүшеймдә көвдәчийин көкчүйә кечән һиссәсинә көк б о г а з ы дейилир.

Рүшейм маяланмашы диши һүчейрәдән әмәлә кәләрсә, она партеногенез (бакирә маяланма) дейилир. Партеногенез ики типдә ола биләр: 1) һаплоид (редукция олунмуш) маяланмашы диши һүчейрәсиндән әмәлә кәлән рүшейм, 2) диплоид (редукция олунмашы) маяланмашы диши һүчейрәсиндән әмәлә кәлән рүшейм. Бир сыра һалларда рүшейм юмурта һүчейрәсиндән дейил, антипод вә я синеркидләрдән әмәлә кәлир. Белә һалларда енә һаплоидлик вә диплоидлик ола биләр. Рүшейм рүшейм кисәсиндән харичдәки нуселлус һүчейрәләриндән дә әмәлә кәлә биләр. Үмүмийәтлә, чинси әләгә олмадан, рүшейм кисәсинин башга һүчейрәләриндән әмәлә кәлән рүшеймә а п о м и к с и с дейилир. Бә'зән апомиксис рүшеймләрин мигдары 60—90%-ә чатыр. Она үзүмдә, алмада, моругда вә саирәдә тәсадүф әдилир. Апомиксия нәтичәсиндә нуселлус, өртүк, антипод вә синеркид һүчейрәләриндән бир чох тохум әмәлә кәлир. Бу һадисәйә п о л и з м б р и о н и я дейилир.

Рүшейм бөйүдүкчә тохумлуг формалашыр вә тохуму әмәлә кәтирир.

Тохум габыгла әһәтә әдилмиш олур ки, о да тохумлугун бир вә я ики өртүйүндән әмәлә кәлир. Бә'зән тохум габыгынын әмәлә кәлмәсиндә нуселлусун бир һиссәси дә иштирак әдир.



Шәкил 118.

1—Лобанын чүчәртиси, а вә б—йоруңләпәли рүшейм; 2—йә палыдынын чүчәртиси; 3—сидр арачынын фындыгынын узунуна кәсийиндә рүшейм, эндоспермин ортасында ерләшмишдир; 4—5 бурданын дәнәчийи вә онун чүчәрмәси; 6—бурда дәнәчийинин узунуна кәсийин.

Чох заман нуселлус тохумда перисперм шаклинде галыб эһтият гида топланан ер везифэсини көрүр. Бу чүр эндосперм амбар шаклинде олур. Эндоспермли тохумлар зүлалли тохум, эндоспермсиэлэр исэ зүлалсыз тохум адланыр. Зүлалсыз тохумларда эһтият гида топланан ер ләпәләрдир, мәсәлән, лобя, нохуд, палыд гозасы вә саирәдә олдуғу кими (шәкил 118).

Зүлалли тохумларда ләпәләр эндоспермдән гида маддәләрини сорараг онлары тумурчуглара вә көкчүйә вермәк везифэсини дашийыр.

Чох вахт тохумун габыгында тохумун яйылмасына көмәк эдәчәк уйғунлашмалар әмәлә кәлир; буна зәнчиротунун учағаныны, памбығын лифләрини, гаратиканын танадчыг мейвәләрини мисал көстәрмәк олар.

Бә'зи тохумларын габыгында тохуму горуян уйғунлашмалар әмәлә кәлир; мәсәлән, тохумун сәрт габыгы олмасы ону харичи механики тә'сирләрден горуюр. Габыгынын рәнки мүхтәлиф һәшәрата охшаян тохумлары гушлар емир. Буна кәнәкәрчәйин тохумуну бир мисал кими көстәрмәк олар. Тохумун үзәриндә чох вахт ади көзлә көрүнә биләчәк чапыг олур. О, тохумун аягчыга бирләшән ериндә галыр. Тохум аягчыгынын тохумла бирләшдийи сәтһ исә, узун чапыг әмәлә кәлир ки, она да тикиш дейилир.

МЕЙВӘ

Дишичик маяландыгдан сонра инкишаф эдәрәк мейвә әмәлә кәтирир. Маяланмайыб әмәлә кәлән мейвәйә партенокарп вә я ахта мейвә дейилир. Партенокарп мейвәләрин тохуму олмур.

Партенокарп мейвәли биткиләр ялныз векетатив сурәтдә чохала биләр. Партенокарп мейвәләри оланлардан даһа чох тәсәдүф эдиләнлери алма, армуд, үзүм, нарынч, портахал, лимон, әнчир, шәрг хурмасы, хурник, тут вә с. кими биткиләридир.

Партенокарп ики чүр олур: векетатив вә стимулятив. Векетатив партенокарпияда тозланма олса да, маяланма кетмәдийинә көрә тохумсуз мейвә әмәлә кәлир. Стимулятив партенокарпияда мейвәнин әмәлә кәлмәси үчүн мүхтәлиф васитәләрлә дишичийин ағзы тычыгландырылыр. Тычыгландырма үчүн башга битки чинсләринин тозчуғундан вә я дикәр васитәләрден истифадә этмәк олар. Мәсәлән, армудларын тозчуғуну алмаларын дишичийин ағзына, ябаны үзүмүн тозчуғуну мәдәни үзүмүн (ади тәнәйин) дишичийин ағзына, картофун тозчуғуну памидорун вә я бадымчанын дишичийин ағзына сүртмәклә тохумсуз мейвә әлдә этмәк мүмкүн олур. Беләликлә, дишичийин ағзыны тычыгландырмаг юмурталығын диварына тә'сир әдиб, онун инкишафына сәбәб олур. Нәтичәдә дә тохумсуз мейвә әмәлә кәлир.

Партенокарпия дишичийин ағзына мүхтәлиф кимйәви маддәләрлә тә'сир этмәклә, она тыздырылмыш платин мәфтил сүртмәклә вә я ону һәшәрат дишләмәклә дә әмәлә кәлир.

Мейвәләрин типләри

Мейвә әмәлә кәлдийи заман дишичийин юмурталығынын дивары мейвәянлыгына чеврилир. Мейвәянлыглары (перикарписи) мүхтәлиф гурулушда вә мүхтәлиф сәртликдә ола биләр. Мейвәнин әмәлә кәлмәсиндә ялныз дишичийин юмурталыгы иштирак әдирсә, о чүр мейвәйә һәгиги мейвә, чичәйин ятағы, саплағы вә я өртүйү (чичәкянлыгы) иштирак әдән мейвәйә исә яланчы мейвә дейилир. Биринчийә лимон, портахал, алча, килас, кавалы, шафталы вә саирәни, икинчийә исә—алма, армуд, гарпыз, говун (емиш) вә саирәни мисал көстәрмәк олар.

Мейвәләри әдәтән ики група бөлүрләр: гуру мейвәләр вә яш мейвәләр. Гуру мейвәләрдә мейвәянлыгы (перикарпис) одунлашмыш, дәриләшмиш вә я пәрдәләнмиш олур, яш мейвәләрдә исә—чох вахт үч һиссәдән ибарәт олур: харичдә габыг экзокарп һиссә, ондан алтда вә чох заман яхшы инкишаф этмиш әтли һиссә—мезокарп, мейвәнин там ортасында исә—эндокарп. Эндокарп һиссәси пәрдәләшмиш, дәриләшмиш вә я одунлашмыш (чәйир-дәкләшмиш) олур.

ГУРУ МЕЙВӘЛӘР

Гуру мейвәләр дә үч группа бөлүнүр: чохтохумлу ачылан, биртохумлу ачылмаян вә парчаланан гуру мейвәләр.

1. **Чохтохумлу ачылан гуру мейвәләрдә** етишмиш мейвә янлыгы, мүхтәлиф шәкилләрдә ачылараг тохумларыны яйыр. Онлар да ашағыдакы типләрә бөлүнүр:

а) *Ярпаг мейвә*. Онун әмәлә кәлмәсиндә ялныз бир мейвәярпағы иштирак әдир вә ялныз бир тәрәфә габаг тикиш үзрә ачылыр, мәсәлән маһмызчичәкдә (*Delphinium consolida*), аконитдә (*Aconitum*) вә саирәдә олдуғу кими (шәкил 119).

б) *Пахла мейвә*. Бу да ялныз бир мейвәярпағындан әмәлә кәлир, анчаг ачылан заман ики тәрәфә (габаг вә дал тикишләр үзрә) ачылыр, мәсәлән, лобяда, нохудда, мәрчидә, пахлада, күлүлдә вә пахлалы биткиләрдән бир чохунда олдуғу кими.

в) *Буйнузмейвә вә я буйнузчугмейвә*. Онлар ики мейвә ярпағындан әмәлә кәлир, икиювалыдыр, ики яндан тайла ачылыр вә араларында аракәсмә галыр. Хаччичәклиләрин мейвәләринин чоху я буйнузмейвә, я да буйнузчугмейвәдир.

Буйнузмейвәнин узунлуғу эниндән дөрд дөфәдән чох артыг олур. Бунлара турпун, кәләмин, чығчығанын (*Sisymbrium*) мейвә-

ләрени мисал кәстәрмәк олар. Буйнузчугда исә мейвәнин узунлуғу эниндән ән чоху үч дәфәйә гәдәр артыг олур. Мәсәлән, везәринин (*Lepidium sativum*) вә гушәппәйинин (*Capsella bursa-pastoris*) буйнузчуг мейвәси кими.



Шәкил 119. Маһмызчичәк биткисн.

1—чичәйи; 2—тохуму; 3—днәграмы (биткиннн тәпәснндә яриаг мейвәләрнн көрүнүр).

а) *фындыг вә я фындыгчыг*—онларда мейвәянлығу одунлашмыш вә тохумла бирләшмәмишдир, мәсәлән, палыдын, фындығын, чөкәнин, гурдбоғанын, үчярпаг йончанын мейвәләрнн кими.


б) *Тохумчамейвә*. Онларда мейвәянлығу дәриләшмиш вә тохумла бирләшмәмишдир. Буна мисал олараг күнәбаханын вә гангалын мейвәләрннн кәстәрмәк олар.

г) *Гутучуг*. Икн вә я бир нечә мейвәярпағындан әмәлә кәлир вә ачылмалары мұхтәлиф олур. Бәзиләрнндә гутучуг тәпәснндән ачылмаға башлайыр. Бу заман гутучугун тайлары (мейвәярпаглары) я тамам айрылыр, тадан чырылараг ачылыр, я мейвә ярпаглары ормәсәлән, памбыгда олдуғу кими (шәкил 120), я да гутучугун анчаг юхары һиссәси бир гәдәр араланмагла ачылыр (шәкил 121, 4).

Гутучуглар бәзән гапаллары васитәсилә ачылыр, мәсәлән, дәлибәнкдә (*Nyoscyamus*) бағарярпағында (*Plantago*), көзотунда (*Anagalis*) вә саирәдә олдуғу кими (шәкил 121, 3). Гутучуг бәзән дә дешикләрлә ачылыр, мәсәлән, лаләдә, хашхашда (шәкил 121, 2), я да дишчикләрлә ачылыр, мәсәлән, гәрәнфилләрдә, чинчилиимдә олдуғу кими (шәкил 121, 1).


2. Биртохумлу ачылма-ян гуру мейвәләр ашағыдакы типләрә бөлүнүр.

в) *Дәнәчикмейвә*. Онларда пәрдәвари мейвәянлығу олур вә о, тохумла сых бирләшир, мәсәлән, бугданын, арпанын, гарғыдалынын мейвәләрнндә олдуғу кими.



Шәкил 120. Тайларла ачылан гутучугун ачылмасы схемләрн.

1—аракәсмәләрдән ачылан гутучуг; 2—тайларла ачылан гутучуг; 3—мейвә ярпагларынын ортадан чатламасы илә ачылан гутучуг (памбыгда).



Шәкил 121. Гутучуглар вә онларын ачылмасы.

1—дишчикләрлә (новрузкүлүндә); 2—дешикләрлә (хашхашда); 3—гапачыгла (дәлибәнкдә); 4—тайларла (батбатда).

г) *Ганадмейвә*. О, фындыгчыг олур, мейвәянлығундан ганад кими чыхынты әмәлә кәтирир, мәсәлән, тарағачда, көврүшдә, ағчагайында, гаратиканда, айлантда вә саирәдә олдуғу кими.

Парчаланан мейвәләр. Онлар чохтохумлу ачылан гуру мейвәләрлә биртохумлу ачылма-ян мейвәләр арасында кечид формасы тәшкнл эдир вә бир нечә типә бөлүнүр. О чүмләдән:

а) *Чохтохумлу парчаланан гуру мейвәләр*, я да биртохумлу айры-айры бугумлара бөлүнән мейвәләр. Онлара дәвәтиканынын (*Alhagi*) мейвәләрнннн бир мисал кәстәрмәк олар. Әмәккәмәчи фәсиләснндән күлхәтимдә, әмәккәмәчидә—(балвада) вә саирәдә бу чүр мейвәләрә тәсадүф эдилнр.

б) Бир вэ я ики тохума парчаланан мейвэлэр. Бу чүр мейвэлэр ики вэ я бир нечэ мейвээрпагындан эмэлэ кэлэрэк етишэн заман айры-айры тохумча мейвэлэрэ айрылыр, мäsалэн, чөтир-чичеклилөрдөн балдырғанда, шүйүтдө, кешнишдө, зирэдө, чирэдө вэ саирэдө олдуғу кими.

ЯШ МЕЙВЭЛЭР

Чохтохумлу вэ биртохумлу ачылмаян гуру мейвэлөрдөн тэбии сечмэ нәтижесиндө һейванлары өзүнэ чөлбөтмөк вэ гида үчүн мейвәянлығы әтли олан ики чүр яш мейвә эмәлә кәлмишдир.



Шәкил 122. Чохярпағлы гурдбоғад

1—биткинни харичи көрүнүшү; 2—чичәйи; 3—тохумчуғлардан эмәлә кәлмиш мүрәккәбмейвәси; 4—айрыча тохуммейвәси; 5—әркәкчикләри.

Онлардан бири киләмейвәлиләр, икинчиси исә чәйирдәкмейвәлиләрдир.

Киләмейвә. Онун мейвәянлығы әтли, сулу олуб ачылмаяндыр. Киләмейвәләрин ичәрисиндө бир нечә вэ я чохлу мигдарда тохум олур. Үзүмүн, памидорун, лимонун, портахалын мейвәләри һәгиги киләмейвәләрдир, алманын, армудун, һейванын, гарпы-




Шәкил 123. Бешбармағ чичәк

Сағда—чичәкли вэ чаван мүрәккәб ярпағмейвәли будағы; солда—етишмиш мүрәккәб ярпағмейвәли битки.

зын, хиярын вэ бир сыра башга биткилэрин мейвэлэри исэ яланчы килэмейвэлэрдир.

Чэйирдэкмейвэ. Онун мейвэянлыгы харичи инчэ габыгдам ибарэт олуб, онун алтында этли хиссэ, ортасында исэ одунлаш-



Шәкил 124. Моруг

1—етишмиш мүрәккәб чэйирдэкмейвэлэри олән будаг; 2—юмшаг тикавлы көвдәсиндән бир парча; 3—тумурчуглу көвдәсиндән бир парча; 4—чичәй.

мыш сәрт габыглы хиссэ (чэйирдэк) ерләшмишдир. Мәсәлән, алманын, әрийин, кейәмин, бадамын, пүстәнин, киласын, зогалы мейвэлэри кими.

Гозун мейвәси яланчы чэйирдэкмейвәдир.

Юхарыда көстәрилмиш беш группун һамысында һәм яланчы, һәм дә һәгиги мейвәләр олур.

Мүрәккәб мейвә вэ я йығыммейвә. Чичәйин айры-айры диши-чикләри үмуми бир мейвә әмәлә кәтирirsә, она мүрәккәб мейвә вэ я йығым мейвә дейилир. Мәсәлән, гурдбоған (*Rapunculus*) чинсинин бүтүн нөвләринин мейвәси мүрәккәб тохумчамейвәдир (шәкил 122), бешбармаг (*Aquilegia olympica*) биткисинин мейвәси мүрәккәб ярпаг мейвәдир (шәкил 123), моругкимиләр чинсинин айры-айры нөвләринин (моругун, бөйүрткәнин) мейвәлэри мүрәккәб чэйирдэкмейвәдир (шәкил 124), чүнки бу ахырынчыларын мейвәси айры-айры чэйирдэк мейвәлэрин бир ерә топланмасындан әмәлә кәлмишдир.

Мейвә группу. Тәкчә бир чичәкдән дейил, чичәк группундан әмәлә кәлмиш мейвәләрә мейвә группу дейилир, мәсәлән, әнчир вэ тут мейвәси кими.

МЕЙВӘ ВӘ ТОХУМЛАРЫН ЯЙЫЛМАҒА УЙГУНЛАШМАЛАРЫ

Биткиләр тәбиәтдә әсасән мейвә вә тохумлары васитәсилә яйылыр. Чох вахт харичи мүһит шәраитинин тәсири алтында газанылмыш ени ирси хусусийәтләр нәсилдән-нәслә кечир вә һәр дәфә ени шәраитдә әмәлә кәлән биткиләр тәдричән тәкамүл эдирләр. Биткиләр яйылмаг үчүн әсасән харичи мүһит амилләриндән күләйә, суя вә һейванлара жерә уйгунлашмышдыр. Биткиләрин тәбиәтдә яйылмасында инсан да бөйүк рол ойнамышдыр.

Яшайыш уғрунда мүбаризәдә галиб кәлмәк үчүн бәзи биткиләрдә векетатив вә кенератив чохалма даһа чох инкишаф этмишдир; мәсәлән, памбығын алаг отларындан олан кәкрәоту (*Acroptilon repens*) күлли мигдарда тохум әмәлә кәтирмәклә бәрабәр, онун ералты органлары векетатив олараг сүрәтлә чохалыр. Биткиләрдән бир чохунда исә векетатив чохалма демәк олар ки, йох дәрәчәсинә энмишдир вә битки ялныз тохум васитәсилә чохалыр, мәсәлән, мәдәни тахыллар вә бириллик отлардан бир чохунда олдуғу кими. Дикәр биткиләрдә исә әксинә, тохум васитәсилә чохалма, демәк олар ки, йох дәрәчәсинә энмишдир, векетатив чохалма исә үстүнлүк тәшкил эдир, мәсәлән, су тауну биткиси (*Elodea canadensis*), һабелә сөйүдләрин вә чинарларын чоху адәтән векетатив үсулла чохалыр.

Тәбиәтдә биткиләрин яйылмасыны тәмин эдән васитәләрдән бири дә онларын чохлу тохум әмәлә кәтирмәсидир. Мәсәлән, мәдәни тахыл биткиләриндән бири әлверишли шәраитдә илдә 2000-ә гәдәр тохум верә биләр. Лакин бәзи алаг отлары орта һесабла 10—15 мин, бәзиләри исә 100 миндән артыг тохум верир. Сүмүргән оту бир илдә 100 мин, гарайонча 50—150 мин, дәлибәнк 450 мин, пәнчәр 400 минә гәдәр тохум верир.

Бәзи ағачлар даһа артыг тохум верир, мәсәлән, чинар ағачы бир илдә 28 миллиона гәдәр, сөйүд, гарарач, тут вә саир.

Бә'зи биткиләрин тохуму чох аз олур. Онлардан бә'зиләринин мейвәсиндә анчаг бирчә тохум олур, һәм ин тохум да чәйирдәк кими харицдән хусуси өртүклә мұһафизә олунур, гоз, фындыг вә саирә буна бир мисал ола биләр.

Элә биткиләр вардыр ки, онларын тохумлары һейванларын һәзм каналындан кечдийн заман зирәһләри юмшалаыр вә чүчәрмәсини асанлашдырыр.



Шәкил 125. Мешә хыначәйи (*Impatiens noli-tangere*) мейвәсинин партламасы.

Биткиләрдә тохум вә мейвәләрин яйылмасыны тә'мин этмәк үчүн чох мүхтәлиф уйғунлашмалар ола биләр. Мәсәлән, пахлалы биткиләрдән бә'зисинин тикишләрини тәшкил эдән тохумалар мейвә етишән заман бурулуб тохумлары атыр. Мәсәлән, лобя вә гарабурчаг (*Vicia*) нөвләрини буна бир мисал олараг кәстәрмәк олар. Мешә хыначәйи (*Impatiens noli-tangere*) бә'зән дә мәдәни хыначәйи (*Impatiens balsamina*) биткисинин гутучуғунун тайларыны тәшкил эдән һүчәйрәләрдә мейвә етишән заман тургур артдығындан, она тохунан кими гутучуғун тайлары гывырылыб шиддәтлә ачылараг тохумлары узаға атыр (шәкил 125).




Шәкил 126. 1—дәлихиярын көвдәсинин бир һиссәси; 2—тохумуну харицә атан етишмиш мейвәси.

Дәлихиярда исә мейвә етишән заман дахилиндәки маени тәзийгидән тохумлар кәнара сычрайыр (шәкил 126).

Бә'зи биткиләрдә мейвәянлығы ганад шәклиндә мүхтәлиф чыхынтылар әмәлә кәтирир. Белә мейвәләрә ганадмейвә дейилир, мәсәлән, гараағачын, көврүшүн, гаратиканын, ағчагайынын мейвәләри кими.

Бә'зи биткиләрдә чичәкалтлығы ганад шәклини алмышдыр, мәсәлән, чөкә, вәләс, хамырмая (*Humulus lupulus*) биткиләриндә олдуғу кими. Бу чүр ганадларын әмәлә кәлмәси мейвәләрин күләк васитәсилә яйылмасы үчүндүр. Күләклә яйылма васитәләриндән бири дә мейвә вә я тохумун үзәриндә, я да тохумун бир тәрәфиндә парашүт шәклиндә түкләр әмәлә кәлмәсидир. Мәсәлән, памбығын тохумларынын һәр тәрәфиндә, гангалын зәнчиротунун, пишикотунун мейвәләринин бир учунда топа илә белә түкләр әмәлә кәлир. Бу чүр түкләрә кәкил дейилир. Үмүмийәтлә, күләк васитәсилә яйылан биткиләрә әнәмохор биткиләр дейилир.

Бә'зи биткиләрин мейвә вә тохумлары үзәриндә гармаглар, тиканлар вә я япышган кими маддәләр әмәлә кәлир ки, онларын васитәсилә һейванларын түкләринә вә я инсанын палтарларына илишиб узағлара яйылыр. Мәсәлән, тулатутан, битирған, еркөкүнүн тохумлары бурая айдир. Һейванлар васитәсилә яйылан биткиләрә зоохор, инсан васитәсилә яйыланлара исә антропохор биткиләр дейилир (шәкил 127).



Шәкил 127.

1—Кечибуйнуз (*Proboscidea*) биткисинин чичәйи; 2—Кечибуйнуз биткисинин мейвәсинин бир һиссәси чүрүдүклән сонра алдығы вәзийәт; 3—Һарпагофитон (*Harpagophyton*) биткисинин мейвәси.

Тарла вә әкинләрдә алаг отларынын яйылмасы сәбәби һәм ин саһәләрин әтрафындакы хам ерләрдә битән отлардан бир чохунун яйдығы учаған, кәкил вә ганадлы мейвәләрдир. Буна көрә дә

тарлаларын этрафындакы ерлерин отлары чичэк ачыначая гэдэр бичилмәлидир.

Этрафы чиришли вэ япышганлы олан мейвэләр гушларын түкүнә япышараг, бир өлкәдән башга өлкәйә дүшүр. Гушлар васитәсилә яйылан биткиләре орнитохор биткиләре дейилир.

Су биткиләринин яйылмасында суда үзән вэ су мәнбәләринин этрафында яшаян гушларын бөйүк ролу вардыр. Онларын түкләринә вэ аяглары алтына япышмыш палчығын ичәрисиндә бир сыра биткиләрин тохумлары узаг мәсафәләре апарылыр. Бундан башга гуруда яшаян гушларын да аягларына сувашан палчыг васитәсилә чохлу тохум яйылыр. Мәсәлән, Чарлз Дарвин бир кәклийн аягындан гопарылмамыш бир парча палчыгдан 82 нәз битки тохумуну мүййән этмишдир.

Бә'зи биткиләрин мейвәянлыглары сулу вэ әтли олур ки, о да һейванлары, хусусән гушлары вэ инсанлары чөлб әдир. Әтли мейвәянлыгы ейилдикдә я тохумлары чыхарылыр, я да удулур, һәм олуна билмәйән тохумлар гушларын вэ һейванларын ифразаты илә харичә чыхыр вэ бунлардан бә'зиләри чүчәрир.

Биткиләрдән бир чохунун мейвәләри етишән заман мүхтәлиф рәнкләр алыр вэ чох вахт хош ийли хусуси әтрә малик олур. Етишән заман мейвәләрин әлавә әтир ифраз әтмәси, әлван рәнкләре дүшмәси, яшыл ярпаглар арасындан айдын сечилмәси үчүн бир васитәдир.

Мейвәләрин әксәрийәтинин күрәви олмасы, йәгин ки, мейвә етишдикдән сонра ерә дүшдүкдә, бир гэдәр юварланараг ана биткинин гол-будагларынын әмәлә жәтирдийи кәлкәли мүһитдән кәнара чыхыб ишыглы мүһитә дүшмәси үчүн бир уйғунлашмадыр.

Бә'зи биткиләрдә, һәтта мейвәнин өз-өзүнә торпаға сохулмасы үчүн мараглы бир уйғунлашма әмәлә кәлмишдир. Мәсәлән, саатчичәйи (чилинкабурун) (*Erodium*) вэ тәкәсаггал биткиләриндә белә бир уйғунлашма көрүнүр (шәкил 128). Онларын мейвәләриндә һигроскопик гылчыглар вардыр. Бу гылчыглара рүтубәт тә'сир әтдикдә ачылыр, гурудугда исә гыврылараг бурғу кими торпаға сохулур.


Бә'зи биткиләрин мейвәләри етишдикдә күләк васитәсилә асанлыглы гопараг чөлдә юварлана-юварлана кедир, беләликлә дә тохумларыны этрафа яйыр. Буна дэвәтиканыны вэ бә'зи гарағанлары мисал кәстәрмәк олар.

Мейвәләрин үзәриндә адәтән тикан, гыл, яндырычы түк вэ саирә әмәлә кәлир. Бу да онлары һейванлар тәрәфиндән ейилмәкдән горуюр. Шабалытын чанагы вэ батбатын гутучуғу үзәриндәки тиканлар буна бир мисал ола биләр.

Су биткиләриндән бир чохунун тохуму үзәриндә я пробка тәбәгәси, я да хусуси һава илә долу говуглар әмәлә кәләрәк, тохуун чәкисини йүнкүлләшдирир. Бу жүр тохумлар вэ я мейвәләр, узун мүддәт суя батмадан вэ чүрүмәдән суюн үзүндә галыб далға

васитәсилә кәнара чыхыр вэ әлверишли мүһитә дүшдүкдә чүчәриб инкишаф әдир.

Алаг отларынын яйылмасында суюн бөйүк ролу вардыр. Су архларынын кәнарларында битән биткиләрин тохумлары суя дүшәрәк, онун васитәсилә тарлалара вэ әкин саһәләринә кедир



Шәкил 128. Мейвәләрин өз-өзүнә торпаға сохулмасы.

1 вэ 2—тәкәсаггалын мейвәләри; 3 вэ 4—саатчичәйинин (чилинкабурун) мейвәләри.

вэ орада әлверишли шәраитдә чүчәрир. Одур ки, алаг отлары илә мүбаризә мәгсәдилә архларын вэ чайларын кәнарларындакы биткиләри чичәк ачмаздан әввәл бичмәк лазымдыр.

Биткиләрин тохум вэ мейвәләринин яйылмасында нәглийят васитәләринин вэ тичарәтин дә ролу аз дейилдир.

БИТКИЛӘРИН ЯЙЫЛМАСЫ ВЭ ЕНИ НӨВЛӘРИН ӘМӘЛӘ КӘЛМӘСИНДӘ ИНСАНЫН РОЛУ

Инсан һеч фикир вермәдән аягтаблары, палтары, кәнд тәсәррүфат аләтләри, ерә сәпдийи күбрәләр, сәпин материалы, мүхтәлиф нәглийят васитәләри вэ саирә илә биткиләрин тохум вэ мейвәләрини яйыр.

Шимали Америкадан Европая кәтирилмиш хырда ләчәк биткиси (*Erygeron canadensis*), пәнчәр нөвләрindən (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus albus*), энотера (*Oenothera*), су тауну (*Elodea canadensis*), ийли ағ кирпик (*Matricaria matricarioides*) вә саирә һазырда кениш яйылмышдыр. Бизә тез-тез раст кәлән сары пытраг (*Xanthum spinosum*) Чәнуби Америкадан Орта Асияя кәтирилән батбат (*Datura stramonium*) исә Орта Асиядан да Европая кәтирилмишдир. Ириярпаглы бағаярпағы (*Plantago major*), сүрүнән гияготу (*Agropyrum repens*), чинчилим (*Stellaria media*), әкин гәрәнфили (*Agrostemma gitago*) вә саирә Европадан Шимали Америкая кәтирилмиш вә һазырда орада кениш яйылмыш нөвләрдир.

Бә'зи алаг отлары мәдәни биткиләрлә бирликдә башга ерләрдән кәтирилмишдир. Онлардан бир чохунун тохуму мәдәни биткиләрин тохумуна охшайыр вә онларла бирликдә битир, мәсәлән, тулатутанын тохуму илә дарынын тохуму демәк олар ки, бир-биринин әйнидир.

Алаг отларындан бир чохунун тохуму узун мүддәт мәдәни биткиләрлә биркә битдийиндән тәбии сечмә нәтичәсиндә тарла шәраитинә уйғунлашмышдыр. Инсан өз фәәлийәти нәтичәсиндә нәинки алаг отларынын узаг ерләрә яйылмасында, һабелә ени-ени алаг оту нөвләринин әмәлә кәлмәсиндә бөйүк рол ойнайыр. Мә'лумдур ки, инсан бир сыра мәдәни биткиләри сечмә йолу илә әлдә этмишдир. Онларын әлдә әдилмәсиндә инсанын әсас ролу һәмин биткиләр үчүн әлверили шәраит яратмасы вә чарпаз тозландырма кими тәдбирләрдән истифадә этмәсиндән ибарәтдир. Бу ишләрин нәтичәсиндә мәдәни биткиләр о гәдәр дәйишмишдир ки, артыг өз чинс башчыларындан тамамилә узаглашмыш, онлардан кәскин фәргләнмиш вә ени нөв һалыны алмышдыр.

Гейд этмәк лазымдыр ки, мәдәни биткиләрдән бир чохунун чинс башчылары тәбиәтдә олмамаш вә әһтимал ки, инсан тәрәфиндән һибридләшдирилмә нәтичәсиндә әлдә әдилмишдир.

ТОХУМ


Маяландыгдан сонра тохумлуғун (мегаспоранкиянын) инкишафындан әмәлә кәлән мәнсула тохум дейлир. Тохумун ичәриндә рүшейм, онун да әтрафында рүшеймин мүвәггәти гидасыны тәшкил әдән әһтият маддәси олур. Һәр тохум харичдән табыгла өртүлүр. Тохумун харичи габыг һиссәси мүхтәлиф сәртликдә вә рәнkdә, сәтһи исә чопур, гырышыг, һамар, кәлә-көтүр, тиканлы, түклү ола биләр.

Тохумда рүшеймин вәзийәти вә формасы да нөвдән асылы олараг мүхтәлиф олур. Мәсәлән, кәнәкәрчәkdә тохумун рүшейми дүз, гәрәнфилдә әйри, чөл гәрәнфилиндә һәлгәвари, гызылсар-

машыгда бурғушәкилли, һамырмая биткисиндә гыврылмыш һалда (шәкил 129) вә и. а. олур.

Икиләпәли биткиләрдән бир чохунда инкишаф әдән рүшейм бүтүн эндосперми сәрф әдир вә онун анчаг харичи гаты галыр. Биткинин чүчәрмәси вә бөйүмәсинә сәрф олуначаг әһтият гида маддәси ләпәләрдә топландығындан ләпәләр әтли вә йоғун олур. Эндосперми олмаян тохумлар бир сыра пахлалылар, мүрәккәбчи-чәклиләр, хаччичәклиләр, габагкимиләр, күлчичәклиләр үчүн сәчийәвидир.

Бә'зи биткиләрдә исә, әксинә, ләпәләр ири олмайыб, әһтият гида маддәси эндоспермдә топланыр. Һәтта нуселлусу тамамилә сыхышдырылмыш олур (шәкил 130).



Шәкил 129.
Һамырмая биткиси
тохумунун кәсийи.

Шәкил 130. Мүхтәлиф тохумларын схематик
кәсикләри.

1—эндоспермли икиләпәли биткинин тохуму; 2—эндоспермли бирләпәли биткинин тохуму; 3—эндоспермсыз икиләпәли биткинин тохуму; 4—эндоспермсыз бирләпәли биткинин тохуму.

Белә эндоспермли тохумлара тахылларда, замбағчичәклиләрдә, бадымчанчичәклиләрдә, чәтирчичәклиләрдә тәсадүф әдилир.

Бә'зи биткиләрдә нуселлус галараг ичәрисинә әһтият гида маддәсилә долур вә перисперм адланан һиссәни әмәлә кәтирир, мәсәлән, унғуча, гәрәнфилчичәклиләр, гара истиот вә бир чох башга битки чинсләринин тохумларында олдуғу кими.

Перисперм бә'зән о гәдәр чох инкишаф әдир ки, эндосперми сыхышдырмаға башлайыр вә я һәр икиси әйни дәрәчәдә инкишаф әдир.

Тохумда ләпәләрин мигдары мүхтәлиф ола биләр. Тохумунда бир ләпәси олан биткиләрә бирләпәлиләр дейлир. Тахыллар, замбағчичәклиләр вә саирә бирләпәли биткиләрдир.

Тохумунда ләпәләрин мигдары 2 (бә'зән 5-ә гәдәр) олан биткиләрә икиләпәлиләр дейлир. Пахлалылар, күлчичәклиләр, мүрәккәбчичәклиләр вә саирә икиләпәли биткиләрә анддир.

Инсан вэ һейванларын һәятиндә мейвә вэ тохумларын әһәмийәти.

Мейвә вэ тохумларын һәр шейдән әввәл ейинти әһәмийәти вардыр. Онлар адәтән чий вэ бишмиш һалда ейилир. Мә'лумдур ки, бә'зи биткиләрин мейвәсиндән чөрәк, мүрәббә, дошаб, шәрбәт һазырланыр вэ гәннады истеһсалында истифадә эдилир, бә'зиләринин мейвәсиндән шәраб, спирт вэ саирә алыныр, бә'зиләринин дә мейвәләри ейинтийә дад вермәк вэ я сәрхошәдичи маддә алмаг үчүн ишләдилир. Бә'зи тохумлардан каучук, нишаста вэ саирә кимйәви маддәләр әлдә этмәк үчүн дә истифадә эдилир. Банан, мөз, һинд гөзү, чөрәк ағачынын мейвәләри тропик өлкәләрин әһалисинин әсас гидасыны тәшkil эдир. Бундан башга, какао вэ гәһвә кими гиймәтли маддәләр ағачларын тохумундан алыныр. Лимон, нарынч (мандарин), портагал, хурма, бадам, үзүм, әнчир, шәрг хырнийи (хурмасы), фейхоа, зейтун, пүстә кими гиймәтли да биткиләрдән алыныр. Алма, армуд, фындыг, гөз, шабалыд, алча, кавалы, әзкил, албалы, көйәм, тут, әрик, шафталы, говун, гарпыз кими дадлы мейвә верән биткиләр ер үзүнүн мө'тәдил иглимли өлкәләриндә кениш яйылмыш гиймәтли биткиләрдир.

Биткиләрдән бир чохунун тохумундан әтирли яғлар, ейинтә яғлары, сәнаәә лазым олан техники яғлар, дәрманлар, нишаста, шәкәр, зүлали маддәләр вэ бояглар алыныр. Мейвә вэ тохумлардан бир чохунун һейванлар үчүн ем әһәмийәти вардыр. Файдалы биткиләрдән башга, инсан вэ һейванлары зәһәрлийә билән биткиләр дә вардыр. Мәсәлән, сезалпиния (*Caesalpinia*), мелиа (*Melia*), сафора ағачы, батбат, дәлибәнк, ханымоту, зәбурчаг вэ саир биткиләрин мейвәләри зәһәрлидир.

ТОХУМЛАРЫН ЧҮЧӘРМӘ ШӘРАИТИ

Мә'лумдур ки, һәр тохумун дахилиндә мүәййән мигдарда кимйәви бирләшмә һалында су вардыр. Тохум гурудугу заман бу су айрылмайыб тохумда галыр. Әлверишли температурада тохум хариңдән су алдыгда чүчәрмәйә башлайыр.

Бә'зи тохумларын габығы вэ я мейвәянлығы хариңдән суюн тохума дахил олмасына мане олуи. Белә һалларда тохуму узун мүддәт чүчәрмәдән гала биләр. Бунун гаршысыны алмаг үчүн тохуму мүхтәлиф туршуларда сахламагла вэ саирә йолларла онун габығыны зәдәләйәрәк ичәрисинә су кирмәси үчүн имкан ярадылыр. Сәрт габыглы тохумлара мисал олараг үчярпаг йончалары, гара йончаны, зәгалы, әрийи, кавалыны вэ саирәни кәстәрмәк олар. Гырмызы вэ гара йончанын тохумларынын габығы зәдәләнмәйибсә, нәм торпагда 40 ил галыб, сонра чүчәрә биләр.

Анчаг биткиләрин әксәрийәтинин тохуму сую асанлыгла өзүнә чәкиб тез чүчәрир.

Осмос гануну илә тохума дахил олан суюн тә'сири алтында

тохум шишир. Тохум рүтубәтү торпагдан, судан, һәтта һавадан да ала биләр. Тохумун шишмәсинә су илә бирлигдә ферментләрин дә бөйүк тә'сири олуи. Ферментләрин тә'сирилә тохумун әһтият гига маддәләринин таркиби дәйишир вэ сәлар мәһлул һалына кечиб чүчәрмәкдә олан рүшеймин гидаланмасына сәрф олунур. Тохум нисбәтән сакит дөвр кечирдийи заман рүшейм чох яваш тәнәффүс эдир, чүчәрмә башландыгда исә рүшейм һүчәйрәләринин тәнәффүсү шиддәтләнир.

Тохумун тәнәффүсү дахилиндәки әһтият гига маддәләри һесабына давам эдир. Бир һалда ки, тохумда тәнәффүс просеси кәдир, демәли, чүчәрмәйә лазым олан шәртләрдән бири дә оксикенин олмасыдыр.

Тохумда чүчәрмәни тә'мин этмәк үчүн су вэ оксикендән башга бир дә нормал температур лазымдыр. Бу амид, һәр битки нөвү үчүн ашағыдакы үч сәвиййәдә ола биләр: минимум (ән ашағы), оптимум (орта) вэ максимум (ән йүксәк). Бә'зи кәч чүчәрән тохумлары чүчәрмәйә һазырлайырлар (стратификасия эдирләр). Бу тәдбир ондан ибарәтдир ки, тохумлар гуту ичәрисиндә яш гума басдырылыб пайыздан яза гәдәр сахланылыр, язда исә әкилир. Мүәййән эдилмишдир ки, бир сыра ябаны биткиләрин тохумларынын чүчәрмәсинә алчаг температур яхшы тә'сир эдир. Бә'зи бадымчан, хоружкүлү (түлпан) кими мәдәни биткиләрин тохумлары да шахтанын тә'сириндән яхшы чүчәрир.

Тохумларын чүчәрмәси үчүн ишыға олан әһтият мүхтәлиф битки нөвләриндә мүхтәлифдир. Мәсәлән, еркөкүнүн тохуму ялныз ишыгда чүчәрәр, түтүнә аз мүддәтли ишыг тә'сири лазымдыр, батбат, пәнчәр вэ саир алағ отларынын тохумларынын чүчәрмәсинә исә ишыг пис тә'сир эдир. Мәдәни биткиләрин әксәрийәтинин тохуму торпағын алтында гаранлыг мүһитдә чох яхшы чүчәрир.

Мүхтәлиф биткиләрин тохуму чүчәрмә габилийәтини мүхтәлиф мүддәт әрзиндә мүһафизә эдир. Мәсәлән, тахыллар чүчәрмә габилийәтләрини 10—12 ил, бә'зи тәрәвәз биткиләри исә 7—13 ил мүһафизә эдир. Лакин бу мүддәтдән сонра онларын чүчәрмә габилийәтини итирмәсинин сәбәби, әһтият гига маддәләрини рүшеймин тәнәффүсүнә сәрф этмәләриндәндир. Ябаны биткиләрдән бир чохунун тохумлары өз чүчәрмә габилийәтини бир нечә он ил итирмир.

Бә'зи мәдәни биткиләрин тохумларынын чүчәрмәси үчүн ашағыдакы температур лазым кәлдийи мүәййән эдилмишдир.

Температур һәдләри (С° илә)

Биткиләрин ады	Минимум	Оптимум	Максимум
Човдар	0—4,8	25—31	31—37
Зуғда	0—4,8	25—31	31—37
Күнәбахан	4,8—10,5	31—37	37—44
Габаг	10,5—15,6	37—44	44—50
Хляр	15—18,5	31—37	44—50

АЛИ БИТКИЛЭРИН СИСТЕМАТИКАСЫ

Ҳазыркы битки систематикасы өз башланғычыны XVI эсрдә көтүрмүшдүр. Бу эсрдә «әләфийятчылар» адланан алимләр мейдана чыхмышды. Онларын яздыглары «Әләфийят» эсәрләри яһныз биткиләрин тәсвириндән ибарәт иди. «Әләфийят» китабларында тәсвир эдилән биткиләр һеч бир элми әсаси олмаян системләрдә верилрди. Онларын систематик әсасыны биткинин инсан үчүн мәнфәәтли вә я зәрәрли олмасы тәшкил эдирди. Мәсәлән, бу заман биткиләр дәрман биткиләри, техники биткиләр, ейинти биткиләри, әтирли, әтирсиз биткиләр вә саир бу кими адларла гейд олунурду.

Белә бир «Әләфийят» китабы биринчи дәфә 1530-чу илдә язылмышдыр. «Әләфийят» китаблары о дөврдә ботаника элми сәһәсиндә бөйүк бир ирәлиләмә иди.

Битки систематикасы тарихи дә бир сыра башга элмләр кими о заманкы игтисадийят вә тичарәтлә әлагәдар олараг инкишаф әтмишдир.

Ботаниканын систематика һиссәсинин әввәли дәрманчылыг сәнәти илә башланыр вә еничә кенишләнмәкдә олан тичарәт, кәнд тәсәррүфаты сәнәи илә параллел инкишаф эдир.

ССРИ Элмләр Академиясынын Ленинграддакы Ботаника бағы 1713-чу илдә дәрман биткиләри әкмәк үчүн тәшкил эдилмишдир. Ени базарлар ахтармаг вә хаммал мәнбәләри әлдә әтмәк мәгсәдини күдән дәниз тичарәтинин вә сонралар сәнәе капитализминин инкишафы, биткиләр аләмилә танышлығын кенишләнмәсинә сәбәб олмушдур. Бунун үчүн дә биткиләрин мүййән гайдада низама салынмасына бөйүк әһтияч көрүнүрдү. Бу әһтиячы тәмин әтмәк үчүн битки систематикасы адланан эл мейдана чыхмышдыр.

Битки систематикасынын вәзифәси һәр биткинин адыны мүййәнләшдирмәк, ону айдын тәсвир вә тәсниф әтмәк, йә'ни аз-чох бир-биринә гоһумлут мүнәсибәти олан организмләри тәкамүл принципи әсасында мүййән системә салмагдыр. Битки систематикасынын әсас систематик ваһиди нөвдүр.

Нөвә илк дөфә XVII әсрдә Ремм тәрәфиндән тәриф верилмишдир. Реммә көрә, нөв һәр һансы биткинин тохумларындан әмәлә кәлмиш фәрдрәдән ибарәтдир. Битки систематикасында биринчи олараг нөвү тәсвир әтмиш К. Линней нөвүн тәрифи үзәриндә даянмишдыр. К. Линней нөвүн сабитлийи вә дәйишмәзлийи һаггында идеалистчәсинә фикир йүрүтмүшдүр. Ондан сонракы бир сыра алимләр нөвә тәриф вермишләрсә дә, онлара да нөвүн сабит олдуғуну көстәрмишләр. Бунларын тәрифинин әсасында бир-биринә охшар фәрдрәдин һәмнин фәрдрә охшар бир фәрдрәдән әмәлә кәлмәси тәрифи дурурду.


Нөвүн тарихийи вә дәйишилмәси һаггындакы анлайышы биринчи олараг Ламарк вермишдир. Дарвин нөвү шәрти бир анлайыш кими гәбул әтмишдир. О, нөвә нисбәтән мүййәнләшмиш нөв мүхтәлифлийи кими бахырды. Дарвинә көрә, нөв тарихи һадисәдир. О әмәлә кәлир, инкишаф әдир, тамам инкишаф дәрәчәсинә чатыр, сонра һәят шәраитинин дәйишмәси нәтичәсиндә, һәят мүбаризәсиндә даһа гүввәтли олан ени рәгибләрин әмәлә кәлмәси нәтичәсиндә дүшкүнлүйә мейл әдир вә нәһайәт мәһв олур.

К. А. Тимирязев белә язмышдыр: «Нөв—тәбии-тарихи мүчәррәд анлайышдыр вә я һәгиги фактдыр?—суалына, бу сөзлә әләгәдар икимәналы олан ики чүр чаваб вермәлийик. Тәбиәтдә чидди мүййәнләшмиш, һәмишә өзүнә бәрәбәр вә дәйишмәйән, нөв адлы категория йохдур. Лакин һәмнин нәтичәдән гәтиййән асылы олмаярат гәбул әтмәлийик ки, бизим мүшаһидәмиздә нөв реал олараг вардыр вә һәмнин факт өз изаһыны көзләйир»¹

Әлбәттә, нөвүн әһәтә әтдийи фәрдрә бир-биринин әйни дейилдир. Онларын һәр бири мүййән фәрди хүсусийәтләрлә фәргләнир. Бу фәрди хүсусийәтләр онларын хүсуси тәбиәти илә әләгәдардыр вә яшадыглары мүйитин тәсири алтында әмәлә кәлиб ирсән кечир. Белә фәрдрә нөв мүхтәлифлийи дейилир. Бу хүсусийәт мәдәни биткиләрдә, мәсәлән, кәләмләрдә, өзүнү даһа кәскин сурәтдә көстәрир. Кәләмләрин ябаны нөвләринин башчылары Аралыг дәнизи вә Атлантик океаны кәнарларында битир. Бир нечә мин ил бундан габаг бу дәнизләрин әтрафында яшаян әһали онлары мәдәни һалда бечәрмәйә башламышдыр. Онларын узун илләр әрзиндә мәдәни сурәтдә бечәрилмәси, мүхтәлиф истигамәтдә сечилмәси вә башга нөвләрлә һибридләшдирилмәси нәтичәсиндә харичи көрүнүшчә бир-бириндән фәргләнән бир чох нөв мүхтәлифлийи әлдә әдилмишдир, мәсәлән, ағбаш кәләм, гырмызы кәләм, чичәк кәләм, турп кәләм вә с. (шәкил 131).

Тәкамүл, даима дәйишмәкдә олан тәбиәтә уйғунлаша билән организмләрин сечилмәси истигамәтиндә кетмишдир. Фәрдрә арасында мүхтәлиф истигамәтләрдә кедән дәйишиклик нөвүн әмәлә кәлмәсини ифадә әдир. Ени нөвләрин әмәлә кәлмәсиндә

айры-айры формаларын чүтләшдирилмәси бөйүк рол ойнайыр ки, онун да нәтичәсиндә ени ирси формалар мейдана чыхыр. Бүтүн бунлар о демәкдир ки, нөв сабит олмайыб һәмишә дәйишир, йәни нөвләр әмәлә кәлмиш, әмәлә кәлир вә кәләчәкдә дә ени нөвләр әмәлә кәләчәкдир.



Шәкил 131. Кәләм чешидләри.

1—мәдәни кәләм чешидләринин башчысы олан ябаны кәләм; 2—ярпаг кәләм; 3—Савви кәләми; 4—ики метр һүндүрлүкдә олан ем кәләми; 5—Брүссел кәләми; 6—Брокколи кәләми; 7—Колраби кәләми; 8—чичәк кәләм; 9—баш кәләм.

Бә'зи нөвләри бир-бирилә мүгайисә әтсәк, айры-айры хүсусийәтләринин бир-биринә охшадығыны көрәрик. Бу да онларын гоһумлугларыны көстәрир. Белә нөвләр бирләшәрәк чинс тәшкил әдир. Мәсәлән, албалычичәклиләр өз мейвәләринин гурулушуна көрә тамамилә киласә охшайыр. Лакин мейвәси, дады, рәнки вә ярпагларынын һәчми илә киласдан фәргләнир. Килас вә албалы тамамилә айры-айры нөвләрдир. Йәгин ки, һәмнин нөвләрин яхын кечмишдә үмуми чинс башчылары олмушдур. Одур ки, бунлар әйни чинсә аид әдилир. Бурая алча, кавалы, көйәм, шафталы кими нөвләр дә дахилдир. Онлар мейвәләринин формасы, рәнки вә дады, чичәкләринин гурулушу, ярпаглары вә саи-

¹ П. М. Жуковски — Ботаника, 1949, сәһ. 338 (русча).

рә илә фэргләнир. Бу нөвләрн һамысы кавалыкимиләр (*Prunus*) чинси алтында бирләшдириләр. Беләликлә, чинс систематикада икинчи систематик ваһид олуб бир-биринә яхын нөвләр группуну тәшкил эдир.

Бә'зи айры-айры нөвләр арасында да узаг вә үмуми әләмәтләр тапмаг олар, мәсәлән, юхарыда көстәрдийимиз алча, кавалы, албалы, килас вә саирәнин чичәкләринин гурулушу бадамын вә әрийин чичәйинә охшайыр. Лакин мейвәләринин гурулушу вә саир хүсусийәтләри илә онлардан фэргләнир. Бу вә буна охшар башга чинсләри бирләшдирән фәсиләйә күлчичәклиләр (*Rosaceae*) фәсиләси дейилір.

Бә'зән әйни фәсиләнин ичәрисиндә анчаг бир-ики хүсусийәти илә фэргләнән яхын группалар олури, онлара да ярымфәсиләләр дейилір. Мәсәлән, күлкимиләр фәсиләси кавалыкимиләр, алмакимиләр, итбурнукимиләр вә топулгалар ярымфәсиләләринә айрылыр. Даһа узаг үмуми хүсусийәтләри олан айры-айры фәсиләләр мүййән сырада бирләшир. Мәсәлән күлчичәклиләр вә пахламейвәлиләр фәсиләләри күлчичәкли кимиләр (*Rosales*) сырасында бирләшир.

Тәкамүлдә инкишаф хәтти әйни олуб, гурулушларында бә'зи үмуми чәһәтләр олан сыралар мүййән синиф адланыр. Мәсәлән, бүтүн өртүлүтохумлулар, икиләпәлиләр (*Dicotyledoneae*) вә бирләпәлиләр (*Monocotyledoneae*) олмага ики синифә айрылыр. Бирләпәлиләр вә икиләпәлиләр һәятларынын мүййән дөвләриндә чичәк ачыр вә маяландыгдан сонра әмәлә кәлән мейвәнин дахилиндә (һапалы мүнһтдә) тохум инкишаф эдир. Онлар бирләшәрәк ваһид битки типн әмәлә кәтирир. Бу синифләрә бирликдә чичәкли вә я өртүлүтохумлу биткиләр (*Angiospermae*) типн дейилір.

Систематиканын гаршысында дуран вәзифәләрдән бири дә биткиләри адландырмагдыр, чүнки битки адландырылмазса, үзәриндә тәдгигат апарылан, тәсвир эдилән вә я һаггында данышылан биткинин мәһз һансы битки олдуғу мә'лум олмаз. Биткиләрә мүнхәлиф халгларын вердикләри адлар чох мүнхәлиф олдуғундан вә бу адларын һамысыны гейд этмәк мүмкүн олмадығындан, онлар бейнәлмиләл ад гәбул эдилмиш латын адлары илә адландырылыр.

К. Линней нөвү ики адла адландырманын (бинар номенклатуранын) әсасыны гоймушдур. Нөвүн адынын биринчи сөзү нөвүн аид олдуғу чинси, икинчи сөзү исә нөвүн өзүнә мәхсус олан ады ифадә эдир. Мәсәлән: *Morus nigra*. Бурада *Morus* — тут сөзүнү *nigra*, исә гара сөзүнү (нөвү) ифадә эдир. Бундан башга һәр нөвүн адындан сонра һәммин нөвә биринчи дәфә ад вермиш вә ону тәсвир этмиш мүйлиф гейд эдилір. Мәсәлән, *Morus nigra* L. Бурада ахырынчы L. һәрфи, һәммин нөвә илк дәфә Линней тәрәфиндән ад верилдийини вә я онун, Линней тәрәфиндән тәсвир

олундуғуну көстәрир. Бә'зән әйни биткини бир нечә адла адландырырлар. Бу әләвә адлара синоним дейилір. Мәсәлән, һейвә *Cydonia oblonga*, бә'зән дә *Cydonia vulgaris* адланыр. Бу ахырынчы ад һейванын синонимудур.

СҮН'И СИСТЕМЛӘР

1583-чү илдә Андрей Чезалпин «Биткиләр һаггында 16 китаб» адлы әсәриндә биткиләри 15 синифә бөлмүшдүр. Онун синифләринә бир-бириндән чох узаг олан вә я бир-биринә һеч гоһумлуғу олмаян биткиләр дахил эдилмишдир. Мәсәлән, онун VII синифинә сүмүркәноту (*Orobanch*), дәлибәнк (*Hyosciamus*) кими мүнхәлиф чинсләр вә хаччичәклиләр фәсиләси дахил эдилмишдир. Беләликлә, бир-ики хүсусийәтә әсасланан су системи тама-милә сүн'и вә әсассыз иди.

Карл Линней 1738-чи илдә яздығы «Биткиләрин синифләри» (*Classes plantarum*) адлы әсәриндә биткиләри, башлыча олар, әркәкчийи, бә'зән дә мейвәләри, касачығы вә я тачы әсасында, бир сөзлә, һеч бир принципи олмаян тәсадүфи хүсусийәтләрә көрә 24 синифә айырмышдыр. Линнейин бу сүн'и системиндә әйни фәсиләдән олан мүнхәлиф чинсләр башга-башга синифләрә дахил эдилмишдир. Мәсәлән, тахылларын, әтирли сүнбүл нөвү (*Anthoxantum odoratum*) икинчи синифә, тахыл нөвләринин әксәрийәти үчүнчү синифә, чәлтик исә алтынчы синифә дахил эдилмишдир.

К. Линней мәфкурәчә метафизик вә идеалист иди. Онун фикринчә: «Ер үзүндә биринчи дәфә аллаһ тәрәфиндән нә гәдәр битки вә һейван нөвү яранмышса, онларын һамысы бу вахта гәдәр яшайыб галыр». Беләликлә, К. Линней нөвләрин сабитлийи кими әлмә зидд вә әсассыз бир фикир ирәли сүрмүшдүр.

ФИЛОКЕНЕТИК СИСТЕМ

1859-чу илдән ә'тибарән тәбиәтшүнаслығын ени дөврү башланмышдыр. Бу заман Чарлз Дарвин «Нөвләрин мәншәи» адлы әсәри илә тәкамүл нәзәрийәсинин әсасыны гоймуш вә бир сыра дегиг фактларла тәкамүлүн нечә инкишаф этдийини көстәрмишдир.

Дарвин өз тәкамүл нәзәрийәси илә Линнейин нөвләрин сабитлийи һаггындакы идеалист мәфкурәсинә сарсыдычы зәрбә эндирмишдир. Дарвин «Нөвләрин мәншәи» адлы әсәри илә биолокия саһәсиндә, хүсусилә дә биткиләрин вә һейванларын систематикасында бөйүк ингилаб яратмыш вә филокенетик системин әсасыны гоймушдур. Филокенетик системин мәгсәди ән бәсит битки организмләриндән башлаяраг ән мүрәккәб организмләрә гәдәр битки аләминин инкишаф йолуну изләмәкдир. Филокенетик систем яратмаг үчүн ялныз бир хүсусийәт кифайәт дейилдир. Һәр һалда

бир чох хүсусийэт вэ эламэти нээрдэ тутулмалы вэ бунун үчүн дэ мүхтэлиф методлардан истифадэ эдилмэсидир. Белэ методлар дан бири, м ү г а й и с э л и м о р ф о л о ж и м е т о д д у р. О н у н в а с и т э с и л э а й р ы - а й р ы б и т к и г р у п л а р ы н ы н г о н у м л у г у н у м ү э й ё н л э ш д и р м э к ч о х а с а н д ы р. М ү г а й и с э л и м о р ф о л о к и я м е т о д у н д а н и с т и ф а д э э т д и к д э б и т к и л э р и н я л ы з х а р и ч и х ү с у с и й ё т л э р и д е й и л, н а б е л э д а х и л и (а н а т о м и к) х ү с у с и й ё т л э р и д э м ү г а й и с э э д и л м э л и д и р. М э с э л ё н, х а ч ч и ч ё к л и л э р и н с и с т е м а т и к а с ы н д а о н л а р ы н м е й в э л э р и г а п а г ы н д а к ы э п и д е р м и с и н (« д э р и ч и к н и с с э с и н и н ») а н а т о м и к г у р у л у ш у н у н б ө й ү к э н ё м и й ё т и в а р д ы р. Г э д и м д э я ш а м ы ш в э и н д и я л ы з г а з ы н т ы н а л ы н д а т а п ы л а н т о х у м л у г ы ж ы л а р ы н н ө в л э р и, к ө в д э л э р и н и н а н а т о м и к г у р у л у ш у и л э м ү э й ё н э д и л и р. Б э ' з и ч и ч ё к л и б и т к и л э р д э с у а п а р ы ч ы б о р у л а р э в э з и н э т р а х е и д л э р о л м а с ы, н ё м и н б и т к и н и н г э д и м л и й и н и и с б ё т э д ё н с и с т е м а т и к х ү с у с и й ё т д и р.

Гэдимдэ яшамыш, инди исэ газынты һалында тапылан биткилэрин гонумлуғуну мүййән этмэк үчүн палеонтологий методдан истифадэ эдилир.

Экэр гэдимдэ яшамыш биткилэрин һамысынын галығы тапылсайды, о заман палеонтологий методдан истифадэ эдэрэк бүтүн биткилэр алэминин тэкамүлү һаггында гэт'и тэсэввүр элдэ эдилэрди вэ филокенетик системин гурулмасына чэтинлик төрөнмэзди. Лакин, чох тээсүф ки, бу күнэ гэдэр палеонтологий бир сыра мүнүм битки галығларыны элдэ эдэ билмэмишдир. Буна жөрэ дэ бэ'зи битки группары арасында тэкамүл чөһөтдөн элагэ гырылыр.

Филокенетик систематикая көмөк эдэн методлардан бири дэ эмбриология вэ я онтокенетик методдур. О, көмөкчи методлардан бири олуб, һомолокияны айдынлашдырмаг вэ бир сыра фэсилэлэрин чичэклеринин гурулушугу изаһ этмэк үчүн гиймэтли материал верир; мэсэлэн, өртүлүтохумлуларда рүшейм кисэсинин вэ икинчи эндоспермин инкишафы бу методла изаһ эдилмишдир. Бэ'зи биткилэрин чаван инкишаф дөврүнүн формалары башга группарынына охшайыр, буна жөрэ дэ онлар эһтимал ки, бир-бирилэ гонумдур вэ бири дикэринин инкишафы нэтичэсиндэ эмэлэ жэлмишдир.

Башга бир метод палеоботаники методдур ки, о да гэдимдэн галмыш вэ һазырда яшаян биткилэрин кечмиш кеоложи дөврлэрдэки вэ һазыркы яйылма саһэлэринэ эсасланараг мүййән биткинин вэ я мүййән систематик битки группунун инкишафы вэ я тэкамүлү һаггында нэтичэ чыхарыр. Бундан башга, бу метод биткилэрин гэдимлийини мүййәнлэшдирдикдэн сонра онларын башга битки группарына олан тэкамүл мүнэсибэтлэрини дэ мүййәнлэшдирэ билэр. Палеоботаники метод эйни заманда чографи методун көмөкчисидир.

Чографи вэ экологий методлар мугайисэли морфологий методла сыхы сурэтдэ элагэдардыр. Мэ'лум олдуғу кими,

Һэр битки нөвүнүн чографи ареалы, йэ'ни ер күрэси үзэриндэ мүййән яйылма саһэси вардыр. Бу да нөвүн морфологий вэ анатомик хүсусийэтлэри, уйғунлашма кейфийэти вэ яйылма габиллийэти илэ элагэдардыр. Биллисэ вэ бэ'зи башга алимлэрэ жөрэ, нисбэтэн гэдим олан нөвлэр даһа жениш эразидэ яйылмышдыр. Лакин белэ бир фикир һэгигэтэ уйғун дейилдир, чүнки нисбэтэн чаван биткилэрдэн бир чоху ер күрэсиндэ олдуғча жениш яйылмышдыр. Мэсэлэн, чаван битки группарындан бири олан мүрөккэбчичеклилэр һазырда ер күрэсинин бүтүн гит'элэриндэ яйылмышдыр.

Һэр һансы битки нөвүнүн чографи яйылмасында онун мүййән иглим шэраитинэ, торпаға, битки өртүйүнэ вэ саирэйэ уйғунлашмасынын бөйүк эһемийэти вардыр. Буна жөрэдир ки, шоран биткилэри, кирэчли ер биткилэри, гаялыг биткилэри вэ дөниз саһили биткилэри мейдана чыхмышдыр. Бу ахырынчы методун, нөв дахилиндэки хырда систематик ваһидлэрин вэзиййэтинин мүййәнлэшдирмэкдэ бөйүк эһемийэти вардыр.

Тератологий метод. Онун маһийэти биткилэрдэки эйбөчэрлийи өйрөнмөкдир. Бэ'зэн бу эйбөчэрлик вэситэсилэ биткилэрин айры-айры органларынын мөншэини өйрөнмөк мүмкүн олур.

Биокимйэви метод. Мүййән битки группары үчүн онларда бэ'зи кимйэви маддэлэрин олмасы характерикдир. Мэсэлэн, лалачичеклилэрдэ алколоидли сүд ширэси, мүрөккэбчичеклилэрдэ каучуклу сүд ширэси, хаччичеклилэрдэ мирозин, көбөлөклэрдэ хитин олмасы характер чөһөтлэрдэндир.

Бу метод биткилэрин тэркибиндэ олан кимйэви маддэлэрэ эсасланараг онларын гонумлуғларыны мүййән эдир.

Гейд этмэк лазымдыр ки, биткилэрдэ кимйэви маддэлэр биткинин яшындан вэ мүнитиндэн асылы олараг дэйишэ билэр.

Иммунитет методу. Бу метод биткилэрин хэстэлийэ (башлыча олараг көбөлөк хэстэлийинэ) тутулмасы хүсусийэтинэ эсасланыр. Мүхтэлиф битки чешидлэри, нөвлэри, чинслэрин мүхтэлиф хэстэлик төрэдэн паразитлэринэ гаршы мүхтэлиф дэрэчэдэ давамлылыг көстэрир. Биокимйэви метод кими бу метод да башга методларын нэтичэлэрини тэсдиг этмэкдэ көмөкчи ролу ойнай билэр.

Һибридлэшдирмэ методу. Һэмин метод систематик формаларын кибридлэшдирилмэсинэ эсасланыр. Нөв дахилиндэ һибридлэшмэ, йэ'ни нөв мүхтэлифликлэри вэ я формалары арасында һибридлэшмэ асанлыгла баша кэлир вэ нэтичэдэ нормал нэсл алыныр. Бу исэ систематик яхынлыгы исбат эдир. Нөвлэр арасында бэ'зэн һибридлэшмэ чэтин олур, бэ'зэн дэ һеч мүмкүн олмур. Бунун сэбэби онларын бир-бирини маяламамасыдыр. Бир фэсилэнин айры-айры чинслэринин фэрдлэри арасында һибридлэшмэ даһа чэтин кедир. Лакин бу чэтинликлэр И. В. Мичурин төрөфиндэн арадан галдырылмышдыр.

Айры-айры фәсиләләрнн нөвләри арасында исә һибридләшмә һәләлик мүмкүн олмамышдыр. Чинсләр, нөвләр вә нөв мүхтәлифликләри арасында һибридләшмә дә онларын систематик вәзиййәтләрини айдынлашдырыр. Лакин бә'зән эйни нөвдән олан формалар чәтин һибридләшир вә өзләрини систематиканын узаг нөвү кими апарыр. Көрүнүр ки, белә формалар эколожи вә чографи чәһәтдән узаг формалардыр. Бә'зән дә элә һаллар олур ки, мүхтәлиф чинсләр арасында һибридләшмә эйни чинсин нөвләринә нисбәтән даһа асанлыгла кедир.

Һибридләшмәмәнин әсас сәбәби айры-айры биткиләрин һүчәйрә мөһтәвийятынын мүхтәлиф хассәли олмасыдыр. Һүчәйрә мөһтәвийятынын кейфиййәтчә мүхтәлифлийи һәммин нөвүн мүхтәлиф мәншәли олмасыны вә кенетик мүстәгилләшмәсини кәстәрир.

Һазырда филокенетик систематика юхарыда кәстәрилән методлардан истифадә эдир. Бу методлар бир-бирини йохлайыр, тамамлайыр, бири дикәринә көмәк эдир вә бир чох чәһәтләри айдынлашдырыр.

Инди бу методларын тәтбиг эдилмәсинә бахмаяраг, вәһид филокенетик систематика яратмаг һәлә дә мүмкүн олмамышдыр вә мүхтәлиф алимләрин тәклиф этдикләри филокенетик систематика схемләри бир-бириндән кәскин сурәтдә фәргләнир.

1 ШӨ'БӘ

АРХЕГОНИЯЛЫ БИТКИЛӘР (*Archegoniatae*) ТИПИ

Архегониялы биткиләр элә биткиләрә дейилир ки, онларда архегония адланан бутулкавари диши чинси органы олсун.

Архегониялы биткиләр ахырынчы тәдгигата әсасән ашағыдакы алты синфә айрылыр.

1. Мамырлар (*Bryophyta*),
2. Псилофитләр (*Psilophyta*),
3. Плаункимиләр (*Lycopsida*),
4. Бугумлулар (*Articulata*) вә я чивәярпаглылар (*Sphenopsida*),
5. Гыжыкимиләр (*Pteropsida*)
6. Чылпагтохумлулар (*Gymnospermae*).

МАМЫРКИМИЛӘР (*Bryophyta*) СИНФИ

Бу синфә һазырда яшамагда олан, һәгиги көкү олмаян, лакин йүксәк гурулушлу нүмайәндәләриндә көвдә вә ярпаглар, бәсит гурулушлуларында исә торпаг үзәринә сәрилмиш талломлар (гатлаглары) олан биткиләр аиддир. Онларда чинси нәсл илә гейри-чинси нәслин нөвбөләшмәси даһа айдын нәзәрә чарпыр. Чинси нәсл олан биринчи нәсл икинчийә үстүнлүк кәлир вә она нисбәтән даһа гүввәтли олур. Мамыркимиләр һәрәкәт эдән сперматозоидләр васитәсилә маяланыр.

Бу синиф ики ярымсинфә бөлүнүр: биринчиси—чийәротлары вә я ясты мамырлар (*Hepatica*), икинчиси — я р п а г л ы мамырлар (*Musci*).

ЧИЙӘРОТЛАРЫ ВӘ Я ЯСТЫ МАМЫРЛАР (*Hepatica*) ЯРЫМСИНФИ


Чийәротлары спорундан әмәлә кәлән чүчәртиләр (протонема) хырда олуб бә'зән яшлы биткидән аз фәргләнир вә чох вахт лөвһә шәклиндә олур. Чийәротларынын әксәриййәти икиәвли биткиләр-

дир, протонеманын инкишафында я эркэк я да диши битки эмэлэ кэлир. Бу ярымсииф үч сырая бөлүнүр:

1. Маршансиякимилэр (*Marchantiales*)
2. Юнкерманкимилэр (*Jungermaniales*),
3. Антосеротлар (*Anthoceratales*)

МАРШАНСИЯКИМИЛЭР (*Marchantiales*) СЫРАСЫ

Онун нүмайэндэлериндэн *Marchantia polymorpha* (шәкил 132, 133, 134) чох вахт рүтубәтли ерләрдә вә булагларын кәнарларында тапылыр. Түнд-яшыл рәнкдә олуб талломлары чүт-чүт будагланмышдыр. Будагларынын чухурларында талломун бой нөгтәси ерләшир ки, онун васитәсилә дә битки бөйүйүб будагланыр. Талломун алт сәтһиндә бирһүчәйрәли, рәнксиз вә торпағын дәринлийинә кедән саплар эмәлә кәлир ки, онлара яланчы




Шәкил 132. Маршансия (*Marchantia polymorpha*) мамыры.

1—эркәк чәтири вә пучур тумурчуглары олан сәбәтчикли мамыр; 2—эркәк чәтирин узунуна кәсийи; 3—нисбәтән чаван вә яшлы диши чәтирин алтдан көрүнүшү; 4—диши чәтирин алтдан көрүнүшү; 5—ичәрисиндә чаван спорлары олан архегония; 6—спорлары вә элатерлерини сәпән етишиб ачылмыш гутучут; 7—үч спор вә бир элатер.


көкләр вә я ризондләр дейилир. Бу ахырынчылар көк вәзифәсини ифа эдир. Талломун үст һиссәсиндә бир чүт хусуси сәбәтчик эмәлә кәлир ки, онларын да дибиндә ики бой нөгтәси олан вә инчә аягчыглар үзәриндә даянан пучур тумурчуглары инкишаф эдир. Пучур тумурчуглары онлары горумагдан мұһафизә эдән парафизләрлә эһатә эдилмишдир.

Пучур тумурчуглары сәбәтчикдән айрылдыгдан сонра әлвәришли мұһитә дүшдүкдә чүчәриб ени битки эмәлә кәтирир. Талломунун алт сәтһиндә рүшейм ярпаглар һесаб олуан пулчуглар олур ки, гураглыг заманы онлар өзләриндә узун мүддәт сую сахлайыр. Таллом дорзивентрал гурулмушдур. Онун үст эпидермисинин алтында хлорофилли һүчәйрәләрден тәшкил олунмуш, параллел һалда дүзүлмүш вә кениш ромбшәкилли бошлугларда ерләшән тохумалар вардыр. Онлар талломун үст сәтһини түнд яшыл рәнкдә кәстәрир. Онун дахили һиссәси харичи мұһитдә ағызчыглары әвәз эдән кичик дешикләр васитәсилә бирләшир. Хлорофилли һүчәйрәләрин эмәлә кәтирдийи тохуманын алтында узунсов вә рәнксиз һүчәйрәләрден ибарәт тохумалар вардыр ки, орада әһтият һалында нишаста вә яғ топланыр. Һәмин тохума талломун алт эпидермисинә гәдәр кедиб чатыр.



Шәкил 133. Маршансия (*Marchantia polymorpha*) мамырынын

1—чаван антеридиясы; 2—етишмиш антеридиясы; 3—сперматозондләр; 4—чаван архегониясы; 5—етишмиш архегониясы; 6—архегониянын бораз һиссәсини эһинә кәсийи.



Шәкил 134. Маршансия (*Marchantia polymorpha*) мамырынын диши даяғынын узунуна кәсийиндә архегонияларын көрүнүшү.

Маршансия мамыры икиэбли биткидир, йә'ни биткинин бириндә диши чинси органы—архегония, диһәриндә исә, эркәк чинси органы—антеридия эмәлә кәлир. Бу чинси органларын һәр икиси хусуси даягларын учунда отурур. Даяглар талломун үст сәтһиндә эмәлә кәлир. Онлар дишиләрдә гыса вә инчә чыхынтыдан ибарәт олуб, тәләсиндә чохбучаглы улдүзчуг эмәлә кәти-

рир. Улдузчуғун бучагларынын алт тәрәфиндә ғыса вә йоғун аягчыглардан салланмыш архегониялар олур. Архегония бутулка шәклиндәдир. Онун ашағыдакы кенәлмиш һиссәсинә—гарынчыг, дар вә узанмыш һиссәсинә исә—боғазчыг дейилир. Архегониянын дивары биргат һүчейрәләрдән ибарәтдир. Гарынчығын ашағы һиссәсиндә бир дәнә ири күрәви юмурта һүчейрәси, онун да үстүндә нисбәтән хырда гарын канал һүчейрәләри әмәлә кәлир.

Эркәк биткинин даяглары үзәриндә антеридиялар (эркәк чинси органлары) олур. Бу даягларын тәпәси даирәви дүздүр, кәнарлары исә—8-дилимлидир. Онун үст һиссәсиндә бир чох мәсамә вардыр ки, онлар да каналчыглар васитәсилә бир-бирилә әлагәдардыр. Дилимләрин һәр бириндән бир дәнә антеридия чыхыр. Антеридия юмуртавары олуб, ғыса аягчыг үзәриндәдир вә дивары биргат һүчейрәдән ибарәтдир. Антеридиянын ич бошлуғунда сперматокен тохума әмәлә кәлир. Һәмин тохуманын һәр һүчейрәси ики сперматозоид әмәлә кәтирир.

Етишән архегониянын гарын вә боғаз канал һүчейрәләри селикләшир. Селик архегониянын дахилини тамамилә долдуруб юмурта һүчейрәсини әһатә эдир. Бу селик маддәси архегониянын ағзындан харичә чыхыр вә сперматозоидләри чәлб эдир. Етишмиш антеридия партладыгда ондан гамчылары васитәсилә һәрәкәт эдән сперматозоидләр чыхыр. Архегония вә антеридиялар яғыш заманы вә я чохлу шәһ дүшдүкдә ачылыр. Сперматозоидләр су васитәсилә архегония доғру һәрәкәт эдир вә нәтичәдә онлардан бири архегония васитәсилә юмурта һүчейрәсинә кечиб ону маялайыр. Беләликлә маяланмыш юмурта һүчейрәсиндән диплоид рүшейм әмәлә кәлир ки, о да соргона чеврилир.

Спорогонун аягчығы чох ғысадыр. О, әмзикләри васитәсилә гаметофитин тохумалары ичәрисинә сохулараг онун үзәриндә ярымпаразит һәят кечирир. Аягчыг юхарыдан гутучугла гуртарыр. Гутучуғун ичәрисиндә чох һүчейрәли спор әмәлә кәтирән тохума вардыр. Бурадакы һүчейрәләрин бәзиләриндән спорун ана һүчейрәси әмәлә кәлир. Бу ахырынчылар диплоид олур, лакин спор әмәлә кәтирдикдә һүчейрәләр редуксия йолу илә бөлүнүр вә һәр бириндән дөрд әдәд һаплоид хромозомлу нүвәси олан спорлар әмәлә кәлир. Али биткиләрин һамысында олдуғу кими, онун спорунун ики габығы олур; харичдәки сәрт габыг—экзипа, дахилдәки инчә эластик гат исә—интина адланыр.

Спорогонун дахилиндә спорлардан башга бурғушәкилли һүчейрәләр дә әмәлә кәлир ки, онлара элатерләр дейилир. Спорлар етишән заман гутучут (спорогон) партлайыр. Бу заман элатерләр бурғу шәклиндә ачылыб спорлары узаға туллайыр. Етишмиш спор әлверишли мүнитә дүшдүкдә әввәлчә сап, сонрадан исә таллом шәклиндә инкишаф эдиб, яшыл рәнкли һаметофит (әсл биткини) әмәлә кәтирир.

Маршансия биткисиндә вә үмумийәтлә чийәротларында гейри-чинси спорофит нәсл илә чинси (һаметофит) нәсл нөвбәләшир. Һаметофит дөврү, таллом үзәриндә антеридин вә архегония әмәлә кәлән дөврүдүр, спорофит исә—маяланмадан сонра спорогонун инкишаф дөврүдүр. Һаметофит һүчейрәләринин нүвәсиндә хромозомларын мигдары спорофитинкидән ики дөфә аздыр. Маяланма заманы хромозомларын мигдары ики дөфә артыр, лакин спор әмәлә кәлән заман хромозомларын мигдары азалыр.

ЮНКЕРМАНЛАР (*Jungermaniales*) СЫРАСЫ

Юнкерманларын галыглары даш көмүр дөврүндән мәлүмдүр. Бу сырая 3500-ә гәдәр нөв дахилдир. Ибтидаи формаларынын талломлары ерин үзүнә сәрилмиш вә дихотомик—чүһачалы олур, лакин али формаларынын бәдәни көвдә вә ярпаглара айрылыр. Чинси органлары даягсыз олуб, чәтир шәклиндәдир. Онлар билаваситә талломун я да будагларын үзәриндә отурур. Спорогонун аягчығы яхшы инкишаф этмишдир. Спорогонда спорлар вә элатерләр етишир. Спорогон 4 тай илә ачылыр. Дивары бир нечә гат һүчейрәлидир.

Бу сыра анакрокиния (*Anacrogynae*) вә акрокиния (*Acrogynae*) олмагла ики ярымсырая бөлүнүр.


Анакрокиния ярымсырасынын нүмайәндләриндә таллом лөвһә шәклиндә олур, мәсәлән пеллиада (*Pellia*). Лакин бу ярымсыранын элә формалары да вардыр ки, онларда таллом лөвһә һалында ярпаглы көвдәли формалара кечид тәшкил эдир. Анакрикиния ярымсырасындан күрәмейвәлиләр (*Sphaerocarpaceae*) фәсиләси буна мисал ола биләр.

Күрәмейвәлиләр (*Sphaerocarpaceae*) фәсиләси


Күрәмейвәлиләр фәсиләсинин гутучутлары ачылмыр вә бурғулары йохдур, лакин бунун әвәзиндә онларда инкишаф этмәйән гидаландырычы һүчейрәләр вардыр. Бу фәсиләнин сферокарп (*Sphaerocarpus*) чинсинин спорогону аягчыгсыз олуб, говугшәкилли ири өртүклә әһатә эдилмишдир. Буна анакрокиния ярымсырасынын бәсит гурулушлу нүмайәндәләриндән пеллияны (*Pellia epiphylla*) (шәкил 135, 136, 137) көстәрмәк олар.

Бу биткинин нисбәтән зәиф будагланмыш, энсиз лөвһәшәкилли торпаға сәрилмиш таллому вардыр. Бөйүмә нөгтәси будагларынын учунда ерләшмишдир. Талломунун алт сәтһиндән ялныз ризоидләр әмәлә кәлир ки, онлар да биткинин торпагдан гидаланмасыны тәмин эдир. Таллому бәсит гурулушлу олуб ярпаг вә көвдәйә айрылмамышдыр. Чинси органлары (антеридия вә архегониялары) билаваситә талломун үст сәтһиндә олур. Антеридиялар чохлу мигдарда әмәлә кәлир вә талломун орта дамары үзәриндәки хусуси антеридия бошлугларында бир-бир ерләшир. Антеридиялар


күрәшәкилли чисимчикләрдән ибарәт олуп, дивары биргат һүчей-
рәлидир вә ғыса аягчыглар үзәриндә даяныр. Оун ич һиссәси
сперматокен һүчейрәләрдән дүзәлмишдир, бу һүчейрәләр-



Шәкил 135. Спорогонлу—пеллиа
(*Pellia epiphylla*) ясты мамыры.




Шәкил 136. Пеллиа (*Pellia epiphylla*) мамырының анте-
ридиялы талломунун кәсийи.



Шәкил 137. Пеллиа (*Pellia epiphylla*)
мамырының архегониялары.

дән дә икигамчылы сперматозондлар
эмәлә кәлир. Архегониялар бой нөгтәсин-
дән бир гәдәр керидә, хусуси чухурларда
групларла ерләшир. Онларын гурулушу
маршансияныкына охшайыр. Маялан-
масы да маршансияда олдуғу кимидир.
Маяланмадан сонра эмәлә кәлән етиш-
миш спорогон гутучугдан вә яхшы инки-
шаф этмиш аягчыгдан ибарәт олур. Аяг-
чыгың дйби эмзийә чеврилир. һәмйи
орган васитәсилә спорогон өзүнү
гида илә тәмин этмәк үчүн таллома



Шәкил 138. Пеллиа (*Pellia epiphylla*) мамырының
спорогонунун узунуна
кәсийи.

япышыр. Гутучугда спорлар эмәлә кәлир. Илк заманлар спорогом
талломун чухурунда хусуси папагчыгла өртүлмүш һалда ерлә-
шир. Бу папагчыг архегонияның гарын һиссәсинин бирләшмиш
ериндән эмәлә кәлир (шәкил 137).

Битки ғышы бу һалда кечирир. Язда спорогонун аягчығы тез
вә сүр'әтлә узаныр, нәтичәдә гутучуг папагчығы дешәрәк талло-
мун үстүнә чыхыр. Сонра гутучугун дивары партлайыр вә спор-
лар дағылыр. Спорлар әлверишли шәраитә дүшдүкдә чүчәрәрәк
ени биткиләрини эмәлә кәтирир. Беләликлә пеллиа биткисиндә
дә маршансияда олдуғу кими, чинси нәсл илә гейри-чинси нәсл
нөвбәләшир. Оун чинси нәсл дөврү—талломдан (чинси орган-
лар), гейри-чинси нәсл дөврү исә спорогон эмәлә кәлдийи
дөврдүр.


АНТОСЕРОТЛАР (*Anthocerotales*) СЫРАСЫ

Бу сырая дахил олан биткиләр хырда лөвһәчикләр һалында
талломлу олур, бәдәнләри исә айры-айры тохума вә органлара
айрылмамышдыр. Һүчейрәләриндә ялныз 1 вә я 2 хромотофор вә
периноидлар олур ки, бу чәһәтдән яшыл йосунлара охшайыр.
Бәдәнинин алт вә үст сәтһиндә ағызчыг вә селикли дешикләр
(мәсамәләр) вардыр. Антеридиялары чох вахт бәдән бошлуғунда
хусуси камераларда бир вә я бир нечә олуп, селикли маддә илә
әһәтә эдилмиш һалдадыр. Онларын һәр биринин хусуси аягчыг-
лары вардыр вә һәр бириндән чохлу мигдарда икигамчылы спер-
матозонд эмәлә кәлир. Антеридия етишән заман суюн тәсирилә
талломун вә антеридияның үзәри селикләшир вә бу заман антери-
диядан сперматозондлар чыхыб суя төжүлүр. Архегониялар да
талломда ерләшир вә хусуси даяғы олмур. Етишмиш архегония
ачылараг аз мигдарда селикли маддә ифраз эдир ки, һәмйи мад-
дәйә дә сперматозондлар чәлб олунур. Сперматозонд дахил олдуғ-
дан сонра маяланмыш юурта һүчейрәси бөлүнмәйә башлайыр
вә нәтичәдә спорогон эмәлә кәтирир.

Бу сыранын *Anthoceros* чинсинин етишмиш спорогон-
лары узунсов олуп, узун мүддәт дйбдән бөйүйүр (шәкил 139).

Спорогон юхарыдан ики һиссәйә бөлүнүр вә онларын ара-
сында сапшәкилли сүтунчуг олур. Спорогонун ян тайлары илә
сүтунчуг арасындакы һиссәдә спорлар вә векетатив һүчейрәләр
эмәлә кәлир. Спорлар етишән заман спорогон юхарыдан партла-
йыр вә бир-бириндән айрылмыш ики ян тапаға бөлүнүр. Сүтунчуг
исә узун мүддәт сап шәклиндә галыр. Спор чүчәрдикдә бирдән-
бирә таллом эмәлә кәтирир. Һәр талломда архегонияларын сайча
чох олмасына бахмаяраг һәр таллом үзәриндә ялныз 3—4 споро-
гон инкишаф эдир. Антосерос мамыры өз талломуна көрә бәсит
олса да, спорогонун гурулушуна көрә юхарыдакылардан мүрәк-
кәбдир, онун диварыны эмәлә кәтирән һүчейрәләрдә хромотофор

вэ ағызчылар вардыр. Антосерос мамырлары хырда вэ көркәм-сиз олуб, тәбиәтдә вэ хусусән инсанларын һәятында хусусән әһәмийәтә малик дейилдир.



Шәкил 139. Чийәроту мамырындан олан (*Anthoceros laevis*) спорогонларын инкишафы.
1—3—спорунун эпина кәсийи; 4—5—узуна кәсийи;
6—етишмиш спорогон; к—сүтунчуғу; ар—археспориясы;
сп—спорлары; н—аягы; ст—дабаны.

ЯРПАГЛЫ МАМЫРЛАР (*Musci*) ЯРЫМСИНФИ

Ярпаглы мамырлар ярымсинфи юра вэ тәбашир дөврүндә әмәлә кәлмишдир. Тәдгигат көстәрир ки, ярпаглы мамырлар чийәроту мамырларынын инкишафы мәһсулу дейилдир. Чох әһти-мал ки, онларын һәр икиси бир-биринә яхын олан ики гамчылы йосунлардан инкишаф этмишдир.

Ярпаглы мамырларын 10000-ә гәдәр нөвү мә'лумдур. Бу ярымсиниф 4 сырая бөлүнүр:

1. Һәгиги мамырлар (*Bryales*),
2. Торф мамырлары вэ яағ мамырлар (*Sphag-
nales*),
3. Архидиялар (*Archidiales*),
4. Тайгапагмейвәли вэ ягара мамырлар (*And-
reales*),

Бунларын нүмайәндәләринин һамысында аз-чох яхшы инки-шаф этмиш көвдә вэ ярпаглар вардыр. Чинси органлары антери-дия вэ архегониялардан ибарәтдир. Спорогону гутучугдан ибарәт олуб, аз-чох инкишаф этмиш аягыч үзәриндә даянмышдыр. Гу-

тучугун тәпәсиндә архегониянын гарынчыг һиссәсиндән инкишаф этмиш гапагыч, ичәрисиндә исә хусуси сүтунчуғ вардыр. Споро-гонун дахилиндә ялныз спорлар әмәлә кәлир, элатерләр исә әмәлә кәлмир. Протонемасы (илк чүчәртиси) яхшы инкишаф этмиш олуб.

ҺәГИГИ МАМЫРЛАР (*Bryales*) СЫРАСЫ


Бу сырадан гутукәндири (*Polytrichum commune*) мамы-рында һәгиги мамырлар сырасынын бүтүн характерик хусусий-йәтләрини көрмәк олар.

Polytrichum чинсинин нөвләри нәм мөшәләрдә, батаг-лыгларда, чәмәнләрдә сых чим һалында битир. Будагланмаян вэ диңгәлхан көвдәләри үзәриндә сых вэ учу шиш ярпаглар олуб. Көвдәсинин дибиндә торпагалты һиссәси көкүмсов көвдәйә бәизәр олуб, онун үзәриндә исә торпагдан сую вэ минерал маддә-ләри соран, беләликлә дә көкү әвәз эдән яланчы көкләр—риз о-идләр әмәлә кәлир. Диңгәлхан ярпаглары хырда вэ пулчуғ кимидир, орта вэ тәпә ярпаглары исә диңгәлхан ярпагларындан фәргли олараг бир гәдәр ири вэ яшыл рәңкдәдир. Яшыл ярпаглары әмәлә кәтирән һүчәйрәләрин ара бошлуглары су илә долудур. Архегония вэ анте-ридиялары көвдәсинин тәпәсиндә олуб парафизләрлә әһәтә олун-мушдур. Бу биткиләр ики эвлидир. Язын әввәлләриндә маяланыр. Спорогонларында хлорофил дәнәчикләри олуб (шәкил 140 вэ 141).

Спорогонун аягычга кечид һиссәси (диби) бир гәдәр йоғун-лашмыш олуб ки, буна а п о ф и з дейилир. Гутучугун гапагычы вардыр. Гутучугун ичәрисиндән апофизин инкишафынын давамы олан сүтунчуғ галхыр. Онун тәпә һиссәси даирәви шәкилдә кәнә-лир ки, она да э п и ф р а г м а дейилир. Эпифрагманын үст һиссә-синдә гапагыч әмәлә кәлир вэ о түклү папагычла өртүлүр (бу гапагыч, спорофит инкишаф этдийи заман архегониядан галан галыгдыр). Гутучугун ич бошлугунда вэ сүтунчуғу әтрафында кисәшәкилли споранкия әмәлә кәлир. Споранкиянын ич бошлу-гунда спор әмәлә кәтирән тохума инкишаф эдир вэ спорлары әмәлә кәтирир. Етишмиш гуру гутучугун бүтүн ич бошлуғу күлли мигдарда спорла долур.


Гутучугун ағыз һиссәсинин кәнарларында бир вэ я ики сыра диңгәликләр олуб ки, онлар һигроскопик һәрәкәт эдир. Бу диңгәлик-ләр һалгасына п е р и с т о м дейилир. Һәмин диңгәликләр һаванын рүтубәтлилийи дәрәжәсиндән асылы олараг һәрәкәт эдир вэ спор-ларын гутучугдан харичә сәпәләнмәсини низама салыр. Гутучуг-дан кәнәра чыхан етишмиш спорлар күләк васитәсилә асанлыгла йыйлыр. Әлверишли мүнһәт дүшмүш спор чүчәрәрәк илк чүчәр-тини—һамстофит нәслини әмәлә кәтирир.

Һәгиги мамырлар сырасынын нүмайәндәләри дүнянын демәк олар ки, һәр ериндә йыйлмышдыр. Онлара ялныз чох гуру ерләр-



Шәкил 140. Ардың гушкэндири мамыры
(*Polytrichum juniperinum*)
1—эрмәк битки; 2—антеридиялар йығымы; 3—антеридия
вә парифизалар; 4—спорогонлу диши биткилар.

дә вә хусусән сәһраларда аз тәсадүф олунур. Рүтубәти чох олан ерләрдә исә бу мамырлар һәм сай, һәм дә нөв э'тибарилә чох олур. Һәгиги мамырлар дургун вә ахан ширин суларда да яшайыр, лакин дузлу дәниз вә кел суларында яшай билмәйир. Мамырларын демәк олар ки, һамысы кома һалында яшадыгыннан ястыглар вә я бүтөв өртүк әмәлә кәтирир.



Шәкил 141. Рүтубәтөлчән мамыр
1—3—споруң чүчәрмәси; 4—протенема вә көвдәнин диши.

Мамырларә ән чох тәсадүф әдилән ер тропик өлкәләрин ду- манлы дағларыдыр. Орада һәтта ағачларын будагларындан сал- ланан вә узунлуғу 1 м-ә чатан эпифит мамырлар вардыр. Онлар- дан, мәсәлән, (*Aerobrium*, *Meteorium*) вә саир мамырларын нөвлә- рини көстәрмәк олар. Бурада ади көзлә чох чәтинликлә көрүнән нөвләр дә вардыр.

Мамырлардан көвдәләри дик галханлар чох аздыр. (*Polytric- haceae*) фәсиләси мүстәсна олмагла, мамырларын әксәрий- йәти я сүрүнән, я да салланан көвдәлидир. Мамырлар чох мүх- тәлиф шәрайтдә яшадыгларына көрә, онларын көвдәләри вә яр- паглары да гурулушча чох мүхтәлиф олур. Бә'зи мамырлар чох шиддәтли союға вә истийә давам кәтирир, бә'зиләри суда яшай билдийи кими, әлдә овушдурдугда овулуб ун һалыны алынчая гәдәр гурумаға да давамлыдыр. Бу дәрәчәдә гурумуш биткийә су верилдикдә, енидән чүчәриб яшайышыны давам әтдирир. Мәһз буна көрәдир ки, мамырлар чох йүксәк дағларын төпә- сирдә вә һәтта гүтбләрдә белә яшай билир.

Һәгиги мамырлар (*Bryales*) сырасына дахил олан мамырларын тәбиәтдә бөйүк тәсәррүфат әһәмийәти вардыр. Он- лар торпағын кейфийәтини кәскин сурәтдә яхшылашдыр-

магла, торпагда яшайн миркоорганизмларин вэ али битки-ларин яшайшында бөйүк рол ойнайыр. Мамырлар рүтүбэтли торпаг гатынын үзәриндэ сых өртүк эмэлэ кәтирэрэк суюн торпагдан бухарланмасына вэ торпага оксикен дахил олмасына мане олур, торпагда хүсуси гычгырма просеси кетмәсинэ вэ анаэроб бактерияларын инкишафына сәбәб олур. Лакин торпага оксикен дахил олмасына мане олдуғундан чох вахт ади биткиләр зәифләйиб гуруюр. Бу мамырларын мешә торпағы үзәриндә күтләви сурәтдә эмэлэ кәлмәси торф мамырларынын орая сохулмасы вэ мешәни батаглыға чеврилмәси илэ нәтичәләнир. Бә'зән һәммин мамырлар чәмән торпагларында кениш яйылараг, торпағын кей-фиййәтинин писләшмәсинә сәбәб олур. Бә'зән дә онлар шибияләр-лә бирликдә чылпаг гаяларын үзәриндә яшайраг дашларын овулуб торпага чеврилмәсинә сәбәб олур. Онларын бу йолла эмэлэ кәтир-дикләри торпаг гаты үзәриндә даһа йүксәк гурулушлу битки нөвләринин яшамасы үчүн имкан яраныр.


Бу мамырларын инсан үчүн билаваситә әһәмиййәти йох дәрә-чәсиндәдир. Онларын бә'зи нүмайәндәләринин өмрү ялныз бир векетасия дөврүдүр, лакин йүз вэ һәтта мин ил яшай билән нөв-ләри дә вардыр.

ТОРФ ВЭ ЯАҢ МАМЫРЛАР (*Sphagnales*) СЫРАСЫ

Бу сырай ялныз *Sphagnaceae* фәсиләси дахилдир. Онын ялныз бирчә *Sphagnum* чинси вардыр ки, о да 250-йә гәдәр нөвү әһатә эдир. Нөвләри, ярпагларынын вэ көвдәләри га-бығынын хүсусиййәтләри илэ бир-бириндән чох чәтинликлә фәргләнир.

Торф мамырлары торф батаглыгларында там бир өртүк эмә-лэ кәтирир. Һәмән мамырларын көвдәләри узун вэ зәиф олуб, чох будагланыр вэ үзәри хырда ярпагларла өртүлүр. Хырда бу-дагчыглары көвдәнин тәпәсиндә башчыг һалында топланмыш олур, узун будаглары исә көвдә бою ашағы салланыр. Бу ма-мырларын гурулушу ярпаглы мамырларә нисбәтән садәдир. Көв-дәләринин ичи паренхим һүчәйрәләри илэ долудур. Онлары про-зенкима һүчәйрәләриндән ибарәт олан механики һүчәйрәләр бу сонунчулары исә 2—3 гатдан ибарәт габыг һиссәси әһатә этмиш-дир. Габыг һиссәсини кениш, шәффаф вэ диварларында ири де-шикләр олан һүчәйрәләр эмәлэ кәтирмишдир. Бу өлү һүчәйрәләр тәбии шәраитдә су илэ долу олур. Ярпагларында орта дамәр йох-дур. Ярпағы тәшкил эдән һүчәйрәләр ики чүрдүр. Онлардан эн-сиз вэ узун оланларында хлорофил вардыр вэ учлары тора бир-ләшмишдир. Икинчи чүр һүчәйрәләр исә энли вэ шәффаф олуб тор бошлугларында ерләшмишдир. Торда чохлу дешик вэ йоғун-лашмыш бургулар вардыр. Хлорофилли һүчәйрәләр ассимилясия һүчәйрәләридир, икинчиләр исә су илэ долмуш олур.


Торф мамырлары бирәвли вэ икиәвли биткиләрдир. Антери-дия вэ архегониялары хүсуси будагчыгларда олур. Эркәк будаг-чыглары гонур вэ я сары рәнкли энли ярпаглары илэ фәргләнир. Бу ярпаглары арасында, узун аягчыг үзәриндә антеридиялар



Шәкил 142. *Catharina undulata* мамыры

олтурур. Онлар күрәви шәкилдә олуб, ичәрисини спермакән һүчәйрә-ләрлә долудур. Бу ахырынчылардан бургу шәкилли вэ икигам-чылы сперматозондлар эмәлэ кәлир. Архегониялар диши будаг-ларынын учунда эмәлэ кәлир вэ һәгиги мамырларын архегония-ларына охшайыр. Етишмиш антеридиялар тәпәдән бир нечә пар-чая айрылыр. Онлардан чыхан сперматозондлардән һәр бири бир архегонияны маялайыр. Маяланмыш юуртадан спорогон инкишаф эдир. Спорогон күрәви шәкилдә вэ гыса аягчыгы олуб, көвдәнин учуна басдырылмыш олур (шәкил 142, 143).

Гутучугун ичиндә конусшәкилли спорогон олур ки, онун да алтында сүтунчуг ерләшир. Гутучугун тәпәсиндә папагчыг олур. Спорогону харичдән өртмүш папагчыг тез дүшүр. Спорлар етиш-



Шәкил 143. *Sphagnum acutifolium*

1—биткинин антеридиялы будаглары олан бир һиссәси; 2—ярпаглары голарылмыш антеридиялы будаг; 3—ачылмыш антеридия; 4—сперматозоид; 5—дишн будагын тәпә һиссәсинин узунуна кәсипи.

дикдән сонра гапагчыг ачылыр вә спорлар әтрафа яйылыр. Спорогон етишән заман онун көвдәйә басдырылмыш аягчыгы хейли узанага ярпагларын арасындан харичә чыхыр. Бу ярпагсыз узанмыш көвдә һиссәсинә яланчы аягчыг дейилир.

Торф мамырлары башлыча олараг аг батаглыгларда вә я торф батаглыгларында, тундраларда да олур. Торф батаглыглары Авропанын, Асиянын вә Американын шималында чох бөйүк саһә тутур. Ялныз ССРИ-нин Азропа һиссәсиндә бу батаглыгларын үмуми саһәси бир пәчә миллион гектара чатыр. Субтропик өлкәләрдә белә батаглыглар йүксәк дағларда олур. Бу батаглыгларын әмәлә кәлмәси мин илләрдә давам әдир. Чанлы организмләр белә батаглыға дүшдүкдә чүрүмәйиб өз гурулушуну муһафизә әдир. Бунун сәбәби одур ки, торф мамырлары чүгүдүйү заман әмәлә кәтирдикләри маддәләр һәммин батаглыгларда чүгүдүчү вә дағдычы микроорганизмләрин артыб чохалмасына мане олур. Мәсәлән, Алманиянын шималында, Данциг әтрафындакы торф батаглыгларында Рома әскәрләринин бүтүн һәрби сурсатлары илә бирликдә галыглары тапылмышдыр.

Торф мамырларынын вә онлардан әмәлә кәлмиш торфларын өзләриндә су сахламаг габилыйәти олмасы торпагын нәмлийини хейли артырыр. Торф батаглыгларында торф мамырлары өзләриндәки сую яваш-яваш бурахдығындан чайларын мәнбәләрини тәшкил әдир вә онларда суюн мигдарыны низама салыр. Торф батаглыгларынын бу иши хусусән дағларда яхшы көзә чарпыр. Одур ки, батаглыглары гурузмаг мәгсәдилә торф мамырла-

рынын тәләф әдилмәси ола билсин ки, өлкәнин тәсәррүфатына зәрәр етирсин. Торф батаглыгларынын мешәләрдә әмәлә кәлмәси исә тәсәррүфата бөйүк зиян кәтирир, чүнки торпагын артыг дәрәчәдә нәм олмасы ағачларын көкләринин чүрүмәсинә вә ерә йыхылыб гурумасына сәбәб олур. Она көрә дә торф батаглыгларынын зиянлы вә я мәнфәәтли олмасыны дәриндән өйрәнмәк ләзымдыр.

Торф мамырларынын әсас мәнфәәтли чәһәти одур ки, бунларын лайларла үст-үстә ятмасы нәтижәсиндә әмәлә кәтирдикләри торфдан яначаг вә күбрә кими истифадә әдилир. Торф мамырларыннан һасил олан сфагн памбыгы әвәз әдир вә антисептик хәсәйә малик олдуғундан табәәтдә ишләдилер (шәкил 143).

АРХИДИЯЛАР (*Archidiales*) СЫРАСЫ

Бунлар торпаг үзәриндә яшаян хырда мамырлардыр. Гутучугларынын үзлүйү узун мүддәтдән сонра гейри-мүнтәзәм шәкилдә партлайыр вә онун галыгы узун мүддәт гутучугун дибиндән гопмур. Спор кнәсиндә спорлар чүчәрмә габилыйәтини итирмиш һүчәйрәләрә гарышыр. Сүтунчулары йохдур.

Бу сырая ялныз бирчә *Archidium* чинси дахилдир. Онун нөвләринә башлыча олараг Асия вә Америкада раст кәлишир. Авропада исә бирчә (*Archidium undulata*) нөвү битир.

ТАНГАПАГ МЕНВОЛИ ВӘ Я ГАРА МАМЫРЛАР (*Andreales*) СЫРАСЫ

Бунлар хырда көвдәли вә яланчы һачаланмая охшар зәиф будагланан биткиләрдир, гаяларын вә дашларын үзәриндә гонур рәнкли ястыглар әмәлә кәтирир. Көвдәләринин үзәри сых вә энсиз ярпагларла өртүлмүшдүр. Бу сырая 120-ә гәдәр нөвү олан *Andraea* чинси дахилдир. Спорогону көвдәсинин тәпәсиндәдир. Гутучугу әввәлләр конусшәкилли папагчыгла өртүлү олур ки, о да архегониянын боғаз һиссәсиндән әмәлә кәлир. Гутучуг 4 чадарла (чатла) ачылыр. Чадарлар гутучугун дибиндән башланыр, лакин учуна гәдәр кедиб чатмыр. Гутучугун ичиндәки сүтунчуг исә торф мамырларында олдуғу кими гапагчыға гәдәр узаныр. Спорлары нисбәтән ири олур. Онлар узун мүддәт чүчәрәрәк лентвари протонема әмәлә кәтирир. Бу мамырларын табиятдә әһәмийәти йох дәрәжәсиндәдир.

ЯРПАГЛЫ МАМЫРЛАРЫН МӘНШӘИ ВӘ ТӘКАМУЛҮ

Онларын ән гәдим нүмайәндәләри даш көмүр дөврүнүн үст гатларындан мәлүмдур. Онлар гуш кәндири мамырына охшайыр. Онларын галыглары мамырларын мәншәи һаггында бир әсас вермир. Лакин морфоложи вә эмбриоложи хусусийәтләринә көрә

демек олар ки, онлар ярпагы конкерманлардан эмелә кәлмишдир. Онларын эн чох тәкамүл эдән групу *Polutrachaceae* фәсиләсидир. Ярпагы мамырлар вә чийәр отлары айрыча гыса филокенетик тәкамүл хәттинә маликдир вә онларда һаметофит нәсл үстүнлүк тәшкил эдир.

ПСИЛОФИТКИМИЛӘР (*Psilopsida*) СИНФИ

Псилофиткимиләр торпаг үзәриндә яшаян мамырларын, али биткиләрин даһа ибтидан вә бәсит гурулушлу нүмайәндәләридир. Һәмин синифдән анчаг п с и л о ф и т л ә р (*Psilophytales*) сырасы вардыр. Онлар силур, алт девон вә орта девон дөврләриндә яшамышдыр вә бир сыра биткиләр бунлардан эмелә кәлмишдир. Һәмин мамырлардан бир чохунун көкү вә ярпагылары йохдур. Көвдәләри гаршы-гаршыя һачаланмышдыр, бәзиләриндә гыл кимн ярпагылар вардыр.

Псилофитләр сырасына ашағыдакы чинсләр дахилдир: р и н и я (*Rhynia*) һ о р н е а (*Hornea*), п с и л о ф и т (*Psilophyton*) астероксилон (*Asteroxylon*).

Р и н и я (шәкил 144) морфоложи вә анатомик гурулушча чох садә олан 10—30 см һүндүрлүкдә вә 5 мм йоғунлугда хырда битки имиш. Торпағын алтында үфүги вәзийәттә узанан көкүмсов көвдәси вә гаршы-гаршыя һачаланан ерүстү көвдәси вар имиш. Онун көкү вә ярпагылары олмамышдыр. Көвдәсинин мәркәзиндә ялныз бир су-гида борусу топасы ерләширмиш. Көвдәси харичи тәрәфдән ағызчыгы эпидермислә өртүлүрмүш. Ичи спорларла долү олан споранкиялар һачаланан көвдәнин учунда ерләширмиш.

Һ о р н е а да риния кими торф батагылыгыларында яшаян хырда, көкүмсов көвдәси гыса, ерүстү көвдәси гаршы-гаршыя һачаланан, учларында споранкиясы олан битки имиш, көвдәси үзәриндә ярпагылары йох имиш, көкүнү ризоидләр әвәз эдирмиш.

А с т е р о к с и л о н у н габагылардан фәрги нисбәтән ири вә мүрәккәб гурулуша малик олмасыдыр. Һәмин биткинин ералгы көкүмсов көвдәсиндән эмелә кәлән ерүстү көвдәси гаршы-гаршыя һачаланан ян будагылар эмелә кәтирмиш, лакин әсас көвдәсинин гаршы-гаршыя будагланмасы мәсәләси мәлүм дейилдир. Ерүстү көвдәләри гылаохшар сых ярпагыларла өртүлүрмүш. Көкүмсов көвдәдән айрылараг торпаға кирмиш будагылары (ибтидан көкләри) вар имиш. Көвдәсинин мәркәзиндә нәгләдичи бору топасы ерләширмиш ки, онун да энинә кәсийи дөрдбучагы улдуз формасында имиш. Бучагыларынын арасында ону әһәтә эдән флоэмасы вар имиш. Онун да үстүнү габыг әһәтә эдирмиш.

Көвдәләринин габагында вә ярпагыларында ағызчыгылар вар имиш. Споранкиялары хусуси мейвә будагыларынын учларында ерләширмиш (шәкил 145).

Псилофитләрин гаметофитләри тапылмадыгындан, онларда нәсил нөвбәләшмәси һаггында мәлүмат вермәк чәтиндир. Лакин

псилофиткимиләр синфинин п с и л о т л а р (*Psilotales*) сырасына мәнсуб олан п с и л о т (*Psilotum*) чинсиндә һаметофит тапылмышдыр вә тапынты ибтидан көвдәли биткиләре даир бәзи мәсәләләри айдынлашдырмаға көмәк этмишдир. Псилотун һаметофитинин илк фәрди инкишаф дөврүнүн хусусийәти

спорофитин көкүмсов көвдәсинә охшамасындадыр. Онун бәдәни цилиндришәкилли олуп, дахилиндә һәгиги нәгләдичи бору топары вардыр. Лакин бу борулар там олмайыб гырыг-гырыгдыр, топарлар һәлгәвари вә нәрдиваншәкиллидир, әтраф ниссәси дахили митселлидир. Бу хусусийәтләр исбат эдир ки, ерүстү биткиләре яшыл олмаян биткиләре ара-



Шәкил 144.

1—риния; 2—һорнеа; 3—псилофит



Шәкил 145. Астероксилон.

сында симбиозлуг башламышдыр. Псилотун һаметофити үзәриндә антеридия вә архегония инкишаф эдир.

Һаметофитин вә чаван спорофитин бир-биринә охшамасы кәс-тәрир ки, али биткиләр изоморф нәсил нөвбәләшмәси нәтичәсиндә йосунлардан эмелә кәлмишдир.

Бәзи мұәллифләр псилофитлары плаунларға аид эдирләр, лакин онлары псилофитларға аид этмәк даһа доғру олар, чүнки псилофитларын һаметофитлары плаунларынкындан даһа чох фәрглидир.

Харичи мүнһидә оксикенин чох олмасы торпагдан су вә минерал гидалар алынмасы, суюн аз бухарланмасы, һаметофитин гурумагдан мұһафизә эдилмәси вә рүшеймин зәдәләнемәкдән горунмасы илк али биткиләрдә бир сыра хусусийәтләр әмәлә кәтирмәли иди. Бунунла әлагәдар оларағ архегония, ағызчығлы дәричк, көвдә, чохһүчейрәли споранкия кими ени органлар әмәлә кәлмишдир.

Фотосинтездән кениш истифадә этмәк, торпагдакы һетеротрофларла симбиоз һәят кечирмәк, спорлары яймағ үчүн күләждән истифадә этмәк вә саир бу кими уйғунлашмалар ортая чыхмаға башламышдыр. Әйни заманда карбон газындан вә күнәш шүаларындан кениш истифадә этмәк үчүн күлли мигдарда хырда хлоропластлар, будағлар, ярпағлар әмәлә кәлмишдир; ялһыз фотосинтезин артмасы сайәсиндә күлли мигдарда спор әмәлә кәлмәси мүмкүн олмушдур.

Совет ботаникләриндән Ятсенко-Хмелевски кәстәрмишдир ки, псилофитлар анатомик гурулушлары илә ер үзүндә яшәян али биткиләрин башланғыч групдур. Псилофитларин силур дөврүндә, мамырларын исә карбон дөврүндә, йә'ни мамырлардан бир нечә он миллион ил габағ әмәлә кәлдийини нәзәрә алсағ, псилофитларин мамырлардан инкишаф этдийини сөйләмәк үчүн әлдә һеч бир әсас олмадығы алашылыр.

Гыжыкимиләрин диқәр үч синфи: плаункимиләр, буғумлулар, вә ади гыжылар псилофитләрдән инкишаф этмишдир. Онлардан плаункимиләр вә буғумлулар биринчи ики сыраны тәшкил эдән хырда ярпағлыларын инкишаф хәттини, гыжылар исә—ириярпағлыларын инкишаф хәттини әмәлә кәтирмишдир.


ПЛАУНКИМИЛӘР (*Lycopside*) СИНФИ

Плаункимиләр псилофитлар (*Asteroxylon*) типиндән төрәмишдир. Һәмин синфин нүмайәндәләри вахтилә ағач вә от шәклиндә кениш яйылмышды, лакин карбон дөврүндә ағач шәклиндәкиләр тәләф олмуш, от шәклиндәкиләрдән исә һазырда плаунлар вә садакинеллалар галмышдыр. Онларын сүрүнән көздәләриндән юхарыя доғру әйилиб галхан вә гаршы-гаршыя будағланан зоғлар әмәлә кәлир. Үзәрләри бурғу үзрә дүзүлмүш пулчугшәкилли сых ярпағларла өртүлмүш олур. Споранкиялары, шәклини дәйишмиш ярпағларын голтуғунда ерләшәрәк тәпәлә гозалар әмәлә кәтирир.

Һәмин синиф кибритоту вә я чанаварпәнчәси (*Lycopodiales*), селаквинеллалар (*Selaginellales*), вә лепидодендронлар (*Lepidodendrales*) сырасына бөлүнүр.

КИБРИТОТУ ВӘ Я ЧАНАВАРПӘНЧӘСИ (*Lycopodiales*) СЫРАСЫ

Һәмин сыранын чанаварпәнчәси *Lycopodiaceae* адланан ялһыз бирчә фәсиләси вардыр ки, о да *Lycopodium* вә *Phylloglossum* олмагаа ики чинсдән ибарәтдир. *Lycopodium* чинсинин 100-ә гәдәр нөвү вардыр вә бүтүн дүняда яйылмышдыр, *Phylloglossum* чинсинин исә ялһыз бирчә нөвү вардыр ки, о да *Phylloglossum Durmandii* -дир. Бу ахырынчы Австралияда вә онун яхынлығындакы адаларда битән хырда от биткисидир. Онун ералты юмрусу вардыр вә бу юмру васитәсилә гурағлығы кечирир. Һәмин фәсиләдән бизим биткиләр арасында яйыланы кибритоту (*Lycopodium clavatum*) нөвүдүр (шәкил 146).



Шәкил 146. Чанаварпәнчәси вә я кибритоту

1—спор верән сүмбүллү битки; 2—споранкиялы спорофил (спор ярпағы); 3—спорлар; 4—протал; 5—вентерилия; 6—сперматозондләри; 7—8—архегониялары; 9—протал үзәриндә чаған биткинин әмәлә кәлмәси.

Онун көвдәси ер үзәриндә сүрүнән вә юхарыя доғру гаршылығлы һачалаған будағлар әмәлә кәтирир. Онларда хырда вә бизәолшар хәтвари ярпағлар олур. Көкләри сүрүнән көвдәнин торпаға тәрәф олап һиссәсиндән әмәлә кәлир вә яба шәклиндә һача-

ра микроспорлар ири спорларга исә мегаспорлар дейлир. Микроспорлар чүчәрән заман эркәк проталы (антеридиялы проталы), мегаспорлар исә диши проталы (архегониялы проталы) эмәлә кәтирер. Бу проталларын һәр ики нөвүнүн векетатив һиссәси артыг дәрәчәдә редукция этмишдир.

Һәмин сыранын селакинелла чинсинин нөвләри от биткиләри-дир. Һүндүрлүкләри 50 см-ә гәдәр олуб, адәтән гаршылыглы һа-чаланан сых будаглары вардыр. Будагларында сых дүзүлмүш хырда ярпаглар олур. Бәзиләриндә мүхтәлиф ярпаглылыг (ге-терофилия) мүшәһидә эдилер. Белә һалларда будагларын үзә-риндә ики сыра ири, ики сыра да хырда ярпаглары көрмәк олар. Селакинелла биткиси торпага көкләри васитәсилә бирләшир. Бундан башга, көвдәләри үзәриндә ризофорлар адланан яланчы көкләр эмәлә кәлир. Ризофорлар көвдәнин будагланан һиссәсиндән ашағыда эмәлә кәлиб, инчә узун көк формасында олур. Лакин онлар, көкүн әксинә олараг, экзокендир (харичдән эмәлә кәлир) вә онларда көк үскүйү олмур.


Көвдәнин дахилиндә бир нечә бору топасы вардыр. Онлар кисбәтән зәиф инкишаф этмиш олур, көвдәнин әсас күтләсини исә габыг тәшкил эдир. Гида борусу топаларында кселеманы флоэма әһатә эдир вә һәр бору топасы һава бошлугу илә әһатә эдилмиш олур. Бу бошлуклардан габыга доғру гыса саплар ке-дир ки, онларын васитәсилә дә топалар һәмин бошлукда галыр.

Ярпагларынын характер хүсусийәти онларда ади хлорофил дәнәләринин олмамасыдыр; бунун әвәзиндә исә пластинка шәк-линдә хромотофорлар вардыр.

Селакинелла спорлар васитәсилә чохалыр. Спорлар споран-киәларда етишир. Споранкиәлар споранкиә эмәлә кәтирән спор сүнбүлләриндә, спор сүнбүлләри исә будагларын учларында ер-ләшир. Сүнбүлүн ортасында ох вардыр ки, она спор ярпаглары битишир. Һәр спор ярпагында бир әдәд споранкиә ерләшир. Споранкиядан юхарыда, спор ярпагынын үзәриндә учбучаг шәк-линдә лөвһәйәохшар дилчик олур ки, о да селакинелла үчүн ха-рактәр хүсусийәтдир, лакин онун әһәмиийәти һәлә айдынлашды-рылмамышдыр. Хырда спорлары эмәлә кәтирән споранкиәя ми к р о с п о р а н к и я, ири спорлары эмәлә кәтирәнә исә— м е г а с п о р а н к и я дейлир. Микроспоранкиә чохлу мигдарда микроспор, мегаспоранкиядә исә ялныз дөрд әдәд чох ири спор эмәлә кәлир.


Мегаспорлар тиканчыглы габыгла өртүлү олур. Етишмиш споранкиянын партламасы нәтижәсиндә харичә чыхыб әлверишли мүһитә дүшдүкдә чүчәрәк проталы эмәлә кәтирер. Мегаспор чүчәрән заман (шәкил 148) ортасында спермакән һүчәйрәләр группә эмәлә кәлир. Орада тәкчә бир векетатив һүчәйрә спорун динбиндән айрылыр ки, она да ризоидал һүчәйрә дейлир. О, тәкчә эркәк проталынын векетатив һүчәйрәсидир.

Спермакәнә вә ону әһатә эдән һүчәйрәләрә антеридия кими бахылмалыдыр. Беләликлә селакинелланын эркәк проталы кәскин сурәтдә ихтисар олунамудур, даһа доғрусу эркәк нәсли бирчә антеридиядан ибарәтдир. Спермакән һүчәйрәләрдән ики-гамчылы сперматозонидләр эмәлә кәлир. Мегаспордан диши про-талы чүчәрир. О, мегаспорун габыгы ичәрисиндә эмәлә кәлир.



Шәкил 148 Селакинелланын (*Selaginella*) 1 вә 2—чүчәрмиш микроспору; 3—сперматозонидләри.

Мегаспор чүчәрән заман онун мөһтәвийяты сүр'әтлә бөлүнәрәк хырдаһүчәйрәли тохуманын әсасыны гоюр. Бунунла да мегаспо-рун ичәриси долур. Бу тохума диши проталыны тәшкил эдир. О бөйүйүәрәк мегаспору партладыб бир гәдәр чөлә чыхыр. Лакин ону тамамилә бошалтмыр. Орада протал үзәриндә а р х е г о н и я эмәлә кәлир. О, гурулушча садә олуб проталын тохумасы ичәри-синә кирир. Архегонияя янашан сперматозонид она дахил олуб юмурта һүчәйрәсини маялайыр, ондан да рушәйм инкишаф эдир. (шәкил 149).



Шәкил 149. Селакинелла (*Selaginella Mar- tensii*) рушәйминин инкишафы.

1—5—ардычыл инкишаф мәрһәләләри; п—асгид; л—би-ринчи ярпаглар; я—дилчик; тр—бой нөгтәси.

Көрүнүр, плаунларда олдуғу кими селакинеллаларда да дүз нәсл нөвбәләшир, лакин бурада фәрг ондан ибарәтдир ки, микро-спордан антеридиялы эркәк проталы мегаспордан исә архего-ниялы диши проталы инкишаф эдир. Дикәр характерик хүсусий-йәт, селакинелламарда һәр ики протал нөвүнүн кәскин сурәтдә ихтисар олунамасыдыр. Бу да мүхтәлиф спорлулугла әлагәдар олараг, чинси нәслин азалмасыдыр. Белә бир һал али биткиләрә доғру мейилдир.

Селакинеелланын ССРИ-дә 8 нөвү тапылмышдыр. Онлар башлыча оларак Гафгазда, Уралда, Арктикада, Сибирдә вә Узаг Шәргдә ййылмышдыр. Бурада дағларда вә гаялыг-дашлыг ерләрдә *S. sibirica* вә *S. helvetica* кими нөвләр сулу чәмәнләрдә, вә торфлу ерләрдә исә *S. selaginoides* битир.

Азәрбайчанда ашағы дағ гуршағындан башлаярак алп гуршағына гәдәр мамырлы мешә вә коллугларда *Selaginella helvetica* раст кәтир.

ЛЕПИДОДЕНДРОНЛАР (*Lepidodendrales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын бүтүн нүмайәндәләри тәләф олмушдур вә һазырда онлар ялныз газынты һалында тапылыр.

Лепидодендронлара девон, даш көмүр вә перм дөвләриндә яшамыш һүндүрлүйү 30 м-ә гәдәр олан ағач биткиләри аиддир. Ярпагларында дилчикләр олмасы илә селакинеллалара яхынлашыр. Көвдәләри садә вә я аз-чох будаглыдыр. Ярпаглары нисбәтән хырда олуб, 15 см-ә гәдәр узунлугдадыр, энсиз хәтвари шәкилдәдир, үст тәрәфиндә бир дамары вә дибиндә дилчийи вардыр. Ярпаглар төкүләнән сонра көвдә үзәриндә характерик изләр галыр.

Лепидодендронлар ярпаг изләринин гурулушуна вә ярпагларынын дүзүлүшүнә көрә ики фәсиләйә бөлүнүр: лепидендронлар (*Lepidodendraceae*) вә сикиллариялар (*Sigillariaceae*).


Лепидодендрон фәсиләси нүмайәндәләринин ярпаглары чәп сыраларла дүзүлүб, пахлавашәкилли батынчлар үзәриндә ерләширмиш (шәкил 150), будаглары исә спор ярпаглары топары (сүнбүлчүкләр) илә гуртарырмыш. Буна көрә дә сүнбүлчүкләр лепидостробус адландырылмышдыр. Онларын мегаспоранкиялары микроспоранкияларындан алтда имиш (шәкил 151).

Протал, көрүнүр ки, мегаспордан харичә чыхырмыш. Сикиллария фәсиләсинин дә нүмайәндәләри эһтимал ки, ағачлармыш, көвдәләринин үзәри алтыбучаглы ярпаг изләрилә өртүлүрмүш. Бу алтыбучаглы изләр сургуч мөһрә охшадығына көрә сикиллария¹ адыны алмышдыр. Бу ағачларын көвдәләри лепидодендронларынкы гәдәр һүндүр дейилмиш, бәзиләринин көвдәси зәиф будагланырмыш, бәзиләриндә исә көвдә тамамилә садә олурмуш, дибдән йоғунлашырмыш вә спорярпағы топары көвдәнин нисбәтән яшлы һиссәсиндә эмәлә кәлирмиш. Спорлары мөхтәлиф имиш.

Лепидодендронлар, сикиллариялар вә онлара яхын формаларын битки аләминдә һаким мөвгә тутдуглары даш көмүр дөврүндә ири мешәләр эмәлә кәтирмишди. Онларын галыглары башга биткиләрин галыларилә бирликдә даш көмүрү вә нефти эмәлә кәтирмишдир.


¹ *Sigillum* — латынча мөһүр демәкдир

Лепидодендронлар вә сикиллариялар һаггында юхарыда дейиләнләрден айдын көрүнүр ки, онлар өзләринин бир сыра хусусийәтләрилә индики икиләпәли вә чылпагтохумлу ағачлара



Шәкил 150.

1—көкүндән башга тамамилә бәрпа эдилмиш лепидодендрон; 2—биткидә ярпаг изләри; 3—сикиллариянын ярпаг изләри.



Шәкил 151. Лепидодендронун (*Lepidostrobus*) — сүнбүлүнүн узунуна кәсийинин схем.

Ю х а р ы д а—микроспоранкиялар, а ш а ғ ы д а—мегаспоранкиялар, я—споранкияларын гаршысындакы дилчикләр

охшайырмыш. Мәсәлән, онларда да камбия тәбәгәси олмасы сайәсиндә икинчи дәфә йоғунлашмаг вә тохум эмәлә кәтирмәк кими хусусийәтләр варимиш. Онлар инкишаф чәһәтдән инди яшаян плаун вә селакинеллалардан даһа үстүн ер тутурмуш.

БУГУМЛУЛАР (*Sphenopsida*) СИНФИ

Бу синфин нүмайәндәләри көвдәләриндә мүнтәзәм сурәтдә нәвбәләнән дүйүн вә бугумлар олмасы илә фәргләнир. Онларын көвдәләри үзәриндә хырда дәстәләрлә, чох вахт ихтисар олунмуш ярпаглар олур. Бу синфин башлыча сыралары бунлардыр:

1. Г а т ы р г у й р у ғ у к и м и л ә р (*Equisetales*).
2. Ч и в я р п а г л ы л а р (*Sphenophyllales*).

Бу ахырынчы сыранын нүмайәндәләри анча газынты һалында тапылыр.

ГАТЫРГУЙРУҒУКИМИЛӘР (*Equisetales*) СЫРАСЫ


Бу сыранын нүмайәндәләри үчүн көвдәләри үзәриндә мүнтәзәм сурәтдә фәргләнмәйән бугумлар олмасы характерикдир. Дүйүнләрдә артыг дәрәжәдә ихтисар олунмуш вә чох вахт гын кими

кенәлмиш ярпаг дәстәләри олур. Дүйүндәрдән дәстә илә чыхан будаглар да әмәлә кәлир. Ерин үзүнә галхан көвдәләринин учунда спор әмәлә кәтирән сүнбүлләр олур ки, онлар да галханчыглардан вә спор ярпагларындан ибарәтдир. Онлар да дәстә-дәстә дүзүлмүш олур. Проталлары яшыл рәнкли хырда лөвһәләрдән ибарәтдир вә чох вахт бир чинсли олур. Сперматозоидләр: дәстәгамчылыдыр. *Equisetales* сырасынын ики фәсиләси вардыр: 1. Һазырда яшayan гатыргуйруғлары (*Equisetaceae*) вә 2) тәләф олмуш каламитләр (*Calamitaceae*)

Бу ахырынчыларынын һәм әйни спорлу, һәм дә мүхтәлиф спорлу нүмайәндәләри вар имиш.

Гатыргуйруғу (*Equisetaceae*) фәсиләси

Бунун нүмайәндәләринин һамысында спорлар бир-биринин әйнидир. Һәмин фәсиләйә ялныз бир г а т ы р г у й р у ғ у (*Equisetum*) чинси анддир ки, онун да 24 нөвү, Австралиядан башга бүтүн дүняя яйылмышдыр. Азәрбайчанда бу чинсин 5 нөвү вардыр.



Шәкил 152. Гатыргуйруғу (*Equisetum*)

1—эркәк проталы; 2—диши проталы; 3—сперматозоид.

Онун спорундан протал, йә'ни чинси нәсл (һаметофит) әмәлә кәлир ки, о да мүхтәлиф формалы яшыл лөвһә шәклиндәдир. Гатыргуйруғунун спорлары бир-биринин әйни олса да, әмәлә кәтирдикләри проталлар мүхтәлиф чинслидир; проталларын бә'зиси антеридли олуб эркәк проталы, бә'зиси дә архегонлу олуб—диши проталыдыр (шәкил 152).

Онларын мүхтәлиф чинсли олмасынын сәбәби харичи шәраитин тәсиридир, мәсәлән протал пис шәраитдә антеридли, яхшы шәраитдә исә архегонлу олур. Одур ки, эркәк протал хырда вә зәиф, диши протал исә ири вә гүввәтли олур. Әлверишли шәраитдә *Equisetum arvense* спорларынын 50%-и эркәк вә 50%-и диши проталы әмәлә кәтирир. Шәраити пislәшдирәрәк спорлары сых әкмәклә эркәк проталларын сайыны 90%-ә чатдырмаг олур. Әксинә, гита маддәсинин мигдарыны артырмагла диши проталларын сайыны артырмаг мүмкүндүр. Диши проталын гитасыны артырмагла икичинсли протал әлдә этмәк мүмкүн олур. Диши проталы 2 см эниндә олуб, дибдән йоғунлашмышдыр вә пластинка шәклиндә дилимләрә бөлүнмүшдүр. Бу дилимләрин чухурларында архегониялар инкишаф әдир.

Эркәк проталын учлары бир аз дилимли олур вә онларын учларында антеридиялар әмәлә кәлир. Бә'зи гатыргуйруғу нөвләриндә, мәсәлән, *Equisetum arvense*, *E. laevigatum*, *E. majus* вә саирәдә протал икичинсли олур. Онларда әввәлчә архегония әмәлә кәлир, сонралар исә антеридия инкишаф әдир. Проталлар торпаға ризоидләр васитәсилә бирләшир. Антеридия әмәлә кәлән заман проталын сәтһ һүчәйрәләри ашагы вә юхары һиссәләр олмагла ики һиссәйә бөлүнүр. Юхарыдакылардан дивар һүчәйрәләри, ашагыдакылардан исә сперматозоид һүчәйрәләри әмәлә кәлир.

Дивар тәбәгәси харичдән бир дә кутикула илә өртүлмүш олур ки, о да сонралар партлайыр. Бу заман онун алтында ерләшән дивар тәбәгәсинин рәнксиз һүчәйрәләри араланыр вә нәтичәдә кениш мäsәмә әмәлә кәлир ки, бурғу шәклиндә гывырлмыш сперматозоидләр бурадан харичә чыхыр.

Гатыргуйруғу нөвләринин сперматозоидләри гыжыларынкындан ири вә нисбәтән аз гывырлмыш олур.


Гейри-чинси нәсл олан спорофит (диплоид) чохиллик отлардыр (шәкил 153). Ичи бош вә бир-бириндән буғумлар васитәсилә тез айрылан көкүмсов көвдәләри торпағын алтында сүрүнүр, һәмин көвдәләрдән көкләр вә бириллик ерүстү көвдәләр әмәлә кәлир. Ерүстү көвдәләри дә бир-бириндән буғумлар васитәсилә тез айрылан ичибош һиссәләрдән ибарәтдир. Һәр буғумун тәпәсиндә дәстә илә рүшейм һалында дишшәкилли ярпаглар ерләшир.

Дәри вә механики тохуманын склеринхим топаларында чохлу силисиум (кварс) топланмыш олур ки, о да гатыргуйруғуна сәртлик верир вә ону бармагларымызын арасында овушдурдугда хырчылдайыр. Одур ки, гатыргуйруғундан тахта вә буйнуз шейләри һамарламаг вә метал габлары тәмизләмәк үчүн истифадә әдилир.

Гатыргуйруғуларын спор ярпаглары әграфында 8—10-а гәдәр споранкия олур. Онларда бир-биринин әйни олан чохлу спор әмәлә кәлир. Спорлар етишәнә яхын спор сүнбүлү охунун узанмасы нәтичәсиндә спор ярпаглары дәстәләри араланыр вә онларын

арасында чатлар эмәлә кәлир ки, орадан спорлар харичә чыхыб яйылып.

Спорлар түнд-яшыл рәнкли күрэви һүчейрәләрдән ибарәтдир. Онлар харичдән чох талын габыгла өртүлмүшдүр вә бурғу шәклиндә гыврылан ики чүт ленти вә я элатери вардыр. Элатерләр гидроскопик олуб рүтубәтин тәсириндән ачылып, гурудугда исә гызрылып.



Шәкил 153. Әкин гатыргуйруғу (*Equisetum arvense*)
1—векетатив вә мейвә верән чоғлу битки; 2—3—спорофилләр;
4—6—спорлар.

Спорлар элатерләри васитәсилә бир-бирилә илишиб, ири сейрәк комалар эмәлә кәтирәрәк күләклә асан яйылып. Бу спор комалары әлверишли ерә дүшдүклә бир-биринин янында мүхтәлиф чинсли проталлар эмәлә кәтирир, онлар да асанлыгла мая-

ланыр. Гатыргуйруғу биткиләринин антеридиялары күрэви олур вә юхарыда кәстәрилдийи гайдада инкишаф эдәрәк сперматозоид эмәлә кәтирир. Архегониялары типикдир вә гарын һиссәсилә проталын тохумасы дахилиндә ерләшмишдир. Архегониянын маяланмыш юмурта һүчейрәсиндән ени гатыргуйруғу биткиси инкишаф эдир. Үмумийәтлә гатыргуйруғу биткиләринин һүндүрлүйү 0,5—1 м олур, лакин Чәнуби Америкада яшаян *E. giganteum* нөвүнүн һүндүрлүйү 12 м-ә вә эни 0,5—2 см-ә чатыр. О, дырманан биткидир. Бизим шәраитдә яшаян гатыргуйруғу биткиләриндән *E. arvense* вә *E. maximum* нөвләринин көкүмсов көвдәләриндә хүсуси юмулар эмәлә кәлир вә онларда эһтият гйда маддәси топланыр векегатив чохалмалары көкүмсов көвдәләрилә олур.

Гатыргуйруглардан *E. arvense* нөвүндә векегатив көвдә илә спор верән көвдә бир-бириндән кәскин сурәтдә фәргләнир. Оун спор көвдәси язын әввәлләриндә эмәлә кәлир, рәнксиз олур, спор вердикдән сонра тез тәләф олур, векегатив көвдәси исә яшыл рәнклә олуб узун мүддәт яшайыр. Бә'зи гатыргуйруғу нөвләриндә спор сүнбүлү яшыл көвдәнин үзәриндә вә уч һиссәсиндә эмәлә кәлир.

Әкин гатыргуйруғу *E. arvense* (шәкил 153) чәтинликлә тәләф әдилән алаг отларындан олуб, бүтүн шимали ярымкүрәдә яйылмышдыр. Гатыргуйруғунда эквизетин адлы зәһәр вардыр ки, о да алколоиддән ибарәтдир. һәмин зәһәрдән атлар, даналар вә чаван инәкләр чох тез зәһәрләнир вә чох вахт тәләф олур. Анчаг бу маддәдән тәбабәтдә сидик кәтирән вә дахили ган ахманы даяндыран бир дәрман кими, һабелә ойнаг елинин мүәличәси үчүн истифадә әдилир. *E. arvense* нөвүнүн от һиссәсиндә 26,4—190 мг% «С» витамин вә я аскарбин туршусу вардыр.

Каламитләр (*Calamitaceae*) фәсиләси

Вахтилә яшамыш бу фәсиләнин нүмайәндәләри садә вә мүхтәлиф спорлу олмушдур. Инди онларын бир нүмайәндәси белә галмамышдыр вә онлара анчаг газынты һалында тәсадүф әдилир.

Каламитләр үмумийәтлә морфоложи чәһәтдән гатыргуйругларына охшаян вә көвдәләри үзәриндә ярпаглары дәстәвари дүзүлмүш ағачлар имиш, көвдәләри айдын буғумлу вә өзәкли олуб, икинчи йоғунлашма габилийәтинә малик имиш, үзәри табыгла өртүлүрмүш. Спор ярпаглары дәстә һалында топланараг гозалар тәшкил эдирмиш. Онлар галхан шәкилли олуб бир нечә споранкиялы имиш вә чох вахт мейвәсиз ярпаг дәстәләри илә нөвбәләширмиш.

Онларын һаметофитләриндән һеч бир әсәр галмамышдыр. Каламитләрин күлли мигдарда галытлары газынты һалында даһи көмүр дөврүнүн юхары гатларында тапылып. Онларын көвдәлә-

ринин һүндүрлүгү 20—30 м-э вэ эни 30 см-э чатырмыш (шәкил 154). Олар хырда көлләрин саһилләриндә вэ лилли ерләрдә мешәләр әмәлә кәтирмишди. Каламит-ләрдә ярпагларын сәрбәст, гатыргуй-ругларында исә битишик олмасы кәс-тәрир ки, икинчиләр биринчиләрә нисбәтән даһа чох тәкамүл әтмиш-дир, чүнки һәр һансы органын бити-шиклиһи тәкамүл әламәтидир.

ГЫЖЫЛАР (*Pteropsida*) СИНФИ

Палеозойда әмәлә кәлмиш гыжы-ларын һазырда бир чох формасы яшамагдадыр, онларын бә'зи нөвләри палеозойда тәләф олмуш, бә'зиләри исә һәлә дә яшайыр. Мезозойда яйылмыш гыжылар исә инди дә мүх-тәлиф морфоложи вэ эколожи фор-маларда яшамагдадыр.

Бу синфин характер хусусийәт-ләриндән бири онларын ириярпаглы (макрофилия) олмасыдыр. Сонунчу-лар, чох вахт мүрәккәб олуб, көвдә-ләри нисбәтән гысадыр вэ буғумлары зәиф инкишаф әтмишдир. Оун баш-лыча сыралары; корамал отла-ры (*Ophioglossales*) вэ һәгиги гы-жылар (*Filicales*)дыр.

КОРАМАЛ ОТЛАРЫ (*Ophioglossales*) СЫРАСЫ

Сыранын нүмайәндәләринин про-галы чохилликдир, торпағын алтында әмәлә кәлдийинә көрә яшыл олмур вэ чох вахт көбәләк һифләрилә мүш-тәрәк (симбиоз) һәят кечирир. Чинси органлары проталын үст тәрәфиндә, я да һәр ики тәрәфиндә әмәлә кәлир. Спорофитин рүшейми торпаг алтында яшайыр. Спорофитләри хырда отлар-дыр, үфүги вэ я чәпинә инкишаф әтмиш көкүмсов көвдәси вардыр. Ярпаглары ики чүр олуб, бир гисми спор верир, галанлары исә векетатив ярпаг олараг галыр. Спор верәнләр

бәситдир, я да бармагшәкилли вэ я ләләкшәкилли бөлүнмүшдүр.

Бу сонунчуларда спор верән һиссә нисбәтән садәләшмиш олур. Ярпаглары, чаван икән азча гыврылмыш олур. Споранкиялары ярпағын спор верән һиссәсинин кәнарларында әмәлә кәлир. Спо-ранкиялар етишән заман энинә партлайыб ачылыр вэ һалгасыз олур.

Һәмин сыранын ялныз бирчә корамал оту фәсиләси (*Ophioglossaceae*) вардыр. О да *Ophioglossum*, *Batrychium*, *Helmitostachys* чинсләриндән ибарәтдир, биринчи икинчили олуб тәкчә бир нөвүнә Азәрбайчанда раст кәлинир.

Корамал оту (*Ophioglossaceae*) фәсиләси


Бу фәсиләйә анчаг бир чинс аиддир. Һәмин чинсин дә 32 нө-вүндән бирчә нөвү *O. vulgatum* Азәрбайчанын Хачмас, Губа, Шамахи вэ Ләнкәран районларында мешәләрдә яйылмышдыр шәкил 155, 1).

Корамал оту 15—30 см һүндүрлүкдә хырда биткидир. Оун гыса вэ чәп олан көкүмсов көвдәсиндән янлара әмичи телләри олмаян гыса көкләр айрылыр. Көкүмсов көвдәдән ер үзәриндә ики һиссәйә бөлүнмүш бир ярпаг чыхыр ки, оун да бири спор ве-рән, дикәри исә векетативдир. Спор вермәйәни овал шәклиндә олуб, бир гәдәр әтли аялыдыр. Спор верәни исә, векетатив һис-сәдән узун олуб, тәпәсиндә хырда хәтвари сүнбүлчүйү вардыр. Һәмин һиссә бир-биринә гарышмыш ики чәркә споранкиядан әмә-лә кәлмишдир. Бу биткинин ярпаглары узун мүддәт (4—5 ил әрзиндә) тәдричән инкишаф эдир.

Корамал отунун споранкиялары чох ири олуб, күрәви шәкил-дәдир. Спорларын һамысы бир бөйүклүкдә вэ әйни шәкилдәдир. Проталлары харичи көрүнүшү вэ яшайышына көрә бә'зи плаунла-ры хатырладыр. О, торпаг алтында яшайыб сохулчан (яғыш гур-ду) шәклиндә олур. Чинси органлары проталын кәнарларында ерләшир. Антеридиялары ири вэ күрәви олуб, проталын тохума-лары арасында ерләшмишдир. Онларын ичиндә чохгамчылы спер-матозоидләр әмәлә кәлир.

Архегониялары проталын ичиндә ерләшсә дә, боғазы бир гә-дәр харичә чыхыр. Адәтән гарынчыг һиссәсиндә юмурта һүчей-рәси олур ки, о да маяландыгдан сонра рүшейм әмәлә кәтирир. Рүшейм әввәлләр проталын дахилиндә олур, сонралар исә харичә чыхыб корамал отуну әмәлә кәтирир. Корамал оту спорлардан башга бир дә векетатив үсулла чохалыр. Оун көкләри үзәриндә әләвә тумурчуглар әмәлә кәлир ки, онлар да көкүмсов көвдәдән айрылыб чүчәрдикдә ени корамал оту верир.

Корамал оту фәсиләсинин башга бир чинси *Botrychium* -дир ки, оун да бүтүн дүняда яйылмыш 34 нөвүндән бир нөвү *B. lunaria* Азәрбайчанын Гарабаг вэ Ләнкәран районларында алп вэ субалп чәмәнләриндә яйылмышдыр. Бу битки корамал отундан ярпағынын спор верән һиссәсинин шахәләнмәсилә фәрг-



Шәкил 154. Каламит

Даш көмүр дөврүнүн үст гат-ларыннан тапылмыш битки-нин бәрпа әдилмиш көрүнүшү

ленир. Бу битки аз-чох будагланандыр вә гыса будагларынын тәпәләрində споранкиялар ерләшир. Споранкиялар гыса аягчыглар үзәриндә отуруп. Векетатив һиссәси ләләкшәкилли вә я мүрәккәбләләкшәкилли бөлүнмүш олур (шәкил 155, 2, 3, 4).



Шәкил 155. Қорамал оту фәсиләсинин (*Ophioglossaceae*) мүхтәлиф нөвләри.

1—*O. vulgatum*, 2—*Batrachium Matricariae* 3—*B. lunaria* 4—*B. virginianum*

МАРАТТИЛӘР (*Marattiales*) СЫРАСЫ

Мараттиләрин бүтүн нүмайәндәләри хариҗи көрүнүшчә һәгиги гыжыларә охшасалар да, ашағыда кәстәрилән бир нечә хусусийәтләри илә онлардан фәргләнир. Мараттиләрдә споранкия-

нын дивары чоҗатлы олдуғу һалда, һәгиги гыжыларда бирҗатлыдыр.

Бу сыранын нүмайәндәләриндә споранкиялар чох вахт бир-биринә бирләшәрәк синанкия әмәлә кәтирир. Һәгиги гыжыларә нисбәтән һаметофит даһа чох инкишаф этмишдир, лакин гурулуш вә формалары илә фәргләнмир. Антеридия вә архегониялары проталын тохумасы ичәрисиндә олур.

Бу сыранын маратти фәсиләси (*Marattiaceae*) ашағыдакы 5 чинси әһатә эдир: *Kaulfussia*, *Archangiopteris*, *Angiopteris*, *Danaea* вә *Marattia*. Маратти фәсиләси нүмайәндәләринин ярпаглары ири ләләкшәкилли вә я бармагшәкилли мүрәккәб олур. Бу ярпаглар ералты көвдәләрдән әмәлә кәлиб, бә'зән чох ири олур. Мәсәлән *Angiopteris* ин ярпагларынын әни вә узунлуғу тәхминән бир метрә яхындыр. Онларын саплагларынын дибиндә ики ярпагалтылығы вардыр. Споранкиялар ярпагларын алтынды соруслар әмәлә кәтирир. *Angiopteris* вә *Archangiopteris*-дә соруслар сәрбәст олдуғу һалда, галан чинсләрдә бирләшиб синанкия әмәлә кәтирир. Дикәр чинсләр синанкиянын формасы вә споранкияларын ачылма хусусийәтләрилә бир-бириндән фәргләнир. Бунлар тропик вә субтропик өлкәләрдә яйылмыш биткиләрдир.

ҺӘГИГИ ГЫЖЫЛАР (*Filicales*) СЫРАСЫ


Ярпаглары нөвбәли дүзүлмәклә, узун мүддәт тәпәдән бой атыб бөйүйүр вә чаван икән илбиз кими гыврылмыш олур. Гыжыларын ярпагларыны башга али биткиләрин ярпагларынын һомоложиси һесаб этмәк олмаз. Онлар һәгиги ярпаглар кими дибдән дейил, көвдәләрдә олдуғу кими учдан бөйүйүр. Ярпагларын голтуғунда һеч вахт тумурчуг олмур. Буна көрә дә онлар я стыбудаг (вай) адландырылыр. Бу ярпаглар чох инкишаф этмишдир вә мүрәккәб гурулушлудур. Көвдәләри нисбәтән гыса вә зәиф буғумлудур. Споранкияларын дивары бирҗатдыр вә чох вахт онларда хусуси һалгалар олур. Проталлары ерин үзүндә яшайыр, яшыл рәнkdә вә лөвһә шәклиндәдир.

Бу сыра ики ярымсыраә бөлүнүр: хусуси гыжылар (*Eufilicales*), су гыжылары (*Hydropterides*). Бә'зән биринчиләр эйни спорлу, икинчиләр исә—мүхтәлиф спорлу гыжы адландырылыр.

ХУСУСИ ГЫЖЫЛАР (*Eufilicales*) ЯРЫМСЫРАСЫ

Мешәләримиздә яйылмыш эркәк гыжыны (*Dryopteris filixmas*) буна мисал кәстәрмәк олар (шәкил 156), Онун көкүмсов көвдәсинин тәпәсиндән сых, әнли вә мүрәккәб гурулушлу ярпаглар чыхыр. Көкүмсов көвдәси торпағын үзүнә яхын һиссәдә үфүги вәзийәтдә ерләшир, гыса лакин йоғун олуб, гара вә я гонур рәнkdәдир. Йоғунлуғунун сәбәбләриндән бири ярпаг саплағы га-

лыгларынын илдән илэ үзәриндә топлашмасыдыр. Ярпагларыны һәр ил пайызда төкүр, онларын ялныз ералты саплаг һиссәләри галыр. Һәр ил яз фәслиндә көкүмсов көвдәнин тәпәсиндәки бой



Шәкил 156. Эркәк гыжы *Dryopteris (Aspidium filix mas)*.

1—биткнннн харичи көрүнүшү; 2—пулчуу; 3—ярпаг парчасынын алт һиссәси соруслары илэ; 4—сорус; 5—спорлары; сәпәләнә ачылмыш споранкия; 6—өртүк (индузиум); 7—спор.

нөгтәсиндән ени ярпаг дәстәләри эмәлә кәлир. Торпаг алтындан чыхан чаван ярпаглар илбиз шәклиндә гыврылмыш вә үзәри гонур рәнкли пулчугларла сых өртүлмүш олур. Ярпаглары чох яваш бөйүрәк ялныз үч илдән сонра тамам инкишаф әдир. Тамам инкишаф әтмиш ярпагларын узунлуғу 1 метрә чатыр вә ики-

гат ләләкшәкилли парчаланмыш олур. Көкүмсов көвдәдән бир чох инчә көк эмәлә кәлир.

Яй фәслинин орталарында ярпағын алт сәтһиндә соруслар, онларын ичәрисиндә споранкиялар вә бу ахырынчыларын да ичәрисиндә спорлар эмәлә кәлир. Споранкиялар юваларда дәстә илэ ерләшдийи үчүн онлара соруслар дейилир. Соруслар ярпағын орта дамары боюнча ики сыра дүзүлмүшдүр вә ярпағы чырмыш кими керүнүр. Һәр сорус үстдән бөйрәкшәкилли инчә өртүклә өртүлү олур ки, она индузиум дейилир. Ади көзлә бахдыгда соруслар бөйрәкшәкилли юрулара охшайыр. Споранкиялар янлардан сыхылмыш даирәви гутучуглардан ибарәтдир. Онларын һәр биринин өзүнә мәхсус аягычыгы вардыр. Споранкиянын дивары бир гат инчә гылафлы һүчейрәләрдән тәшкил олунмушдур. Споранкиянын дарағында бир гат һүчейрә ерләшмишдир ки, онларын да диварлары чох галынлашмышдыр, рәнкләри исә гызылы-гонурдур. Һәмин һиссәйә һалга дейилир.

Эркәк гыжынын һалгасы бүтөв олмайыб споранкия даирәсинин тәхминән $\frac{2}{3}$ һиссәсини тәшкил әдир, ердә галаһ һиссәси исә инчә диварлы һүчейрәләрдән ибарәтдир.

Споранкия етишән заман инчә ериндән партлайыр. Һәмин ерә ағызчыг (*Stomium*) дейилир. Спорлар бу ағызчыгдан харичә чыхыр. Һәр спор бирһүчейрәли олуб, дивары галындыр вә үзәри кәлә-көтүр гара габыгла өртүлмүш олур. Һалга споранкиянын ачылмасы вә спорларын яйылмасы үчүн бир уйғунлашмадыр.


Эркәк гыжынын спору әлверишли мүнитә дүшдүкдә чүчәрәрәк проталын вә я һаметофитин башлангычыны эмәлә кәтирир. Протал 2,10 мм эниндә инчә, яшыл рәнкли, үрәк шәкилли лөвһәдән ибарәтдир (шәкил 157 А). Хлорофиллә зәнкин олан бир гат һүчейрәләрдән эмәлә кәлмишдир, ялныз орта һиссәсиндә бир нечә гат һүчейрә вардыр. Проталын алт сәтһиндән бир нечә ризоид эмәлә кәлир ки, онларын васитәсилә дә о, торпаға бирләшир.

Чинси органлар—антеридия вә архегониялар, проталын алт сәтһиндә эмәлә кәлир; антеридиялар чох вахт дал тәрәфдә ризоидләр арасында, архегониялар исә бир гәдәр юхары габаг тәрәфдә эмәлә кәлир. Антеридия күрәви олуб, дивары биртәбәгәлидир. Дахилиндә спермакән һүчейрәләр олур ки, онлардан да сперматозоидләр эмәлә кәлир. Антеридиялар яғышда вә я да чох шәһ дүшдүкдә ачылыр. Онлар учдан партлайыр вә эмәлә кәлән дәликдән сперматозоидләр чыхыб суя төкүлүр. Сперматозоидләр бурғу шәклиндә олуб, өн тәрәфдән дәстә һалында гамчылары вардыр. Һәмин гамчылар васитәсилә суда һәрәкәт әдир. Сперматозоидин архә тәрәфиндә парлаг говуг вардыр. О, спермакән һүчейрә плазмасынын галығыдыр.

Архегониясы ади бутулка формасында олуб, гарын һиссәсилә проталын тохумасына кирмишдир, ялныз гыса бораз һиссәси харичә чыхыр.

Архегониянын гарын хиссэсиндэ юмурта хүчэйрэси ерлэшир, юмурта хүчэйрэсинин үстүндэ гарын канал хүчэйрэси олур; богаз хиссэсиндэ исэ чох вахт бир-бирилэ гарышан богаз канал хүчэйрэлэри ерлэшир. Архегония етишэн заман тэпэдэн ачылыр вэ канал хүчэйрэлэри һэлл олараг селийэ чеврилир. Сперматозоид бу селик васитэсилэ һэрэкэт эдэрэк юмурта хүчэйрэсинэ чатыр вэ ону маялайыр. Маяланмыш юмурта хүчэйрэси бөлүнэрэк, нэтичэдэ рүшейм башлангычыны верир. Рүшеймдэ көк, көвдэ, ярпаг вэ хүсуси аягчыг олур ки, онун васитэсилэ проталла бирлэшир. Чүчүрдикдэн сонра рүшейм мүстэгил олараг яшамаға башлайыр, протал исэ тэдричэн өлүр.

Бу дейилэнлөрдөн мэлүм олур ки, эркэк гыжынын да инкишаф дөврүндэ нэсли нөвбэлэшир. Гыжы биткиси гейри-чинси (спорофит) нэслдир, чүнки һамин нэслдэ гейри-чинси чохалмаг үчүн спорлар эмэлэ кэлир, протал исэ чинси нэсл олуб һаметофит адланыр, чүнки онда чинси органлар-антеридия вэ архегониялар эмэлэ кэлир. Спорофитин хүчэйрэлэри диплоид нүвэли, һаметофитин хүчэйрэлэри исэ һаплоид нүвэли олур. Хромозомлар спор эмэлэ кэлдийи заман йә'ни спорларын ана хүчэйрэлэринин нүвэлэри бөлүндүкдэ азалыр, маяланма заманы исэ артыр.



Шәкил 157. Гыжынын проталы.

А—алтдан көрүнүшү; В—энинэ көспийи; ан—антеридия; ар—архегония.

Эркэк гыжынын (*Dryopteris filix mas*) көкүмсов көвдэсиндэ филмарон маддэси вардыр ки, ондан табабэтдэ лентвари гурдлары төкмөк үчүн истифаде олунур. Эркэк гыжы Гафгаз вэ хүсусән Азәрбайжан мешәләриндэ кениш яйылмышдыр вэ өлкәмиздә онун чох бөйүк әһәмиийәти вардыр. Бу да өлкәнин филмарона олан төләбатыны тамамилә тәмин эдә билир.

Бундан башга гыжыларын чохунун көкүмсов көвдэсиндә олдуғу кими һамин биткидә дә 7—8% ашы маддэси вардыр. Бу ашы маддэси дәрини тэдричән ашылайыб она сары рәнк верир.

Һәгити гыжылар (*Filicales*) сырасынын 134 чинси вэ 6000-ә яхын нөвү вардыр. Онлар бүтүн дүня үзәриндә яйылмышдыр. Онун типик нүмайәндәләри рүтубәтли ерләрдә вэ башлыча олараг субтропик вэ мө'тәдил иглимли мешәләрдә битир.

Һәгити гыжыларын ичәрисиндә ксерофил формалар да вардыр.

Гыжылар бойлары вэ заһири көрүнүшләринә керә чох мүхтәлиф олур. Онлардан бә'зиләри ади көзлә чәтинликлә көрүнүр вэ бойлары миллиметр илә өлчүлүр. Бунлара мисал *Trichomanes* *Goeblianum* вэ *Tr. microphyllum* көстөрмөк олар. Бу гыжылар мамырларын арасында кизләнмиш һалда битир. Дикәр тәрәфдән ири ағач шәклиндә оланлары да вардыр, мәсәлән, *Alsophila* вэ *Dicksonia* 25 м һүндүрлүкдә олуб, Австралия вэ Ени Зелландияда бир сыра дағ мешәләри эмәлә кәтирмишдир.

Гыжыларын чоху үфүги вәзийәтдә сүрүнән көкүмсов көвдәли от биткиләридир. Онлардан бир чохунун көвдэси чүрбәчүр шәкилләрдә олур. Бунун сәбәби дә онларын һәят шәраитидир. Мәсәлән, субтропик өлкәләрдә битән гыжылар арасында лиан кими сармашанлары да аз дейилдир.

Кечмиш кеоложи дөврләрдә, хүсусән даш көмүр дөврүндә ағачшәкилли гыжылар чох кениш яйылмыш, Онларын галыглары Донбасда, Кузбасда вэ саир ерләрдә даш көмүр тәбәгәләриндә раст кәлир. Даш көмүр дөврү гыжыларынын газынты һалында чыхан ярпаг вэ көвдәләринин галыглары көстөрир ки, о заман олдуғча ири вэ яхшы инкишаф этмиш мүхтәлиф гыжы формалары олмушдур. Мүасир гыжыларын әксәрийәти хырда биткиләр олуб гаранлыг мешәләрдә, гаяларда вэ ағачларын көвдэсиндә битир. Ағачларын көвдә вэ будагларында эпифит һалда яшайи гыжылар ән чох тропик өлкәләрдәдир. Бундан башга, бир гәдәр рүтубәтли өлкәләрдә мәсәлән, Асиянын шәргиндә, ССРИ-дә, Узаг Шәргин дәниз саһилләриндә, Загафгазиянын Ләнкәран вэ



Шәкил 158. *Cystopteris bulbifera* гыжысынын ярпагшәкилли көвдәләри үзәриндә эмәләкәлән элавә тумурчуглар.

Колхида эразисиндә раст кәлир. Бәзиләринин көвдәләринин үзәри һава көкләри илә өртүлмүшдүр ки, онларын васитәсилә һавадан рүтубәт алыр. Ағачшәкилли ғыжыларын көвдәләри будагланмыр, үмумийәтлә ғыжыларда будагланма чох зәифдир. Онларда тумурчуг эмәлә кәлирсә дә бу тумурчуглар али биткиләрдә олдуғу кими ярпағын толтуғундан дейил, көвдәнин башга һиссәләриндән чыхыр. Бәзи ғыжыларда, мәсәлән, *Asplenium viviparum* нөвүндә ярпаглар үзәриндә әләвә тумурчуглар эмәлә кәлир вә битки онларын васитәсилә векетатив сурәтдә чохалыр.

Бәзән ярпаг шәкилли көвдәләри үзәриндә эмәлә кәлән әләвә тумурчуглар соғанак кими айрылыб дүшәрәк, чүчәриб ени битки верир. Буну, *Cystopteris bulbifera* нөвүндә мүшәһидә этмәк олар (шәкил 158).

СУ ГЫЖЫЛАРЫ ВӘ Я МҮХТӘЛИФ СПОРЛУ ГЫЖЫЛАР (Hydropterides) ЯРЫМСЫРАСЫ

Бу ярымсыранын нүмайәндәләри суда вә батаглыкта яшайыр. Онларын микро вә мегаспоранкия адланан ики чүр споранкия эмәлә кәтирмәси ән характер хусусийәтләридир. Микропоранкияларда чохлу мигдарда хырда, мегаспоранкияда исә ялныз бир ири мегаспор эмәлә кәлир. Споранкиялар вә соруслар хусуси «мейвә» һиссәсиндә олур ки, она спорокарпия дейилер.

Микроспорлар чүчәрән заман һәр бириндә бир әдәд, чох ихтисар олунмуш эркәк проталы кәчишаф әдир. Һәмин проталда ялныз антеридия эмәлә кәлир. Мегаспордан хырда диши проталы яраныр. Һәмин проталда ялныз архегония эмәлә кәлир.


Бу ярым сырая салвиния (*Salviniaceae*) марсилия (*Marsiliaceae*) олмагла ики фәсилә дахилдир.

Салвиниялар (*Salviniaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин Азәрбайҗанда ялныз *Salvinia* чинси вә онунда бирчә үзән салвиния (*S. natans*) нөвү раст кәлир. О, Нуха, Варташен, Гутгашын, Загатала, Кировабад, Ләнкәран районларында дурғун суларда вә чәлтик зәмиләриндә битән чох зиянкар алағ отудур. Үзән салвиния ССРИ-нин чәнуб районларында, күлли мигдарда тәсадүф әдилир. О, суда үзән хырда биткидир (шәкил 159). Онун суда үфүги вәзийәтдә узанан инчә көвдәси үзәриндә үч-үч дүзүлмүш ярпаглардан икиси суюн үзүндә, үчүнчүсү исә суюн ичиндә ерләшир. Суда үзән ярпаглары бүтөв вә юмурташәкилли олуб, ғыса саплагчыгла көвдәйә бирләшмишдир. Яшыл рәнkdә олан үст сәтһи әмзикләрлә, алт сәтһи исә гонур түкчүкләрлә өртүлмүшдүр. Суюн алтында галан ярпаглары сап кими узун һиссәләрә бөлүнмүшдүр вә үзәри ғыса түкләрлә сых өртүлмүшдүр. Бу ахырынчылар көкә охшайыр,

лакин көк дейилдир. Онларда һәгиги көк олмур. Мега вә микропоранкиялар һәмин суалты ярпагларын ғысалмыш һиссәләриндә спорокарпия ичәрисиндә эмәлә кәлир.

Споранкиянын аягчығы спорокарпиянын ичәрисинә кирир вә орада санчаг башы шәкилдә шишәрәк пласента эмәлә кәтирир. Пласентанын үзәриндә мега вә микропоранкиялар эмәлә кәлир. Микро вә мегаспоранкиялар айры-айры сорусларда олур.



Шәкил 159. Үзән салвиния (*Salvinia natans*).

1—үмуми көрүнүшү; 2—ярпаглы вә споранкиялы блә һиссә; 3—мега—вә микропоранкияларынын кәсийи; 4—архегония; 5—диши проталы; 6—чапан спорифитли диши проталы

Микроспоранкия күрәви шәкилдәдир, дивары биртәбәгәлидир вә инчә узун аягчыг үзәриндә ерләшмишдир. Онун ичиндә чохлу мигдарда микроспор олур. Мегаспоранкиялар микроспоранкиялардан даһа ирьдир вә овал шәкилдәдир. Диварлары биргәтлыдыр вә һалгасыздыр. Мегаспоранкияда ялныз бирчә мегаспор олур. Микроспор етишән заман микроспоранкиянын диварыны дешәрәк харичә чыхыр вә чүчәриб эркәк проталы эмәлә кәтирир.

Чох кичилмиш эркэк проталын векетатив хиссәси ялныз ики һүңейрәдән ибарәт олур проталын ашағысында ерләшмишдир. Проталын юхары хиссәсиндә ики антеридия олур ки, онларын да һәрәсиндән дөрд сперматозоид әмәлә кәлир. Мегаспордан диши проталы әмәлә кәлир. О, хырда үчбучаг шәклиндәдир вә һәмишә мегаспорла бирләшмиш һалда олур. Онун сәтһиндә ади типли архегония әмәлә кәлир. Маяланан юмурта һүңейрәси ени спорофит верир.

Марсилия (*Marsiliaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин бир чинси марсилиядыр (*Marsilia*) Бүтүн дүняда онун 50-йә гәдәр нөвү мәлумдур.

Азәрбайчанын аран районларында хусусән чәлтик әкини сәһәләриндә, баталыг ерләрдә дөрд ярпаг марсилия (*M. quadrifolia*) адланан нөвү битир; бу нөв Волганын ашағыларында вә Шимали Гафгазда бә'зән кениш сәһәләрдә битәрәк чәмән әмәлә кәтирир (шәкил 160).


Дөрдярпаг марсилиянын көвдәси узун вә сүрүнәндир. Онун алт хиссәсиндә дәстә һалында көкләр әмәлә кәлир. Ярпагларын аясы узун саплаглар үзәриндә дөрд ярпагыдан ибарәтдир. Гаранлыгда ярпаглары илбиз шәклиндә йығылыр.

Марсилия фәсиләсинин (*Marsiliaceae*) салвиния фәсиләсиндән (*Salviniaceae*) фәрги споранкиясынын ики вә я чохсоруслу олмасыдыр. Бунларын арасындакы башга бир фәрг дә ондан ибарәтдир ки, споранкиянын дивары *Salviniaceae* фәсиләсиндә олдуғу кими, сорусу өртүйүнүн һомоложиси дейилдир, ярпағын там бир дилиминдән әмәлә кәлмиш төрәмәләр, сорусу хусуси ярпаға бүрүнәрәк спорокарпияны әмәлә кәтирмишдир, беләликлә о, саплаг үзәриндә даянан пахлая охшайыр. Бу саплаг чох вахт ярпағын саплағы илә битишир. Бә'зи нөвләрин спорокарпиясы ейлир. Спорокарпиянын ичиндәки соруслар, суда шишән хусуси юмшаг тохума илә әһәтә олунмушдур. Етишмиш споранкиянын сәрт габығы узунуна чатлаяраг ики хиссәйә бөлүнүр вә ондан селикли узун чыхынты айрылыр ки, онун да янларында соруслар олур. һәр сорус инчә өртүклә өртүлмүшдүр. Онларын дахилиндә мегаспоранкиялар ерләшир. Микроспоранкияда 64 микроспор олдуғу һалда мегаспоранкияда ялныз бирчә мегаспор олур.

Марсилиянын микроспору чүчәрән заман әввәлчә 3 протал һүңейрәсинә бөлүнүр. Онун юхарыдакы һүңейрәсиндән аракәсмә васитәсилә бөлүнмә нәтижәсиндә енә бир һүңейрә әмәлә кәлир. Бу һүңейрә илә ашағыдакы һүңейрә мәһсулсуз галыр, сонралар ашағыдакындан бир балача һүңейрә айрылараг рудимент һалда ризонд чыхарыр. Ортадакы ики һүңейрәдән аракәсмә васитәсилә бир антеридиянын ана һүңейрәләри айрылыр; бунларын да һәр

бири дивар вә антеридия һүңейрәләринә бөлүнүр. Антеридиядан 16 сперматозоид әмәлә кәлир.


Беләликлә, марсилиянын эркэк проталынын 8 һүңейрәсиндән 6-сы мәһсулсуз олур, 2-си исә антеридиялар әмәлә кәтирир. Онун диши проталы исә бирчә архегония әмәлә кәтирир. Лакин диши проталы эркэк проталына нисбәтән чох ири вә гүввәтли олур. Ди-



Шәкил 160. Дөрдярпаг марсилия (*Marsilla quadrifolia*).

ши проталы мегаспору дешиб чөлө чыхар вэ өз инкишафыны да-
вам этдирир (шәкил 161).

Мүхтәлиф спорлу гыжыларын өйрәнилмәсиндә Беляев вэ Ар-
нолдун классик тәдгигатынын чох бөйүк әһәмиһәти вардыр. Беля-
ев өзүнүн морфоложи-анатомик тәдгигатында «архегониялы-
ларын» вэ хусусән мүхтәлиф спорлу плаункимиләрин, су гыжыла-
рынын, һәмчинин чыплагтохумлуларын эркәк чинси нәслинин ин-
кишафыны әтрафлы өйрәнәрәк сүбүт әтмишдир ки, гыжыларын,



Шәкил 161. Дәрдярпаг марсилиянын (*Marsilia quadrifolia*)
чынсы органлары.

1—диши проталы; архегония; 2—спорокарпиянын энинә кәсийи;
3—4—спорокарпиянын ачылышы.

гатыргуйрутларын (әлчә дә хара йосунларынын) сперматозонд-
ләри ялныз бирчә нүвәдән ибарәт олмайыб, онларда протоплаз-
ма да вардыр.

Арнолд мүхтәлиф спорлуларда архегонияларын—диши чинси
нәслинин инкишафыны да өйрәнмишдир.

ЧЫЛПАГТОХУМЛУЛАР (*Gymnospermae*) СИНФИ

Тохумлу биткиләр әсасән ики ерә бөлүнүр: чыплагтохум-
лулар вэ өртүлү тохумлулар. Чыплагтохумлулар нә-
тәркиби әтибарилә нисбәтән аз, өртүлүтохумлулар исә чохдур.
Чыплагтохумлулар архегониялы, биткиләрдир.

Тохум, һәр шейдән әввәл, ән тәкамүл әтмиш чохалма васитә-
сидир. Тохум, маяланмадан сонра тохумлуғун инкишафындан
әмәлә кәлир, тохумлуг исә өртүклә өртүлмүш вэ бир мегаспору
олан мегаспоранкиядыр. Һәмин өртүк мегаспору тамамилә өрт-
мүр вэ онун бир тәрәфиндә дешик шәклиндә ачыглыг галыр ки,
она тохум йолу (тоз йолу) вэ я микропилия дейилир.

Чыплагтохумлуларда тохумлуг вэ маяландыгдан сонра ондан
әмәлә кәлән тохум, билаваситә спор ярпағынын (спорофилин)
үзәриндә, ачыгда олур, бунунла да онлар өртүлү тохумлулардан
фәргләнир.


Сон заманлара гәдәр күман эдилирди ки, тохумлу биткиләр
гыжыкимиләрә нисбәтән тарих әтибарилә даһа чаван битки-
ләрдир. Онларын әмәлә кәлмәсини мезозой дөврүнүн ахырлары-
на аид эдирдиләр. Лакин даш көмүр дөврүнүн галыгларында гы-
жы кимиләрлә бирликдә чыплагтохумлуларын да галыглары
тапылмышдыр. Мәлүм олмушдур ки, ярпагларынын гурулушуна
көрә гыжы һесаб эдилән вэ палеонтоложик галыг шәклиндә тапы-
лан биткиләрин бир гисми, мәсәлән тохумлу гыжы олан
Pteridospermae вэ *Cycadofitiales* эйни заманда тохумлу
битки имиш. Онлар мүхтәлиф спорлу гыжылардан әмәлә кәл-
мишдир. Бундан башга ликопсидалар филокенетик әлагәдар
олан вэ газынты һалында тапылан тохумлу плаунлар (*Lepi-
dospermales*) да тохумлу биткиләрдир.

Чыплагтохумлулар синфи 7 әсас сырая бөлүнүр:

1. Тохумлу гыжылар (*Pteridospermae*),
2. Саговникләр (*Cycadales*),
3. Беннеттитләр (*Bennettitales*),
4. Кинкголар (*Ginkgoales*),
5. Кордаитләр (*Cordaitales*),
6. Ийнәярпаглылар (*Coniferales*),
7. Гырхбуғумкимиләр (*Gnetales*).

Тохумлу гыжылар (*Pteridospermae*) сырасы Палеозой
дөврүндә кениш яйылмыш олан тохумлу гыжыларын көвдәси ин-
чә вэ узун, ярпаглы ири, чох заман шахәләнмиш, бәзиләри дыр-
манан гыжыларә охшар ағач вэ лиан имиш. Онлар мүхтәлиф
спорлу олуб тохум васитәсилә чохалырмыш. Спор ярпаглары чох
вахт өзүнүн ади ярпагларындан фәргли имиш.

Тохумлу гыжыларә *Pteridospermae* -ны мисал кәс-
тәрмәк олар. Онун көвдәси инчә, узун вэ үзәри ашағыя әйилмиш
тиканларла өртүлү имиш. Көвдәсиндә икигәт ләләквари мүрәккәб
ири ярпаглар вар имиш. Көвдәсинин ичиндә чох инкишаф әтмиш
өзәк вар имиш вэ камбия тәбәгәси олдуғуна көрә икинчи йоғун-
лашма хусусийәти дашыйырмыш. Икинчи одунчағы индики
чыплагтохумлуларда олдуғу кими трахеидләрдән ибарәт имиш.
Zyginopteris -дә микро вэ мегаспоранкиялар вар имиш. Мик-
роспоранкиялары әлчә дә ади векетатив ярпаглары садә анато-
мик гурулушда имиш. Онларын айры-айры ярпагчылары галхан-



Шәкил 162. Юхарыда—газынты һалында тапылан *Luginopteris aldhamia* биткисинин бир һиссәси. Ашағыда—1—тохумлуғлу бир будағы; 2—«чанаһа» бүрүнмүш айрыҭа тохумлуғу.

чығлара чеврилмишдир, онларын да алт сәтһи үзәриндә узунуна дүзүлмүш 6—7 әдәд икиювалы микроспоранкия ерләширмиш. Микроспоранкиялар микроспорларла долу имиш. Мегаспоранкия тохумлуғ ролуну ойнайырмыш. Тохумлуғу индики саговникләрин тохумлуғуна охшайырмыш. Ону харичдән үзәри вәзили түкләрлә өртүлү олан «чанаһлар» әһатә әдирмиш. Тохумлуғун ичиндә бир әдәд ири мегаспор олурмуш. Көрүнүр ки, мегаспордан диши проталы әмәлә кәлирмиш. Мегаспору галын диварлы мегаспоранкия өртүйү вә я интегумент әһатә әдирмиш вә онунла битишик имиш. Тохумлуғун тәпәсиндә тоз ювачығы ерләширмиш. Маяландыгдан сонра тохумлуғдан тохум инкишаф әдирмиш.

САГОВНИКЛӘР (*Cycadales*) СЫРАСЫ



Тохумлу гыжыларын сонракы тәкамүл хәтти саговникләри ортая чыхармышдыр. Онлар тохумлу гыжылардан спорофилләринин шиддәтли метаморфоза уғрамасы илә фәргленир. Һәммин биткиләр илк дәфә перм дөврүндә әмәлә кәлмиш вә ән чох мезозой дөврүндә инкишаф этмишдир. Саговникләр инди анчаг тропик вә субтропик өлкәләрдә раст кәлир.

Саговникләрин чоху нисбәтән ғыса, йоғун, будагланмаян көвдәлидир. Үзәрләри төкүлмүш көһнә ярпагларын изләрилә өртүлмүшдүр. Көвдәләри чох аз һалларда будагланыр. Көвдәләринин тәпәсиндә тәчшәкилли, топа илә чыхмыш дәривари, ләләкшәкилли, чох ири, яшыл ярпаглар олур. Онларын ортасында пулчугшәкилли диб ярпагларына бүрүнмүш бой нөгтәси ерләшир. Тумурчуғун ичәрисиндәки чаван ярпаглар, гыжыдакы кими, илбиз шәкилдә гывырлымыш олур.

Саговникләр һәмишәяшыл биткиләрдир; ени ярпаглары һәр ил вә я ики илдән бир әмәлә кәлир. Онлар бир тәрәфдән ағач шәкилли гыжылара, диһәр тәрәфдән исә палмалара охшайыр. Микроспоранкиялары, хусуси гозалара топланмыш пулчугшәкилли микроспорофилләрдән ибарәтдир. Мегаспоранкиялары (тохумлуғлары) мегаспорофилләрин кәнарында ерләшир, я да пулчугшәкилли мегаспорофилдә олуб гозалар әмәлә кәтирир.


Бу сыранын бир нүмайәндәси олараг сикас (*Cycas*) чинсинин *C. revoluta* нөвүнү көстәрмәк олар. Онун көвдәсинин дахили гурулушу-мүрәккәб олуб, тәхминән 1 м йоғунлуғдадыр. Саго маддәси алыннан чох инкишаф этмиш өзәйи вә габығы илә һабелә нисбәтән зәиф инкишаф әдиб трахедләрдән әмәлә кәлмиш одунчағы илә характеризә олунур (шәкил 163).

Саговникин көвдәсиндә икинчи йоғунлашма габилийәти вардыр. Онларын тохумлуғлары етишәндә кавалы бөйүклүкдә олур (шәкил 164). Тохумлуғун мәркәзи һиссәси (инчә диварлы һиссәси) хусуси тохума—эндосперм вә я протал илә долудур; онун юхары һиссәсиндә ики архегониясы вардыр. Эндосперм хырда




Шәкил 163.
1, 2, 3 сикасын (*Cycas*) мұхтәлиф нөвләринин мегаспорофилләри; 4—5 микроспорофилләри; 6—микроспоранкиялары.

һүңейрәләри тохума илә әһатә әдилмишдир ки, она нутселлус дейилир. Ону харичдән интегумент әһатә әтмишдир. Бу ахырынчы үч һиссәдән ибарәтдир: дахилдә—әтли, ортада—даш кими бәрк, харичдә исә—енә әтли һиссә, тохумлуғун тәпәсиндән дар бир канал кечир. О, тоз йәлу вә я микропилиядыр ки, нутселлуса дахил олур. Микропилиянын гаршысында балача бошлут вардыр. Она тоз одачығы дейилир, һәм ин ер, бурада олан нутселлус һиссәсинин тохума һүңейрәләринин әримәси нәтичәсиндә әмәлә кәлән шәкәрли маддә илә долу олур. Тохумлуғун дибиндән бору топалары кирәрәк өртүкдә шахәләнир (шәкил 165).



Шәкил 164. Сикас палмасы тохумлуғунун узунуна кәсийн.



Шәкил 165. Саговникни тохумлуғунун узунуна кәсийн.
1—тозланымчә гәдәр; 2—ики архегония әмәлә кәлмиш һалы; тозланмадан сонра тозчуғларын тохум йолуна дүшәрәк нутселлус тохумасына гаусторияларыны бурахмасы.



Шәкил 166.
Микроспорун үч һүңейрәйә бөлүнмәси

Нутселлус мегаспоранкиянын диварыдыр, эндосперм исә диши һаметофитдир (проталыдыр) вә бир мегаспорун инкишафы нәтичәсиндә әмәлә кәлмишдир. Бурада әмәлә кәлән өртүк—интегумент, башга архегониялыларда көрүнмәдийинә керә ени төрәйишдир. Бүтүн чылпаттохумлуларда олдуғу кими, сикасда да мегаспор һеч заман мегаспоранкиядан айрылмайыб онун ичәриндә чүңәрир. Маяланмыш юурта һүңейрәси онун дахилиндә инкишаф әдир вә тохумлуғу тамамилә тохума чеврилир.

Сикас икиәвли биткидир. Микроспор ярпағларынын һәр бири үчбучаға охшар пулчуғлар шәклиндәдир, микроспоранкиялары микроспор ярпағларынын алт һиссәсиндә соруслара топланмышдыр. Микроспоранкияларын да һәр биринин ичиндә чохлу микроспор (тозчуғ) олур. Тозчуғлар күрәви олуб, харичдән галын габыг (экзина), дахилдән исә ич габыг (интина) илә өртүлмүшдүр. Ичиндә гаты плазмасы вә нүвәси вардыр. Микроспорлар споранкиядә етишидикдән сонра әлә орадача чүңәрмәйә башлайыр. Бу

заман микроспор үч hüчейрәйә бөлүнүр (шәкил 166). Бунлардан нисбәтән кичийн вә микроспорун диварына тәрәф оланы, эркәк проталынын векетатив hüчейрәсидир; икинчиси—антеридия hüчейрәсидир ки, сперматозоиди әмәлә кәтирир; үчүнчүсү исә—тоз борусу вә я гаустория әмәлә кәтирән hüчейрәдир.

Микроспоранкиядан чыхан микроспорлар күләк васитәсилә мегаспоранкиянын үзәринә дүшүр вә микропилия васитәсилә тоз камерасына (адачыға) дахил олур. Бурада, юхарыда гейд этдиймиз үчүнчү hüчейрә тоз борусу әмәлә кәтирир, нутселлусун тохумасына сохулур вә чүчәрмәкдә олан тоз борусуну нутселлусла бирләшдирир (шәкил 167).




Шәкил 167. *Dioon edule* биткисинин архегониясы вә тоз борусу олан тохумлугунун тәпәдән кәсийи.

Бу заман тозчуғун ичиндәки икинчи hüчейрәдән фырфыра шәкиндә вә үзәриндә лентвари дүзүлмүш гамчылары олан ики сперматозоид әмәлә кәлир. Сперматозоид һәмин гамчылар васитәсилә тоз борусунун ичиндә һәрәкәт эдир. Тоз борусу тезликлә учундан партлайыр вә орадан чыхан сперматозоидләр тоз камерасына дүшүб, ону долдуран маедә үзмәйә башлайыр. Бу заман нутселлус тохумасынын позулмасы нәтижәсиндә сперматозоид тоз камерасы илә ирәлиләйиб эндосперм вә архегония чатыр, онун ичинә кирир, юмурта hüчейрәси илә гаршылыгы ассими-

лясия кедир, беләликлә маяланма просеси баша чатыр (шәкил 168).

Маяланмыш hüчейрә дәрһал бөлүнмәйә башлайыр вә юмурта hüчейрәсиндән чох мүрәккәб йолларла рүшейм әмәлә кәлир. Рүшейм эндоспермдә чүчәрир вә онун сонракы инкишафы эндосперм hüчейрәләринин дахилиндәки гита һесабына кедир.



Шәкил 168. Сикас биткисиндә (*Cycas revoluta*) маяланма просеси. Солда—юмурта hüчейрәсинин бир һиссәсинин сперматозоид илә ассимилясия олунмасы; юмурта hüчейрәсинин юхарысында юмурта hüчейрәсини киро битмәйән икинчи бир сперматозоид; сағда—мүхтәлиф маяланма мәрһаләләри.

Өртүк (интегумент) вә нутселлус тохумун габығынын әса-сыны тәшкил эдир.

Юхарыдакы тәсвирдән, сикас биткисиндә чинси нәслин бундан габагкы плаунлара вә гыжылара нисбәтән чох ихтисар эдилдийи айдын көрүнүр. Онун эркәк һаметофити ялыыз үч hüчейрәдән ибарәтдир ки, онларын да бири протала мәхсусдур, икиси исә антеридиялары әвәз эдир. Дишн һаметофити хырда микроскопик hüчейрәләрден ибарәт олуб, бүтүн өмрүнү спорофитин үзәриндә мегаспоранкияда кечирир вә мүстәгил яшамаг габилийәтини артыг итирмишдир.

Бу сыранын бүтүн нүмайәндәләринин инкишаф просесләри бир-биринин эйнидир.

Сикас чинсинин нөвләри Асиянын тропик вә субтропик өлкәләриндә, Полинезияда, Шәрги Африка, Орта Америкада вә Австралияда яйылмышдыр. Бәзи нөвләри сәго маддәси вердийи үчүн вә декоратив битки оларат бечәрилир.

БЕННЕТТИТЛЭР (*Bennettitales*) СЫРАСЫ

Беннеттитлэр мезозой дөврүндә яшамышдыр. Һазырда ялғыз газынты Һалында тапылар. Онларын ән чох инкишаф этдийи дөвр, триасын юхарысындан башлайып та тәбәшир дөврүнүн алт гатына гәдәр давам этмишдир. Илк дәфә палеозоюн ахырларында әмәлә кәлмишдир. Беннеттитләрин нөвләри хейли чох имиш. Харичи көрүнүшчә саговникләрә охшайырлармыш. Онларын да бәзиләринин көвдәси дүз, будагланмаян, бәзиләрининки—гыса, будагланан, бәзиләрининки исә—яланчы будагланан имиш. Көвдәләринин тәпәсиндә вә я будагларында узун ләләкшәкилли вә я бәсит ярпаглары вар имиш. Төкүлмүш ярпагларынын изләри көвдәнин үзәриндә зирәһ әмәлә кәтирirmiш. Анатомик гурулушлары илә онлар саговникләрә охшайырмыш.

Беннеттитләрин вә инди яшаян бәзи саговник нөвләринин көвдәләри үзәриндә, гыжыларын көвдәсиндә көрдүйүмүз пулчугшәкилли түкләр вардыр ки, бу әләмәт саговникләри вә беннеттитләри һәгиги гыжыла а яхылашдыран әләмәтләрдән бири сайыла биләр. Бу әләмәт һәр ики сыранын тәкамүл нәтижәсиндә гыжыкимиләрдән әмәлә кәлдийинә бир сүбүт ола биләр. Ағачшәкилли вә юмрукөвдәли беннеттитләрин ярпаглары көвдәнин үзәриндә нөвбә илә сых дүзүлмүшдүр.

Беннеттитләр мүхтәлиф спорлу биткиләр имиш вә онларын әксәрийәтиндә микроспорофилләр вә мегаспорофилләр эйни биткидә әмәлә кәтирмиш. Көвдәнин метаморфозундан ибарәт олан бу спорофилләр гоза шәклиндә олуп, төкүлмүш ярпагларын дибләри арасында әмәлә кәтирмиш.


Спорофилләр әх үзәриндә отураарак бир чох өртүчү ярпагларла әһатә олунурмуш. Өртүчү ярпаглар охун үзәриндә бурғу кими дүзүлүрмүш. Мегаспорофилләр узун аягчылыгы имиш вә тәпәсиндә узун тохум йолу (микрופилиясы) олан тохумлуғу вар имиш. Мегаспорофилләрин арасында тәпәдән көһнәлмиш мәһсулсуз ярпаглар ерләширмиш. Әһтимал ки, онлар мегаспоранкиялары вә мегаспорлары мұһафизә әдирмиш. Гозаның дибиндә дә мәһсулсуз ярпаглар вар имиш, онлар да йәгин ки, горуючу рол ойнайырмыш.

Беннеттитләрин гозаларында эйни заманда микроспоранкиялар да вар имиш. Микроспорофил мегаспорофилдән тез етишиб микроспорларыны сәпдикдән сонра төкүлүрмүш, даһа доғрусу өртүлүтохумлуларда олан протоандреилик онларда да мұһаһидә әдилirmiш. Бу да чарпаз тозланманы тәмин әтмәк үчүн бир уйғунлашма имиш. Көрүнүр ки, күләк васитәсилә тозланырлармыш.

Етишмәмиш гозаларында дәстә илә дүзүлмүш ләләквари вә диби бирләшмиш 10—18 микроспорофил вар имиш. Онлар әввәлчә гыжылардакы кими гывырлымыш һалда олуп сонралар инкишаф этдикчә ачылырмыш. Микроспоранкиялар икитат ләләк-

вари будагланмыш микроспорофилин чыхынтылары үзәриндә чүт-чүт дүзүлүрмүш.

Беннеттитләрин гозасыны өртүлүтохумлуларын (чичәкли биткиләрин) икичинсли чичәкләри илә мұғайисә әтмәк олар. Өртүчү ярпаглар, чичәкянлыгы кими, гозанын дахили үзвләрини горуюрмуш. Ләләкшәкилли микроспорофил бир чох тоз кисәси (микроспоранкиялары) олан эркәкчикләрин гаршылыгы, охун мәркәз һиссәсиндә ерләшмиш, мегаспорофилләр исә мейвә ярпагларынын гаршылыгыдыр. Лакин онларда, чичәкли биткиләрдә көрдүйүмүз дишичикләр йохдур, йәни тохумлуг чыплаг һалда



Шәкил 169. *Cycadeoidea dacotensis*

1—ағачтәмамлы гозасының узунуна көсйи; 2—ярым ағачтәмамлы эркәк гозасының узунуна көсйи.

мегаспорофилин тәпәсиндә отурмушдур вә мегаспорофил ону әһатә әтмәмишдир. Тохумлуғу һәр тәрәфдән мәһсулсуз ярпаглар әһатә әтмишдирсә дә лакин бу ярпаглар тохумлуглары бир-бириндән айырыр вә тохумлуғун борусу горуючу ярпаглардан харичә чыхыр. Әкәр тохумлуғу мегаспорофил һәр тәрәфдән әһатә әтсәйди, о заман юмурталыгы олан дишичик әмәлә кәләрди вә маяландыгдан сонра юмурталыгдан мейвә инкишаф әдәрди, о заман белә гозаны, өртүлүтохумлулардан гурдбоған фәсиләсинин бәзи биткиләриндә вә магнолияда (лимончичәйиндә) олдуғу кими чичәк һесап әтмәк оларды. Беннеттитләрин тохумлуғу о гәдәр чылпаг олмадығындан вә аз да олса мәһсулсуз ярпагларла әһатә олундуғундан бәзи ботаникләр онлары ярымчылпагтохумлу битки һесап әдирләр, бәзиләри исә, магнолияларын вә гурдбоғанларын аид олдуғу чохмейвәлиләр сырасынын беннеттитләрдән төрәдийини сөйләйирләр. Лакин чичәкли биткиләрин әсас әждады ярымчылпагтохумлу дейилмиш, онларын синанкиялары йох имиш, беннеттитләрдәки гозалар кими икичинсли имиш вә бүтүн һиссәләри беннеттитләрдә олдуғу кими бурғу шәклиндә дүзүлүрмүш. Беннеттитләрдә чичәйәохшар икичинсли гоза олду-

гуну сөйләмәклә бәрабәр гейд этмәлийик ки, чичәкли биткиләрин эст эчдадында даһа ибтидан гурулушлу гозалар вармыш вә онлар беннетитләрә охшайырмыш.



Шәкил 170. *Bennetites Gibsonicus* биткисинин гозасы.

Беннетитләрин тохумлу тыжылар вә саговникләрлә сых инкишаф рабитәси олмасына һеч шүбһә йохдур. Беннетитләрин саговникләрден әсас фәрги, гозасынын икчинсли вә бирчинсли олмасыдыр (шәкил 169, 170).

КИНКГОЛАР (*Ginkgoales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын нүмайәндәләри триасын сонундан мәлумдур, юра дөврүнүн галыгларында исә чох тәсадүф эдилер.


Һазырда бу сыранын ялныз бирчә (*Ginkgoaceae*) фәсиләси вардыр ки, онун да инди бирчә нөвү (*Ginkgo biloba*) яшайыр. Бу биткийә ябаны һалда тәсадүф эдилмир, мәдәни һалда исә Японияда вә Чиндә чох бечәрилир. Бундан башга, ССРИ-гын шәһәр районларында — Гафгазда, Крымда яхшы битир, Азәрбайҗанда, Ләнкәран

районунда вә Мәрдәкәнда (Чохиллик биткиләр институтунда) вардыр. Японлар вә чинлиләр чох гәдим дөврләрден бу биткини бечәриләр (шәкил 171).

Кинкго (*Ginkgo biloba*) 30—40 м һүндүрлүкдә вә 3—4 м йоғунлугда олан ағачдыр; габығы түнд-боз рәнкдә олуп, үзәри һамардыр. Көвдәси тәпә һиссәсиндән чох будагланараг, ики чүр будаг әмәлә кәтирир. Онларын бир гисми узун олуп, үзәриндә сейрәк дүзүлмүш ярпаглары вә учундә тумурчуғу вардыр, бир гисми исә гысалмыш будаглыдыр ки, онларын да үзәриндә бир-бирини өртмүш пулчуғлар олур. Белә будагларын тәпәсиндә ярпаг дәстәси олур. Ярпаглары үчбучаг шәклиндәдир, аялары тәпәсиндән ики дилимә бөлүнмүшдүр вә я бүтөвдүр. Саплаглары узундур. Ярпагларынын елпиквари дәрҗәланмасы характердир. Анатомик гурулушу ийнәярпаглыларынкына охшайыр. Камбия тәбәгәси олдуғуна кәрә көвдәләри энинә йоғунлашыр.

Микроспорсфилләри ярпагларын голтуғунда ерләшмиш сыргашәкилли юмшаг гозалара топланмышдыр. Һәр микроспорофилдә 2—4 микроспоранкия олур вә онлар узунуна партлайыр. Мегаспоранкия (тохумлуг) да гыса будаглар үзәриндә вә ярпагларын голтуғунда әмәлә кәлир. Тохумлуглар чүт-чүт олараг, узун вә тәпәси йоғунлашмыш саплаглар үзәриндә әмәлә кәлирләр. Тохумлугун дибиндә һалгашәкилли лөвһә олур. Бу һиссәләрин һамысы бирликдә мегаспорофил тәшкил эдир. Тохумлугун гурулушу саговникинкине охшайыр. Тохумлугун галын бир өртүйү вардыр ки, о да тәпәдән узанмыш икидилимли микропилиядыр. Өртүйүн ичиндә, эндосперми вә архегониялы проталы

олан нутселлус вардыр. Нутселлусун тәпәсиндә тоз камерасы әмәлә кәлир. Етишмиш микроспор микропилия васитәсилә тоз камерасына дүшүр. Саговникдә олдуғу кими, бунун да микроспорунун проталы антеридия вә тоз борусу әмәлә кәтирән һүчәйрәләр олмагла үч һүчәйрәдән ибарәтдир. Бу ахырынчы тоз камерасында чүчәриб гыса тоз борусу әмәлә кәтирир ки, о да инчә



Шәкил 171. Кинкго (*Ginkgo biloba*)

1—диши «чичәкли» гысалмыш зор (тәбии бөйүклүкдә); 2—диши «чичәк»; 3—аркәк «чичәкли» (гозалы) гысалмыш зор (тәбии бөйүклүкдә); 4—ярпаг (тәбии бөйүклүкдә); 5—узунуна кәсилмиш тохумлуг; 6—нутселлус; 7—илк эндосперм; 8—тохумлугун өртүйү; р—тоз адачыгы (15 дәрҗә бөйүклүкдә); 9—етишмиш тохум (тәбии бөйүклүкдә); 10—иши дәрҗә кәрүнән етишмиш тохумун узунуна кәсийи (тәбии бөйүклүкдә); 11—архегония; 12—юмурта һүчәйрәси; 13—гарын канал һүчәйрәси (60 дәрҗә бөйүклүкдә).

чыхынтылары илә нутселлуса битишир. Бу заман антеридия һүчәйрәсиндән тачшәкилли гамчылары олан ики ири сперматозоид әмәлә кәлир. Тоз борусунун учу партлайыр вә орадан чыхан сперматозоидләр әввәлчә тоз адачыгындакы маеә дүшүр, сонра орадан архегония кириб юмурта һүчәйрәсилә гаршылыгы ассилиясыя олунараг ону маялайыр. Маяланмыш юмурта һүчәйрәсиндән олдуғча мүрәккәб үсулла рүшәйм инкишаф эдир вә бүтүн тохумлугдан тохумун башлангычы әмәлә кәлир.


Кинкгонун етишмиш мейвәси тәхминән килас бөйүклүкдә олур, үзәриндә галын габығы вардыр, ич һиссәси әтлидир, бу

ахырынчынын орта हिस्सәси дашлашмышдыр. Эндосперми чох инкишәф этмишдыр; онун юхары हिस्сәсиндә икиләпәли рүшейм әмәлә кәлир.

Кинкгонун әсас хусусийәтләри—ярпагларынын дихотомик (гаршы-гаршыя) дамартанмасы, тәпә тохумлуғлу вә сперматозоидли олмасыдыр.

КОРДАИТЛӘР (*Cardaitales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын нүмайәндәләри даш көмүр вә перм дөврләриндә яшамышдыр вә һазырда онлар анчаг газынты һалында тапылыр. Онлар лепидодендронлар, сигиллариялар вә каламитләрлә бир-




Шәкил 172.

1—*Cordaites lucis*-нин спорофилләрден ибарәт «сырғачыглы» будагы; 2—сырғачыглы; 3—яңи будагы; 4—микроспорофилләрли олан будагы; 5—*C. Relioni*-нин эркәк гозасынын узунуна кәсийи; 6—эркәк гозалар; 7—«иччәкяңлыгы» ярпаглары; 8—*C. Williamsoni*-нин гозасынын узунуна кәсийи; 9—оку; 10—я—мейвә вермәйән ярпаглары, мегаспоранкиясы (тохумлуғу); 11—*C. Grand' Eury*-нин тохумлуғуну узунуна кәсийи; 12—орғуй; 13—гоз камерасы; 14—гоз дәнәләри.

ликдә, бә'зән дә халис мешәләр әмәлә кәтирмишдыр. Кордаитләрдин һүндүрлүйү 30 м-ә, йоғунлуғу исә 60 см-ә чатырмыш. Ярпаглары көвдәләринин тәпәсиндә олуб, дил вә я лансетшәкилли параллел дамартлы вә бүтөв кәнарлы имиш, бурғу шәклиндә дүзүлүрмүш. Бә'зи чинсләрдин ярпаг аялары бүтөв кәнарлы бир метр узунлуғда имиш. Көвдәсинин яхшы инкишәф этмиш өзәйи вар имиш ки, о да ийнәярпаглылардакы кими галын одунчагла әһәтә олунурмуш. Кордаитләрдә камбия тәбәгәси олдуғуна көрә икинчи йоғунлашма габилийәти вар имиш. Микро вә мегаспоранкиялары сырғашәкилли гозаларда имиш. Бу гозалар көвдәнин юхары हिस्сәсиндә, ярпагларын арасында вә көвдәнин үзәриндә ерләширмиш. Гоза вә я сүнбүлләр садә вә будагланмыш ох үзәриндәки спорофилләрден ибарәт имиш.

Эркәк гозаларын оху йоғун имиш вә онун үзәриндәки спорофилләрден ибарәт олан ярпаглар бурғу шәклиндә дүзүлүрмүш. Онларын да араларында эркәкчикләр ерләширмиш. Эркәкчикләр 2—3 олуб узун саплагларын учунда имиш. Диши гозасы заһири көрүнүшчә эркәк гозая охшайырмыш, лакин гурулушу, нисбәтән, мүрәккәб имиш. Диши гозаларын да үзәриндә пулчуглар вар имиш, лакин бу пулчугларын голтуғларында гыса зоглар вар имиш. Һәмин гозаларын үзәриндә бир нечә хырда ярпаг олурмуш, һәр зогун тәпәсиндә мегаспоранкия вә я тохумлуғ отурурмуш. Тохумлуғун гурулушу вә маяланма үсүлү саговникләрдә вә кинкголарда олдуғу кими имиш (шәкил 172, 173).



Шәкил 173. *Cordaites* «гозаларынын» схеми.

1—эркәк гоза; 2—диши гоза.

ИЙНӘЯРПАГЛЫЛАР (*Coniferales*) СЫРАСЫ

Ийнәярпаглылар, ярпаглары ийнә вә я пулчуг шәклиндә олан ағач вә я коллардыр. Көвдәләри демәк олар ки, һәминшә монопоидиал будагланан, икинчи дәфә йоғунлаша билән вә бору тоғалары әвезинә трахеидләри олан биткиләрдыр. Бу сыранын арчалардан башга бүтүн нүмайәндәләринин габығында гәтәли йоллары вардыр. Ийнәярпаглылар, чылпагтохумлулар арасында ән чох нөвү олан сырадыр. Онун 550-йә гәдәр нөвү мәлумдур ки, онлар да мүлайим вә союг иглимли өлкәләрдә яйылмышдыр. Инди онлар рүтубәтә вә ксерофиллийә чох уйғунлашмышдыр. Ярпагларынын гышда төкүлмәдийинә бахмаяраг, ярпағыны төкән

өртүлүтохумдуларга нисбәтән сую дәфәләрлә аз бухарландырыр. Яшлы биткиләрдә ики чүр ярпаг олур: пулчугвари вә я пәрдәйә охшар диб ярпаглар вә яшлы рәңкли орта ярпаглар. Гысалмыш көвдәләрин үзәриндәки ярпагларын дибиндә пәрдәйә охшар пулчугвари ярпаглар, адишамда (*Pinus silvestris*) айдын көрүнүр. Гарашам (*Larix*) вә яланчыгарашамдан (*Pseudolarix*) башга бүтүн ийнәярпаглыларда ярпаглар чохиллик олуб төкүлмәйәндир. Ярпагларында гәтран йоллары вардыр.


Мега вә микроспорофилләри гозаларга топланмышдыр. Тоз борусу васитәсилә архегония кечән һәрәкәтсиз эркәк һүчәйрәси васитәсилә маяланыр.

Адишамы (*Pinus silvestris*) бу сырая бир мисал кәстәрмәк олар (шәкил 174). Адишам көзәл көркәмли ири ағачдыр. Һүндүрлүйү 40 м-ә чатыр. Көвдәләри вә будагларынын учунда тумурчуглар вардыр. Онларын һәр бири инкишаф әдәрәк ени зәғлар әмәлә кәтирир. Зәғлар ики нөвдүр: онларын бир гисми узун олуб, үзәрләриндә гәтур пулчуглар вардыр, диқәрләри исә гысадыр вә һәммин гәтур пулчугларын голтуғунда ерләшмишдир. Онларын да үзәриндә ийнәшәкилли бир чүт ярпаг олур.

Шамын анатомик гурулушу чох характерикдир; өзәйи чох аз инкишаф этмишдир; иклинчи одунчаг тамамилә камбиядан әмәлә кәлир вә трахеидләрдән ибарәтдир; өртүлүтохумлулардакы кими бору топалары йохдур. Трахеидләри 3—4 мм узунлугда олуб, радиал диварларында характерик дешикләри вардыр ки, онлар да иллик һалгаларда нөвбә илә ерләшир. Одунчаг һиссәсиндән бир чох өзәк шүасы кечир. Бундан башга орада һәмишә гәтран йоллары олур.

Шамын эркәк гозалары сүнбүлә охшар сых «чичәкгруппунда» топланмышдыр. Һәр гоза гысалмыш зәғун үзәриндә әмәлә кәлир. Эркәк гозанын ортасындан кечән оха микроспорофилләр вә я «эркәкчикләр» бирләшир. Микроспорофил пулчуг шәклиндәдир вә һәр пулчуғун алт тәрәфиндә ики микроспоранкия (тозлуг) ерләшир. Ох васитәсилә һәр спорофилә бору топалары кирир. Микроспоранкиядә чохлу микроспор вә я тозчуг олур. Микроспорлар күрәви олуб ики гылафла өртүлмүшдүр (дахилдән инчә—интина, харичдән исә галын—экзина). Экзина һиссәсиндә кәнара чыхмыш торшәкилли ики ири говуг әмәлә кәлир. Һава илә долу олдугларына көрә бу говуглар күләк васитәсилә асанлығла яйылыр, беләликлә дә тозланма кедир. Микроспорда гаты плазма вә нүвә вардыр. Микроспор һәлә тозлугда икән, йә'ни тозлуг ачылмамышдан әввәл мүчәрмәйә башлайыр. Чүчәрән заман микроспорда ики хырда һүчәйрә әмәлә кәлир. Онларын бири антеридияны, диқәри исә векетатив һүчәйрәни әмәлә кәтирир. Бу заман тозлугун диварлары партлайыр вә тозчуглар белә ики-һүчәйрәли икән харичә чыхыб күләк васитәсилә диши гоза дүшүр.

Диши гозалар 1—2 әдәд оларағ узун зәғларын тәпәсиндә әмәлә кәлир. Онлар ох вә пулчуглардан ибарәтдир. Пулчугларын үст һиссәсиндә дибә тәрәф бир чүт тохумлуг ерләшир; тохумла-



Шәкил 174. *Pinus silvestris*

1—эркәк вә диши гозалы будаг (ашағыда—етишиб, ачытмыш, юхәрыда—чаван гозалар); 2—мүхәлиф чәһәтләрдән көрүнән микроспоранкиядә микроспорофил; 3—ачылмыш микроспоранкиядән алдан көрүнүшү; 4—өртүчү ярпаг вә онун архасында тохум пулчуғу; 5—ики тохумлуғу олан тохум пулчуғунун үстдән көрүнүшү; 6—тохум пулчуғунун үзәриндә икиганадлы тохум; 7—айрыча ганадлы тохум; 8—ганадсыз тохум.

рын микропилиялары пулчуғун оха бирләшән еринин яхынлығында олур. Тохумлуг чох да бөйүк олмаян овалшәкилли мега-споранкиялары метаморфоздур (шәкил 174).

Ону энинэ кэсдикдэ, ортасында протал, я да эндосперм ерлэшдийн көрүнүр. Эндосперм инчедиварлы һүңейрэләрдән тәшкил олунмушдур. Оун микропилия тәрәф олан юхары һиссәсиндә ики архегония ерләшир. Һәр архегония ири нүвәли вә гаты плазмасы олан һүңейрәдән ибарәтдир. Юмурта һүңейрәсинин үстүндә тез тәләф олан бир гарын канал һүңейрәси олур.


Эндосперм нутселлусла әһатә олунур, о да тохумлуғу әһатә эдән өртүклә өртүлмүш олур. Һәмин өртүк нутселлусун дибинә битишир. Өртүйүн учунда микропилия олур. Микроспор (тозчуг) микропилия васитәсилә нутселлусун үзәринә дүшәрәк орада чүчәрир вә узаныб тоз борусу әмәлә кәтирир ки, о да нутселлусдан вә сонра эндоспермдән кечәрәк архегония чатыр (шәкил 175).

Антеридия һүңейрәсиндән ики эркәк кенератив (чинси) һүңейрә әмәлә кәлир. Он л а р а с п е р м и дейилир. Онлар да тоз борусу васитәсилә юмурта һүңейрәсинә доғру кедир.

Сонра тоз борусу партлайыр вә спермләрдән бири юмурта һүңейрәси илә гаршылыгы ассимиляция олунур. Маяланма просеси чох вахт бир ил давам эдир, гоза мейвә әмәлә кәлир (шәкил 175). Маяланмыш юмурта һүңейрәсиндән рүшеймин башланғычы әмәлә кәлир. Оун инкишафы олдуғча мүрәккәб һадисәдир. Бу һадисәни илк дәфә И. Н. Горожанкин кәшф этмишдир. Горожанкинә гәдәр Страсбургер бу һагда сәһв мәлумат вермишдир. Гошаман рус ботаники Бекетов даһичәсинә демишдир ки, «инди бүтүн ботаникләр чинчәк боручуғунун (йә’ни тоз боручуғунун) учуна көз тикмәлидирләр, ботаника бурада бөйүк кәшф көздәйир».

Маяландыгдан сонра тохум инкишаф этмәйә башлайыр. Оун өртүйүндән тохумун габығы, нутселлусдан исә—эндосперм әмәлә кәлир. Эндосперм әһтият маддәләрлә (башлыча оларағ яғларла) долу олур вә тохум чүчәрән заман рүшейм онунла гидаланыб бөйүйүр.

Шамын тохумунда шәффаф бир ганад вардыр, бу да онун күләк васитәсилә яйылмасында бөйүк рол ойнайыр. Шамларын гозалары ики илдә етишир. Тозланма июн айында баш верир, маяланма исә бир ил давам эдир, нәтичәдә рүшейм вә тохум әмәлә кәлир. Эһни заманда гоза пайыза яхын бөйүйүр. Тохум



Шәкил 175. Шамың архегониялы вә тоз боручуғлу тохумлуғунун үч һиссәсинин узунуна кәсһийи.

етишән заман гозаның яшыл рәнки гонур рәнкә чеврилир. Пулчуглары араланыр вә тохумлары төкүлүр.

Бу дейиләнләрдән мә’лум олур ки, маяланма вә тохум әмәлә кәлмәси просеси шамда да саговникләрдәки кими кедир. Бунларын арасындакы әсас фәрг ондан ибарәтдир ки, шамларда маяланма һәрәкәтсиз эркәк һүңейрә (сперми) васитәсилә кедир вә тоз борусу онлары юмурта һүңейрәсинә кечиомәк үчүн васитәлик эдир. Саговникләрдә исә эркәк һәмәтасы һәрәкәт эдән сперматозоидләрдир вә тоз борусу чүчәрән тозчуғу нутселлуса бирләшдирмәйә хидмәт эдир. Онларын һәр икисиндә нәслин нөвбәләnmәси әһнидир.

Иһнәярпағлылар сырасы алты фәсиләйә бөлүнүр.

Гарачөһрә (*Taxaceae*) фәсиләси

Оун микроспорофилләриндә 3-дән 6-я гәдәр эркәкчик вардыр. Тохумлуглары айры-айры зогларын учларында олур. Онларын дибиндә маяланмадан сонра ачығ гырмызы рәнкли әтли кичик чанағ әмәлә кәлиб тохуму әһатә эдир.

Бу фәсиләйә *Cephalotaxus*, *Torreya* вә *Taxus* олмағла үч чинс дахилдир. Бунлардан ахырынчы чинс даһа мұһүм олуб кениш яйылмышдыр. Һәмин чинсин әң мөшһүс нөвү ади гарачөһрәдир (*Taxus baccata*). О, кол вә я кичик ағачдыр. Чох вахт Крымда, Гағзада, хүсусән Азәрбайчанда рүтубәтли, көлкәли мөшәләрдә мөшәалты ағачлары оларағ яйылмышдыр. Бундан башға Әлчозаирдә, Кичик Асияда, Һималайда, Сурияда, дағ районларында битир.

Гарачөһрәнин ярпағлары әнсиз нештәр шәклиндә олуб ики чәркәйә дүзүлмүшдүр. Мега вә микроспор ярпағлары эһни битки үзәриндә олур, бирәвлидир (шәкил 176).

Тохумун әтрафында олан вә мейвә янлығына охшар гырмызы әтли һиссә ейилир, лакин ярпағларында вә чаван зогларында инсан вә һейванлары зәһәрләйә билән алколоид дә вардыр.

Гарачөһрәнин одунчағы чох сәрт олдуғуна вә кеч чүрүдүйүнә көрә чох гиймәтлидир. Мәһз бу сәбәблә дә артығ дәрәчәдә тәләф әдилдийиндән инди чох сейрәкләшмишдир. Гарачөһрәйә яхын олан *Taxus cuspidata* нөвү Узар Шәргдә нисбәтән чохдур.

Подокарп (*Podocarpaceae*) фәсиләси

Бунларын микроспорофилләриндә эркәкчикләрин сайы ялһыз 2-дир. Диши гозалары әтли спорофилләрдән ибарәт олан хырда зоглардыр. Фәсиләнин 5 чинси вардыр ки, бунлардан ики чинсий *Dacrydium* вә *Podocarpus* чинсләринин әһәмийәти чохдур. Бунларын бә’зи нөвләри чәнуб ярымкүрәсиндә дағ мөшәләринин әсасыны тәшкил эдир. Бә’зи нөвләри нәһәнк ағачлардыр,

онлардан иншаатда və сәнаедә истифадә этмәк үчүн чоҳлу тахта һазырланыр.

Һәмнн фәсиләнин нүмайәндәләриндә диши гозаларын үзәриндә бир, ики və я чоҳлу лигдарда тохумлуғу олан спорифилләрдән



Шәкил 176. Гарачәһрә *Taxus baccata*

1—эркәк чичәкли будаг; 2—диши чичәкли будаг; 3—тохумлу будаг; 4—эркәк чичәк; 5—эркәкчик; 6—диши чичәк; 7—диши чичәк; 8—тохумянлыгы етишмәмиш тохум; 9—тохумянлыгы илә тохумун узунуна кәсийи; 10—етишмиш тохум; 11—тохумун узунуна кәсийи; 12—эркәк гозанын диаграмы.

ибарәт гозалар олур. Онлар маяландыгдан сонра мейвә верән пулчуглары одунлашыр, аз-аз һалларда исә әтләшәрәк килә-мейвә шәклини алыр.

Араукариялар (*Araucariaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин әсас хусусийәти və башгаларындан фәрги одур ки, тозчугларында һава говуғу йохдур və мегаспорофилләриндә ялныз бирчә тохумлуғ вардыр. Бу фәсиләнин һазырда ялныз ики чинси мәлумдур ки, о да *Agathis* və *Araucaria* чинсләриндән ибарәтдир. Онлар ялныз чәнуб ярымкүрәсиндә раст кәлинир. Бу чинсләрә мәнсуб олан айры-айры нөвләрин көздәләринин һүндүрлүйү 60 м-ә, йоғунлуғу исә 2 м-ә чатыр. Бирәвли биткиләрдир. Онлардан чоҳ гиймәтли тахта һазырланыр. Бундан башга *Agathis* чинсинин нөвләриндән гәтран алычыр ки, ондан да сәнаедә кениш истифадә эдилир. Бу чинсин нөвләринә Ени Зеландияда, Филиппин və Малай адаларында тәсадүф эдилир. *Araucaria* чинси нөвләри Чәнуби Америкада хәлп мөшәләр әмәлә кәтирмишдир. Онлардан Чили шамы (*Araucaria imbericata*) Гара дәниз саһилләриндә və Крымда бир декоратив ағач олараг бечәрилир. Әв шамы (*A. excelsa*) дибчәкләрдә бәзәк биткиси кими сахланылыр.

Шамлар (*Pinaceae*) фәсиләси

Һәмнн фәсиләнин характерик хусусийәти, юхарыда үмуми шәкилдә тәсвир эдилмиш ади шамын (*Pinus silvestris*) тимсалы үзәриндә кәстәрилмишдир. Һәмнн хусусийәтләр шам (*Pinus*) чинсинин демәк олар ки, бүтүн нөвләринә аиддир. Онун нөвләриндән Азәрбайчанын дағ мөшәләриндә аз-аз раст кәләни гармагвари шам (*P. hamata*)-дыр; бундан башга бир дә Элдәр дәрәсиндә сылдырым гаялыгларда реликт (гәдим) һесаб эдилән Элдәр шамы (*P. eldarica*) битир. Бунларын һәр икиси Азәрбайчанда Бакынын, Кировабадын və саир районларын парк və бағларында бечәрилир. Шамлардан скипидар, канифол, ашы маддәси, «В» və «С» рчтаминләри və гиймәтли тикинти материалы һасил эдилир. Горуячу мөшәзәгларында бу шамлардан кениш истифадә олунмалыдыр. Бу фәсиләйә бир дә күкнарь-йолка (*Picea*) чинси аиддир ки, онун да ән чоҳ яйылмыш нөвү ади йолкадыр (*P. excelsa*). О, ССРИ-нин Авропа һис-



Шәкил 177. Йолка (*Picea*)

1—эркәк гозалы будаг; 2—диши гоза; 3—көһнә диши гоза; 4—үзәриндә тохумлары олан пулчуг; 5—тохумлары.

сәсіндә кениш мешәләр әмәлә кәтирмишдир. Сибир мешәләриндә исә Сибир шамы (*P. obovata*) нөвүнә тәсадүф эдилір (шәкил 177).

Шам (*Pinaceae*) фәсиләсинин гара шам (*Zarix*) чинсинин нөвләриндән Сибир гара шамының (*Zsibirica*) һүндүрлүйү 40 м-ә чатыр. Онун габығында 10%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр. Даур шамы (*L. dahurica*) рүтубәтли, батаглыг ерләрдә битир. Одунчагы ағыр вә сәртдир. Көвдәсиндән телеграф шалбанлары һазырланыр вә көрпү иншаатында истифадә эдилір. Габығында 20%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр. Бурая бир дә Европа шамы (*L. europaea*) нөвү аиддир. Онлар башлыча олараг ССРИ-нин Европа һиссәсинин шимал-шәргиндә, Сибирдә, Узақ Шәргдә яйылмышдыр.

Һәмин фәсиләйә бир дә ағ шам (*Abies*) чинсинин *A. sibirica* нөвү аиддир. О, шимал-шәргдә вә Сибирдә яйылмышдыр. Одунчагы аз гиймәтлидир, лакин ондан алынан балзам, яраны сағалтмаг үчүн чох яхшы дәрмандыр. Бундан башга одунчагдан алынан борнил—асетондан әлә кейфийәтли камфора да һазырланыр. Ағ шам чинсинин дикәр нөвү олан *A. Nordmanniana* Гафгаз дағларында кениш яйылмышдыр. О, уча бойлу көзәл бәзәк битки-сидир. Әсәл сидр (*Cedrus*) нөвләри олан Ливан сидри вә гара Һималай сидри Кичик Асияда вә Һималай дағларында яйылмышдыр. Онлар Крымда вә Гафгазда да бечәрилир.

Таксондлар (*Taxodiaceae*) фәсиләси

Таксондлар фәсиләсинин нүмайәндәләри ябаны һалда ялныз Америкада битир, ССРИ-дә исә Гара дәниз вә Крым саһилләриндә сүн'и сурәтдә етишдирилир. Онларын одунчагындан чүрбәчүр әв шейләри истехсалында гиймәтли бир материал кими истифадә эдирләр.

Мейвә пулчугларында 2-дән 9-а гәдәр тохумлуг олур; ярпаглары бурғу шәклиндә дүзүлмүшдүр. Фәсиләнин нисбәтән мәшһур нүмайәндәси секвойдыр ки, она веллингтония вә я мамонт ағачы да (*Sequoia gigantea*) дейишәр. О, дүнянын ән һүндүр, йоғун вә узунөмрүлү ағачларындандыр. Һүндүрлүйү 100—150 м, диаметри 20 м олуб, 6000 илә гәдәр өмүр сүрүр. Будаглары мамонтуң дишинә охшадығына көрә она «Мамонт ағачы» ады верилмишдир.

Сәрвләр, мазылар (*Cupressaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин башга чылпагтохумлулардан әсас фәрғи нөвләриндән чохунда ярпагларын пулчуг шәклиндә вә бәзиләриндә исә ийнә шәклиндә олмасы вә онларын көвдәдә гаршы-гаршыя, бурғу кими вә я дәстә илә дүзүлмәсидир. Әксәрийәтинин ярпагларында әтирли яғы олан вәзиләр әмәлә кәлир. Бир вә я икиәвли биткиләрдир. Спорофилләри кичик гозачыға топланмышдыр.


Микроспорофилләри (эркәкчикләри) бурғу кими, я да гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Микроспорофилләрдә 3—5 микроспоранкия олур. Тоз һүңейрәләринин (микроспорларынын) һава кисәләри олмур. Мегаспорофилләри адәтән етишән заман одунлашыр вә гозанын охундан айрылмыр. Тохумлуглары (мегаспоранкиялары) мейвә верән ярпагларын голтуғунда ерләшир, микропилиясы исә мейвә ярпагларынын уч тәрәфиндә отуруп, йәни тохумлуглары дүз олур. Чинси нәслин үмуми инкишафы даһа ихтисар олунмуш һалда шамлардакы вә таксондлардакы кимидир.

Фәсиләнин 16-я гәдәр чинси вардыр. Онлар бир-бириндән гозаларынын гурулушлары илә фәрғләнир. Бу фәсиләнин Азәрбайҗанда ашағыдакы үч чинси битир: сәрв (*Cupressus*), гут (*Thuja*) вә ардыч (*Juniperus*) чинсләри.

Сәрв чинсиндән ади сәрв нөвүнүн (*Cupressus sempervirens*) дағынын вә үфүги будагланан көвдәси вардыр, бечәрилән нөвүнүн көвдәси исә пирамида шәклиндә узаныр. Гоза ары одунлашыр. Крымда вә Гафгазда чохлу мигдарда бечәрилир (шәкил 178).

Туя (*Thuja*) чинсиндән биздә паркларда вә бағларда шәрг туясы (*Thuja orientalis*) бечәрилир. О, һүндүрлүйү 3 м-ә гәдәр олан ағачдыр.

Ардыч (*Juniperus*) чинсинин Азәрбайҗанда 6 нөвү яйылмышдыр. Бу чинсин характер хусусийәти мегаспорофилинин (мейвә пулчугунун) әтләшиб киләмейвә шәклини алмасыдыр. Ярпаглары яшыл рәнkdә олуб, пулчуг вә я ийнә шәкиллидир, гаршы-гаршыя вә я дәстә илә (һәр дәстәдә үч-үч) дүзүлмүшдүр. Бәзи нөвләринин ярпагларында һетероморфлуг мүшаһидә олунур—битки чаван икән ярпаглары ийнәшәкилли олуб, дәстә илә чыхыр, гоча биткиләрдә исә—пулчугшәкилли олуб, гаршы-гаршыя дүзүлүр. Мейвәләри икинчи ил етишир вә әтли олур. Одунчаглары чох сәрт олуб кем чүрүйүр. Азәрбайҗанда битән узун сов ардычын (*J. oblonga*) вә башга ардыч нөвләринин мейвәсиндән әт хәрәкләринә вә дуза гоюлан кәләмә дад вермәк үчүн истифадә эдилір. Узунсов ардыч нөвүнүн мейвәсиндә 42%-ә гәдәр шәкәр вардыр. Ондаң араг чәкир вә шәраб һазырлайырлар. Мейвәси ишләтмә дәрманы кими тәсир эдир. Ардыч яғындан тәбабәтдә кениш истифадә эдилір. Ярпагларында «С» витамини олур. Чаван будагларында вә ярпагларында 5—8% ашы маддәси вардыр.



Шәкил 178. Сәрв (*Cupressus*)

Гуру даг районларында сейрэк мешәлик әмәлә кәтирир. Сәрв-ләр вә ардычлар мешә золағлары салмағ вә чылпаг дағ ямачла-рыны яшылашыдрмағ үчүн әлверишли биткиләрдир.

ГЫРХБУҒУМКИМИЛӘР (*Gnetales*) СЫРАСЫ

Бурая дахил олан биткиләрин көвдәләриндә хусуси типли су вә гита бору топалары вардыр. Икинчи йоғуулашма габил-лийәтинә маликдир. Бир вә икиэвли биткиләрдир. Тохумлуғу 1—2 өртүклүдүр; өртүкләр учдан узанмышдыр вә бир гәдәр өртүлү тохумлу биткиләрин дишичийинин сүтунчуғуна охшайыр, лакин онун мәншән башгадыр. Гәтран йоллары йохдур; ярпаг-лары гаршы-гаршыадыр. Рүшейми икиләпәлидир. Бу сыранын башга чылпагтохумлулардан фәрги, эркәк вә диши чичәкләриндә чичәкяилчығына охшар хусуси өртүк олмасыдыр.

Юхарыда кәстәрилән хусусийәтләринә кәрә һәммин сыра чыл-пагтохумлулар ичәрисиндә хусуси ер тутур.

Гырхбуғумкимиләр сырасынын үч фәсиләси вә һәр фәсиләнин бир чинси вардыр. Бун ердан Азәрбайчанда битәни ачылығ (гырхбуғумлар) — (*Ephedraceae*) фәсиләсинин ачылығ (*Ephedra*) чинсинин нөвләридир.

Ачылығ (гырхбуғумлар) (*Ephedraceae*) фәсиләси

Ачылығ фәсиләсинә аид олан ачылығ (*Ephedra*) чинсинин Азәрбайчанда 4 нөвлү яйылмышдыр ки, бунлардан бири бо й л у ачылығ (*E. procera*) дикәрләри исә ики сүнбүл ачы-лығдыр (*E. distachya*), орта ачылығ (*E. intermedia*), га-тыр гуйруглу ачылығ (*E. equisetina*) вә бечәрилән нөвү олан кирпикли ачылығ (*E. ciliata*). *E. distachya* нөвү, чох будагланан кичик кол оллуб, будағлары үзәриндә ихтисар олун-муш хырда ярпағлары вардыр, бу кениш яғылмыш нөвдүр. (шә-кил 179). Икиэвли, тәкбир һалларда исә бирэвли биткиләрдир.

Микроспорофилләри тохумлутдан кәнардадыр. Һәр эркәкчик бир-биринә битишмиш ики ярпагчыгла әһатә әдилмишдир. Белә бир эркәк «чичәк» пулчуғун голтуғунда ерләшир. Тохумлуг буда-ғын тәпәсиндә олур. Тохумлуғун нутселлусунун ичиндә 2—5 архе-гониясы олан эндосперм вардыр. Эндосперм харичдән ики өртүк-лә әһатә әдилмишдир. Онлардан ичәридәки инчә өртүк олуб узан-мыш микропилия бәрусуну әмәлә кәтирмишдир, харичдәки исә сәрт өртүклүдүр. Тохумлуг хырда «чичәкалтылығы» илә өртүл-мүшдүр. Әмәлә кәлән мейвәси килмейвәйә охшайыр. Харичи өр-түкдән әтли һиссә, дахилдәкиндән исә сәрт габыг әмәлә кәлир.

Ачылығ чинсинин нөвләри ССРИ-дә Волганын ашағы һиссә-синдә, Крымда, Гафгазда, Сибирдә, Орта Асияда яйылмышдыр.

Азәрбайчанда Бакы, Кировабад, Шамаһы, Хызы, Исмайыллы, Нуха районларынын гураг ямачларында битир.

Ачылығын мейвәсиндә эфидрин вә псевдоэфидрин алколоид-ләри вардыр. Эфидрин ган даяндырычы дәрман кими ишләдилир



Шәкил 179. Ачылығ (*E. distachya*)

А-1—эркәк чичәкгрупплары олан будаг; А-2—мейвәли будаг; В-1—эркәк чичәкгруппу; В-2—эркәк чичәк; В-3—тохумлуғун узунуна кәсийи

вә онлар тәнкәнәфәслик (астма), көй өскүрәк, мәхмәрәк вә саир хәстәликләрин мүәличәсиндә истифадә әдилир. Мейвәләриндә «С» витамини, көвдә вә будағларында исә чохлу мигдарда ашы маддәси вардыр

АРХЕГОНИЯЛЫЛАРЫН МӘНШӘЛӘРИ ВӘ ТӘҚАМУЛУ

Архегониялы биткиләрин тохумлуг мүнәсибәтләрини мүәййән этмәк үчүн онлары ики әсас група бөлмәк лазым кәлир. Бу груп-лардан бириндә бүтүн һеяты дөврийә һаметофит үзәриндә кедир

вэ һаметофит үстүнлүк тәшкил эдир, спорофит нәсл исә зәиф һалда олуб табе хусусийәт дашыйыр. Белә бир хусусийәт мамыркимиләрә (*Bryophyta*) аиддир. Икинчи группа исә, биринчинин әксинә олараг, спорофит нәсл чох яхшы инкишаф этмишдир, һаметофит исә зәиф галмышдыр, һәтта бә'зи һалларда чох ихтисар олунмуш вэ минимума чатмышдыр. Белә бир хусусийәт псилофитләрдән башламыш бүтүн гыжыкимиләрә (*Pteridophyta*) вэ чылпагтохумлуларә (*Gymnospermae*) аиддир. Онларда архегонияларын гурулушунун бир формада олмасы бу группаларын эйни мәншәли олдугларыны көстәрир. Йәгин ки, бүтүн архегониялы биткиләр вахтилә су мүнитини тәрк әдәрәк гуруя чыхмыш йосунлар группундан инкишаф этмишдир. Һәлә гәдимдән бу үмүми көкдән ики төкамүл хәтти инкишафа башламышдыр. Онларын бириндән әсас әтибарилә һаметофит нәсл инкишаф әдәрәк үстүн кәлмиш, спорофит нәсл исә тәдричән азалыб мүстәгил яшамаг габилыйәтини итирмиш, беләликлә дә мамыркимиләр әмәлә кәлмишдир. Гыжыкимиләри вэ онлардан инкишаф этмиш чылпагтохумлуларә әмәлә кәтирән шахәдә исә, әксинә, спорофит чох мүхтәлиф вэ мүрәккәб формаларда төкамүл этмиш, эйни заманда һаметофит өзүнүн ибтидаи гурулушуну сахламыш, бә'зәлә дә (мәсәлән, плаунларда вэ я корамал отларындакы кими) хусуси һәят шәраитинә уйғунлашараг, мүхтәлиф спорлуларда олдугу кими, ихтисар олунмушдур. Гыжыкимиләрдә вэ чылпагтохумлуларда спорофит һаметофитә нисбәтән даһа давамлы олмуш, буна көрә дә гыжыкимиләр вэ чылпагтохумлулар битки әләминин сонракы инкишафында бөйүк рол ойнамышдыр.

Юхарыда көстәрилән төкамүл хәтләринин һәр бири мүстәгил инкишаф этмишдир. Йәгин ки, мамыркимиләр (*Bryophyta*) төкамүл йолнлә яшыл йосунлардан әмәлә кәлмишләр. Бәсит талломлу ясты мамырларын һаметофит хәттиндән, бир тәрәфдән мүрәккәб талломлу маршансиялар, диһәр тәрәфдән исә анакрокин юнкерманиялар, сонраларда исә ярпаглы юнкерманиялар әмәлә кәлмишдир. Ярпаглы мамырлар көрүнүр ки, ярпаглы юнкерманияларын һәр һансы гәдим әчдадындан төкамүл этмишдир вэ өз инкишафыны давам этдирәрәк ени битки группаларына башланғыч олмушдур. Онларын галыглары даш көмүр дөврүндән мә'лумдур.

Псилофитләр көрүнүр ки, гәдим гонур йосунлардан инкишаф этмишдир. Псилофитләри мәркәзи груп һесаб этмәк олар ки, ондан *Lycopside*, *Sphenopsida* вэ *Pteropsida* кими әсас синифләр инкишаф этмишдир. *Lycopside*-лар ярпаг кими чыхынтылары олан көвдәли (*Asteroxylon*) типли псилофитләрдән инкишаф этмишдир. Онларын төкамүлү микрофилияя доғру кетмишдир, йә'ни онлар башлыча олараг көвдәнийн һесабына инкишаф этмишдир, ярпаглар исә нисбәтән өз кичиклийи вэ садәлийи сахламышдыр.

Көрүнүр ки, *Pteropsida*-ларын әчдады *Rhynia* кимиләр олмушдур. Онларын садә, гаршы-гаршыя һачаланан көвдәләриндән мүрәккәб төкамүл йолу илә, бу синиф үчүн характер сайылан мүрәккәб ири ярпаглар әмәлә кәлмишдир, йә'ни бурада төкамүл макрофилия истигамәтиндә кетмишдир.

Sphenopsida-лар өзләринин *Calamophytales* кими бәсит нүмайәндәләри илә псилофитләрә яхынлашыр. Онларда хусуси бүтүмлу гурулуш әмәлә кәлмәси онларә *Pteropsida*-лардан даһа артыг *Lycopside*-ларә яхынлашдырыр.

Беләликлә, псилофитләр ашағыда үч әсас филокенетик хәттин башланғычыны вермишдир ки, онларын да һәр бири сонралар мүстәгил инкишаф этмишдир.

1. **Макрофилли плаункимиләр** *Lycopside* —ады нүмайәндәләри лепидодендронлар, сикиллариялардыр;


2. «**Бүтүмлу**» *Sphenopsida* вэ *Articulata*-ларын—али нүмайәндәләри каламитләрдыр;

3. **Гыжыкимиләр** *Pteropsida*—али нүмайәндәси ағачаохшар гыжылардыр.

Чылпагтохумлуларә кәлинчә, онларын ибтидаи нүмайәндәләри олан тохумлу гыжылар билаваситә *Pteropsida*-ларә яхынлашыр. Тохумлу гыжыларла чылпагтохумлуларын «макрофил» типләри: *Cycadales*, *Bennettitales* вэ *Ginkgoales* асанлыгла бирләшир. Кордаитләрин, ийнәярпаглыларын, ачылыгкимиләрин мәншәи һәлә тамам айдычлашдырылмамышдыр. Одур ки, чылпагтохумлуларын индики системи сүн'и системдир (шәһит 180).

Архегониялыларда ашағыдакы хусусийәтләр вардыр: 1) вегетатив, гейри-чинси вэ чинси чохалыр; 2) чинси нәсл (һаметофит нәсл) илә гейри-чинси нәсл (спорофит нәсл) мүнтәзәм сурәтдә нөвбәләшир; 3) мамырлардан башга спорофит нәсл прогрессив сурәтдә инкишаф эдир, һаметофит исә кет-кәдә ихтисар олур; спорофит узун өмүрлү вэ йүксәк ихтисаслашмыш олур, һаметофит исә гысаөмүрлү вэ ялныз чинси чохалманы тә'мин этмәк үчүн уйғунлашмыш олур; һаметофит әввәлчә икичинсли, сонрлар исә бирчинсли олур, о әввәлчә торпағын алтында вэ я үстүндә әмәлә кәлир, сонра исә мегаспорун габығынын ичиндә инкишаф эдир, бә'зи плаункимиләрдән башлаяраг бурғу шәклиндә юхарыя галхан төкамүл хәтти үзрә та чичәкли биткиләрә гәдәр мүхтәлиф-спорлулуг үмүми хусусийәт һалыны алыр; 4) архегонияларда (бә'зи гыжылар мүстәсна олмагла) спор ярпаглары тәдричән көвдә вэ будагларын учларында гоза һалында топланыр вэ вегетатив (гидаландырычы) ярпаглардан фәргләнир; 5) чылпагтохумлуларда микроспоранкия тозлуг ювасына, мегаспоранкия исә тохумлуға чеврилмишдир, мегаспоранкия ана биткидән айрылмыш; 6) Тәдричән эркәк һаметофит хусусийәтини итирәрәк бир вегетатив вэ ики спермия һүчәйрәси олан гоз борусуна, диши һаметофит исә илк эндоспермә чеврилир; 7) чинси әлағә процесини тә'мин этмәк үчүн илк нүмайәндәләринин спермато-

зондларнинг суя элтишчи олдуғу ҳалда чох инкишаф этмишларинда (мәсәлә, ийнәярпағлыларда) гамчысыз сперматозондлар,



Шәкил 180. Архегониялы биткиләрнн филогенетик схемн.
(Алйохин, Голенкин, Курсанов вә Мейерә көрә).

йә'ни спермиялар әмәлә кәлмишдир ки, онлар да тоз борусу васитәсилә архегония чатдырылып.

Гыжыкимиләрдән башлаяраг һәгиги көк әмәлә кәлмиш вә о, биткини мәһлул һалында минерал мәддәләрлә гидаландыран

орган вәзифәсини көрмәйә башламышдыр. Саговникләрдән башлаяраг вертикал көк әмәлә кәлмишдир. Хырда чыхынтылар шәклиндә илк яarpaларын әмәлә кәлмәси псилофитләрдән башламышдыр; онларын көвдәләри үзәриндә ағызчыглар олмушдур. Көвдәнин икинчи дәфә йогунлашмасы хусусийәти тәләб олмуш, плаункимиләрдән башланмышдыр. Бир чохалма васитәси олан тохумун әмәлә кәлмәси тохумлу гыжылардан башламышдыр, одур ки, тохум-чичәк вә мейвәйә нисбәтән даһа гәдим тәрәмәдир.

Фидокенетик системия тәртиб эдилмәсіндәки чәтнянлыкләрн сәбәб бир чох регрессия инкишаф һалларыдыр. Мәсәлән, һейшәрат вәситәсизлә тозламға уйғулашымыз битки грүпләрыдә, бәзәләри муыйбән инкишаф дәрәжәсина чәтдыгдан сонра күдәк вәситәсизлә тозламға үчүн бир сыра бәсит вә ибтидау түсүсүй. Иглар кәб эдир. Бунара гүччәкәклиләри, гөччәкәклиләри, кичикчәкәклиләри, сөвдичәкәклиләриг вә сәирәнн мисәл кәстәр-кәб олар.

Бәзи ботаниклар чичәклә биткиләрин ачылыгкыиһлардәя (*Ginetalia*) әмәлә кәлдйиниң нсбат этмәй чалышмйшлар. Ачылыгкыиһлар сырасыиһи бәзи аиллқк әләһиһлар оһласы чичәклә биткиләре яхынлашдырырса да, ләкин чичәклә биткиләрин ачылыгкыиһлардәя әмәлә кәлдйиниң субүт әдәчәк җәһәти дәлиһләр нөһүд.

Чыпгартуохумуларын чохунда эрkek гозалар гейри-мүйэйэн мигдарде чикроспор яргатындан, дини гозалар исе гейри-мүйэйэн мигдарде мегаспор яргатындан эмэле кэлиимиз. Батта нэски кэлиимиз бейнеттитлэр сифиния бэизээринде гозалары никисчилэ олуб, мүйэйэн дэрчөдө өртүдүтүохумлу биткэлэрин чикрөктөрүөс хошайармыш. Олур ки, чикээл (өртүдүтүохумлу) биткэлэрин чикэйини мандан баггында бэиз ботаникаларин ирдэс сүрдүктөрүн гоза (стүбүлэр) нэзэрыйиылэри даһа чох иналандыр-чыдар. Һэммн алимлэрин фикринчэ, илк чикэк гоза шаклиндэ чимш. Ондары һиссэлэр чох олуб, бүрү узга дүзүдүрмүш. Белэ бир чикэк гурулушуну илдн биэ чикээли (өртүдүтүохумлу) биткэ-лэрин эн ибтидан групу һесап олунач чохмэйвэллэлдэн (*Poly- sarcus*) магнолиаларда өз бэиз гурдбаған фәсиләсинин шәм-белә заләриндә көсүрүк.

Гоша нээрийнхэснэ көрө, тэжүүл аламжлэринин аһемийһэ-
ти ашағыдакы чэдвэлдэ көстэрнлир.

Һәр хансың фәсикләнеп системдә тутуңу мөвгән мүйәһи этмәк үчүн әсәс хуҗасыңны биткиләргән гурулуш әләмәтләриндәк бәзиләрини бир-бирини өзәс этмәсидир. Биткинин ибтидавиләйи әя я аһликин мөһәсәләс буларын җәһәтләсә һәлл әдилер. Лакин һәр гурулд, фәсикләдә, чинсәдә, нөвдә арасыксызлаһәт тәкәмүл процесә чох вахт мухтәһәф йолларла кедәр. Бунун дә нәтиҗәсиндә һәр гурулд бир чүр әләмәт, дикәр гурулд икә бәштә чүр әләмәт даһа чох дәнйишр. Оңуң ки, эйиң фәсикләнин чүмәлгәндәләриндә

ЧИЧЭКЛИ ВЭ Я ӨРҮЛҮТӨХУМЛУ БИТКИЛЭР
Anthophyta ВЭ Я Angiospermae ТИПИ

Өртүлүтохомулу быткыларына чылаптохуммулардан Фөргн тозчуу бабул этиэк үчүн чичкеде арызчыг, сүтүнчүг вэ муурталыгдан иберет дйишчик алдакан органын эмэле кэлмисидир. Аңызчыг тозчуу тутма; муурталыг нсе — ичарындиэк тохумдуг маяландыгдан сонра эмэле кален тохому хэрич амиллэрин ээрэрин тэбиринден гөрүмүг үчүндү; тохумдугдан харачыдак нисса мейвэ аргаларынын көнэраты илэ бир-бирине бирлэшимесинден эмэле кэлмишдир, маялнмадан сонра ондан мейвэаныгы эмэле калдр. Дйишчик ялыз өртүлүтохуммулара махусу олган натиг чичкеде сүр. Одуру ки, өртүлүтохуммулара дншачикли бытквларда дейлини.

[illegible]

Чыпгатахомулларын һәмкис (тәләф олмуш бәзн форма-лардан башта) агач биткеләредр, һалбуки чичекли биткелә-рин ичәрисиндә бирилли, киңликл вә чоһналик отлар чоһау. Чичекли биткеләрин характер хуsusийәтләриндән бири дә дәли-ли вә харичи гурулушларыныңдыкә йүксәк дифференсациядр. Су вә гүдә борусу тоһаларындакыкә мүхтәлифликл, яргатлары вә чичекләрин фәртли олмасы, һәшәрәт вәситәдәкә чарпәс тоһан-маг үчүн әмәлә кәлмиш үбүгүләншмәләр өртүлүтохомулу битки-лар чыпгатахомуллардан айырар. Өртүлүтохомулдуғи өзү (дичәнейин олмасы) чарпәс тоһамак илә алағадардыр.

Өртүлүтөхүмүлөр табашыр дөврүндөн мөлүмдүр, ола бил-
син ки, онларын төкөмүлүнүн көкү даһа да гөдмиләрдән баш-
лабыр.

Биринчи доростал ибтидамик аломатлар	Иккинчидоростал нисбатон тоқимул оламетлар
Ковда	
а) Ағач ва қол	а) Биткинин от шаклига аламасы
б) Баситлик, булагланмамағ	б) Будагык олиағ
в) Янқ хуруш	в) Сарына
г) Бору тоғаларымын олмасы, ялмыз трахедларын олмас	г) Бору тоғаларымын олмасы ва тоғаричи нызмаи ертумасы
Ярпағ	
а) Боситлик	а) Мүрәккәблик
б) Бургу үзрә (новба ила) дүзүлүшү	б) Гарым-гаршыя, дәстә ила дүзүлүшү
в) Янлағарымын текмәси	в) Ярпағларын текмәси
г) Тора охшар дәмәраана	г) Паралел дәмәраама (жашы э'тибарлаэ нисбатон сорақы дәмәраама новдзүр)
Чичәк	
а) Чичәкләрин төх-тәклийи	а) Чичәкләрин группәлә топанамасы
б) Чичәйин ниссәләрини (каса арпағлар) ва ләчәкләрин, эрәкчәк ва дишчиңкләрин) бургу үзрә дүзүлүшү	б) Чичәк ниссәләринин дәирә үзрә дүзүлүшү
в) Чичәйин ниссәләринин (эрәкчәк ва дишчиңкләр) чохлағу, гебри-мүйбәлини	в) Дәмәрәләрдәки ниссәләрин аламығы ва мүйбәлини (мәсәлән, 4, 5 ва 3 үзүлү чичәкләр)
г) Икитатлылығь чичәкләр ибтидакир, ләкин чичәйин өртүғү оамәсмын ибтидамик һесаб әтиәк олмаз	г) Чичәйиниң оамәян чичәкләр (өртүксүзләр, ағалмакләр) ва ы биргәтәйлиғь чичәкләр (бәрөртүклүкләр, монөхламидлар); бу ахырынчылар күдәк засәт-снәә тозлашыа көдәкләрәнә кәрә чичәкләрин өртүкләрин икти-сара дүшүмшәдәр
Чичәйин	
а) Чичәйин кәса ва тәч арпағларын сәрбәстлиги, йә'ни битишмәәлини (сәрбәстләғи чичәкләр)	а) Чичәйин кәса ва тәч арпағларын дибәдән бору кими бир-лөшмәси (битишчиңкләк ила чичәкләр)
б) Чичәкләрин әктипоморфу-дү	б) Чичәкләрин зиготоморфу дү
в) Юмуртәлиғь ашағылығь	в) Юмуртәлиғь ашағылығь
г) Кинәсийн апариллығь похлу мейвәарпағидан ибарәт оамәси	г) Кинәсийн сәнкәрплығы
д) Эрәкчәкләрин чохлағу, һәмәсмын сәрбәстлиги	д) Ниссәи бирчә битиш мейвәар-палыдан ибарәт оамәси
Энтомофилия	
а) Энтомофилия	а) Эрәкчәкләрин аламығы, мүйбәли ытларда олмаси, чоғ заман битишчиңлиги
б) Тоғатуу энтомофилия тияп-пакли, дағьмәси, гүртүлүтү ва һәмәрлығы	б) Энтомофилия
	в) Тоғатуу биршырымлы-лығы, ләшгәтәйлиғь, қол-көтүрүлүшү

	Биринчи дәрәҗәли юстициялик әһәмәтләри	Иккинчи дәрәҗәли юстиция тәһкүмә әһәмәтләри
Тоҳум	к) Чичәйиң иккинчидәһиң л) Бирәвәлилик ә) Бир чичәкдә тоҳумлуғларын чолуғу б) Тоҳумдә эндоспермин липи- шәф әтмәс в) Рушәйиң қичқисаңиң, дү- лүң, эндосперм илә әһәтә олуңмәс. дәрәҗәлиң	к) Чичәйиң бирчәклиһиң л) Иккиәвәлилик ә) бир чичәкдә тоҳумлуғларын азлығы б) Тоҳумдә эндоспермин олма- мәс в) Рушәйиң әйрилиһиң йә я букуһау. ә) әндосперминлиһиң; бир- дәрәҗәлиһиң (дәһләриң; олма- мәс әдәләшмә һәтчә сәһир)
Һәттиң да- һам	ә) Чоһөмүрәдүк	ә) Бирлиһиң, иккиһиң битки- ләр (сорадан әһәтә кәл- миһиң)

нән ибтидаанлык, нәм дә алиһкә хусусийәтләренә тәсәдүф элдиләр.
Мәселән, гурабгоң (*Ranunculaceae*) фәсиләсинә мәнсуб олан
гурабгоң (*Ranunculus*) чинисини бүтүн пөвләрини чиңгәкләри
мүтәзәзди, ләкин сиз дә һәмни фәсиләдә мәнсуб олан әсбәч-
кайи (*Consolidia*) чинисини бүтүн пөвләрини чиңгәкләри геһри-
яһийәземдир (энгоморфдур). Бу һадикәдә морфоложи уй-
ғунсузлуғ деиллир. Белә фактлар филогенетик систем дүзәлт-
мәк кишинә чәтинләшдирил, одур ки, систематикада тәдқиقاتчы,
яһнәз бир аламәтлә кифайәтләнырәк хурыда «кәстәрлен»
методларын һәмсиында биркә истифалә этмәли вә чахардылар
нәтиҗалар әсасында систематик ваһидин (пәвүн, чинсин, фәсилә-
нә вә һ. а.) филогенетик системдәки мәвгенин дүзүкүн мүһәйиз-
ләтмәлидир.

Айдыңдыр ки, 182 000-дөн арыгы нұмайғандасы олан чичәклин биткиләр арасында филокентетик систем дүзәлтмәк асан иш дейиләр. Ени вә мүкәмәл филокентетик систем дүзәлтмәк үчүн ардыңчыл палеонтолож и галыглардан истифадә этмәк вә бүтүн ер узавна олан биткиләр ядә танышылыгы ләзымдыр.

Гələ индибедək там мə насиял мукəмал сайылачəғ филоленик систем бохдур, лəкин онə яхын олам мухтəлий филоленик системлəр дүздəлдимəшдир. Оллардэн нəзырдə бəйəнлиш бул гəбул олумшуду А. А. Гроссгейнмн тəсннфəтдыр. А. А. Гроссгейнмн тəсннфəты əсəсндə акаленик П. М. Жуковск бир гəзəрдə дəйишллик этмəлдə өз тəсннфəтын вəришмшдир. Бу китəбдə акаленик П. М. Жуковскнмн тəсннфəты əсəс кəтүрүлүмшүдүр.

**ГРОССЬЕМИН СИСТЕМНИКИ ГРАФИКИ ИФАДЭСИНИН.
БЭЗИ ХҮСУСИЙЭТЛЭРИ ҲАГТЫНДА ӨЗҮНҮН ИЗАНАТЫ**

Пудлення «Динамики системы», «Заман принсины көзлөрчү-мөйөн системн» өз бөзін башга тедигитчыларын ирәли сүрдүкләри графикн системләр тәкәмүл айланышына зидд системләрләр. Систем, Дарвин тәрәфидән тәклиф эдилмиш филокениетик ағач шәкліндә ифадә олунамдылар.


Филогенетик агачы икн чүр: ади формалда яндан өз будагла-
рынын муствы узундө проекирсиясынын экис кини көстөрмөк
олар. Бу ахырынчы жалда системин өсөс сүтүнүлэры өз будагла-
ры дашырын ортасында шуа шөклөндө дүзүлүр. Дашырын мэр-
көзүндө чычкөли биткылырын даһа нөтидан һессаб этдүйнөмиз өсөс
групу гокологиялыдыр. Чычкөли биткылырын ердө галаан бүтүн
группалары ондан эмэлэ калымышдыр. Бу групп филогенетик агачын
өсөсаны тошкөк эдир. Икн даһра чөкмөклэ бир-биринин адыны-
ча нөвөтөлөтүн үч бошлуп алда эаылыл ки, олар да чычкөли бит-
кылырын үч мувафиг ннжишөп дәрчөсө гөбул эдилер. Сыралар
нөс, өз ннжишөп дәрчөлөһирлөндөн асылы олараг ерлөһидирлир.
Бунула белэ, бәэи сыралары икн даһра арасында көстөрмөк ла-
зым калып.

Сыралар мүйүзлүк бөйүктүлүк дараа илэ кестерилин, бу дэ системин даба чэ: өнөндилчэ сөөб олур бэ ер курастинин мүсүм флорасынын таркибиндэ нэр сыранын ролу натгында мүйүзлөк тевсөвүр ярадыр. Нэр сыранин бөйүктүлүгү онун таркибиндаки фэсилаларны мидгарына дейла, невэлтин мидгары илэ мүйүзлөк эдилер, чүнки флоранын таркибиндэ сыранын ролу натгында яланч бэ гайда илэ дүкүз тевсөвүр ярана бвлэр. Садэлкч үчүн сыранын невэлтин күрө шаклиндэ кестерилир вэ курастинин рэдусу мүйүзлөн формула илэ несабалдыр. Шекедэ кестерилин дисклэр фэрэ шүмбэ курааларын сатг үзгэндикчэ проесиялардыр Чыгыска диткаларын инкишад хэтинэ мүйүзлөн олтарг шекедэ мүйүзлүк дисклэр чыныамашдыр: ичч параллел хэтелрнэ олган дисклэр нэшартэ васителсиз тоалдан сыраларын, чоп чизкилэрнэ кестерилөн дисклэр-күлөк васителсиз тоалдан сыраларын, чарпас хэтелрлэ кестерилөн-суда ышамга уйгуулашмын, сасэ эттирилэ өз-өзүнэ тоалдан сыраларын, нэлэйэт гары дисклэр-хетеротроф нэлэ кеширөн сыраларын иларесидир. Бэзи йилларда эйни диски мүйүзлүк хэтелрлэс дэ кестермэк дэзим кэйдэ.

Һәмшн гайда идо схематик оларак һәм яхтисаслашымыш прогрессив камид типлары, һәм да садәләшмиш регрессив типлары кәтәрмәк олар.

Төхмүлүн үмүмү истигамәтнин схемда мәркәздән яңлара, регрессива доғру келән (гидрофил вә һетерофил) типларын иңкишәф истигамәтнин исә яңлардан мәркәзә кәстәрмәк дүзкүн ола билғәмәз.

Сырларын адлары алтчндан мұхтәлиф хәтләр чәкилир. Бу-
рада тропик өлкәләрдә айылмык сырларын алтындан кәггәләр,

[illegible]

полиарктикая махсус сыраларын алтындан бүтөв хөтт, чөнүб ярымкүрсэндэ айымыш сыраларын алтындан исэ гырыг хөтт чөккисиллэр.

Сүтүлэр вэ будалар схемда белэ группалдырылынышдыр: анокимилэрин эчдадындан эмэлэ кэлмнн групплар схемин сир ниссесиндэ, раналкимилэрин эчдадындан эмэлэ кэлмннлэр исэ схемин башга бир ниссесиндэ ерлэшдыралындыр; лэкин схемин мүйөйк секторларында сүтүлэр вэ будалар мүнүтөзм сүрөлдэ иовбалэмнөйб, өз инкишаф дэрчөлөрүндэ асылы оларат дейишэ билэр. Белэ халларда онлар схемдөкн кыкн дейил, башга чүр ерлэшдырлар.

Юхарда көстөрилэн ибтидалык аламэтлэрин чох олан битки группу чохмевэлиилэрдыр (*Polycarpusae*). Онуя чичэйиндөкн ибтидалык аламэтлэри чичэк ятагынын аз-чох габарыг олмасы, чичэйин нисселэринин сайча чох олмасы вэ бургу кимн дүзүлмөс, чичэйин мүнүтөзмлэйн вэ диншчэйин апокарн кенисей тэшкил этмөсидир. Мейвэси етишэн заман илк бахышда ийнөдрпагылылары гозасына охшайыр.

ӨРТҮЛҮТОХУМЛУЛАР (*Angiospermae*) ВЭ Я ДИШИЧИКЛИЛЭР (*Gymnociatae*) ЯРЫМ ТИПИ

Һазыркы системлэрин һамысында өртүлүтохумлулары аша-рыдакы икн сифа бөлүрдөр: 1) икиләпәлиләр; 2) бирләпәлиләр.

Икиләпәлиләр сифи көвлөрүнннн сайына көрө бирләпәлиләр-дән 4—5 дөфө артыдыр.

Икиләпәлиләр сифиндэ мәнсуб олан биткилэрин тохуму бө'згн чөтүрчөккисилэр, нөркисчөккисилэр вэ саирэ мүстөснэ олматла икиләпәли олур. Экспериментин чөккөлөрн 5-типли вэ 5-үзүлүдүр, бө'зилриндэ чичэйин нисселэри "бургу үзрө дүзүлүр. Икиләпәлилэрдән бир чохуну көздөсидэ ана гат (камбия гаты) олур. Олур кн, буларда икинчн йөгунлашма кедир, су вэ гнда борулары топарлары динрэлэр үзрө дүзүлүш олур. Икиләпәлилэрин көкклэри шагули вазыйбатда узаныр вэ ана чөк кениш инкишаф эдир. Ярпагалары тор шөклндэ дамарланымшдыр вэ онларда чох хат ярпагалтыгы олур.

Тохуму бирләпәли олан өртүлүтохумлулара бирләпәли-ләр сифи дейилэр. Бирләпәлилэрин чохуну чичөклэри 5-ти-пл вэ 3-үзүлүдүр, лэкин бө'зилэри бу типдән чыкн билэр. Бирләпә-лилэрдэ ана гат (камбия гаты) йохдур, су вэ гнда борулары топар-лары дагыныгыр. Онларын чохунда икинчн йөгунлашма муша-һиндэ эдиллэр. Ярпагалтыгылар йохдур. Ярпагалары геөсвэри вэ я параллел дамарлыдыр. Тохум чүчэрэн заман илк дөвлрлдэ ана көкү инкишаф этсө да, тез төлөф олур вэ элава көклэр инкишаф элиб, сачагы көклэр эмэлэ кәтирлр.

Бирләпәлилэрдэ икиләпәлилэр арасында бир сыра үмүмн охшар чөһөтлэр бардыр. Мәселән, бирләпәлилэрдән бө'згисиндэ ярпагалтыгынын олмасы, бө'зилэринин ана көкүнү инкишаф

этмәсн ярпагаларынын торшөккилли дамарланмасы вэ саирэ, икн-ләпәлилэрдөкн исэ зәрничдэ, гурдбоғанда чичөкяныгынын 3-үзүлү олмасы, су вэ гнда боруларынын бирләпәлилэрдөкн кимн дүзүл-мәсн вэ н.а. Буна көрө да табикатилэрдән бир чоху бирләпәли-лэрин икиләпәлилэрэ мәнсуб олан гурдбоғаклардан вэ я зәрнич-чөккисилэрдән, һәр халда чохмевэлиилэрдән (*Polycarpicae*) төрдийини идһиә эдлр.

Виз бурада айры-айры битки группларынын тәсвирини ән иб-тидан өртүлүтохумлу олан икиләпәлилэр группундан башлайырыт.

ИКИЛӘПӘЛИЛЭР (*Dicotyledonae*) СИНЧ...

ЧОХМЕЙВЭЛИЛЭР (*Polycarpicae*) САРАСЫ

Чохмевэлилэр сырасынын әсас хүсусийәти, адындан көрүн-дүкү битки диншчэйини тэшкил эдән сәрбәт мейвә ярпагалары-дан ибарәт мейвә эмэлэ кәтирмәсидир. Йөмнн мейвә ярпагалары типик фәсиләләртә габарыг чичәк ятагы үзәриндә бургу үзрө дүзү-лүр. Бир сыра халларда чичөк ятагы дүз. бө'зән дө чухур олур, һәтта бө'зән чичәк ятагынын дивары мейвә ярпагалары илә бир-ләшәб апары юмурталыг эмэлэ кәтирәт. Типик формаларда чичөкяныгы чох олур. Бө'зиләриндә касачыг "а тач бирләшүр, касачыгн алтында чичөк алтыгы эмэлэ кәтирлр вэ тәчдә чәтин-ликлә фәртләнлр. Чохмевэлиилэрдән бө'згисинин чичәи 5-типли олүб икиләпәлилэринкигә, бө'згисинин чичәи һсә 3 типли олүб бирләпәлилэринкигә охшайыр. Буларын бө'зилэри анатомик гурулушлары илә чылаптохумлулар, бө'зилэри дө бирләпәли-ләрә яхынлашыр. Мейвәлэри фындыгыч вә я биртохумлу гүтүчүт-лардан ибарәт олур. Чох аз халларда диншчиклэри сабы азалыб бир нечәй чатыр вә бир-биринә бирләшиб гүтүчүт эмэлэ кәтирәт вә диншчик аңач бир эдәл олур. Бу заман диншчикдән киләчәк вә эмэлэ кәлр. Бу сыра башлыча оларат ағач биткилэри дө-хилдир. Ярпагалары баситлр вэ онларда әтүрли яғ вәзилэри олур. Бу сыра магнolia, а н а с фәсиләлери вә саир фә-силәләр дахилдир.

Магнолия (*Magnoliaceae*) фәсиләси

Магнолия фәсиләси чохмевэлилэр сырасынын типик фәсилә-сидир. Бу фәсиләдә чичәк нисселәринин бургу үзрә дүзүлүшүнә бө'зән дәирә үзрә дүзүлүшлө авәз олундугу көрүнүр. Бу кн дүзү-лүш гайдасы арасында кечид формалары бардыр. Бурая ярпаг-лары бүтөв кәнарлы вә яри олап ағачлар дахилдир. Фәсиләнин *Drimys* чинсинин олунчаг ниссесиндә су вә гнда борулары авә-зинн трахейдлэр бардыр. Ярпаг вә көвдәнин габгыгында да-хили әтири яғ вәзкйлэри ерлэшлр. Чичөклэри әсәсән һәмжидә инкичисилдир. Чичөкяныгы чох яхт бургу үзрә, аз-аз халларда исә дәирә үзрә дүзүлүшүдүр. Магнолия чинсиндә касачыг яр-

вә әмәлә кәтирир. Онларда бә'зән чичәкянлығы олмур вә чичәк чылпаг көрүнүр, Эркәкчикләри үч вә я чох олур.

Ананас фәсиләси магнолия фәсиләсилә сых әлагәдардыр. Ананас фәсиләсиндә чох вахт эркәкчикләр вә мейвә ярпаглары



Шәкил 185. Мүшкгозу (*Myristica fragrans*)

бурғу үзрә дүзүлмүш олур. Икинчи одунчағы садә гурулушлудур, ярпагларында вә габыг һиссәсиндә, әтирли яғ вәзиләри вардыр. Бу фәсиләнин 800-ә гәдәр нөвү мә'лумдур. Онлар тропик өлкәләрдә битир.

Дәфнәкимиләр (*Lauraceae*) фәсиләси

Бу фәсилә мүшкгозу фәсиләсинә яхындыр. Дәфнәкимиләр фәсиләсинин чичәкләри икичинсли вә я бирчинсли 2—5 вә чох вахт 3 үзвлүдүр. Чичәкянлығы ики, эркәкчикләри исә 3—4 дан-



Шәкил 186. Камфора ағачы. (*Cinnamomum camphora*)

1—Чичәйинин хариңи көрүнүшү; 2—чичәйинин даһили көрүнүшү; 3—чичәйинин узунуна кәсийи; 4—5—нектарлыглары; 6—чичәйинин диаграммы; 7—мейвәси.

редә дүзүлмүшдүр. Бә'зән эркәкчикләрин бири стаминодия чеврилмиш олур. Тоз кисәләри гапагларла ачылыр. Диңичийи магнолияя инсбәтән али гурулушлудур, чүнки ону төшкил әдән 3 мейвәярпағы бирләшәрәк сиккарп кенисей әмәлә кәтирмиш-

дир. Мейвэләри киләмейвә вә я чәйирдәкли мейвәдир. Бу фәсиләйә мәнсуб олан биткиләрин чохунун чичәк формулу бирләпәлиләрдәки кими 3 типлидир ($P \div 3, A3+3+3+3, g(3)$). Чоху, һәмшә яшыл ағачдыр. Ярпагларынын ярпагалтлығы йохдур вә бурғу кими дүзүлмүшдүр. Ярпагларында вә бир чохунун көвдәсинин габығында әтирли яғ вәзиләри вардыр.

Дәфнә фәсиләсинин 1000-ә гәдәр нөвү вардыр. Онлар, башлыча олараг, субтропик өлкәләрдә яйылмышдыр; ләкин бәзи нөвләри мұлайим иглимли ерләрдә дә битир.

Бу фәсиләнин әсас чинсләриндән бири дәфнә ағачыдыр *Laurus nobilis*. Дәфнә ағачы Загафгазиянын Гара дәниз сәһилләриндә чох яйылмышдыр. Азәрбайчанда бәзи шәһәр бағларында бәзәк биткисин кими әкилир. Ярпағында хош ийли яғ вәзиләри олдуғуна көрә ондан хәрәйә дад вермәк үчүн истифадә олунур. Загафгазияда һәр ил бир нечә йүз тон дәфнә ярпағы йығылыр.

Дәфнә ағачынын тәзә мейвәсиндән алынан дәфнә яғындан дәрман һазырланыр. Дәфнәнин тохумунда 24—26% яғ вардыр. Ярпағындан 0,4—1,0% миғдарында алынан әтирли яғ, гурулушча чох мүрәккәб олуб, яхшы әдвийят сайылыр. Дәфнә ағачы һәмшәяшыл олуб, бүтүн районларда бечәрилә биләр.

Бу фәсиләнин чох әһәмийәтли чинсләриндән бири дә дарчындыр (*Cinnamomum*) онун нөвләринин габығындан алынан дарчын бир әдвийят кими, яғы исә тәбабәтдә ишләдилир. *C. camphora* нөвүндән тәбабәтдә чох истифадә эдилән кафыр (камфора) яғы алыныр (шәкил 186).

Бу чинсин бәзи нөвләринин одунчағы чох дәйәрли вә мейвәсин эмәли олмагла барабәр, бир бәзәк биткисин кими дә чох гиҗәтлидир.

ГУРДБОҒАНКИМИЛӘР (*Ranales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын әсас фәсиләләри зәринчкимиләр, гурдбоғанлар вә су замбағы фәсиләләридир.

Зәринччәклиләр (*Berberidaceae*) фәсиләсин


Бу фәсиләнин нұмайәндәләри, бәсит вә я мүрәккәб ярпаглары олан кол вә я чохиллик отлардыр. Чичәкләри тәк-тәкдир вә я салхым кими чичәк группларына топланмышдыр, адәтән иккинчислидир. Чичәк үзләринин даирәви дүзүлүшүнүн үмуми формулу беләдир: $P3 \div 3, N3 \div 3, A3 \div 3, g 1$ (шәкил 187—188). Бурада N негтарлығы көстәрир ки, онлар ләчәкләрин дибиндә әркәкчикләрин дәйишмәсиндән эмәлә кәлмишдир вә ики даирә үзрә дүзүлмүшдүр.

Әркәкчикләринин тозлутлары, дәфнәдә олдуғу кими гапагла ачылыр вә я чаглайыр. Мейвәләри биртохумлу сулу мейвә вә я

гутучугдур. Тохуму эндоспермлидир. Фәсиләнин 150-йә гәдәр нөвү мәлүмдур.

Зәринч (*Berberis*) чинси кениш яйылмышдыр. Бу чинсин газынты һалында галыглары үчүнчү дөвр сүхурларында тапылмышдыр. Һазырда Гафгазда, Азәрбайчанын дағәтәйи вә мешә гуршагларында яйылмышдыр. Бу чинс өз-өзүнә тозланма үчүн уйғушлашмышдыр. Будагларындакы ярпаглары чоху тикана чеврилмиш вә биткисини горумаг үчүн уйғушлашмышдыр.

Мейвәләри етишән заман узунсов, гырмызы рәнкдә олур. Дады туршдур. Тәзә икән мүрәббә биширилир, гурусундан сумах кими истифадә эдилир, ширәсиндән лимонад вә ликйор истеһсалында истифадә эдилир. Чичәйи чохлу тозчуг вә нектар верәндир. Гуру ярпағында «А» витамини, мейвәсиндә вә тәзә ярпағында исә «А» вә «С» витамини вардыр. Көвдәсинин габығындан вә көкүндән тәбабәтдә истифадә эдилир; эйни заманда ондан иш вә кәп боямаг үчүн ачыг сары рәнк алыныр.



Шәкил 187.
Зәринчичәйинин
диаграмы.




Шәкил 188. 1 вә 3 зәринчичәйинин дахили гурулушу; 2—ғысалмыш будағы вә чичәк группу

Азәрбайчанда зәринч (*Berberis*) чинсинин ашағыдакы үч нөвү яйылмышдыр: *B. vulgaris*, *B. densiflora* вә *B. iberica*.

Бу биткиләрин зәрәрли чәһәти, тахылларда пас хәстәлиинин төрәдән көбәләйин аралыг саһибин олмасыдыр. Одур ки, тахыл әкилән районларда онун көкү кәсилмәлидир.

рында хоша көлән түршлүг, юмруларында исә «С» витамини бардыр. Кировабад вә Бакы атрафында чөлләрдә, әкин ерләриндә вә гуру тәпәләрдә битир.

Гурдбоған фәсиләсинин ер үзәриндә 1500-ә гәдәр нөвү вардыр. Бу фәсиләнин нұмайәндәләри арасында чичәк вә мейвәләринин гурулушу әтибарилә ән ибтидандән башламыш ән йүксәк формая гәдәр мұхтәлиф кечид формаларына раст кәлинир (чичәкләри садәлиқдән мүрәккәбә, мұнтәзәмликдән гейри-мұнтәзәмлийә доғру мейл әдир).



Шажал 189. Гүрдбоған фэстлэснийн чичэктериндэ тэхамүл

Гурдбоған фәсиләсинә дахил олан биткиләрин чохунун чичәйи актиноморф, бәзиләриники исә зигоморфдур. Бәзи зигоморфларда чичәк маһмызлыдыр. Чичәк һиссәләринин бир гисми дәирә үзрә, бир гисми дә бурғу үзрә дүзүлмүшдүр. Бәзиләриндә чичәкянлығы биргат, бәзиләриндә икигатдыр. Ләчәкләри чох вахт нектарлыға чеврилir. Эркәкчикләри чохдур. Мейвәләри-ярпагмейвә, фындыгчыг вә киләмәйвәдир. Бу фәсилә өз гәдимлийинә бахмаяраг прогрессив олуб, нөв әмәлә кәтирмәкдә давам әдир (шәкил 189).



Шәкил 190. Солда—гарачөрәк оту (*Nigella arvensis*)

1—чичәкли будағы; 2—мейвәли будағы.

Сағда—кони́т (*Aconitum napellus*). 1—чичәйин харичи көрүнүшү; 2—узунуна кәсийи; 3—ләчәкләрин дәйишмәсиндән әмәлә кәлән нектарлыглар; 4—үчярпагмейвәдән ибарәт мүрәккәб ярпагмейвә; 5—партламыш мейвәярпаглары.

Күләбәтин (*Pulsatilla*) вә пион (*Paeonia*) кими чинсләрин касая охшар һиссәләри, шәклини дәйишмиш ярпаглардан ибарәтдир я да кәпәнәк чичәк акони́т (*Aconitum*) чинсинин нөвләриндә олдуғу кими, стаминод һалындакы эркәкчик ләчәк шәклини алыр. Әксәриййәтиндә эркәкчикләр чох олур. Мейвә-ярпаглары чох вахт тәкамүл нәтижәсиндә азалыб бирә чатмышдыр. Мейвәярпаглары чох олдуғда, гурдбоған, сычангуйруғу вә саирә чинсләрин нөвләриндә олдуғу кими, габарыг чичәк ятағы үзәриндә бурғу үзрә дүзүлүр. Бәзи һалларда исә, гарачөрәкдә (мәрсин) олдуғу кими дәирә үзрә дүзүлүр.

Тохумлуғу бир вә я бир нечәдир. Мейвәләри ярпагмейвә, тохумча аз һалларда гутумуг вә я киләмәйвәдир. Азәрбайҗанда гурдбоған фәсиләсинин 33-дән артыг нөвү олан гурдбоған (*Ranunculus*) чинси даһа чох яйылмышдыр. Бәзи нөвләри бишмиш һалда ейилir, бир чоху исә алағ отудур.

Фикария (яғлыча оту) (*Ficaria*) чинсинин *F. Ledebourii* нөвүнүн көк гозаларында чохлу нишаста вардыр, битки чичәкләдикдән сонра һәмин гозалары бишириб емәк олар. Онун шималда битән *F. verna* нөвүнүн көк гозаларында 13,51% нишаста вә 9,73% шәкәр вардыр.

Бу фәсиләдән олан гара гайтарма (*Thalictrum*) чинсинин *Th. minus* нөвүнүн ярпағында 175,7—122,9 мг% «С» витамини вардыр.

Азәрбайҗанын дағ мешә гуршагынын батаглыг ерләриндә битән калта (сунәркизи) (*Caltha*) чинсинин (*C. palustris*) нөвүнүн биширилиб гурудулмуш көкләриндән фәсәли биширмәк олур, анчаг чий һалда зәһәрлидир, чичәкләмә заманы ярпагларында 52 гамма про «А» витамини вә 37—38,41 мг% «С» витамини вардыр.

Гурдбоған фәсиләсиндән ағач шәкилли лианолан ағәсмә (*Clematis*) чинсинин *C. orientalis* вә *C. vitalba* нөвләри вардыр. Бунлар мешә зоғларынын коллары арасында битир. Чаван зоғларыны хырда-хырда доғраяраг юмурта илә гайганаг вә я чығыртма һазырлайырлар.


C. vitalba нөвүнүн ярпагларында 69 гамма про «А» витамини, чичәкләриндә исә 0,12% әтирли яғ вардыр. Чичәк верән зоғларында яшыл гәтрян олур. Фәсиләнин әһәмийәтли чинсләриндән бири олан гара чөрәк оту (*Nigella sativa*) әкилиб бечәрилir вә чох вахт зибилли ерләрдә битир. Онун тохумунда 45%-ә гәдәр пийли, әтирли яғ олур. Һәмин яғын тәркибиндә терпен— $C_{20}H_{34}O$ вардыр ки, ондан да ейинти сәнаеиндә «гара кумел яғы» ады илә истифадә әдилir.

Тәркибиндә бундан башга бир дә, мелантин адлы ачы глүкозид вардыр. Һәмин биткинин тохуму хөрәйә дад вермәк үчүн ишләдилir, чөрәк, булки вә печен'енин үзәринә сәпилир, хияр вә кәләм туршусуна гоюлур.



Шәкил 191. Сычангуйруғу оту (*Myosurus minimus*)

1—бүтөв битки; 2—чичәйи; 3—чаллаһи узунуна кәсийи.



Шәкил 192.

I—сыңангуйруғу биткисинин чичәйи; н—нектарлыглары; л—чичәкяңлыгы;
II—кәпәңәкчичәк (*Asplenium persicifolium*) I—чичәйини узунуна кәсийи; а, б—дәмир
папаг шәкилли чичәкяңлыгы ярпаглары; м—нектарлыгы; 2—юмурталығын узунуна
кәсийи; сп—арха тикиши; бр—гарын тикиши; 3—юмурталығын эһинә кәсийи;
4—тохумлуғ. III—әһәрли гүрдбөгән (*R. scleratus*) чичәйинини узунуна кәсийи.

Сузамбағы (*Nymphaeaceae*) фәсиләси

Сузамбағы фәсиләсинин нүмайәндәләри дурғун вә я яваш ахан суларда битән гәдим (реликт) биткиләрдир. Онларын галыглары тәбашир дөврүндән мәлумтур. Фәсиләнин нүмайәндәләриндә бир сыра ибтидаилик әләмәтләри индийә гәдәр давам әгмәдәдир, мәсәлән, чичәк һиссәләринин гейри-мүәййән вә чох олмасы, бәзән апокарп кинесей мүшәһидә әдилмәси, бирләпәлиләрә хас олан әләмәтләр көрүнмәси вә с.

Бу фәсилә тропик мәншәлидир. *Victoria* вә *Euryale* кимн чинсләрин нүмайәндәләринин ярпаглары 2 м эһиндә олур. Бу фәсиләнин *Sabomba* чинси, чичәйинин беш даирәли вә үчүзвлү олмасы илә гүрдбөгәнә охшайыр.

Азәрбайҗанын Көйҗай вә Күрдәмир районларында дурғун суларда битән шанақуллә (*Nelumbium*) вә сузамбағы (*Nymphaea*) чинси нөвләринин чичәйи мүрәккәбдир. Касачыг ярпаглары 4—12-йә гәдәрдир. Ләчәкләри чохдур, бурғу кимн вә я даирәви дүзүлмүшдүр. Эркәкчикләри чохдур. Мейвә ярпаглары сәрбәст вә аз-чох әтлидир, гыфшәкилли чичәк ятағынын ичәрисинә кирмишдир. Юмурталыгы ашағы вә чохювалыдыр. Ярпаглары суда үзәндир, суюн дибиндә көкүмсов көвдәләри вардыр.

Азәрбайҗанда битән шанақулләнин чаван көкүмсов көвдәләри бишмиш вә я говрулмуш һалда ейлир. Говрулмуш тохумлары гәһвәйә гарышдырыла биләр. Буна яхын олан *N. candida* нөвүнүн тохумунда 47%-ә гәдәр нишаста олур. Көкүмсов көвдәсиндә ашы маддәси олдуғундан дәрини ашыладыгда гәһвәйи вә гара рәнкә бояйыр. Чох кәзәл бәзәк биткисидир.

Дәмирағаччичәклиләр (*Hamamelidales*) сырасы

Нөв тәркиби әтибарилә дәмирағаччичәклиләр кичик бир сырадыр. О, одунчаг һиссәсинин гурулушуна көрә магнолиячичәклиләрә, диши чичәкләринин гурулушуна көрә дә чәмәйвәлиләрәдән *Trachedendron* вә *Tetracentron* кимн ибтидаи чинсләрә охшайыр. Бу сыранын әһәмийәтли фәсиләләриндән *Дәмирағач*, *дикәри* чинар фәсиләсиндир.

Дәмирағач (*Hamamelidaceae*) фәсиләси

Дәмирағач (*Parrotia*) чинсинин *дәмирағач* (*P. persica*) нөвү, чох будагланан вә будаглары бир-биринә говушан һүндүр ағачдыр. Ярпаглары юмурташәкиллидир. Гутучуғу 5—8 мм узунлуғундадыр. Ялыз Ләнкәранда битир вә мейвә әмәлә кәтирир. Одунчағы бәрк олдуғу үчүн тохучулуг сәнаәиндә машын һиссәләри һазырламағ үчүн истифадә әдилир. Эһни заманда бәзәк биткисидир.

Чинар я лапан (*Platanaceae*) фәсиләси

Чинар фәсиләси бир әвли ағачлардыр. Ағачынын пабагы ачыг яғыл вә бозумтулдур. Ярпаглары 5—7 дилимлидир. Чичәкләри узун саплагларә топланмыш башчыг шәклиндәдир. Мейвәләри фыңдыгчыдыр. Бу фәсиләнин *P. digitifolia* нөвү Азәрбайҗанда вә үмүмийәтлә Зағәфразияда бәзәк биткиси оларағ әкилир.

Чинар фәсиләсинин вәтәни Кичик Асиядыр. Бунун *P. arientalis* нөвү Тбилисидә, Зағаталада вә бәзи башга районларда бағ вә паркларда әкилиб етишдирилир. Бу фәсиләнин үмүми мүһүм нөвләриндән бири дә *P. cuneata*-дыр. О, Гара дәниз саһилләриндә битир вә аз-аз һалларда бағ вә паркларда әкилир. Вәтәни Шәрғи Аралыг дәнизи әтрафыдыр.

Күлчичәклиләр (*Rosales*) сырасы

Икиләпәли биткиләрин әсасы, нисбәтән полиморф олан күлчичәклиләрдән башлайыр. Онлар инкишаф әтибарилә чохбудағлы олуб, будагларынын чоху икинчи инкишаф дәрәчәсиндә даянимшдыр. Бу сыранын фәсилә вә ярымфәсиләләринә дахил олан нөвләрин әксәрийәтиндә чичәкятағы чекәк вә юмурталыг юхарыда

олур. Сыранын нисбәтән садә гурулушлу фәсилә вә яримфәсилә-ләринә мәнсуб олан нөвләр, ләчәкләринин сәрбәст, эркәкчикләри, тохумлуглары вә ләчәкләринин чох олмасы илә фәргләнир. Бун-дан сонракы фәсиләләрдә исә чох вахт битишник ләчәклилик вә аз тохумлуг айдын нәзәрә чарпыр.

Бу сыранын бә'зи нүмайәндәләриндә, мәсәлән, бөйүрткәни-кимиләрдә (*Rubus*), чийләккимиләрдә (*Fragaria*) вә саирәдә эркәкчикләрин, бә'зән дә мейвәярпагланынын чохлугу вә сәрбәстлиги, кенәсейин апокарплығы, бурғу үзрә дүзүлүшү, чи-чәкятагынын габарыглығы кими ибтидаилик әләмәтләри, күлчи-чәклиләр сырасынын чохмейвәлиләр сырасы илә әйни мәншәли олдуғуну көстәрир. Көрүнүр ки, чохмейвәлиләрин гәдим әчда-дындан бөйүк бир будаг айрылараг күлчичәклиләр сырасына башланғыч олмушдур.

Күлчичәкликимиләр сырасынын нүмайәндәләри арасында ибти-данлик әләмәтләри оланларла бәрабәр, алилик әләмәтләри олан-лары да чохдур. Алма, армуд, әзкил, емишан вә саирәдә чичәк-ләрин нәшәрат васитәсилә чарпаз тәзланмая яхшы уйғунлашма-сы, юмурталыгын чичәк ятагына кириб онун диварлары илә би-тишәрәк ашағы юмурталыглы чичәк әмәлә кәтирмәси, алча, ка-валы, әрик, шафталы, көйәм вә саирәдә чичәк ятагынын гәдәһ шәкли алараг дашничик янлыглы чичәк әмәлә кәтирмәси вә саир бу кими хусусийәтләр алилик әләмәтләридир. Нәмин сыранын нүмайәндәләри арасында юхары юмурталыгдан ашағы юмурта-лыға вә чичәкләриндә мүнтәзәмликдән гейри-мүнтәзәмлийә доғ-ру кечидләр олмасы, онун чох тәбии бир сыра олдуғуну көстәрир.

Сыранын демәк олар ки, бүтүн нүмайәндәләриндә чичәклилы-ғы бештипидир, чохунун исә чичәйи икичинслидир. Чичәк үз-ләри даирәви дүзүлмүшдүр, актиноморф вә я зигоморфдур. Чи-чәкянлығы адәтән икигәтдыр. Эркәкчикләри чичәкянлығын сайы гәдәрдир вә я чохдур. Дишичийн әмәлә кәтирән мейвәярпаглари бир вә я бир нечәдир, сәрбәст вә я битишикдир. Чичәкятағы чох заман кенәлмиш, габарыг вә я чөкәкдир. Нәр ики һалда чичәк-янлығы ярпаглари вә эркәкчикләр чичәк ятагынын кәнарына битишмиш олур. Алча, кавалы, шафталы, көйәм, бадам вә саирә-нин тохумлуглары бир, алма, армуд, әзкил вә саирәнин исә бир нечә олур. Мейвәләри чох мұхтәлифдир.

Нүмайәндәләри ярпагалтлыглы вә я ярпагалтлыгсыз олур. Ярпаглари әксәрән бурғу үзрә дүзүлмүшдүр.

Күлчичәккимиләр сырасына довшанкәләми (*Crassula-
ceae*), дашдәләнләр (*Saxifragaceae*), күлчичәклиләр (*Rosaceae*) фәсиләләри дахилдир. Бу фәсиләләр илк бахышда чох мұхтәлиф көрүнүрләрсә дә, кечид формалари илә бир-бирлә-сәх әләгәдардыр. Беләликлә, сыра, там кенетик бир груп тәшкил әдир. Дикәр тәрәфдән, нәмин сыра мәнсуб олан дашдәлән фәси-ләси нарчичәккимиләр сырасына о гәдәр яхындыр ки, тәснифат-чылардан бир чоху дашдәлән фәсиләсини вә башга фәсиләләри нарчичәклиләр сырасына дахил әдир вә онлары күлчичәклиләрдән

айырырлар. Бә'зи ботаникләрә көрә күлчичәклиләр нарчичәкли-ләрлә бир сырада бирләшдирилиб, сонра яримсыралара бөлүнмә-лидир.

Довшанкәләми вә я гаягоруғу (*Crassulaceae*) фәсиләси

Довшанкәләминин чичәкләри мүнтәзәмдир. Икичинсли, аз-аз һалларда бирчинсли, икиәви биткиләрдир. Бешүзвлүдүр, айры-айры һалларда 3—4—6 үзвлү олур. Касачыглари сәрбәстдир я да надир һалларда ашағыдан битишикдир. Ләчәкләри сәрбәст-дир вә я аз-чох битишикдир. Эркәкчикләри 10, бә'зән 6—8—12 вә я 20-дир. Мейвә ярпаглари 5—10 олуб сәрбәстдир вә л диблән битишикдир. Юхары юмурталыгдыр, аз-аз һалларда юмурталы-ғы ярим ашағыдадыр. Мейвәси чохтохумлу ярпагмейвәдир. От вә я кол шәклиндәдир. Ярпаглари адәтән әтли (сукулскт) вә бәситдир, ярпагатлығы йохдур. Энтөмофил вә ксерофит битки-ләрдир.

Азәрбайчанда бу фәсиләнин 4 чинси вардыр. Онлардан гаяготу (*Sempervivum*) чинсинин күрәви гаяготу (*Sempe-
vivumglobiferum*) нөвүнүн чавап ярпагларины шорабая төкүр-ләр. Ярпаглариындан алынан су, үзүн дәрисинә гырмыглыг вә тәзәлик верир. Бәзәк биткисидир.

Гаягоруғу (*Sedum*) чинсинин ағ гаягоруғу (*S. al-
bum*) нөвүнүн ярпаг вә зоғларынын учлары салат үчүн ишләдилир.

Бу фәсиләнин нүмайәндәләринин чоху Азәрбайчанда дағ-ямачларында, гуру гаялыг, дашлыг ерләрдә вә мешә кәнарла-рында, яйылмышдыр. Әксәрийәти векетатиз чохалыр.

Дашдәлән (*Saxifragaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин чичәйинин гурулушу тамам мұйәнләшмә-мишдир. Дашдәлән 4—12 үзвлүдүр, лахин 5 үзвлүлүк үстүнлүк тәшкил әдир. Дишичик даһа чох ихтисар әдилмишдир вә чох вахт 2 үзвлүдүр. Юмурталығы юхары вә я ашағыдыр, синкари-дыр. Эркәкчикләрин сайы ләчәкләрин сайы гәдәрдир, я да онлар-дан ики дәфә, бә'зән даһа чох артыгдыр. Юмурталығы бир, ики вә я бешювалыдыр. Мейвәси гутучугмейвә, тәк-тәк һалларда исә киләмейвәдир. От вә я колшәклиндәдир.

Фәсиләнин Азәрбайчанда 6 чинси вардыр. Онлардан ән әһә-мийәтлиси чубуглуча вә я лейләкчичәйидир (*Philadelphus
caucasicus*). Онун чичәйи яхшы әтирлидир. Ин-дийәдәк әтирли яғлары өйрәнилмәмишдир вә ондан истифадә әдилмир. Чубуглуча Азәрбайчанын мешә гуршагларында битир. Көзәл бәзәк биткисидир.

Бу фәсиләнин мәдәни үсулла бечәрилән чинси рус алча-сыдыр (*Grassularia reclinata*) (шәкил 193). Бу чинсә мәнсуб олан биткиләрин мейвәси ейлир. Ябаны формалари Гафгазын юхары дағ гуршагларында сейрәк яйылмышдыр. Бу биткинин чичәйинин арычылыг үчүн бөйүк әһәмийәти вардыр. Мейвәсиндә

олур. Сыранын нисбәтән садә гурулушлу фәсилә вә яримфәсилә-ләринә мәнсуб олан нөвләр, ләчәкләринин сәрбәст, эркәкчикләри, тохумлуглары вә ләчәкләринин чох олмасы илә фәргләнир. Бундан сонракы фәсиләләрдә исә чох вахт битишник ләчәклилик вә аз тохумлулуг айдын нәзәрә чарпыр.

Бу сыранын бә'зи нүмайәндәләриндә, мәсәлән, бөйүртканики миләрдә (*Rubus*), чийәләкки миләрдә (*Fragaria*) вә саирәдә эркәкчикләрин, бә'зән дә мейвәярпагларынын чохлугу вә сәрбәстлийи, кеннсейин апокарплығы, бурғу үзрә дүзүлүшү, чичәкятагынын габарыглығы кими ибтидаилик әләмәтләри, күлчичәклиләр сырасынын чохмейвәлиләр сырасы илә әйни мәншәли олдуғуну кәстәрир. Көрүнүр ки, чохмейвәлиләрин гәдим әчда-дындан бөйүк бир будаг айрылараг күлчичәклиләр сырасына башланғыч олмушдур.

Күлчичәкликимиләр сырасынын нүмайәндәләри арасында ибтидаилик әләмәтләри оланларла бәрәбәр, алилик әләмәтләри оланлары да чохдур. Алма, армуд, әзкил, емишан вә саирәдә чичәкләрин нәшәрат васитәсилә чарпаз тәзланмая яхшы уйғунлашмасы, юмурталыгын чичәк ятагына кириб онун диварлары илә битишәрәк ашағы юмурталыглы чичәк әмәлә кәтирмәси, алча, кавалы, әрик, шафталы, көйәм вә саирәдә чичәк ятагынын гәдәһ шәкли алараг дашичик янлыглы чичәк әмәлә кәтирмәси вә саир бу кими хүсүсийәтләр алилик әләмәтләридир. Нәмин сыранын нүмайәндәләри арасында юхары юмурталыгдан ашағы юмурталыға вә чичәкләриндә мүнтәзәмликдән гейри-мүнтәзәмлийә доғру кечидләр олмасы, онун чох тәбии бир сыра олдуғуну кәстәрир.

Сыранын демәк олар ки, бүтүн нүмайәндәләриндә чичәклилығы бештипидир, чохунун исә чичәйи икичинслидир. Чичәк үзвләри даирәви дүзүлмүшдүр, актинеморф вә я зитоморфдур. Чичәкянлығы әдәтән икигәтдыр. Эркәкчикләри чичәкянлығын сайы гәдәрдир вә я чохдур. Дишичийи әмәлә кәтирән мейвәярпаглары бир вә я бир нечәдир, сәрбәст вә я битишникдир. Чичәкятағы чох заман кенәлмиш, габарыг вә я чөкәкдир. Нәр ики һалда чичәкянлығы ярпаглары вә эркәкчикләр чичәк ятагынын кәнарына битишмиш олур. Алча, кавалы, шафталы, көйәм, бадам вә саирәнин тохумлуглары бир, алма, армуд, әзкил вә саирәнин исә бир нечә олур. Мейвәләри чох мұхтәлифдир.

Нүмайәндәләри ярпагалтлыглы вә я ярпагалтлыгсыз олур. Ярпаглары әксәрән бурғу үзрә дүзүлмүшдүр.

Күлчичәккимиләр сырасына довшанкәләми (*Crassulaceae*), дашдәләнләр (*Saxifragaceae*), күлчичәклиләр (*Rosaceae*) фәсиләләри дахилдир. Бу фәсиләләр илк бахышда чох мұхтәлиф көрүнүрләрсә дә, кечид формалары илә бир-бирилә сых әләгәдардыр. Беләликлә, сыра, там кенетик бир груп тәшкил эдир. Дикәр тәрәфдән, нәмин сырая мәнсуб олан дашдәлән фәсиләси нарчичәккимиләр сырасына о гәдәр яхындыр ки, тәснифатчылардан бир чоху дашдәлән фәсиләсини вә башга фәсиләләри нарчичәклиләр сырасына дахил эдир вә онлары күлчичәклиләрдән

айырырлар. Бә'зи ботаникләрә көрә күлчичәклиләр нарчичәклиләрлә бир сырада бирләшдирилиб, сонра яримсыралара бөлүнмәлидир.

Довшанкәләми вә я гаягоруғу (*Crassulaceae*) фәсиләси

Довшанкәләминин чичәкләри мүнтәзәмдир. Икичинсли, аз-аз һалларда бирчинсли, икиәвли биткиләрдир. Бешүзвлүдүр, айры-айры һалларда 3—4—6 үзвлү олур. Касачыглары сәрбәстдир, я да надир һалларда ашағыдан битишникдир. Ләчәкләри сәрбәстдир вә я аз-чох битишникдир. Эркәкчикләри 10, бә'зән 6—8—12 вә я 20-дир. Мейвә ярпаглары 5—10 олуб сәрбәстдир вә л диблән битишникдир. Юхары юмурталыгдыр, аз-аз һалларда юмурталығы ярим ашағыдадыр. Мейвәси чохтохумлу ярпагмейвәдир. От вә я кол шәклиндәдир. Ярпаглары әдәтән әтли (сукулент) вә бәситдир, ярпагатлығы йохдур. Энтомофил вә ксерофит биткиләрдир.

Азәрбайчанда бу фәсиләнин 4 чинси вардыр. Онлардан гаяоту (*Sempervivum*) чинсикин күрәви гаяоту (*Sempervivum globiferum*) нөвүнүн чаван ярпагларыны шорабая төкүрләр. Ярпагларындан алынан су, үзүн дәрисинә гырмыгылыг вә тәзәлик верир. Бәзәк биткисидир.

Гаягоруғу (*Sedum*) чинсинин ағ гаягоруғу (*S. album*) нөвүнүн ярпаг вә зоғларынын учлары салат үчүн ишләдилир.

Бу фәсиләнин нүмайәндәләринин чоху Азәрбайчанда дағ ямачларында, гуру гаялыг, дашлыг ерләрдә вә мешә кәнарларында, яйылмышдыр. Әксәрийәти векетатиз чохалыр.

Дашдәлән (*Saxifragaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин чичәйинин гурулушу тамам мұәйәнләшмәмишдир. Дашдәлән 4—12 үзвлүдүр, лахин 5 үзвлүлүк үстүнүк тәшкил эдир. Дишичик даһа чох ихтисар эдилмишдир вә чох вахт 2 үзвлүдүр. Юмурталығы юхары вә я ашағыдыр, синкаридыр. Эркәкчикләрин сайы ләчәкләрин сайы гәдәрдир, я да онлардан ики дәфә, бә'зән даһа чох артыгдыр. Юмурталығы бир, ики вә я бешювалыдыр. Мейвәси гутучугмейвә, тәк-тәк һалларда исә киләмейвәдир. От вә я колшәклиндәдир.

Фәсиләнин Азәрбайчанда 6 чинси вардыр. Онлардан ән әһәмийәтлисиз чубуглуча вә я лейләкчичәйидир (*Philadelphus caucasicus*). Онун чичәйи яхшы әтирлидир. Индийәдәк әтирли яғлары өйрәнилмәмишдир вә ондан истифадә эдилмир. Чубуглуча Азәрбайчанын мешә гуршагларында битир. Кәзәл бәзәк биткисидир.

Бу фәсиләнин мәдәни үсулла бечәрилән чинси рус алчасыдыр (*Grassularia reclinata*) (шәкил 193). Бу чинсә мәнсуб олан биткиләрин мейвәси ейлир. Ябаны формалары Гафгазын юхары дағ гуршагларында сейрәк яйылмышдыр. Бу биткинин чичәйинин арычылыг үчүн бөйүк әһәмийәти вардыр. Мейвәсиндә

10 гамма каротин, 54 мг% «С» витамини, ширәсиндә 8,17—9,51% шәкәр, 0,98—1,25% сәрбәст туршулар вә 0,88% пектин маҗәси вардыр. Мейвәсиндән чахыр алыныр, мармалад вә мүрәббә һазырланыр.



Шәкил 193. Рус алчасы (*Grassularia reclinata*)

Гарағат (*Ribes Biebersteinii*) нөвүнүн мейвәси ейилир. Оун мейвәсиндән лимонад үчүн шәрбәт һазырланыр, чичәкләри чох баллыдыр. Азәрбайҗанда гарағат (*R. vulgaris*) мәдәни үсулла дағ районларында бечәрилир. Мәдәни нөвләриндән башга Азәрбайҗанда ябаны һалда *R. orientale* вә *R. Beibersteinii* нөвләри дағларда мешәли вә коллу ямачларда битир.


Агтәрә вә я гараҗи йәроту (*Parnassia*) чинсинин Азәрбайҗанда бирчә нөвү яйылмышдыр ки, о да батаглыг ағ тәрәсин (*P. palustris*)-дән ибарәтдир. Оун ярпагларындакы ашы маддәсиндән кахетин алыныр. Азәрбайҗанда батаглыг ерләрдә битир.

Чәфәроту вә я далағоту чинс нөвүнүн (*Chrysosplenium alternifolium*) ярпагларындан вәзәри кими истифадә эдилир. Галын мешәләрдә битир.

Дашдәлән (*Saxifraga*) чинсинин Азәрбайҗанда 15 нөвү яйылмышдыр. Онлар дәниз сәвиййәсиндән хейли йүксәкдә олан дашлы вә гумсал ерләрдә битир. Ярпагларындан ейишти үчүн истифадә эдилир. Әксәр нөвләри бәзәк биткисн кими әкилир.

Күлчичәклиләр (*Rosaceae*) фәсиләси

Күлчичәклиләр фәсиләсинин 2000-ә яхын нөвү вардыр вә бүтүн дүняда яйылмышдыр. Бәзи чинсләри һәлә дән инкишафда олдуғундан тамамилә формалашмадыгларына кәрә чох полиморфдур. Буна кәрә дән онларда бир-бириндән аз фәргләнән чаған



Шәкил 194. Күлчичәклиләр фәсиләләсинин мүхтәлиф чичәкләринин узунуна кәсікләри:

1—моруг вә я бөйүрткансимләрин сайча чох олан апокарп мейвә ярпагларынын табарыг чичәк ятагы үзәриндә сәрбәст отурма; 2—шеһдуранын бир мейвә ярпағындан әмәлә кәлмиш динчәли; 3—тбурнузда чохлу сәрбәст мейвәярпагларынын дәрин вә чәтәк чичәкяллыгынын динчәлә отурмасы; 4—алмань (*Alnus*) мейвәярпаглары (чичәк ятагынын ичинә кириб оун дивары илә битишмишдир).

нөвләр вардыр. Белә чаған вә филокенетик инкишафда олан чинсләрә емишан (*Crataegus*), күл вә я итбурну (*Rosa*), бөйүрткан (*Rubus*), гайтарма (*Potentilla*), шеһдуран (*Alchimilla*) вә саирә чинсләр дахилдир. Күлчичәклиләр фәсилә-

синин чичәкләри мүнтәзәmdir вә чоху бешүзвлүдүр. Чох вахт эркәкчикләри ләчәкләрдән 2—4 дәфә артыгдыр.

Мейвәярпаглары бәзиләриндә чох, бәзиләриндә беш вә я бәр-дәнәдир. Чичәкләри үст, алт вә я дишичикяны чичәкдир. Мейвә-ләри мүхтәлифдир, бәзиләриндә ярпагмейвә, тохумчәмейвә, бә-зиләриндә исә мүрәккәб чәйирдәкмейвә вә киләмейвәйә охшар яланчәмейвәдир.

Бәзи нөвләрин мейвәләриндә сонрадан газанылмыш хусу-сийәтләр көрүнүр. Мәсәлән, бәзи биткиләрдә мейвә янлығы-нын әтли олмасы, бәзиләриндә мейвәянлығынын үзәриндә гар-маға охшар чыхынтылар, бәзиләриндә исә гылчыгаохшар ләләк-вари чыхынты әмәлә кәлмәси вә саирә. онларын әтрафа яйыл-масыны тәмин этмәк үчүн сонрадан газанылмыш хусусийәт-ләрдир.

Бу фәсиләнин алилик әләмәтләрилә бәрәбәр бәзи ибтидаилик әләмәтләри дә вардыр. Мәсәлән, шәһдурән (*Alchimilla*), сиббалдия (*Sibbaldia*), гушгонмаз (*Filipendula*), чынгылоту (*Geum*) вә саир чинсләрдә халазогамия вә мезо-гамия, бәзиләриндә исә чохчүчәйрәли археспория олмасы ибти-даилик әләмәтләридир.

Фәсиләнин тохумлары эндоспермсиздир, рүшәйми яғлыдыр, чохунда акитдалын глюкозиди вардыр. От, кол вә ағач шәклиндә энтомофил биткиләрдир.

Күлчичәклиләр фәсиләси ашағыдакы 4 ярымфәсиләйә бөлү-нүр: 1) топулгалар, 2) итбурнукимиләр, 3) алмакимиләр, 4) ка-валыкимиләр.

Топулгалар (*Spiraeoideae*) ярымфәсиләси

Бу ярымфәсилә дашдәлән (*Saxifragaceae*) фәсиләсиндән итбурнукимиләрә тәбии кечид тәшкил әдир. Топулгаларла итбур-нукимиләр (*Rosoideae*) арасында бир чох кечид формасы олду-гундан топулгалары мүстәгил фәсиләйә айырмаг олмаз. Топулга-лар фәсиләсинин чичәкләри дишичикалты (юхары юмурталыгы) чичәкдир. Чичәк ятағы аз чох дүздүр, дишичик 5 мейвә ярпағын-дан әмәлә кәлмишдир. Мейвәси мүрәккәб ярпагмейвәдир.

Топулга (*Spiraea*) чинсинин бәзи нөвләри бәзәк биткиси кими бағларда бечәрилир. Онун Гафгазда ябаны һалда мешә вә орта дағ гуршағларында кол шәклиндә яйылмыш нөвү дишли топулга (*S. crenate*) -дыр. Онун ярпаглары чай кими дәмләниб ичилир. Бундан башга, Азәрбайчанда бир дә дазыярпаг топулга (*S. hypericifolia*) нөвү вардыр.

Онлар яхшы бал верән биткиләрдир. Дазыярпаг топулганын ярпағында 84,5% мг «С» витамини вардыр.

Итбурнукимиләр (*Rosoideae*) ярымфәсиләси

Итбурнукимиләр от вә коллардыр, чичәкләри дишичикяны чичәкдир. Мейвә ярпаглары бир вә я чохдур. Биртохумлу ачыл-маян мейвәләри олур. Һәмин ярымфәсиләдән топулгалар ярым-фәсиләсинә яхын олан чинси—гушгонмаздыр (*Filipendula*). Онун чичәкләри хырда вә ағ олуб, сүпүркәшәкилли чичәк групуна топланмышдыр. Чичәк ятағы аз-чох дүздүр, мейвәси мүрәккәб тохумчәмейвәдир.

Азәрбайчанда онун ики нөвү вардыр: алтыләчәк гуш-гонмаз (*F. hexapetala*) вә гарагачярпаг гушгон-маз (*F. ulmaria*).

Дағ әтәкләриндән башлайыб алп гуршағына гәдәр яйылмыш-дыр. Буларда салисил алдәһиди вардыр. Алтыләчәк гушгонма-зын көк юмрулары чох дадлы вә әмәлидир, ярпагларында хәйли «С» вә «А» витаминләри вардыр, буна көрә дә яхшы ем битки-сидир. Гарагачярпаг гушгонмазын чаван көвдәсиндән салат, чи-чәкләриндән исә чай үчүн истифадә әдилир. Чох яхшы бал верән биткидир.

Чичәк ятағы чох габарыг олан вә онун үзәриндә бурғу шәк-линдә дүзүлмүш бир чох сәрбәст дишичикдән әмәлә кәлмиш чәйирдәкли мүрәккәб мейвәләри моругкимиләр чинсиндә (*Rubus*) көрүрүк. Белә мейвәни сәһвән киләмей әдланды-рырлар. Моругкимиләр чинсинин Азәрбайчанда 10-а гәдәр нөвү вардыр. Һәмин нөвләрин бәзиләри аран сәрһәддиндән башла-раг алп чәмәнләринә гәдәр яйылмышдыр. Онларын тәснифаты һәлә мүкәммәл өйрәнилмәмишдир. Онлар тәбии учгунларын, чай кәнарларынын ююлуб апарылмасынын вә гая учгунларынын гар-шысыны алмаг вә яшыллашдырма үчүн чох яхшы колланан бит-кидир.

Моруг (*Rubus*) чинсинин әсл моруг (*R. idaeus*) нөвү Азәрбайчанын орта вә юхары дағ гуршағларында кәйиш яйылмышдыр. Моругун мейвәси чох дадлыдыр. Тәркибиндә 4,38% мүхтәлиф шәкәрләр, 1,42% сәрбәст туршулар, 0,66% пек-тин маддәләри вардыр. Мейвәсиндә лимон, очдан аз мигдарда алма туршусу вә даһа аз мигдарда салисил туршусу вардыр. Азәрбайчанда битән моругларын мейвәләри чох ири олур. Онун мейвәләриндән лимонад үчүн яхшы ширә алыныр. Мейвә вә яр-пагларындан чай кими истифадә әдилир. Чох яхшы бал вә тоз ве-рән биткидир. Арыларын ондан топладығы балда моруг дады вә әтри олур. Гуру мейвәсиндән һазырланан чай яхшы тәрләдичидир. Мейвә вә ярпагларында кифайәт мигдарда «С» витамини вар-дыр. Тохумларында 21,3% гуруян яғ вардыр. Мәдәни һалда бе-чәрилмәйә лайиг биткидир.

И. В. Мичурин тәрәфиндән моругун «Мәһсулдар моруг» «Техас моругу» кими чох гиймәтли чешидләри әлдә әдилмишдир. Теха-сын мейвәси чох ири вә ширин олур вә бишән заман парчаланмыш.

Чийәләк (*Fragaria*) чинси чохилик от биткисидир. Үчәр

мүрәккәб ярпагы, сүрүнән вә дүйүнләриндән эләвә көк верән биткидир. Сүрүнән көвдәси васитәсилә векегатив олараг чоха-лыр. Мейвәләрн җынышчыг олуб иҗли вә ширәли мейвәянылығы ичәрисиндә ерләшмишдир.

Азәрбайҗанда онун үч нөвү вардыр. Һәмнн нөвләр башлыча олараг дағ мешә гуршагларында, отлаг вә коллугларда яйылмышдыр. Бу чинсин дағ чийәләк (*F. vesca*, *F. viridis* вә *F. moschata*) нөвләрннн мейвәси ләзәтли вә әтирлидир. Тәр-кибиндә дәмнр, 5—8% мүхтәлиф шәкәрләр вә 1,41% сәрәәст туршулар вардыр. Бунлардан ән чох оланы лимон туршусудур. Мейвәси ейилир вә ондан мүрәббә биширилир, мармалад һазыр-ланмасында истифадә эдилир. Лимонада әтир вермәк үчүн чөв-һәр һазырланыр. Онун ярпаглары чай кими дәмләниб ичилир. Ярпагларында вә нисбәтән аз мигдарда олмага мейвәсиндә «С» витамини вардыр. Тохумларында 16—18% гуруян яғ олур (шә-кил 195).

Бағ чийәләйи (*F. elatior*) ири мейвәли олуб, ән чох Губа вә Хазмаз районларында әкилиб етишдирилир. Мейвәси ейилир вә ондан чох көзәл мүрәббә һазырланыр.

Чохнөвлү чинсләрннн бири гайтарма (*Potentilla*) дыр. Гай-тарманын Азәрбайҗанда 31-ә гәдәр нөвү вардыр. Онлар от биткиләридир. Гайтарманын чичәк ятағы табарыгдыр, апо-карп кеннсейдән әмәлә кәлмиш мүрәккәб тохумачамейвәлидир.

Һәмнн чинсин газ гайтармасы нөвү (*P. anseriana*) чохиллик битки олуб, Ләнкәранда чай кәнарларында вә рүтубәт-ли ерләрдә битир. Чохлу бал вә тозчуг верән биткидир. Ярпагла-рында 160,8 мг% «С» витамини вә кифайәт гәдәр ашы маддәси вардыр. Көвдә вә ярпагларындан сары рәнк алыныр.

Мешә гайтармасы (*P. erecta*) чохиллик битки олуб, Азәрбайҗанда орта дағ гуршагына гәдәр яйылмышдыр. Көклә-риндә хош әтирли яғлар олдуғундан бә'зи спиртли ичкиләрә га-рышдырылыр. Көкүмсов көвдәсиндә 20—35% ашы маддәси вардыр.

Чынгылоту (*Geum*) чинсиннн Азәрбайҗанда 4 нөвү вар-дыр. Онлар чохиллик отлар олуб мешәләрдә, дағ чөмәнләриндә вә чох рүтубәтли ерләрдә битир. Чичәк ятағы табарыгдыр. Кеннсей бундан габагкы чинсдә олдуғу кимидир, ләкин сүтүнчуг-лары чох узун олуб, мейвә етишән заман күләк вә һейванлар ва-ситәсилә яйылмаг үчүн уйғунлашмышдыр.

Һәмнн чинсин чай чынгылоту нөвү (*G. rivale*) орта дағ гуршагына гәдәр ерләшән әразидә батаглыг вә чох рүтубәтли чөмәнләрдә битир. Каса ярпаглары гырмызы, ләчәкләри чәһрайы рәнкдә олуб, чичәкләри башы ашағы салланмыш һалда олур.

Шәһәр чынгылоту нөвүнүн (*G. urbanum*) каса ярпаглары яшыл вә тачы сары рәнкдә олур. Мешәләрдә орта дағ гуршагына гәдәр йүксәкликдә битән чох ади формадыр.

Бунларын һәр икисиннн чаван ярпаглары салат кими ейилир. Көкләриндә әтирли ачы «мәхәк көкү» адланан маддә вардыр

ки. ондан херәйә, ликора, пивәйә дад вермәк үчүн истифадә олу-нур. Чай чынгылотунун ярпагларында кифайәт гәдәр «А» вә «С» витаминләри вардыр. Шәһәр чынгылотунун көкүндә 40%-ә гәдәр танин олдуғу үчүн ондан бир ашы маддәси кими истифадә эдилир вә хүсуси михәк ийи верир.




Шәкил 195. Дағ чийәләйи (*Fragaria vesca*)

Шәһдуран чинсиннн (*Alchimilla*) Азәрбайҗанда 22-йә гәдәр нөвү вардыр. Онлар башлыча олараг субалп вә алп чөмән-ләринә яйылмышдыр вә һәмнн ерләрин алаг отларыдыр.

Шәһдуран нөвләрнннн чичәк ятағы чөкәк вә каса шәкилли-дир, чичәк һиссәләри чох азалмышдыр вә чох вахт апогамдыр.

Итбурну və я күл (*Rosa*) онун 42 чинси. Азербайчанда нөвү вардыр, бунлардан да 6-сы мәдәни һалда бечәрилир. Чичәк ятағы чөкәкдир və етишән заман әтли олур. Чичәк ятағы чичәк оху һиссәсинин кенәлмәсиндән әмәлә кәлмишдир. Онун дибиндә чохлу дишичик олур. Онларын сүтунчутлары сап шәклиндә юхары узанмышлар. Дишичикләри апокарп кенисей тәшкил әтмишдир.



Шәкил 196. Шәһдуран (*Alchimilla*) биткиси.

1—үмуми көрүнүшү; 2—чичәк группундан бир һиссә; 3—чичәйин узунуна кәсийи; 4—чичәйин диаграмы.

Мейвәләри киләмейвәдир. Ярпаглары мүрәккәб ләләкшәкиллидир və ярпагалтлыглары вардыр. Мешә әтәкләриндән башланмыш субалт чәмәнләринә гәдәр яйылмыш коллардыр. Мәдәни нөв və чешидләриндән бир чоху бағлар və һәйәтләрдә бечәрилир. Бәзиләринин ләчәкләриндән күл яғы адланан әтирли яғ алыныб әтриһят сәнаәиндә ишләдилир.

Бәзи нөвләринин ләчәкләриндән ширниһята дад və әтир вермәк үчүн, бәзән мүрәббә үчүн истифадә әдирләр. Етишмиш мейвәләриндән тәзә һалда чох аз истифадә әдилир; лакин онларын чох бөйүк дәрман әһәмийәти вардыр. Чаван көвдәләриндән тәрәвәз кими истифадә әдилир. Мейвәсинин гурудулуб үйүдүлмүш габығы емәкләрдә сумаг әвәзинә ишләдилир.

Итбурну мейвәсиндән яхшы әтирли чахыр һазырланыр. Итбурнунун бүтүн нөвләринин чичәйи нектар və тоз верәндир *R. canina* və *R. tomentosa* нөвләринин мейвәләриндә чохлу каротин вардыр. Гурудулмуш мейвәсиндә «С» витамини чохдур.

Итбурну чинсинин мүхтәлиф формаларында «С» витамини мигдары дәйишир. Бу дәйишилмәйә эколожи шәраитин və мейвәнин етишмә дәрәчәсинин бөйүк тәсири вардыр. Мейвәләриндә «К» витамининә дә раст кәлинир.

Rosa canina нөвүнүн мейвәсиндән чәкилән ширәдән өд ифразы үчүн истифадә әдирләр. Бу итбурну нөвү Азербайчанын аран ерләриндән башлайыб та орта дағ гуршағына гәдәр яйылмышдыр. Онун тохумунда дәйәрли әлиф яғы вардыр.

Алмакимиләр (*Rosoidae*) ярымфәсиләси

Чичәкләри ашағы юмурталыглыдыр. Гығырдагвари və я дашлашмыш дивары олан юмурталығы харичдән, чичәк ятағы диварларынын битишмәсиндән әмәлә кәлмиш мейвәяндығы илә әһәтә әдилмишдир. Ағач və я коллардыр. Ярпаглары садә və я мүрәккәб олуб, ярпагалтлыглары вардыр.

Һәммин ярымфәсилә юмурталыгларынын диварларына көрәнки група айрылыр: 1) юмурталығынын дивары пәрдә кими гығырдаг һалында олуб, мейвәси киләмейвәйә охшайлар, 2) юмурталығынын дивары дашлашмыш və мейвәси чөйирдәкмейвә кими оланлар.

Юмурталығынын дивары пәрдә кими гығырдаг һалында олуб, мейвәси киләмейвәйә охшайлар

Бурая бир нечә чинс аиддир.


Алмалар (*Malus*) чинси. Бу чинсин мәдәни нөвү алмадыр (*M. domestica*). Мейвәләринин формасы, бөйүклүйү və рән-



Шәкил 197. Итбурну (*Rosa canina*).

кинә көрә чох мухтәлиф алма чешидләри вардыр. Совет Иттифагынын алма чешидләри харичи өлкәләринкиндән дадынын йүксәк кейфийәтли олмасы, шахтая давамлылығы, чох мәһсулдарлығы вә тез етишмәси илә фәргләнир.

И. В. Мичурин гибриdlәшдирмә үсулилә Иттифагымызын орта вә шимал һиссәләриндә бечәрилмәси мүмкүн олан 60-дан артыг көзәл вә чох гиймәтли алма чешидләри етишдирмишдир. Онлардач «Алты йүз грамлыг антон алмасы», «Анисовка», «Белфлор-китайка», «Белфлор-рекорд», «Тохумсуз Мичурин алмасы», «Бресдорф», «Шедевр Мичурина», «Комсомолес» алма чешидләрини көстәрмәк олар. Чыр алма ағачларынын дағ мешә бағлары салмаг үчүн чох бөйүк әһәмиийәти вардыр.



Шәкил 198. И. В. Мичуринин әлдә этдийи чәләби алма илә Чин алмасынын гибриdlәшдирмә.

Азәрбайжан мешәләриндә чыр һалда—чыралма (*M. orientalis*) битир. Бу нөв Гафгаз эндемләриндән олуб мешәләрдә кениш йыйлмышдыр. Мейвәсиндән дадлы вә әтирли квас һазырланыр. Ондан алынән чөһәрдән лимонад истеһсалында вә сәринлик верән башга ичкиләрдә истифадә эдилир. Ярпагларындан ачыг-чәһрайы рәнкли чай дәмләнир. Дилимләнмиш мейвәсиндән дадлы шәраб һазырланыр. Тохумларындан емәли яғ алыныр. Чичәкләри бал вә тоз верәндир. Бөйүк бир ағачдан арылар 6 килоя гәдәр бал йығырлар. Мейвәсиндә 36 мг % «С» витамини вардыр. Одунчаг һиссәсиндән дүлкәрлик ишләриндә гиймәтли бир материал кими истифадә эдилир.

Чыр алмалара мәдәни алма чешидләри чаланмагдан башга, онлардан гибриdlәшдирмә ишләриндә дә кениш истифадә эдилир.

Армуд (*Pyrus*) чинси. Ләчәкләри ағ, тозлуглары гырмызыдыр. Мейвәси алманынкындан фәрглидир. И. В. Мичуринин әлдә этдийи армуд чешидләриндән бир чоһу 36°-йә гәдәр шидәтли шахталара давамлы олуб, чох мәһсулдардыр. Азәрбайжанын дағ мешәләриндә вә ачыг ямачларда ябаны һалда битән 13 армуд нөвү вардыр. Онлардан мәдәни нөвләри чаламаг вә гибриdlәшдирмә үчүн кениш истифадә олуна биләр.

Армудун мәдәни вә ябаны нөвләринин мейвәсиндән яхшы шәраб вә дошаб һазырланыр. Ади армудун (*Pyrus communis*) ярпаглары даирәви, юмурташәкилли вә я овалдыр, саплағы аясындан узундур вә я она бәрабәрдир, аясынын кәнары бүтөв вә ити мышардишлидир. Каса ярпаглары мейвәнин үзәриндә гадыр. Сүтунчуғу 5-дир, юмурталығы 5-ювалыдыр, эркәкчикләринин мигдары 20-йә гәдәрдир. Гафгаз дағларында ябаны һалда чоһлу мигдарда битир. 5000-ә гәдәр мәдәни чешиди вардыр.

И. В. Мичурин тәрәфиндән «гыш береси», «гәләбә береси», «шәкәр суррогаты», «толстобежка» вә шахтаг чоһ давамлы олуб йүксәк кейфийәтли мейвә верән бир сыра башга чешидләр әлдә эдилмишдир. Бунларын бир гисмини И. В. Мичурин ялныз *P. communis* нөвүнүн чешидләри арасында, бәзиләрини исә мухтәлиф армуд нөвләри (ади армуд илә Уссури армуду) арасында апардығы гибриdlәшдирмә нәтижәсиндә әлдә этмишдир.

И. В. Мичурин Узәг Шәргдә битән вә шахтаг чоһ давамлы олан Уссури армуду (*P. ussuriensis*) нөвүндән узәг гибриdlәшдирмә ишиндә дә чоһ кениш истифадә этмишдир. Чыр армудларын дағ-мешә бағлары салынмасында бөйүк әһәмиийәти вардыр.

Һейва (*Cydonia*) чинси. Бу чинсин ялныз бирчә нөвү мәлүмдур ки, о да ади һейвадыр (*C. oblonga*). Һейванын мейвәләри чоһтохумлу, сары рәнкли вә чоһ әтирлидир. Ләчәкләри чәһрайы вә я ағымтылдыр. Ярпаглары бәсит вә эллипсшәкиллидир, алт тәрәфи ағымтыл түклүдүр; етишмәмиш мейвәләрин дә үзәри сых кечә түклү олур. Бир чоһ мәдәни чешидләри вардыр. Чыр һалда Губа, Ләнкәран, Нуха районларынын мешәләриндә битир.

Мейвәсиндән лимонад үчүн яхшы әтирли чөһәр алыныр. Ондан наливка вә ликйор үчүн дә истифадә эдилир. Тохумларынын яғ кими селикли маддәси юмшалдычы дәрман олараг ишләдилир. Мейвәсинин габығында 8,2 вә әтли һиссәсиндә 2,7 гамма про «А» витамини вардыр. «С» витамини мейвәнин габығында 116 мг %, әт һиссәсиндә исә 10,52 мг %-дир. Дағ-мешә бағлары салынмасында һейва ағачларынын бөйүк әһәмиийәти вардыр. Ярпаглары тәнкнәфәслийин (астманын) мүәллицәсиндә чай кими дәмләниб ичилир.

Гушармуду (*Sorbus*) чинсинин Азербайчанда 11 нөвү вардыр. Гушармуду ағачларынын ярпаглары бәсит вә я ләләкшәкилли мүрәккәбдир. Азербайчанын дағ мешәләриндә вә гаялыг ерләриндә яйылмышдыр. И. В. Мичурин гушармудунун мүхтәлиф нөвләрини гибридләшдириб олдугча жезәл, ширин вә шахтаядавамлы чешидләр әлдә этмишдир. Гушармуду илә әзкилли чарпаз тозландырылмасындан «ликйорлу», «бурка», хүсүсән «Мичурин десерт армуду» нөвләри алынмышдыр.

Бу чинсин ағры овундуран (*S. torminalis*) нөвү Нуха, Гәх, Загатала, Кировабад, Ләнкәран мешәләриндә битир. Онун мейвәси шахта вурдугдан сонра чох емәли олур, араг чәкилир вә сиркә һазырланыр. Одунчаг һиссәсиндән мүхтәлиф әв шейләри вә мусиги

аләтләри һазырламаг үчүн кениш истифадә әдилир. Иран гушармуд (*S. persica*) нөвүнә Нахчыван мешәләринин юхары сәрһәдләриндә тәсадүф әдилир вә шахтая чох давамлыдыр.

Юмурталығынын дивары дашлашмыш вә мейвәси чәйирдәкмәйә кими оланлар

Әзкил (*Mespilus*) чинси. Онун ади әзкилдән (*M. germanica*) ибарәт ялныз бирчә нөвү мәлумдур. Ади әзкил (шәкил 199) 1,5—4 м һүндүрлүкдә ағач вә я колдур. Ярпаглары нештәршәкилли, гыса саплаглы, аясы алтдан түклүдүр. Чичәкләри демәк олар ки, саплагсыздыр. Юмурталыгы түклүдүр. Касачыг ярпаглары хәтвари — нештәршәкиллидир. Ләчәкләри ағдыр. Мейвәси күрәви вә я узунсовдур. Етишән заман гонур рәнк алыр, юмшалыр, түксүз олур. Демәк олар ки, Азербайчанын бүтүн дағ мешәләриндә битир. Ябаны чешидләринин мейвәси хырда, мәдәни нөвләринин мейвәси илә чисбәтән ири олур.

Шәкил 199. Әзкил ағачынын (*Mespilus germanica*) будағы.

Әзкилли етишмиш мейвәсиндә 10—10,6% шәкәр вә 1,2—1,17% алма туршусу вардыр. Ондан араг чәкилир вә дошаб бишириләр. Мейвәсинин габығында 3,0 әт һиссәсиндә илә 1,2 гам каратин вардыр, габығында 6,8—19,3 мг%, әт

һиссәсиндә илә 1,6—15,8 мг% «С» витамини олур. Ағачынын габығы вә ярпагларында чохлу ашы маддәси вардыр. Мешә бағлары салмаг үчүн чох дәйәрли биткидир.



Шәкил 200. Емишан (*Crataegus*) ағачынын будағы

Емишанлар (*Crataegus*) чинси. Бу чинсин (шәкил 200) Азербайчанда 9 нөвү вардыр. Онлар орта дағ мешәләри гуршағында яйылмышдыр. Хырда ағач вә я коллардыр. Ярпаглары бармагшәкилли далимми, кәсилмиш вә бөлүнмүшдүр. Ярпагалтлыглары вардыр. Чичәк групплары мүрәккәб галханчыг-

лара топланмышдыр. Будаглары нөвләрин чохунда тиканлыдыр. Эксәрийәтинин мейвәси шахта вурдугдан сонра ләззәтли вә емәли олур; бәзиләринин мейвәсиндән чөрәйә ширинлик вермәк үчүн истифадә эдилір. Мейвәсиндән кисел вә компот һазырлайырлар. Чичәкләриндән үрәин фәалийәтини нормаллашдырмаг вә ган тәйягини азалтмаг үчүн истифадә этмәк мөсләһәт көрүлүр. Бүтүн нөвләриндән, арылар бал һазырлайыр. Емишан нөвләри дағларда бағ салмаг вә чылпаг ямачлары яшыллашдырмаг үчүн чох ярарлыдыр.

Кавалыкимиләр (*Prunoideae*) ярымфәсиләси

Кавалыкимиләрин чичәк ятағы чухурдур, аз-аз һалларда чичәк ятағынын дибиндә 2-дән 5-ә гәдәр сәрбәст отурмуш дишичик олур. Тохумлуғу бир вә я икидир. Мейвәләри чәйирдәкмәйвәдир. Мейвәси етишән заман дишичийин юмурталығы чичәкятағынын дивари илә битишмир. Юмурталыг инкишаф этдийиндән чичәк ятағында ерләшә билмир, буна көрә дә чичәкятағы партлайыр вә голуб дүшүр. Одур ки, кавалыкимиләрин пәрдә вә дәрийә охшар чичәк ятағы илә бирликдә касә ярпаглары да дүшдүйүндән, мейвәнин тәпәсиндә касанын галыглары олмур.

Кавалыкейвәлиләр (*Prunus*) ағачлар чинси вә бәзән коллардыр. Ярпаглары эллипсшәкилли олуб учу сивридир, кәнарлары мишардишлидир, ярагалтлығы вардыр вә бурғу үзрә дүзүлмүшдүр. Кавалыкейвәлиләрин чичәкләри чәтиршәкилли бәсит группара топланмышдыр вә я тәк-тәкдир.

Кавалыкейвә нөвләриндән бири алчадыр. Азәрбайчанда битән 2 алча нөвүнүн ябаны һалда бир чох формасы яйылмышдыр. Алча нөвләриндән бири ади алча (*P. divaricata*), диқәри хәзәр алчасыдыр (*P. caspica*). Ади алча Ләнкәрандан башга Азәрбайчанын бүтүн мөшәләриндә битдийи һалда хәзәр алчасы Ләнкәран мөшәләриндә битир. Бунларын һәр икиси Азәрбайчанын ән мүнүм чыр мейвәләриндәндир. Бу мейвәләрдән лимонад үчүн чөһәр һазырлана биләр.

Ади алча мейвәсиндә 4,5—16,6 мг % «С» витамини вардыр. Мейвәсиндән туршу, лаваша вә араг һазырланыр. Чыр алча нөвләри дағ мөшә бағлары салмаг вә чылпаг чәнуб ямачларыны яшыллашдырмаг үчүн чох әлверишлидир.

Чыр көйәм (*P. spibosa*) Азәрбайчанын мөшә этәкләриндәки ачыглыгларда вә чөлләрдә кол шәкилдә кениш яйылмышдыр. Чыр көйәмдә шәкәр, сәрбәст туршу, пектин маддәси вә ашы маддәси вардыр. Бу ахырынчыя көрә дә мейвәси ағзы бүзүшдүрүр. Шахтадан сонра ашы маддәсинин мигдары азалыр, шәкәрләрин мигдары исә артыр. Чох вахт онун мейвәсиндән яхшы квас вә ликйор һазырланыр. Көйәмин бечәрилән ағач формасы вардыр ки, онун мейвәси ири олур. Бу мейвәләрдән көйәм мүрәббәси һазырланыр.

И. В. Мичурин «дессерт көйәми» вә «ширин көйәм» кими бир сыра гиймәтли көйәм чешидләри етишдирмишдир.

Кавалы (*P. domestica*) 12 м-ә гәдәр һүндүрлүйү олан ағачлардыр. Кавалынын ярпаглары түнд-яшыл рәнkdә олуб, алчанынкына нисбәтән галындыр, эллипс шәклиндәдир, учу сивридир, кәнарлары ярымдаирәви дишлидир, ади сәтһи гыса түклүдүр, чичәкләри чох вахт чүт-чүт ерләшир. Касә ярпаглары ичәридән түклүдүр. Чичәйи әтирлидир. Мейвәләри чох мүхтәлиф форма вә рәнкләрдә олур. Кавалы Азәрбайчанын бүтүн районларында бечәрилик. Ябаны һалда битмәси мәлум дейилдир, лакин чырлаша биләр.

Гара кавалынын тәзә мейвәсиндә про «А» витаминин мигдары 25—60 гаммадыр, каротинин мигдары исә 3,26—7,0 (21,5) гамма гәдәр олур. Мейвәси гурудулдуғда каротинин мигдары 25-дән 50,1 гамма гәдәр артыр. «В» витамини вардыр 1,6-дан 6,6 гамма гәдәр олур. «С» витаминин мигдары аздыр, 2,6-дан 11,2 мг % олур. Тохумунда 30%-ә гәдәр пийли яғлар вардыр.

И. В. Мичурин мүхтәлиф кавалы нөвләриндән һибридләшдирмә йолила чох көзәл, шахтаядавамлы вә гиймәтли кавалы чешидләри алмышдыр. Мәсәлән, гырмызы мейвәли «консерв кавалысы» чешиди, «Козловски» гара кавалысы, «шәффаф сары кавалы» бир сыра «рәнклодлар» вә с.

Киләс (киләнар) (*Cerasus*) чинси. Бу чинс ағач вә кол шәкилдә олур. Әсас кәвдәләри әксәрән гырмызымтыл вә я сәс рәнkdәдир. Кәвдәсинин габығы гурупаг кими союлур. Чичәкләри узун саплаглы олуб бәсит чәтирләрә топланмышдыр. Касә ярпаглары вә тач ярпаглары беш-бейдир. Чичәк ятағы гәдәл шәклиндәдир. Мейвәси адәтән күрәви, чылпаг вә әтли олур. Чәйирдәйи демәк олар ки, күрәви шәкилдә олуб ири дейилдир.

Азәрбайчанда 7 киләнар (албалы) нөвү вардыр. Онлардан икиси мәдәни сурәтдә бечәрилик. Бунлардан бири турш киләнар (*C. austera*), диқәри исә ади киләнардыр (*C. vulgaris*), ади киләнарык кәвдәси гәһвәйи бозумтулдур. Ярпаглары эллипс шәклиндә олуб учлары сивридир, кәнарлары мишар дишлидир, үзәрләри чылпагдыр, үст сәтһи парлагдыр. Чичәкләри ики-ики вә я дәстә-дәстәдир, узун саплагларла будаға бирләшмишдир. Киләнарын мейвәсиндә 3,7—9,4 гамма каротин, 13,9—15 мг «С» витамини вардыр. Мейвәләри күрәвидир вә чешидиндән асылы олараг мүхтәлиф ирилиkdә олур. Әт һиссәси юмшаг вә туршашириндир. Тохумлары бир гәдәр басыг күрәви вә сәрт олур. Мейвәләри тәзә икән вә гурудулмуш һалда ейилир. Ондан мүрәббә, кампот, шәрбәт, ширә вә саирә һазырланыр.

Юхарыда көстәрилән мәдәни киләнар нөвләриндән башга ябаны һалда *C. microcarpa* вә *C. araxina* нөвләри дә битир.

И. В. Мичурин бир сыра йүксәк кейфийәтли киләнар чешидләри етишдирмишдир. Онлардан, мәсәлән, «мәһсулдар Мичурин киләнары», «Захаров киләнары», «Идеал», «Шимал көзәли»,

«Надежда Крупская» «Полжир», «Ультра мейвәли киләнар» чешидләрини хәстәрмәк олар.

Килас (*C. avium*) бөйүк ағачдыр. 25 м-ә гәдәр һүндүрлүйү олур. Көвдәләри гәйвәйи-боздур. Ярпаглары зәиф саплагларда даянмышдыр вә саплагларының дибә яхын һиссәсиндә нектарлыглар олур. Бә'зи ябаны нөвләринин мейвәси хырда, гара рәнkdә вә ачы олур. Мәдәни чешидләринин мейвәси күрәвидир вә чешидиндән асылы оларат мүхтәлиф бөйүклүkdә олур. Әтли һиссәси галын, гырмызы, кәһрәба рәнкли вә чох ширин олур. Ябаны киласа Азәрбайҗанын дағ мешәләриндә тәсадүф әдилир. Мәдәни чешидләринин мейвәләри тәзә икән вә гурудулмуш һалда ейилир. Ондан кампот, мят, вә мүрәббә һазырланыр.

И. В. Мичурин тәрәфиндән бир сыра ени килас чешидләри әлдә әдилмишдир, мәсәлән, «Илк гарангуш», «Первенес» вә с. Килас Азәрбайҗанын бир чох районларында бечәрилер. Бә'зән чырлашмыш килас ағачларына тәсадүф әдилир. Мейвәсиндә 3,7—9,7 гамма каротин вардыр. Турш мейвәләриндә ширин мейвәлиләрдәкинә нисбәтән каротин чохдур. Ярпагларында 114,97 мг % «С» витамини вардыр. Көвдәсинин габыгында 5—7-ә гәдәр ашы маддәси олур.

Дәли килас адланан чыр форманын ярпагларында 246 мг % «С» витамини вардыр. Чәйирдәйиндәки әтирли ягларда бензой вә кианус туршулары вардыр. Әтрийятда вә ликйор үчүн истифадә олунур. Көвдәсинин габыгында 7—10% ашы маддәси вардыр. Тахтасы гиймәтлидир, яхшы рәнкләнир.


Чыр килас (*C. incana*) ярпаглары узунсов, нештәршәкилли, учу сивридир, алт тәрәфи кечәйәохшар гыса ағ түкләрлә өртүлмүшдүр вә ч аз-аз һалларда чылпагдыр. Ханлар, Губа, Шамахи, Шуша, районларының гуру дашлы ямачларында битир. Мейвәси туршашириндир, лакин чох хырдадыр. Мешә киласы (*C. mahaleb*) нөвү Ләнкәран мешәләриндә битир. Ону мейвәсиндән алынган ширәдән лимонады вә ликйору боямаг үчүн истифадә әдилир.

Ади шафталы (*Persica*) чинси орта бойлу ағачдыр (шәкил 201). Ярпаглары узун нештәршәкилли, кәнары ити мишар дишлидир, гырмызы вәзилдир. Мейвәләри юмуртавары—күрәви, үзәри түклү, сарымтыл чәһрайы—гырмызы, әтирли вә шириндир. Чәйирдәйи чох гырышыгдыр. Мейвәләри тәзә икән чох ләзәтлидир, ондан мүрәббә, консерв вә компот һазырланыр. Азәрбайҗан районларының чохунда бечәрилер. Яхшы чешиди Ордубад районундадыр. Бә'зән чыр һалда мешәләрдә тәсадүф әдилир; онлар бир гәдәр хырда вә нисбәтән ачы олур.

Һулу шафталының (сары шафталының) тәзә етишмиш мейвәсиндә 6,2 гамма, гурусунда 38 гамма про «А» витамини вардыр. «В» витамини 0,3 гамма, «С» витамини исә 12—20 мг %-ә гәдәрдир. Шафталы, сәнае әһәмийәти олан биткидир.

Бадам (*Amygdalus*) чинсинин Азәрбайҗанда 3 нөвү вардыр.

Онлардан бири мәдәни сурәтдә әкилир. Ади бадам (*A. communis*) ән чох Абшеронда вә Ордубад районунда бечәрилән ағачдыр. Башга районларда тәк-тәк тәсадүф олунур. Ади бадамын ярпаглары нештәршәкилли, мишар дишли, гыса саплаглыдыр. Чичәк ятагы зәнк шәклиндәдир. Ләчәкләри зәиф чәһрайы рәнkdәдир. Мейвәләри эллипсшәкилли вә аз басыгдыр. Мейвәянлығы



Шәкил 201. Ади шафталы (*Persica vulgaris*).

1—чичәкли будагы, 2—чәйирдәйинин гарын тәрәфдән көрүнүшү, 3—чәйирдәйинин ядан көрүнүшү, 4—мейвәсинин узунуна кәсийи

гуру олан чәйирдәк-мейвәдир. Ади бадамын тохумундан алынган бадам ягы тәбәбәтдә кениш тәтбиг әдилир. Мейвәсиндә 1,55 гамма «В» витамини, ярпагларында исә 200 мг % «С» витамини вардыр. Тохумларындан алынган ачы бадам ягында бензой алдеһиди, ки-

нус туршусу, сияһидрин вардыр. Бунлардан этрийятда, сабун биширилмәсиндә, гәннады сәнаендә истифадә эдилір.

Бечәрилән бадам ики чүрдүр. Биринин тохумундан ачы яғ алыныр ки, о да әсас әтибарилә тәбабәтдә ишләдилір, дикәринин тохумларындан исә гәннады сәнаендә истифадә эдилән яғ алыныр вә я тохумлары бир ейинти мәһсулу оларағ ишләдилір. Бунларын һәр икисинин бир чох чешиди вардыр.



Шәкил 202. Ябаны бадам (*Amygdalus Fenzeliana*).

Бадам нөвләриндән *A. Fenzeliana* (шәкил 202) ябаны һалда Нахчыванда, Чәнуби Гарабагда вә Зувандда орта дағ гуршагында кеннш яйылмышдыр. Онун мейвәси мәдәни бадам мейвәсиндән ики дәфә хырдадыр. Бә'зи формаларынын тохуму ачы, бә'зиләрининки исә емәлидир. Мәдәни бадамларын гурагыға давамлылығыны артырмағ үчүн ябаны формаларындан чалағ көтүйү кими вә һибридләшдирмә мәгсәдилә истифадә олуна биләр.

Әрик (*Armeniaca*) чинсинин Азәрбайчанда мәдәни һалда 2 нөвү вардыр. Адн әрик (*A. vulgaris*) 3—4 м һүндүрлүкдә, будағлары этрафа чох дағылан ағачдыр. Әрийин ярпағлары узунсаплаглы, юмуртавари-дәйирми, гандәси бир гәдәр үрәкшәкиллидир, учу сивридир, кәнарлары мишар дишлидир. Қасачығынын дишләри түклүдүр. Ләчәкләри ичәридән ағ, чөлдән гырмызыдыр. Мейвәләри мүхтәлиф бөйүклүкдә вә формададыр, сары вә я нарынчы рәнкдәдир. Азәрбайчанын бә'зи районларында мүхтәлиф чешидләри бечәрилер.

И. В. Мичурин тәрәфиндән Совет Иттифагынын орта гуршағы үчүн «№ 242», «Монгол», «Сатсер» вә саирә әрик чешидләри етишдирилмишдир. Узағ Шәргдә битән колшәкилли, мейвәси хырда вә гуру олан Сибир әрийи (*A. sibirica*) нөвүндән И. В. Мичурин «Ән яхшы Мичурин әрийи», «Йолдаш» вә саир бу кими көзәл әрик чешидләри әлдә этмишдир.

Әрийин мейвәсиндә каротин хейли чохдур. Тәзә мейвәсиндә 50—100 гамма, күндә гурудулмуш мейвәләриндә 125—200 гамма каротин, 0,4—2,0 гамма «В» витамини вә 6,9—14,2 мг % «С» витамини вардыр. Әрийин көмүрләшдирилмиш чәйрәдәйиндән гара бояғ алыныр.

ПАХЛАМЕЙВӘЛИЛӘР (*Leguminosales*) СЫРАСЫ

Пахламейвәлиләр ағач, кол вә я от шәклиндәдир. Бә'зиләриндә ярпагалтлығы вардыр, бә'зиләриндә исә йохдур. Әксәрийәтинин ярпағлары мүрәккәбдир. Чичәкләри группара топланмышдыр, аз-аз һалларда исә тәк-тәкдир, битишик вә я сәрбәстдир, чох вахт икидодаглылардакы кимидир. Ләчәкләри чохунда 5-дир, сәрбәст вә я бир-биринә битишикдир (һамысы вә я бир гисми). Бә'зи нөвләриндә ләчәкләр я һеч йохдур, я да 1-ә гәдәр ихтисар олунмушдур, бә'зән 3 әдәддир. Эркәкчикләри 4, 5, 10 вә я чохдур, бир-биринә саплаглары заситәсилә бору шәклиндә битишикдир, яхуд сәрбәстдир, бә'зи нүмайәндәләриндә 2—3-дүр, бә'зи нөвләрин чичәйиндә стаминодиялар вардыр. Әксәрийәтинин мейвә-ярпағлары бирдир, аз-аз һалларда бир нечәдир. Юмурталығлары бирювалы вә юхарыдыр. Тохумлуғлар мейвәярпағы тикишләринин бою узуну дүзүлүр. Мейвәләри пахламейвә олуб тикишләриндән вә я гапағларындан ачылып, тәкбир һалларда ичәрисиндә тохумлары олан буғумлары парчаланыр. Тохумлары эндоспермсиэ вә периспермсиэдир, бә'зиләри әтлиндир.

Һәмнн сырая үч ярым фәсиләси олан ашағыдакы бир фәсилә дахилдир. Бу фәсиләнин нүмайәндәләри бүтүн гит'әләрдә яйылмышдыр.

Пахлалылар (*Leguminosae*) фәсиләси

Пахлалылар фәсиләсинин әсас хүсусийәти дишьчийин һәмншә бир мейвәярпағындан әмәлә кәлмәси вә юхары юмурталығлы олмасыдыр. Мейвәләри габағ вә дал тикишләрилә ачылан пахладыр. Бүтүн нүмайәндәләринин ярпагалтлығы вардыр.


Пахлалылар фәсиләсинин бә'зи нүмайәндәләриндә (мәсәлән, үчярпағйончада) ләчәкләрин битишиклийн вә зигоморфлуғу кими тәкамүл хүсусийәтләри вардыр. Чохунда әркәкчикләр саплаглары илә битишәрәк бору әмәлә кәтирмишдир. Тохумлары әксәриндә эндоспермсиэ вә аз-чох галынләпәлидир. Рүшәймләри дүз вә я бир гәдәр әйилмишдир. Тохумлары мейвәянылығынын арха

тикишинә битишмишдир. Бу фәсиләнин ер үзүндә 12000-дән артыг нөвү вардыр.

Һәмин фәсилә ашағыдакы үч ярымфәсиләйә бөлүнүр:

- 1) Күстүмотукимиләр (*Mimosoideae*)
- 2) сезалпинләр (*Caesalpinoideae*)
- 3) кәпәнәкчичәклиләр (*Papilionatae*)

Һәмин ярымфәсиләләрнин чичәкләринин гурулушу вә диаграм-лары 203-чү шәкилдә көстәрилир.



Шәкил 203. Пахлалылар фәсиләсинин ярым фәсиләләринин чичәк гурулушу вә чичәкләринин диаграмлары.


А—күстүмотукимиләрнин чичәйи; Б—диаграмы; В—сезалпинләрнин чичәйи; Г—диаграмы; Д—кәпәнәкчичәклиләрнин чичәйи; Е—ләчәкләри; Ж—эркәкчик вә дишичийи; З—мейвәси; Н—диаграмы.

Күстүмотукимиләр (*Mimosoideae*) ярымфәсиләси

Күстүмотукимиләр ярымфәсиләсинә мәнсуб олан биткиләрнин чичәкләри актиноморф, чохунун эркәкчикләри сәрбәстдир. Бә'зиләриндә мейвә яргаглары бир нечәдир. Чичәкләри сых башлыча

вә я сүнбүлшәкилли чичәк группна топланмышдыр. Каа вә тач яргаглары аз-чох битишик олуб, 2—5 үзвүдүр. Бә'зән чичәкянлыгы аз инкишаф этдийиндән эркәкчик саплагларындан бир чоху рәнкли олуб, чичәкянлыгыны әвәз әдир.

Күстүмотукимиләр ярымфәсиләсиндән Азәрбайчанда яйылмыш Күләбришин (*Albizzia julibrissin*) нөвү үчүнчү дөврдән галма гәдим (реликт) битки нөвүдүр. О Ләнкәран мөшәләриндә ябаны һалда чох раст кәлир, бир бәзәк биткиси кими Бақыда вә республиканын районларында бечәрилир. Бу ағачын яргаглары икигәт чүтлөләкшәкилли, мүрәккәб вә иридир, яргагчыглары ярыморагшәкилли, учу сиври, үст тәрәфи түңгә яшыл



Шәкил 204. Күләбришин (*Albizzia julibrissin*).

алт тәрәфи ачыг яшылдыр. Чичәкләри башчыгларә топланмыш, айры-айры башчыглар да сүпүркәләрә топланмышдыр. Эркәкчикләри чох узун саплаглыдыр вә чәһрайы рәнkdәдир. Пахласы ясты вә саплагсыздыр, яхшы бәзәк биткисидир, гураға давамлыдыр. Мешә золаглары салынмасында истифадә олуна биләр (шәкил 204).

Мейвәләриндә 87% мг «С» витамини, чичәйиндә 0,4% инчә этирли яғ вардыр.

Күстүмөтүкүмилер ярымфәсиләснндән олан а к а с и я (*Acacia*) чинсинин бир чох нөвү вардыр. Ярпагларынын саплаглары энлилөшөрөк филлодия метаморфоз этмишдир; онлар энли юмуртавари формадан тикан формасына гәдәр мүхтәлиф шәкилләрдә олур. Чичәкләри 4—5 үзвлү гурулушдадыр. Чохчичәкли башчыгларә топланмышлар, әксәр һалларда башчыглар салхымларә топланмыш олур. Эркәкчикләри чохдур, сары вә я нарынч рәңкләдир. Бу чинсин 500-ә гәдәр нөвү вардыр ки, о да тропик вә субтропик өлкәләрдә яйылмышдыр (*A. abyssinica*, *A. senegal*) вә саир нөвләриндән япышган (гуммиарабик) һасил әдирләр. Бәзиләриндән ашы маддәси алыныр, чоху бәзәк биткисидир. (*A. dealbata*) Крым вә Батумдә бечәрилир.

Күстүмөтү (*Mimosa*) чинсинин 350-йә гәдәр нөвү вардыр. Онлар башлыча оларә тропик өлкәләрдә яйылмышдыр. Онлардан күстүмөтү (*M. pudica*) бәзәк биткиси оларә бечәрилир. Механики тәсирдән (әл зурдугда) ярпаглары йығылыб бир аздан сонра ачылыр. Бу ярымфәсиләйә бир дәрүсәгачы (*Gleditschia*) чинси дахилдир. О, ирибудаглы тиканлы, һүндүр бойлу ағачдыр, ики нөвү вардыр (*G. caspica*, *G. triacanthos*) һәр икиси мөшә золаглары салмаг үчүн әкилмәси мәсләһәт көрүлүр.

Сезалпинлар (*Caesalpinoideae*) ярымфәсиләси

Чичәкләри бир гәдәр зигоморф вә я актиноморфдур, ләчәкләри бир-бирини ашағыдан юхарыя әртмүшдүр, эркәкчикләри чохунда сәрбәстдир, чох вахт онларын бир чәркәси инкишаф этмәмиш олур. Тропик өлкәләрдә яйылмыш кол вә я ағачлардыр (шәкил 205).

Бу ярымфәсиләнин характер чинси сәна (*Cassia*)-дыр. Онун 450-йә гәдәр нөвү вардыр. Касачыг ярпаглары 5-дир вә дибдән зәиф битишмишдир. Ләчәкләри бәрәбәр дейилдир вә тәпәләри оюгдур. Эркәкчикләри 10-дур, чох вахт үстдәкиләр тозлугсуз олур, ики яндакылар дүз вә гысадыр, ашағыдакы үч эркәкчик исә узун вә әйридир. Сүтунчуғу сапшәкилли вә әйридир. Пахлалары аракәсмәли слуб, дәриваридир, чох вахт энли, ясты вә я цилиндрикдир. Коллар, ярымколлар вә я отлардыр. Ярпаглары чүтлөләкшәкилли, мүрәккәбдир.

C. marylandica нөвү 1 м һүндүрлүкдә колдур. Ярпагларын голтуғунда сых чичәк группә олур. Ярпагчыглары чүт олмагла 12-дән 20-йә гәдәрдир, ләләкшәкиллидир, узунсов-овал вә я хәтвари узунсовдур, тәпәләри сиври, диби күтдүр. Ярпагалтлыглары хырда вә биз кимидир.

Касаярпаглары узунсов юмурташәкиллидир. Эркәкчикләри 10-дур, онлардан 3-ү инкишаф этмәмишдир. Пахласы ясты, хәтвари, чылпаг вә я бир аз түклү вә әйридир. Тохуму узунсов-кир-

дәдир. Бағларда бәзәк вә дәрман биткиси кими бечәрилир. Яхшы итиләтмә дәрманы олуб, сәна ады илә мөшһүрдур. *C. angustifolia* вә *C. acutifolia* нөвләриндән әла кағыз һазырланыр.




Шәкил 205. Сезалпиния (*Caesalpinia Gilliesii*).

Сезалпиния (*Caesalpinia*) чинсинин Азәрбайчанда бирчә Гиллис сезалпини (*C. Gilliesii*) нөвү вардыр. О, 1—2 м һүндүрлүкдә, чохбудагланан гыса колдур. Ярпагалтлыгы вардыр вә юмурташәкилли үчбучаға охшардыр, кәнарлары кирпик кими дишлидир, ярпаглары чүтлөләкшәкилли мүрәккәбдир. Чичәкләри чәтирә вә я салхыма охшар сейрәк чичәк группә топланмышдыр. Чичәк саплагы узун олуб, сых вәзили түкләрлә әртүлмүшдүр. Каса ярпаглары түнд сары түклү, кәнарлары вә

хүсусән үч һиссәси дишлидир, ачыг сары рәңкдәдир. 1,5—2,5 см узунлугдадыр. Ләчәкләри 2—4 см узунлугдадыр, ачыг сарыдыр, тәрсинә юмурташәкиллидир, кәнары бүтөвдүр, эркәкчикләринин саплагы 10—12 см-ә гәдәрди, ачыг гырмызы рәңкдәдир. Тозлуғу ачыг сарыдыр. Юмурталыгы узунсов, басыг, гыса вәзили түклү вә чох узун сүтунчуглудур. Пахласы ясты вә түклү олуб, 10 см узунлугда вә тәхминән 2 см эниндәдир. Бәзәк биткиси кими бечәрилер. Гураглығадавамлыдыр. Тохумлары зәһәрлидир. Горуячу мешә золагларында әкмәк үчүн мәсләһәт көрүлүр.

Кәпәнәкчичәклиләр (*Papilionatae*) ярымфәсиләси

Чичәкләри кәпәнәкшәкилли, зигоморфдур. Ләчәкләри гөнчәдә кирәмид кими бир-биринин үзәрини өртмүшдүр. Чичәйинин гурулушу 5-үзәлүдүр. Касачыгы 5 ярпагы вә битишикдир. Тачы бир бөйүк арха ләчәкдән (елкәндән) вә әйни бөйүклүкдә ики ян ләчәкдән (күрәкдән) чохунда исә бир-биринә битишиб гайыгчыг әмәлә кәтирмиш ики ләчәкдән ибарәтдир, үмумийәтлә тач сәрбәст ләчәклидир, лакин она битишмиш һалда да тәсадүф әдилир (мәсәлән, үчярпаг йончаларда олдуғу кими). Эркәкчикләр вә дишичк гайыгчыг ичәрисиндә ерләшир.



Шәкил 206. Нохуд чичәйинин вә тохумунун һиссәләри:

1—там чичәк; 2—онун узунуна кәсийн; 3—тачы; 4—елкән; ган-һападлар (күрәкләр); 5—гайыгчыг; 6—чичәкяшлыгы олмаян чичәк; 7—дишичк; 8—ләпәләртә рүшәйм; 9—ләпәләртә; 10—көкчүк; 11—рүшәйин тумурчуғу.

Эркәкчикләр ади һалда 10 әдәд олуб ики даирәйә дүзүлмүшдүр; онлардан бири чох вахт сәрбәст олуб харичи даирәдә ерләшир, галан 9-у, саплагы вәситәсилә бирләшәрәк дишичийн әтрафында бору әмәлә кәтирир вә бу бору дишичийн дибинә бирләшир; аз-аз һалларда эркәкчикләрин һамысы сәрбәст олур. Диши-

чийи бир мейвә ярпагындан ибарәт олуб, тохумлуғу ики чәркә дүзүлмүшдүр, юхары юмурталыглыдыр. Мейвәләри мүхтәлиф формалы, ачылан вә я ачылмаяндыр, буғумлудур, бәзән биртохумлу фындыгчыг шәклиндәдир, бәзән дә киләмейвә шәклиндә олур. Пахлалары дүз вә я гывырлымышдыр, ганадлы вә я ганадсыздыр, үзәри чылпагдыр, я да мүхтәлиф чыхынтыларла өртүлмүшдүр. Емәлидир вә я чох зәһәрлидир. Тохумлары эндосперм-сиздир, әһтият гыда маддәси ләпәләртә топланмышдыр. Көкләриндә юмулар олур. Онларда азот топлаян бактериялар симбиоз яшайыр. Тропик өлкәләрдәки нүмайәндәләри башлыча олараг агачлар вә лианлардыр, башга ерләрдәкиләр отлар вә коллардыр. Ярпаглары ләләкшәкилли вә я бармагшәкилли олуб мүрәккәб вә я аз-аз һалларда бәситдир.

Арылар вәситәсилә чарпаз тозланыр. Ябаны вә бәзи мәдәли нөвләриндә өз-өзүнә тозланма һаллары олур. Бәзиләриндә (мәсәлән, гарабурчагда, ерфындыгында) чичәкләр клестогамдыр (шәкил 207).

Азәрбайҗанда һәмин ярымфәсиләнин 44 чинси вә 350-дән артыг нөвү вардыр.

Бу ярымфәсиләнин ейинти әһәмийәти олан башлыча нөвү чохформалы лобядыр ки, ондан кениш истифадә әдилир. Тохумунда вә ярпагларында каротин вардыр, үйүдүлмүш тохумунда «В» витамининин мигдары 14 гаммадыр, бундан башга 18—31% зүлалли маддә, 1—3,6% яғ вардыр. Лобянын Күрчүстанда 79 формасы вардыр. Бурая анд олан маш вә я бостан лобясы (*Phaseolus aureus*) чох мәнфәәтлидир. Онун тәркибиндә 25% зүлал, 1,5% яғ вардыр. Лобя әкилмиш торпагда памбыгын мәһсулу хейли артыр. Чохчичәкли лобя (*Ph. multiflorus*) бириллик вә чохиллик биткидир. Чичәкләри ири, ағ вә я гырмызыдыр. Тохумлары иридир. Адәтән сармашан бәзәк биткиси кими бечәрилер.

Бу ярымфәсиләнин яшыл нохуд (*Pisum sativum*) нөвү бириллик, чох гыдалы биткидир. Онда 22—24% зүлал, 65% яғ вә 4—10% шәкәр вардыр. Адинохуд (*Cicer arietinum*) бириллик, бечәрилән биткидир. Тохумунда 18,6—25,8% зүлал, 4,67—19% яғ вардыр. Гураглыға чох давамлыдыр, дағларда дәннәз сәвиййәсиндән 2300 м йүксәкликләрә гәдәр олан ерләрдә бечәрилә биләр. *C. anatolicum* нөвү Нахчываның ерта вә юхары дағ гуршагларында гуру ямачларда битән чохиллик биткидир.

Мәрчи вә я мәрчимәк (*Lens culinaris*) нөвүнүн тохумундан ейинти мәһсулу кими истифадә әдилир вә я ем олараг һейванларә веркилр. Тәркибиндә 25,2—32,5% зүлал, 1,6—17 гамма «В» витамини, чүчәртисиндә исә чоғлу «С» витамини вардыр.

Аш пахласы (*Vicia faba*) тохумунда 27,03—35,00% зүлал, 0,82—1,41% яғ олан биткидир. Ән чох Ләңкәран

овалыгында бечәрилир, 1800 м һүндүрлүйдәк олан ерләрдә бечәрилә биләр.

Ерфындыгы (*Arachis hypogaea*) тохумунун таркибиндә 45—60% яғ вә 27—57% протейн вардыр. Яғы чох йүксәк кейфийәтлидир вә емәлидир. Загатаһа районунда бечәрилир. Чичәкләри ачылыб маяландыгдан сонра узаныб торпаға кирир вә мейвәләри орада етишир.



Шәкил 207. Ерфындығы (*Arachis hypogaea*).


Соя (*Glycine hispida*) тохумунда 16—17% яғ вә 34—36% зүлал вардыр. Ейинти мәһсулу кими ишләдилир вә техники әһәмийәти вардыр. Соя тохумундан ун, яғ вә мүхтәлиф ейинти мәһсуллары һазырланыр. Соя яғындан пендир, шор, сүд, гаймағ, гуру сүд, печен'е, бисквит, гәһвә, глицерин, сабун, каучук сурогаты, лак вә саирә истеһсалында истифадә эдилир. Бу, чох гәдим

дән бечәрилән битки олуб бир чох Шәрг вә чәнуб өлкәләриндә вә Америкада бечәрилир.

Совет Иттифагында Узәг Шәргдә, Орта Асияда, Гәрби Күрчүстанда, Шимали Гафгазда вә Украинада бечәрилир.

Һәмин ярымфәсиләнин нүмайәндәләриндән ағбурчаг (*Lathyrus sativus*), һәм ем, һәм дән биткисидир. Хүсусән онун гуру оту протейнлә зәнкин олдуғу үчүн чох дәйәрлидир. Тохумунда 27,81 — 30,19% зүлал вә 0,62% яғ вардыр.

Әкилән гара йонча (*Medicago sativa*), гара йончалардан (*M. falcata*, *M. coerulea*) вә с. үчярпаг йонча (*Trifolium*) нөвләри, хашамбул (*Melilotus*) вә хашанын (*Onobrychis*) ябаны



Шәкил 208. Кәпәнәкчичәклиләр ярымфәсиләсинә мәһсуб олан биткиләрин чичәкләринин диаграммы:

1—аш пахласының *Vicia faba* диаграммы; 6—өлкән ган—ганәдләр; гай—гайычы; 2— *Cytisus laburnum* нөвүгүн диаграммы.



Шәкил 209. Соя (*Glycine hispida*).

а—биткиның үмүм көрүнүшү; б—тохумлары; в—пахла мейвәләри; г—етишмиш мейвәли битки.

битән вә әкилиб бечәрилән нөвләри чох көзәл ем биткиси олуб, оттарлалы әкин системиндә кениш тәтбиг әдилир. Қолшәкилли көвән (*Astragalus*) чинсинин белә нөвләриндән (шәкил 210) ипәк вә чиг сәнаен үчүн гиймәтли китрә (япышганаохшар маддә) алыныр.



Шәкил 210 Көвән (*Astragalus*).

Бәзәк биткиси олан ағ акасия (*Robinia pseudoacacia*) һәм дә бал верән биткидир. Мешә золаглары салынмасында истифадә этмәк мәсләһәт көрүлүр.

Һәмин ярым фәсиләйә аид олан сафора ағачы (*Sophora japonica*) һүндүр бойлу, мейвәянлығы әтли, буғумлу, пахлалы биткидир. Яшыллашдырма ишләриндә вә мешә зоаглары салынмасында истифадә этмәк мәсләһәт көрүлүр. Мейвәси зәһәрлидир.

Бу ярымфәсиләнин тәбабәтдә ишләдилән нөвләриндән кечитунун (*Galega officinalis*) от һиссәсиндә галекин вә

инсулинә охшар маддәләр вардыр. Кечитундан алынған ширә ганда шәхәрин мигдарыны азалдыр.

Ширин биянын (*Glycyrrhiza glabra*) көкүндә глюкозидә-охшар глисеризин, сапонин, глюкоза, сахароза вә саирә вардыр. Ондан зәһф. ишләтмә дәрманы кими истифадә әдилир. Бундан башга онда бәлгәмкәтиричи хасийәт дә вардыр.


ӘМӘКӨМӘЧИЧӘКЛИЛӘР (*Malvales*) СЫРАСЫ.

Бу сыра күлчичәклиләр сырасындан айрылыб инкишаф этмиш бир будагдыр. Бунларда да күлчичәклиләр кими яопагалтылыглары вардыр. Һәмин сыранын әмәкөмәчи фәсиләсинин чичәкләриндә, күлчичәклиләрин бәзиләриндә олдуғу кими кассаалтылыгы вардыр. Чичәкләри бештипли, тачы сәрбәст ләчәклидир. Эркәкчикләри ики даирәйә дүзүлмүшдүр, лакин харичи даирәдәкиләр ихтисар олунмушдүр, эркәкчикләр саплаглары илә бир нечә дәстә шәклиндә бирләшмишдир. Һамысында чичәкләр актиноморфдур, кенисей синкарпдыр вә юхары юмурталыгдыр. Чохунун көвдәсиндә селикли һүчәйрәләр вә я селик йоллары вардыр, эпидермисләриндә будаглакыш түкләр олмасы характердир. Бу сыранын әһәмийәтли фәсиләләри чөкәчичәклиләр, әмәкөмәчи, Баобаблар вә какаодур.

Чөкәчичәклиләр (*Tiliaceae*) фәсиләси

Чөкәчичәклиләр фәсиләси ағачлар, коллар, аз-аз һалларда исә от биткиләридир. Онларын ярпаглары бәсит, чичәкянлығы чох вахт икигәтдыр. Ләчәкләри 5-дир, бәзән дә ләчәкләр инкишаф этмәмишдир. Эркәкчикләри дөрдювалы тозлуглудур, чохлу мигдардадыр (аз-аз һалларда 5—10-дыр), сәрбәстдир вә я дәстә һалында битишиkdir, бәзән бир гисми стаминодия һалындадыр. Тозчуглары һамардыр. Мейвәярпаглары 2 вә я чохдур. Бир тохумлу вә я чохтохумлудур. Сүтунчуғу бирдир. Мейвәләри гүгүчүг вә я фындыгчыгдыр. Тохумлары эндоспермлидир. Яхшы бал верән энтомофил биткиләрдир.

Бу фәсиләдән Азәрбайчанда ялынз 5 нөвү олан бирчә чөкә (*Tilia*) чинси раст кәлир. Чичәкләри яланчы чәтирләре топланмышдыр. Онларын дибиндә елкән шәклиндә узун өртүчү ярпагчыг вардыр ки, о да мейвәләрин яйылмасыны тәмин әдир. Чичәкләри гурулушча 5 типлидир вә ачыг сары рәнкдәдир. Эркәкчикләри чохдур, дибдән 5 дәстәйә топланмышлар. Юмурталыгы юхарыдадыр. Мейвәси инкишаф әдән заман дишчикдә ихтисар кедир. Бешювалы 10-тохумлуғлу юмурталыгдан бирювалы вә биртохумлу мейвә әмәлә кәлир. Мейвәси фындыгчыгдыр. Азәрбайчанын дағ мешәләриндә ағач шәклиндә битир. Районларын чохунда яхшы бәзәк биткиси кими вә яшыллашдырма мәгсәдилә истифадә әдилир.



Шәкил 211. Чөкә.

1—чөкәнин узунуна кәсилмиш чичәйи; 2—чичәк групу; гаф—ганашәкилли ярпаг; ая—ая ярпаг; өя—өртүмү ярпаг

Гафгаз чөкәсинин (*T. caucasica*) вә башга нөвләринин тохумлары дадлы вә чох яғлыдыр.



Шәкил 212. Ади чөкәнин (*Tilia cordata*) будаглары.

Ади чөкә (*T. cordata*) нөвүнүн тохумунда 11,95% яғ вардыр. Азербайчанда олан эһтиятыны нәзәрә алараг онлардан чохлу мигдарда яғ һәсил этмәк олар.

Гафгаз чөкәсинин (шәкил 211) чаван ярпагларыннан чохләззәтли салат һазырланыр я да тәнәк вә кәләм ярпагы кими долма бүкүлүр. Гуру чичәкләриндән тәрләдичи чай дәмләнир. Бундан башга спиртли ичкиләр истеһсалында да ондан истифадә эдиллир. Чөкәдән лиф, һәсир, кәндир, чарыг вә с. һазырланыр.

Юхарыда кәстәрилдиһи кими чөкәләр чох яхшы бал верән биткиләрдир. Онлардан һәсил олан бал сатышда «чөкә балы» ады илә мәшһурдур вә башга баллардан үстүн тутулур. *T. cordata* нөвүнүн бир ағачындан 12 кг вә бир

һектар чөкәликдән бир тон бал алына биләр. Бу нөвүн ярпағында 500 гамма «А» провитамины вә 224,4 мг% «С» витамини вардыр.

Чичәйиндән алынган чөкә яғы зә'фәрән иһи верир. Чөкә нөвләринин дағларда мешә салмаг вә мешә золағлары яратмаг үчүн истифадә этмәк мәсләһәт көрүлүр.

Әмәкәмәчи (*Malvaceae*) фәсиләси

Әмәкәмәчи фәсиләсинин нүмайәндәләри отлар, коллар вә ағачлардыр. Ярпағлары бәсит, кәнарлары бармагшәкилли, дилли, кәсилмиш вә я бөлүнмүшдүр.

Әмәкәмәчи фәсиләсинин бәзи нөвләриндә ярпағларын кәнарлары бүтөв олур. Ярпағалтлығлары вардыр. Чичәкләри актиноморф, икичинсли вә тәк-тәк олуб, ярпағларын голтуғунда вә я тәпәләрә топланмыш чичәк групу тәшкил эдир. Чичәкянлығы бешүзвлүдүр. Каса ярпағлары чох вахт битишикдир. Ләчәкләри гонча һалында икән бурулмуш олур. Эркәкчикләри чохунда ики сырая дүзүлмүшдүр. Онлардан ләчәкләрә гаршы-гаршыя оланлары нормал икишаф этмишдир. Каса ярпағларынын гаршысында оланлары икә стаминодия һалындадыр. Тозлуглары икиовалыдыр. Тозчуглары чох ири вә ити чыхынтылыдыр. Мейвәләри гутучуг вә я парчаланан мейвәдир.

Фәсиләнин ән әһәмийәтли чинси п ам б ы г д ы р (*Gossypium*). Бәзи тәснифатчылар памбыг чинсини *Bambacaceae* фәсиләсинә анд эдилләр. Памбыг өз вәтәниндә ябаны битән чохиллик коллардыр, мәдәни һалда бир веһетәсия дөзрү кечирдийиндән бириллик битки һесаб олунур. Көвдәси дик галхан, азча түклү, яшыл вә я да гырмызымтылдыр, будагланыр вә диб һиссәси одунлашыр. Будаглары моноподиал вә симподиалдыр. Әсас көвдә үзәриндәки ярпағлар ян будагдакылардан даһа узун саплағлы олур. Ярпағларынын аялары ири олуб, 3—5—7 бармагвари дилимлидир. Аянын диби үрәквари чухурдур вә дилимләрин учлары сивриләшмишдир. Ярпағларын дибиндә 2 ярпағалтлығы вардыр. Гөнчәнин дибиндә 3 әдәд чичәкалтлығы олур вә онларын үрәквари дибләри гөнчәйә битишир. Кәнарлары дарагшәкилли хәтвари телләрә бөлүнмүшдүр. Каса ярпағлары бешдишли вә битишикдир. Ләчәкләри гонча һалында бурулмуш олур. Тач 5 ләчәкдән ибарәтдир, ләчәкләрин диби бирбиринә битишмишдир; бу һиссә эһни заманда эркәкчийин бору-суна да дибдән битишмишдир. Ләчәкләрин рәнки набаты сары, аз-аз һалларда гырмызы олур; чох вахт ләчәйин дибиндә түнд гырмызы ләкә көрүнүр. Чичәйи бүтүн күн ачыг һалда олур, ләкин ахшама доғру гапаныр, тачы абы рәнк алып, бир нечә күндән сонра о, эркәкчик вә онун ичәрисиндән кечән дишичик сүтүнчүгү гопуб дүшүр. О замана гәдәр маяланма да гуртарыр. Эркәкчикләри чохдур. Онларын бирләшмиш саплағлары дишичийи бүтүн бою узуну әһәтә эдир. Дишичик бирдир, 3—5 квалыдыр (аз-аз



Шәкил 213. Орталифли памбыг (*Gossypium hirsutum*)

1—гөвчәли вә чичәк ачымыш будары; 2—чичәйи; 3—4—ачылмыш гөзәсы.

һалларда юваларын сайы 12-йә гәдәр олур). Юмурталығы юхарыдыр, һәр ювада ики чәркә дүзүлмүш бир нечә тохумлуг олур. Сүтунчуғу эркәкчийин борусундан кечәрәк дилимли ағызчыглары илә чөлә чыхыр. Касачығын чөл һиссәсиндә чичәкалтыглары олур. Мейвәси гутучугдур (шәкил 213). Етишдикдә ябаны нөвләрдә гутучугун учу бир аз, мәдәни нөвләрдә исә дибә гәдәр

ачылыр. Тохумларынын үзәри ястыг тәшкил эдән узун түкләрлә өртүлмүшдүр вә я да чылпагдыр. Эндоспермсииздир. Лифләрин узунлуғу памбығын нөв вә чешидиндән асылы олараг 10-дан 65 см-ә гәдәр олур. Памбыг биткиси башлыча олараг һәмин түкләрин (лифләрин) хатиринә бечәрилир.

Лифләр тохучу сәнаеинин һазырладығы мүхтәлиф парчаларын әсасыны тәшкил эдир. Бу парчаларын яхшы чешидләриндән парашүт вә һәтта аэростат балону да һазырламаг мүмкүндүр. Ер үзәриндә яшайн инсанларын 75%-и памбыг парчалардан тикилмиш палтар кейир. Памбыг дүняда тиңарәт васитәләриндән биридир.

Памбыг чох вахт өз-өзүнү тозлайн биткидир. Чичәкләри июн айындан ачылмаға башлайыб, шахталар дүшсә гәдәр давам эдир. Шахта вурмуш гутучуглар (гөзалар) даһа ачылмыр. Җышын шахталары олмасайды, о заман биткинин ердә галаи көкүндән кәлән ил зоглар әмәлә кәләрди. Битки айнебәндиндә (оранжерейда) памбыг типик кол, һәтта ағач кими битир вә узун өмр сүрүр. Чох исти олдугда будагларындан кәсилән гөләм яхшы көк верир.

Ябаны памбыг Авропадан башга бүтүн гит'әләрдә битир. Памбығын әсас нөвләри бунлардыр:

Ади памбыг (*Gossypium hirsutum*) орталифли памбыгдыр. Памбыгчылығда ән әһәмийәтли сәнае нөвүдүр. Кениш бечәрилир. Алимләримизин сәйи нәтичәсиндә Азәрбайҗанда мүвәффәгийәтлә бечәрилән «1298», «108ф», «2421» адлы даһа йүксәк кейфийәтли чешидләр әлдә эдилмишдир.

Бурбон (*G. pyramidalis*) Узунлифли памбыгдыр. *G. maritimum*, *G. barbadense* Орта Асияда вә Азәрбайҗанда бечәрилир. *G. barbadense* нөвүндән Азәрбайҗан районларында чох мүвәффәгийәтлә бечәрилән «59—04И» вә «МОС—602» чешидләри әлдә эдилмишдир.

Зәиф кечәли памбыг (*G. tomentosum*) һавай адаларында ябаны һалда битир.

Ағачшәкилли памбыг (*G. arboreum*). Ябаны һалда Пакистанда битир, мәдәни һалда Һиндастанда, бир гәдәр Әфғанистанда, Бирмада, В'етнамда, Чиндә, Кореяда, Манчурияда вә Японияда бечәрилир.

Җысалифли памбыг (*G. herbaceum*) Вәтәни Африкадыр. Һазырда бечәрилмир.

Стокс памбығы (*G. Stocksii*). Лифләри гәһвәйи рәнkdә олуб, лифләринин узунлуғу 7 мм-дир. Пакистанда, Чәнуби вә гәрби Әрәбистанда битир.

Стурт памбығы (*G. Sturtii*). Тохумлары чох җыса вә яшылымтыл түклүдүр. Орта вә Чәнуби Австралияда битир.

Памбыг чинсинин юхарыдакылардан башга бир сыра ябаны нөвләри дә вардыр. Памбыг, бөйүк тәсәррүфат әһәмийәти олан гуру субтропик биткидир. Памбыгдан чох җиймәтли әлавә мән-

суллар да алыныр. Чийидин тәркибиндә 25%-ә гәдәр бөйүк сәнае вә ейинти әһәмийәти олан яғ вардыр. Чийидин ягы чыхарылдыгдан сонра ердә галан маддәдән һазырланан жмыхда 40—43% зүлалли маддә вә мүййән мигдарда яғ олдуғундан һейватлар үчүн чох яхшы емдир.

Һазырда ССРИ-дә памбыг әсас әтибарилә Өзбәкистанда вә Азәрбайчанда бечәрилиз.

G. hirsutum памбыгынын гозасындан Орта Асияда тәһвәни тамамилә әвәз әдән ички һазырлайырлар. Памбыг чох яхшы бал верән биткидир. Бал арылары суварылан памбыг саһәсинин һәр һектарындан, памбыгын чичәк ачдыгы мүддәтдә 300 кг, дәмйә саһәләрдән исә 100 кг бал һасил әдә биләр. Памбыг районларында арычылыг тәсәррүфаты кенншләндириләрсә, памбыг мәһсулу да хейли артар. Гейд әтмәлийик ки, памбыг биткисинин көкүнүн габығындан ган кәсән дәрман, чубугундан исә луму дузу һазырланыр.

Памбыгчылыгда Азәрбайчан Орта Асиядан сонра икинчи ери тутур вә итисадийятымызда нефт гәдәр мүһүм рол ойнайыр.

Апрел ингилабына гәдәр Азәрбайчанда памбыг чох аз әкилизди вә ибтидан үсулларла бечәрилирди. Ени памбыг чешидләри әлдә әтмәк үчүн дә һеч бир иш апарылмырды. Азәрбайчанда совет һакимийәти гурулдугдан сонра памбыг габагчыл үсулларла бечәрилмәйә башланмыш, памбыг әкинләринин саһәси гат-гат кенншләндирилмиш вә юхарыда кәстәрдийимиз кими совет алимләринин сә'йи нәтижәсиндә бир чох йүксәк кейфийәтли памбыг чешидләри әлдә әдилмишдир. Инди памбыг Азәрбайчанын әксәр районларында әсас битки нөвү олараг чох мүвәфәғийәтлә әкилиб етишдирилир.

Памбыга нисбәтән аз сәнае әһәмийәти олан биткиләрдән бири дә кәнафдыр (*Hibiscus cannabinus*). О, (шәкил 214) һүндүр бойлу отдур. Көвдәсиндән парлаг юмшаг вә эластикли лиф һасил олур. ССРИ-дә Шимали Гафгазда, Гырғызыстанда вә Газахыстанда бечәрилиз.

Күлхәтми (*Althaea*) чинсинин Азәрбайчанда 10 нөвү вардыр. Бурая мәһсүб олан биткиләрин кәса алтлыгынын ярпагчыглары 6—9-дур вә онлар ялыз дибдән битишикдир. Кәсачыгы 5 ерә бөлүнмүшдүр. Ләчәкләри 5-дир. Дишинчийи чохлу мейвә ярпагларындан әмәлә кәлмиш, һәр ювада бир тохумлуғу вардыр. Мейвәләри даирә шәклиндәдир, ортасындан басыгдыр.

Әһәмийәтли нөвләрдән чәтәнәярпаг күлхәтми (*A. cannabina*) нөвүнүн көвдәсиндә 12% габа тохунма парчалар үчүн истифадә олунабиләчәк лифләр вардыр.

Кәлә-көтүр түклү күлхәтми (*A. hirsuta*) нөвүнүн тохумунда 16% яғ вардыр. Чәтәнәярпаг күлхәтми Азәрбайчанда коллугларда вә мешә кәнарларында, түклү күлхәтми исә зибилли, гуру ерләрдә вә бир алағ оту кими тахыл вә памбыг әкинләриндә битир.

Дәрман күлхәтмисинин (*A. officinalis*) көвдә

дилимсиздир вә я бир гәдәр оюгдур, я да учларындан аз-чох дилимлидир. Бүтүн биткинин үзәри улдузшәкилли юмшаг түкләрдә өртүлмүшдүр. Һүндүрлүйү 60—100 см-дир. Чичәкләри голтугларда дәстә-дәстәдир вә һәр дәстәдә бир нечә чичәк олур. Ләчәкләринин узунлуғу 15—20 мм-дир, юхары һиссәләри солгун чәһрайы-диб һиссәләри исә түнд-гырмызы рәнкләдир. Эркәкчикләри түнд-гырмызыдыр вә кәсачыгдан ики дөфә гысадыр. Кәсачыг ярпаглары үчбучагшәкилли, сивридир. Мейвәчикләри өн тәрәфдән түксүз, архадан улдузшәкилли түклүдүр. Чай кәнарларында, рүтүбәтли ерләрдә битир.



Шәкил 214. Кәнаф (*Hibiscus cannabinus*).

а—чичәкли вә чичәксиз көвдәси; б—чичәйи.

Дәрман күлхәтмисинин көкүндән дәрман үчүн истифадә әдирләр: бундан башга о, хырдаланмыш вә бишмиш һалда тәрәвәз кими ейилир; тәркибиндә 37% нишаста, 4% сахароза, 35% селикли маддә вә 11% пектин маддәси вардыр. Һәммин селикли маддәнин олмасы сайәсиндә ондан күлхәтми көкү ады илә тәнәффүс йолуну юмшалдычы бир дәрман кими тәбабәтдә истифадә әдирләр. Ярпагларында 390 гамма «А» провитамина вардыр.

Әмәкәмәчи (*Malva*) чинсинин Азәрбайчанда 10 нөвү вардыр. Бу чинс фәсиләнин характер хусусийәтләринә маликдир: чичәйи беш типлидир, кәсаалтлыгы үчярпагчыглыдыр, эркәкчикләри вә юмурталыгы чохдур, юмурталыгы мейвәярпагларындан әмәлә кәлиб бир-бирилә бирләшмишдир, онларын һа-

мысы бир дө ортадан үмүмү сүтүнчүгө бирлэшмишдир, сүтүнчүгларын юхарысы сэрбэст олуб, сайча мейвэ ярпагларына бəрəбəрдир, мейвəлəри туру вə чох ерə парчаланан тохумчəмейвəдир.

Əмəкəмəчи чинсинин əлəмийəтлi нөвү мəшə əмəкəмəчи сидир (*M. silvestris*). Онун чичəклəри ярпагларынын голтуғунда дəстə-дəстə топланмышдыр. Лəчəклəри ири вə кəсəчыгдан 3—4 дəфə узундур. Тохумлары арха тəрəфдөн һəмəрдыр вə үзəри чыплагдыр. Кəсəалтлығы ярпагчыглары кəсəчыгдан бир аз ғысадыр. Лəчəклəри түнд-гырмызы, бəнəвшəйи вə дəрлi оюгдур. Ярпаглары чылпаг, кəнəри 5—7 күт дишлiдир. Чичəк саплаглары бəрəбəр дейилдир вə ярпаглардан ғысадыр. Көвдəлəри диш дуран вə я ятандыр, гол-будаглыдыр, 20—50 см һүндүр-лүкдəдир. Бириллик вə я икииллик биткидир. Азəрбайжанын дəмəк олар, бүтүн районларында зибилли ерлəрдə битир.

Əмəкəмəчи нөвлəринин чəвəн ярпаг вə мейвəлəри биширилмиш һəлдə ейилir; етишмəмиш мейвəлəрини ушаглар чох һəвəслə ейирлəр. Яхшы бал верəн биткидир. *M. silvestris* нөвүнүн ярпагларында 125—140 гамма «А» провитамины вардыр. Тохумларында 18% яғ вардыр. *M. pusilla*, *M. rotundifolia* нөвлəринин ярпагларында 112—143 мг % «С» витамини олур.

Баобаблар (*Bombacaceae*) фəсилəси

Бу фəсилəнин нүмəйəндəлəри əсəсən тропик өлкəлəрдə яйылмышдыр. Бурая 140-а гəдər нөв дахилдир. Онларын һəмысы ағачлардыр. Чичəклəри əмəкəмəчикимилər фəсилəсинə охшайыр, лəкин лəчəклəринин сых түклү олмасы, тозлугларынын гурулушу вə тоз һүчəйрəлəринин һəмəрлыгы илə əмəкəмəчикимилəрдən фəрглəнир. Һəшəрат вə гушлар вəситəсилə тозланыб маяланыр.

Характерик нүмəйəндəлəриндən бири меймунчəрəйи ағачыдыр (*Adansonia digitata*). О, (шəкил 215) Африка саванларында битəрək 5 мин илə гəдər яшəян ағачдыр, һүндүр-лүйү 25 м-ə, йоғунлуғу исə 4—9,5 м-ə чəтыр. Ярпаглары ат шəбəлдынын ярпагларына охшайыр, гураг замəнлардə ярпагчыгларыны тəkүр вə бу дөврдə гəбəгəохшар мейвəлəри етишир. Мейвəлəри ағача хүсуси кəркəм верир. Азчə турш олан мейвəлəри вə тохумлары емəлидир. Гəлын гəбыг һиссəсиндən кəғыз истəһсалында истифəдə эдилir, одунчəг һиссəси кəврək олдуғундан ишлəдилмир. Сон замəнлар пəмбығы бу фəсилəйə дахил эдирлəр.

Какао (*Sterculiaceae*) фəсилəси

Тропик өлкəлəрдə битən ағачлар, отлар вə лианлардыр. Ярпагалтлығы вардыр, аясы бүтөв вə я дилимлидир. Кəсə ярпаглары битишик, лəчəклəри гəнчəдə икən дүз вə я бурулмушдур. Эркəк-чиклəри ики дəнрəйə дүзүлмүшдүр, онлардан кəсə ярпагларынын

гаршысында дуранлары стаминодиялардыр, лəчəклəрин гаршысында оланлар исə икиювалы нормал тозлуглулур. Бу тозлуглар парчаланмышдыр вə я тəмəм битишикдир. Мейвə ярпаглары 5-дир. Тохумлуғу ики вə я чохдур. Мейвəлəри гүтүчүгдур вə я мейвə-чиклəрə парчаланмышдыр, аз-аз һəллардə килəмейвəдир. Чичəклəри икичинсли вə я бирчинсли олан энтомофил биткилəрдир.




Шəкил 215. Меймунчəрəйи ағачы—Баобаб (*Adansonia digitata*).

1—Ағачын үмүмү көрүнүшү; 2—чичəйи; 3—чичəкли вə кəл мейвəли будағы; 4—чичəкянылығын бир һиссəси кəсəлимиш чичəкдə дишчинин көрүнүшү; 5—битишмиш эркəкчийи; 6—бир эркəкчийи; 7—етишмиш мейвəли будағы; 8—мейвəсинин энинə вə узунуна кəсəйи; 9—тохуму; 10—чичəк саплагын энинə кəсəйи.

Фəсилəнин башлычə чинси кəкə одур (*Theobroma*). Онун бүтүн дүняда 20 нөвү вардыр. Амазон чайынын əтрафындакы мəшəлəрдə ағачларын алтында мəшəалты битки кими

яшайыр. Бу чинсини машһур нөвләриндән бири какао (*Th. cacao*)-дур. О, хырда ағачдыр, чичәкләри чох вахт әсас көвдәсинин үзәриндә әмәлә кәлир, хырда олур. Мейвәләри габырғалы, гырмызы, сары вә я нарынчы рәнкдә олуб хияра охшайыр, һәр мейвәсиндә 20—30 әдәд ири тохум олур. Тохумларынын рүшейм ләпәләри чох әйилмишдир. Һәмни тохумлардан какао вә какао яғы алыныр. Тохумлар ферментләшдирилдикдән сонра хусуси һәзз верән маддә вә синир системини фәалийәтә кәтирән теобромин адлы глюкозид верир. Говрулмуш вә үйүдүлмүш тохумларына шәкәр, какао яғы, ванил вә башга маддәләр гарышдырылдыгдан сонра шоколад һазырланыр. Какао ағачы тропик өлкәләрин бир чохунда бечәрилир.



Шәкил 216.

Солда какао ағачы (*Theobroma cacao*). 1—әсас көвдәси үзәриндә мейвәләри илә бирликлә көрүлүшү; 2—чичәк группу; 3—чичәји. Сағда—ортада чичәкли вә мейвәли көвдә һиссәси 1—чичәжиниң узунуна кәсји; 2—әркәкчикләр вә онларын чыхынтылары; 3—бир ләчәји; 4—әркәкчийи; 5—мейвәсиниң узунуна кәсји; 6—кичиңлимиш тохуму.

ӘТИРШАҢЧИЧӘКЛИЛӘР (*Geraniales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын нүмайәндәләриндә чичәкләрин зитоморфлуғу вә әркәкчикләрин аз олмасы әмәхәмәчикимиләрә нисбәтән бунларын даһа тәкамүл этдийини кәстәрир. Әтиршаһчичәкклиләр сырасында

от биткиләринин чохлуғу мұшаһидә олунур. Әтиршаһчичәкклиләр сырасыны *Malvales* сырасына яхынлашдыран чәһәт, һүчәйрәләриндә, хусусилә дә ярпаг эпидермиси һүчәйрәләриндә селикли маддә олмасыдыр.

Әтиршаһчичәкклиләр сырасына дахил олан биткиләрин чохунун чичәкләри бешүзүлүдүр. Әркәкчикләри 10, я да аздыр, саплаглары бир-биринә битишмишдир, дибиндә харичдән нектарлығы вә я һалга шәклиндә диски вардыр. Дишичийи беш мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, юмурталығы чохювалыдыр. Чохунун ярпаглары бәситдир. Әһәмийәтли фәсиләләри: кәтан, туршәнк, әтиршаһ вә с.

Кәтан (*Linaceae*) фәсиләси

Кәтан фәсиләсинин нүмайәндәләри отлар вә коллардыр. Чичәкләри икигат янлығлы, актиноморф, беш типлидир. Бу фәсиләсин әркәкчикләри 5-дир, бәзи нөвләрин әркәкчикләри стаминодия һалында олур. Юмурталығы яланчы 2—5 ювалы вә синкарпдыр. Мейвәләри гутучуг вә я чәйирдәкдир. Ярпаглары бәсит вә нөвбәлидир, аз-аз һалларда дәстә илә дүзүлмүш олур. Башлыча олараг исти өлкәләрдә битир.

Кәтан (зәйгәрәк) (*Linum*) чинсиниң Азәрбајчанда 13 нөвү вардыр. Бунлардан ән мұһүм бечәриләнн кәтандыр. (*L. usitatissimum*) (шәкил 217). Онун ләчәкләри көй рәнкдә олуб, тез төкүләндр. Гутучуғу күрәви вә 5 дишлидир. Мәдәни нөвләринин бир нечә формасы вардыр. Вәтәни Аралығ дәнизи әтрафыдыр. Ән гәдим мәдәни биткиләрдән бири олуб, эрамыздан 5.000 ил габаг мисирлиләр тәрәфиндән бечәрилмишдир. Тохумунда 20—50 гачма «Д» витамини, 23 мг % «Е» витамини вә 25.4% яғ вардыр. Көвдәсиндән алынан лифләрдән кәтан парчалар тохунур.



Шәкил 217. Бечәрилән кәтан (*Linum usitatissimum*).

1—чичәкянылығы көтүрүлдүкдән сонра әркәкчик вә дишичийиң көрүлүшү; 2—юмурталығын узунуна кәсји; 3—гутучуғун әниңә кәсји; 4—чичәјиң диаграмы.

Туршәнк (*Oxalidaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләсин нүмайәндәләри отлардыр. Ярпаглары бурғу үзрә дүзүлмүш мүрәккәб вә я бәситдир. Чичәкләри мұнтәзәм, икичинслидир. Касачығ ярпаглары вә ләчәкләри беш-бешдир, гөнчәнин ичиндә икән ләчәкләри узунуна гатланмишдир. Әркәкчикләриниң сайы 10—15-дир, чох вахт саплагларынын диб һис

сәси битишмиш олур. Сүтунчуглары 5 вә сәрбәстдир. Мейвәләри гутучуг вә я тәкбир һалларда киләмейвәдир.

Бу фәсиләнин Азәрбайчанда бирчә туршәнк (*Oxalis*) чинси вардыр. Онун да бирчә нөвү буйнузлу туршәнкдир (*O. corniculata*). Ләчәкләри сарыдыр, 8 мм узунлуғундадыр вә касачыгдан узундур. Ерүстү көвдәси яхшы инкишаф этмишдир вә сүрүнәндир. Узунлуғу 40—50 см-ә гәдәрдир. Ярпаглары үчәр мүрәккәб ярпагдыр. Ярпагчыгларынын тәпәси оюгдур. Чичәк группу 2—3(5) чичәкдән ибарәтдир. Чичәк саплаглары ашағыя чеврилмиш олур. Мейвәләр саплагларынын үзәриндә дик даяныр, түклүдур. Гутучуглар тайларыны ачыб тохумларыны атыр. Азәрбайчан районларында зибилли ерләрдә, тәрәвәз әкинләриндә, чичәк дибчәкләриндә, аран районларында рүтубәтли ерләрдә битир.

Ярпаглары турш олдуғу үчүн салат вә шорабада истифадә олунур.

Әтиршаһ (*Geraniaceae*) фәсиләси

Әтиршаһ фәсиләсинин чичәкләри икичинслидир, мүнтәзәм вә я гейри-мүнтәзәмдир. Касачыг ярпаглары 5, ләчәкләри 5 вә сәрбәстдир. Эркәкчикләри 5-дән 15-ә гәдәрдир вә саплаглары дибдән һәлгәвари битишдикдир, чох заман эркәкчикләрдән ялныз беши тозлуғлу олур. Юмурталығы 5—3—2 мейвә ярпағындан әмәлә кәлиб, 5 ювалы вә юхарыдыр. Сүтунчуглары чох вахт юхарыдан узаныб бурунчуг әмәлә кәтирир. Мейвәләри чохунда тохумчалара парчаланан гутучугдур. Тохум етишән заман 5 тохумчая бөлүнүр. Тохумчаларын учундакы гылчыгаохшар чыхынты түкчүклә өртүлү олур. Бу да учаған ролуну ойнайыр. Ярпаглары бармагшәкилли бәситдир, үзәри аз-чох әтирли яғ ифраз әдән түкчүкләрдә өртүлү олур. Отлар вә ағачлардыр.

Әтиршаһ фәсиләсинин Азәрбайчанда 4 чинси вардыр. Онлардан ән әһәмиyyətлисә әтиршаһ (*Geranium*) чинсидир ки, онун да Азәрбайчанда 23-ә гәдәр нөвү вардыр. Бунлардан *Geranium albanum*, *G. ibericum*, *G. platypetalum*, *G. sanguineum*, *G. silvaticum* вә с. әтиршаһ нөвләринин көкләриндә ашы маддәләри вардыр (шәкил 218 вә 219).

G. dissectum нөвүнүн көкләриндән бир тәрәвәз кими истифадә әдилір *G. ibericum* нөвүнүн көк вә ярпагларындан гара рәнк, *G. silvaticum* нөвүнүн чичәкләриндән көй рәнк алыныр. *G. dissectum* нөвүнүн ярпағында 251,1 мг%-дән 457,7 мг%-ә гәдәр, *G. tuberosum* нөвүндә исә 288,4 мг% «С» витамини вардыр. Әтиршаһын нөвләри дағ әтәкләриндән алп чәмәнләринә гәдәр яйылмышдыр. Әкинләрин арасында мешәләрдә вә коллугларда битир.

Әтиршаһ фәсиләсинин Шамданкүлү (*Pelargonium*) чинсинин нөвләри бәзәк биткиләридир, чичәкләри зигоморфдур. Даһа чох Чәнуби Африкада битир. *P. roseum* нөвү рүтубәтли субтро-

пик ерләрдә бечәрилир, әтирли яғлы биткидир. Ондан алынан әтирли яғ әтрийятда ишләдилір.

Саатчичәйи вә ячиликбурну (*Erodium*) чинсинин *E. cicutarium* нөвүндә (шәкил 220) 70 гамма «А» провитамины вә 37—73 мг% «С» витамини вардыр. *Erodium* чинсинин Азәрбайчанда олан 8 нөвүнүн чоху алағ отудур.

Какаин (*Erythroxylaceae*) фәсиләси

Какаин фәсиләси кәтән фәсиләсинә яхын олдуғу үчүн аличләр бәзән онлары бир-бириндән айырмагда чәтишлик чәкирләр. Какаин фәсиләсинин чичәкләри 5 типли, актиноморфдур. Эркәкчикләри 10-дур. Юмурталығы үчювалыдыр. Мейвәләри чәйирдәкмейвәдир. Ярпаглары бәсит олуб, ярпагалтылығы вардыр. Тропик өлкәләрдә кол биткиси олан какаинин (*Erythroxylon coca*) вәтәни Перу вә Боливиядыр. Ярпагларында какаин адланан алколоид вардыр ки, ондан да чәрраһийәдә, диш вә көз хәстәликләринин мұаличәсиндә кейиндичи вә дамарлары сыхычы дәрман кими истифадә әдилір. 1934-чү илдән әтибарән Гара дәниз сайилиндә «Питсунда» совхозунда бечәрилир. Азәрбайчанда бечәрилмир, чүнки +10° һәрарәтдә белә союгдан тәләф олур.


Әриккүлү вә я нәстәрән (заманда гаффар) (*Tropaeolaceae*) фәсиләси

Бу фәсилә *Geraniaceae* фәсиләсинә яхын фәсиләләрдән биридир. Чичәкләри икичинсли, зигоморф, бешүзвлүдур. Тачы маймызлыдыр, 8 әдәд эркәкчийи вардыр. Дишичийи 3 мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталығы юхарыдыр. Мейвәләри үч ерә бөлүнүр.


Әриккүлү вә я нәстәрән (*Tropaeolum majs*) нөвү Азәрбайчанда бир бәзәк биткиси кими бечәрилир. Ләчәкләри сары, нарынчы вә я гырмызы рәнкдә олуб чох әтирлидир. Ярпагларында 450 мг% «С» витамини вардыр. ССРИ-дә бечәрилән әриккүлү нөвү бириллик от биткиләридир. Әтрафында даяг олдугда бу нөв она дырмашыр

Үзәррикчичәклиләр (*Zygophyllaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин Азәрбайчанда битән нұмайәндәләринин чичәкләри актиноморфдур. Касачығы 5 (бәзән 4) ерә бөлүнмүшдур. Ләчәкләри 4—5-дир. Эркәкчикләрин сайы чичәкянлығынын сайы гәдәрдир вә я ондан 2—3 дәфә артыгдыр; эркәкчикләрин дибиндә ич тәрәфдән пулчуглары вардыр. Дишичийи сүтунчуғу бирдир. Юмурталығы 3—5 ювалыдыр. Мейвәси гутучуг вә я чәйирдәкмейвәдир, бәзән мейвә етишән заман фыңдыгчыглара айрылыр. Отлар вә я коллардыр. Ярпаглары бәсит вә я мүрәккәбдир.



Шәкил 218. Әтиршаһлар-
да тохумлуғун вәзийәти:
1—юхарыя йәнәлмәш микро-
пилиялы тохумлуғ; 2т—гарыя
тигишлы салланан тохум-
луғ; 2—ашағыя йәнәлмәш
микропилиялы тохумлуғ; 2т—
арха тикишлы юхарыя галхан
тохумлуғ.



Шәкил 219. Әтиршаһларын мейвәләри:
1—*Peganum harmala* тохумлуғ мейвәси;
2—саат чичәкчәлини (*Erodium*) мейвәси.



Шәкил 220. Саатчичәйин, дурпаоту (*Erodium cicutarium*).

Чоку исти вә мулайим өлкәләрдә битән ксерофит вә шоранлыг биткиләрдир.

Азәрбайчанда 5 чинси вардыр. Онлардан үзәррик (*Peganum*) чинсинин әһәмиийәтли нөвләриндән бири үзәррикдир (*P. harmala*). Үзәррик (шәкил 221) чохилик от биткисидир. Гүндүрлүйү 25—50 см-дир, чылпагдыр, чох будагланандыр. Ярпаглары үч аялыдыр вә я 2—3 бөлүмүшдүр. Сегментләри хәтвари,



Шәкил 221. Үзәррик (*Peganum harmala*).

сиври, дағыныг һиссәчикләре маликдир. Ярпагалтыглары хырда вә бизшәкиллидир. Тәк-тәк вә я чох олан чичәкләри тәпәдә ерләшир. Касамыг ярпаглары хәтвари, ләчәкләри ағ вә я ачыг-сары рәңкдә, 15—20 мм узунлуғдадыр. Азәрбайчанын бүтүн гураг районларында, зибилли ерләрдә битир. Тохумларында

4% бармин və бармалин алколоиди, чичәкләриндә və көвдәләриндә нәсә пегантин алколоиди вардыр ки, онлардан да табәбәтдә истифадә эдилір. Үзәррик тохумунда 14—25%-ә гәдәр пийли яғлар олур ки, онлар да ишыгландырма və я бояғ һазырламағ үчүн ишләдилір. Тохумунун сую ачығ гырмызы рәнкдә олур. Ондан бояғ кимн истифадә этдикдә сарымтыл рәнк алыныр вә сарымтыл гәһвәйн я да чәһрайы көлкә верир.

Дәмир тикан (лөвбәроту) (*Tribulus*) чинсинин дәмир тикан пөвү (*Tribulus terrestris*) голлу-будағлы биткидир. Көвдәләри 10—60 см узунлугда, сүрүнәндир. Ярпағлары чүт ләләкшәкилли, гаршы-гаршыя дүзүлмүш, аз-чоҳ түклүдүр. Чичәкләри тәк-тәк олур, сарыдыр. Ләчәкләри 5—7 см узунлугдадыр, тез текүләндир. Мейвәләри фыңдыгчыдыр. Гуру, зибилли вә юмшаг-тәрпағлы ерләрдә битир.




Шәкил 222. Шорпоту (*Nitraria Schoberi*).

Тохумларыны үйүдүб уна гатарағ чәрәк биширмәк олар. Ярпағларында 153,2—160,5 мг% «С» витамини вардыр.

Шор аоту (*Nitraria*) чинсинин Шобершороту (*Nitraria Schoberi*) пөвү (шәкил 222) 30—100 см һүндүрлүкдә олан коллардыр. Будағлары дағыныгдыр. Габығы тиканлы вә ағдыр. Ярпағ-

лары узунсов күрәкшәкилли, дибә доғру даралмышдыр. Ләчәкләри 4—5 мм узунлугда олуб, яшылымтыл-сары рәнкдәдир. Чичәкләри гыса саплағлыдыр, голлу-будағлы гыврығлара топланмышлар. Мейвәләри нарынчы вә я түнд-гырмызы рәнкдәдир. Азәрбайчанда шоран ерләрдә битир. Мейвәләри зәриф олуб, шириндир вә үзүм дады верир, чәйирдәкләрилә бирлиңдә чий һалда ейлир, я да гурудулуб гыша сахланылыр. Биткинин тәркибиндә сода вардыр.



Шәкил 223. Һәлмәл, итхияр (*Zygophyllum fabago*)

Һәлмәл вә я итхияры чинсиндән һәлмәл (*Zygophyllum fabago*) пөвү чоһналик отдур (шәкил 223). Көвдәләринин узунлугу 40—50 см-дир. Ярпағлары гаршы-гаршыядыр, ярпағалтыглары вардыр, этли вә чылпагдыр. Чичәкләри бешүзүлүдүр. Ләчәкләри ағ, диби нарынчыдыр. Мейвәси узунсов призма шәкли-

дә гутучугдур, узунлугу 15—40 мм-дир, эгли вә ганадсыздыр, бир гәдәр күтбучаглыдыр. Азәрбайчанын гураг ерлериндә, килли вә зибилли ерлериндә битир. Пайыз ярпагларында 25—70 мг %, мейвәсиндә исә 10 мг % «С» витамини вардыр.

СҮДЛӘЙӘНЧИЧӘКЛИЛӘР (*Euphorbiales*) ВӘ ИҮЧФЯЛДЫГЧЫГЛЫЛАР (*Umbellales*) СЫҖАСЫ

Бу сыранын филокөнетик вәзийәти айдын дейилдир. Буну классификаторлар эмәкәмәтичичәклиләр, этиршаһчичәклиләр, кичитканчичәклиләр, бойничәклиләр вә саир бу кими мүхтәлиф сыралара дахыл әдирләр. Бу да һәммин сырая мәнсуб олан биткиләрин чичәйинин хусуи тәбиәтилә әлагәдардыр. Мәсәлән, сүдләйәннин чичәйиндәки садәлийин биринчилик вә я икинчилик әләмәти олмасынын намә'лум галмасы вә саир бу кими хусусийәтләр чәтииклик төрәдир.

Сыранын нүмайәндәләри һәм ағач, һәм дә от формасындадыр. Оыларын характер хусусийәти, дишичийин үч мейвә ярпагидан әмәлә кәлмәси, үч ювалы олуб, һәр ювада бир-ики тохумлуг ерләшмәси, чичәкләринин дәмәк олар ки, һәмишә бирчинсли олмасы, чичәкянылығынын олмамасы аз-аз һалларда биргәт, я да икитәт чичәкянылығы олмасыдыр. Эркәк вә диши чичәкләри мүрәккәб чичәк группларына топланмышдыр.

Сыранын ән бөйүк фәсиләси сүдләйәнкимиләрдир (*Euphorbiaceae*).

Сүдләйәнкимиләр (*Euphorbiaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә коллар, ағачлар, лианлар вә отлар дахилдир. Бурая мәнсуб олан биткиләрин чохунун сүд ширәси вардыр вә бу ширәнин тәркибиндә аз чох каучук олур. Ярпаглары бүтөвдүр, бәзиләриндә чох ихтисар олунмуш ярпаг алтыглары вардыр. Бәзиләринин көвдәләри суккулентдир. Чичәк групплары чәтир-шәкилли, сүпүркәшәкилли вә сүнбүлшәкиллидир. Чичәкләри әлрчинсли вә я икинчинслидир. Бирәвәт, бә'зән дә икиәвәт биткиләрдир. Чичәкянылығы касачыг шәклиндәдир, бә'зән икигәт чичәкянылығы вардыр, я да чичәкянылығы һеч йохдур. Каса вә тәч ярпаглары сәрбәсгдир. Эркәкчикләри 5, я чох, я да ялныз 1-дир. Дишичийин 1—3 мейвәярпагында әмәлә кәлмишдир. Юмурталыгы юхары олуб, 3—2 ювалыдыр. Һәр ювада 1—2 тохумлуг вардыр. Мейвәләри 3 тайла ачылан гутучуг, фындыгыг, чәйирдәк-мейвә вә я киләмәйвәдир. Тохумлары эндоспермидир. Чоху тропик өлкәләрдә битир.

Азәрбайчанда ябаны һалда 5 чинсигә тәсадүф әдилдир. Бунлардан 2 чинсинин айры-айры нөвләри әкилиб бечәрилиз.

Ән мүһүм чинсләриндән бири сүдләйән (*Euphorbia*) чинсидир. Сүдләйән чинсинин Азәрбайчанда 37 гәдәр нөвү вар-

дыр. Бунлар чохиллик вә бириллик отлардыр. Африка сәһраларында вә гуру чөлләрдә битән сүдләйән чинсинин нүмайәндәләри малдили формалы коллардыр. Бу колларын һамысында сүд ширәси вардыр. Ярпаглары отурандыр, кәнарлары бүтөвлүр, гаршы-гаршыя вә я нөвбәли дүзүлмүшдүр. Чичәк групплары тәпәдә вә я голтугда олур. Чичәкләринин чичәкянылығы йохдур, группла ерләшир. Һәммин чичәк групплары икичинсли чичәнә охшайыр ортада саплаг үзәриндә диши чичәк олур, онун чох вахт чичәкянылығы олмур, я да касачыгла әһәтә әдилмиш олур; әтрафында бургу үзрә дүзүлмүш бир чох эркәкчик ерләшир, бу ахырынчылары чичәкянылығы олмур.

Бу чүр чичәк группларынын һамысы битишик ярпаглы зәнк шәкилли өртүклә әһәтә олунур. Һәммин өртүк ярпагларынын арасында 4 дәнә нектарлыг ерләшир. Юмурталыгы үчювалы, сүтучугу үчбөлүмлүдүр.

Бу чинсин бүтүн нөвләри зәһәрлидир. Һейванларын онунла зәһәрләnmәси чох вахт өлүмлә нәтичәләнир. Әһәмийәтли нөвләри һәләб сүдләйәни (*E. aleppica*), бадам сүдләйәни (*E. amygdaloides*) вә саирәдир. Бу сүдләйән нөвләриндән гәрәрәнк алыныр *E. helioscopia* нөвүнүн тохумунда 28,41% яг вардыр. Күрчүстан сүдләйәни нөвләриндән (*E. iberica*, *E. Segueriana*) хаки рәнкдә, йә'ни сарымтыл-яшыл бояг алыныр. *E. Marshalliana* нөвүнүн тәркибиндә (шәкил 224) йүксәк кейфийәтли гәтрян вардыр.

E. virgata нөвүнүн тохумунда 15% яг, ярпагларында 328 мг % «С» витамини вардыр.

Фәсиләнин әһәмийәтли чинсләриндән бири олан лакмус оланун (*Chrozophora hierosolymitana*) ярпаг вә мейвәләринин ширәси, мүхтәлиф парчалары, чахыры, кағызы, көй рәнкә боямаг үчүн көй лилә адиглә ишләдилдир.

Фәсиләнин мүһүм чинсләриндән бири дә кәнәкәрчәк (*Ricinus communis*) биткисидир (шәкил 225). Тропик өлкәләрдә чохиллик колдур, лакин союға давамсыз олдуғундан биздә бириллик битки кими бечәрилиз. Илдә 1 м-дән 5 м-ә гәдәр бөй атыр. Көвдәси чылпаг, көй вә я гырмызы рәнкдәдир, будагланандыр. Әсас көвдә вә ян будаглары салхыквари чичәк группла гуртарыр. Ярпаглары ири, бармагшәкилли, дилимли, узун саплаглы, яшыл вә я гырмызымтылдыр. Чичәкләри бирчинслидир, диши чичәкләр юхарыда, эркәкләри исә һәммин чичәк группун ашағысында ерләшир. Һәр ики чичәк нөвү көркәмсиздир. Чичәкяныглары бәситдир. Эркәкчикләри чохдур. Юмурталыгы 3 ювалыдыр вә һәр ювада бир тохумлуг вардыр. Мейвәләри һамардыр вә я үзәри тиканлыдыр, ачылан вә я ачылмаян гутучугдур. Тохумлары һамар, бәзәкли (кәнәйәохшар), ясты юмурташәкиллидир. Әсасән Африкада бечәрилиз. Азәрбайчанда вә Шимали Гафгазда да бу битки бечәрилиз.

Тохумларындан тиббдә кениш истифадә әдилән кәнәкәрчәк ягы алыныр. Кәнәкәрчәк ярпагларында 450 мг % «С» витамини

вардыр. Тохумунда 50—60% мигдарында гурумаян яғ вардыр ки, ондан да тәйярәләрн вә башга машыналарын яғланмасында вә йүксәк кейфийәтли сабун истисалында истифадә эдилир.



Шәкил 224. Маршал сүдләйәнн (*Euphorbia Marschalliana*).

Сүдләйәнникимиләр фәсиләсинин әп әләмиййәтли чинсләриндән бири тунгагачы чинсидир (*Aleurites*). Ярпаглары ири олуб, бүтөв вә я 3—5 дилмилн узун саплаглыдыр, нөвбәли дүзүлмүшдүр. Чичәк группу салхым вә я сүпүркәшәкиллндир. Бирәвли вә я икнәвли биткидир. Касачыгы 2—5 дилмилн олуб, чичәк ачан заман төкүлүр. Ләчәкләри 5, эркәкчикләри 8—12-дир; бунлардан харичдәкиләр сәрбәст, дахилдәкиләр исә битишикдир. Диши чичәкләрдә дишичик 2—3 ювалы вә икнағызлыдыр. Нәр ювада бир тохумлуг

вардыр. Мейвәси ири олуб, ачылмаян чәйирдәкмәйвә шәклиндәдир.

Азәрбайчанда ики нөвү (*A. Fordii* вә *A. cordata*) бечәрилмәйә башланмышдыр. Башлыча олараг Ләнкәран районунда бечәрил



Шәкил 225. Кәпәкәрчәк (*Ricinus communis*) биткиси.
1—көвдәсинин үч йисәән; 2—диши чичәк группу; 3—эркәк чичәк группу; 4—мейвәси.

чәрилир. Тохумунда 58%-ә гәдәр чох йүксәк кейфийәтли яғ вардыр ки, ондан тәйярәләри, кәмиләри вә саирәни рәнкләмәк үчүн истифадә эдилир.

Шүмшәт (*Buxaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә шүмшәт (*Buxus*) чинсинин нөвләри дахилдир. Бунлардан Загафгазияда ики нөвү ябаны һалда битир ки, онлар да һәмишәяшыл биткиләрдир. Қолхидә шүмшәти (*B. colchica*) Гәрби Қирқұстанда вә Ләнкәран шүмшәти (*B. hyrcana*) Ләнкәран мөшәләриндә битир. Үчүнчү нөвү (*B. sempervirens*) исә бәзәк биткиси кими бечәрилир. Гәрби Загафгазияда вә Ләнкәранда мөшәлалты биткиси кими яйылмышдыр. Чох бал верәндир. Тохумларында 36,75% яғ вардыр. Тахтасынын көпәйини гәләвидә гайнатдыгда алынан су шабалыды рәнк верир ки, бу да боямаг үчүн истифадә эдилир.

Михәкчиçәкклләр сырасынын бә'зи хусусийәтләри күлчичәк-
кләрә охшайыр. Бу сыранын күлчичәкклләрән фәрги, бурая
мәнсуб олан биткиләрин чохунда чичәйин дәртипли олмасыдыр.
Дишичикләринин сүтүнчүгү һәмшә бирдир, күлчичәкклләрә нис-
бәтән бу сырада һилантия даһа чох яйылмышдыр. Күлчичәкклләр-
дә кенисей апокарпидыр вә я зәиф синкарпидыр, михәкчиçәкклләрдә
исә һәмшә синкарпидыр. Чичәкләри битишикләчәкли, мүнтәзәм-
дир. Эркәкчикләри чохдур.

Михәкчиçәкклләрин ярпаглары чох вахт бүтөв олур вә ярпа-
глығы олмур. Чоху ағач вә я колдур. Бу сыранын фәсиләләри-
ни чохунда әтирли ягы олан мүхтәлиф турулушлу вәзиләр
вардыр.

Ийдә (*Elaeagnaceae*) фәсиләси

Ийдә фәсиләси коллар вә я ағачлардыр. Ағ тикан я чай
тиканы (*Hipporhaë rhamnoides*) чинсинин ярпаглары энсиз
олуб, ийдә ярпагларына охшайыр. Ағ тикан чинс чай
ахарларында, гумлу ерләрдә батән колдур. Мейвәси узунсов
олуб, сары вә я нарынчы рәнкләдир. Тады туршдур, чәйирдәк-
мейвәдир. Гуру мейвәсиндә 3,56% шәкәр, 2,64% туршу, яш
мейвәнин әт һиссәсиндә 8%-ә гәдәр пийли яғ вардыр. Ондан ки-
сел, лаваш, мүрәббә һазырланыр. Ярпагларында 262 мг% «С»
витамины вә 10%-ә гәдәр ашы маддәси, мейвәсиндә исә
900 мг %-ә гәдәр «С» витамини вардыр.

Азәрбайчанда ағ тикан биткисинин әһтияти чохдур. Буна көрә
дә ондан «С» витамини алмағ үчүн истифадә эдилмәлидир.
Бу фәсиләйә мәнсуб олан ийдә (*Elaeagnus*) чинсинин үч нөвү
вардыр. Шәрг ийдәси, хәзәр ийдәси вә узуняр-
паг ийдә.

Шәрг ийдәси (*E. orientalis*) Нахчыванда вә Эрмәнистан-
да әкилиб етишдирилир.

Хәзәр ийдәси (*E. caspica*) Абшеронда, Дәвәчи, Хач-
маз, Нуха, Ләнкәран, Гарабағ районларында ябаны һалда яйыл-
мышдыр.

Узунярпаг ийдә (*E. angustifolia*) Азәрбайчанын бү-
түн районларында чайкәнары мешәләриндә, дағ мешәләринин кә-
нарларында ябаны һалда битир. Бу нөвдән мешә золаглары са-
лынмасында истифадә әтмәк мәсләһәт көрүлүр. Чичәйиндән ары-
лар кейфийәтли бал һазырлайыр. Мейвәсинин тәркибиндә
10,56% зүлал, чохлу мигларда глюкоза вә фруктоза, һабелә кали-
ум вә фосфор дузлары вардыр. Узунярпаг ийдәнин мейвәсиндән
шорба, сыйыг, чәрәк компот, сучуг биширилир вә ички һазырла-
ныр. Ярпагларында 328 мг% «С» витамини вардыр. Көвдәсин-
дән тохучулуг сәнаендә ишләдилән гиймәтли китрә алыныр.

Бу фәсиләнин чичәкләри икчинсли актиноморф, чичәкяны-
ғы 4—5 үзлү икигатдыр. Эркәкчикләри чохдур, дишичийи 2—5
вә я чох мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, синкарпидыр, сү-
түнчүгү бирдир. Юмурталығы ашағы олуб, юваларында 1-дән
8-ә гәдәр тохумлуғу вардыр. Мейвәләри киләмейвә, гутучуг, аз
һалларда тохумча вә я фындыгыдыр. Энтомофилдир. Башлы-
ча оларағ тропик биткиләрдир, бә'зән бөйүк мешәләр әмәлә кә-
тириләр. Ярпаглары бәсит олуб гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр,
үзәрләриндә әтирли яғ вәзиләри вардыр. Әксәр нөвләри чох мүх-
тәлиф ийлидир. Тозчутларың йүксәк стерил юлмасы фәсиләнин
характер хусусийәтидир. Бу хусусийәт дә онун гибри́д мән-
шәли олдуғуну көстәрир.

Михәккичиләр фәсиләсинин башлыча чинсләриндән бири э в-
ка л и п т д и р. Эвкалиптләр (*Eucalyptus*) чох сүр'әтлә бөйүйән,
дүзкөвдәли вә одунчағы гиймәтли олан ағачлардыр. Буна көрә
эвкалиптләр мешә тәсәррүфатында чох гиймәтли ағач нөвү сайы-
лыр. Һазырда Совет Иттифагынын Гара дәннзә яхын ерләриндә
(Күрчүстанда) бир нечә эвкалипт нөвү әкилиб етишдирилир.
5-иллик эвкалипт ағачлары 15—25-иллик башга чинс ағачлар-
дан һүндүр вә йоғундур.

Эвкалиптин бә'зи нөвләринин һүндүрлүйү 150 м-ә вә йоғун-
луғу 10 м-ә чатдығы һалда, бә'зи нөвләри кол шәклиндәдир.
Мейвәләри гутучуг вә я фындыгыдыр. Қасачығы юмурталыгла
битишикдир. Чичәк ачан заман ләчәкләри қасаяохшар хусуси га-
пагла өртүлү олур.

Гыздырма хәстәлийи илә мүбаризә апармағ үчүн батаглыг-
ларың гурудулмасында бә'зи эвкалипт нөвләринин бөйүк әһә-
мийәти вардыр.

Эвкалипт тахтасы палыд вә гоз тахтасындан даһа бәрк вә
ағыр олур; ону гурд кәсмир, суалты иншаатында 80 илә гәдәр
галыр. Тахтасынын рәнки ағ, сары, гырмызы вә мүхтәлиф на-
хышлы олур. Ондан мебел, вагон, кәми, мүхтәлиф қағыз нөвлә-
ри, габығындан исә кардон һазырланыр. Ярпаг вә габығында
«кино» адлы ашы маддәси вардыр. Ашы маддәсиндән мүрәккәб
истеһсал эдилир.

Эвкалиптләрин ярпагларында, ағачын нөвүндән асылы ола-
рағ мүхтәлиф әтирли яғлар олур. Бу яғларың бә'зиси лимон, ски-
пидар ийи верир. Эвкалипт яғларындан сабун вә лак истеһса-
лында, машын һиссәләринин яғланмасында вә хусусән табәбәтдә
кениш истифадә эдилир. Эвкалипт яғы көзәл дезинфексия васитә-
сидир. Эвкалипт олан эвдә милчәк, ағчаганад, һүнү вә саир һәшә-
рат олмур.

Эвкалиптләрин әксәрийәти рүтубәтли тропик ерләрдә битир.
Апарылан тәдгигата көрә бир һектар эвкалипт мешәси бир илдә
торпагдан бир миллион ведрә су бухарландырыр. Азәрбайчаның
чәнуб районларында—Астара, Ләнкәран вә саир районларда бир

сыра эвкалипт нөвлəri бечерилir. Башга районларда да онларын бечерилмәси имканыны мүейән этмәк үчүн тәчрүбә апарылыр.

Эвкалиптләрин тохумлары үч илә гәдәр чүчәрмә габлийәтин итирмир.



Шәкил 226. Михәк (*Eugenia caryophyllata*).
Ортада биткисини будағы; 1—чичәйинин узунуна кәсийи; 2—гөңчә һалында ләчәкләри; 3—дишичәйи; 4—әркәкчийи; 5—гөңчәси; 6—мейвәси.

Эвкалиптләрин ән чох яйылдығы өлкә Австралиядыр. Михәкчичәклиләр фәсиләсинин әһәмиийәтли нүмайәндәләриндән бири дә михәк дир (*Eugenia caryophyllata*). О, тропик өлкәләрдән бир чохунда бечерилir. Гөңчә һалында чичәкләри әдвийят олуб, михәк ады илә мәшһурдур. Ондан техникада истифадә үчүн чох гиймәтли олан әтирли михәк яғы алырлар (шәкил 226).

Гәрби Загафгазияда бечерилән фейхоа (*Feijoa Sellowiana*) биткиси дә михәкчичәклиләр фәсиләсинә дахилдир. Онун мейвәсинин 1 кг-да организм тәрәфиндән яхшы мәнимсәнилә билән 6,5—10,2 мг йод вардыр. Буна кәрә тиббдә дәрман кими ишләдилir. Мейвәси яшыл рәнкдә олуб, хырда лимон бөйүклүкдәдир, ичәрисиндә туршаширин әтли һиссәси вардыр. Бу битки Ләнкәранда яхшы битир вә 15°C шахтая давамлыдыр. Онда ксероформлуг габлийәти олдуғундан яхшы олар ки, гураг сүбтропик районларда да бечерилмәси имканыны мүейән этмәк үчүн тәчрүбә апарылсын.

Нар (*Punicaceae*) фәсиләси

Нарын чичәкләри мүнтәзәм олуб, чичәянлыгы 7—8 үзлүдүр. Нарда әркәкчикләр чоҳдур, юмурталыгы ашағыдыр, демәк олар ки, сәрбәст вә я чичәкятағы илә битишикдир, мейвәярпагла-ры 4—8 олуб, бир-биринин үзәриндә ики сырая дүзүлмүшдүр одур ки, ики мәртәбә ювалыдыр. Нарын мейвәси чохтохумлу, яланчы мейвәдир. Ярпагларында әтирли яғ вәзиләри йоҳдур, неш-тәршәкиллидир кәнарлары бүтөвлүр.

Бу фәсиләнин екагә нөвү нардыр (*Punica granatum*). О, ири кол шәклиндәдир. Чаван будаглары тиканлыдыр. Чичәкләри тәк-тәк, я да топа иләдир. Ики формада чичәк ачыр. Онларын күпә шәклиндә оланларындан мейвә әмәлә кәлир, зәнк шәклиндә оланлары исә тез төкүлүр вә мейвә вермир. Чыр нар Азәр-байчанын Күрдәмир, Көйчай, Агдаш, Мийкәчевир, Гутташен, Варташен, Нуха, Хачмаз, Губа районларында яйылмышдыр. Чыр нар ән чох Ләнкәранда, Астара районунун чәнубунда Самухда, Алазан вә Күр чайларынын әтрафында битир. Ән яхшы мәдәни чешидләри Көйчай, Күрдәмир, Агсу, Агдаш, вә с. районларда бечерилir.

Нар ширәсиндә 7,8—15,6% шәкәр, 0,4—3,4%-ә гәдәр сәрбәст туршу вардыр. Нар ширәсинин чох һиссәсини лимон аз һиссәсини исә алма туршусу тәшкил эдир. Нар мейскидән һазырланан «наршәраб» хәрәклә ейлир, ширәсиндән лимонад үчүн дә истифадә эдилir. Нар ширәсиндән һазырланан балда 84% шәкәр олур. Нарын габығындакы алколоиддән тиббдә гарын гурдуну төкмәк вә исһал хәстәлиийини мүаличә этмәк үчүн истифадә эдилir. Етишмәмиш нарда 13,6 мг% «С» витамини вардыр. Гурудуямуш мейвәсинин габығында 26%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр. Габығындан гәһзәйи бояғ алыныр.

Ағларәт (*Lythraceae*) фәсиләси

Чичәкләри актиноморф вә я зигоморфдур. Чичәянлыгы 4—6 үзлүдүр. Каса ярпагларынын чох вахт чыхынтысы олур. Тачы бәзән тамамылә ихтисар олунмушдур. Әркәкчикләри дишичик-дән ики дәфә артығ олур, ики сырая дүзүлмүшдүр. Дишичийи

2—6 мейвъярпагчындан ибарәтдир. Юмурталыгы чох вахт орта олуб, касанпәкилли чичәк ятагы илә битишмәмишдир. Мейвәси гутучуғур. Рүтубәтли, батаглыг ерләрде, су кәнарларында битән отлардыр.

Бу фәсиләнин ағларот (*Lythrum*) чинсинин Азәрбайчанда с нөвү вардыр. Онлардан ағларот (*L. salicaria*) нөвү арх вә колларын кәнарында битир, яхшы нектар верән биткидир, тәркибиндә ашы мэддәси вардыр. Чичәкләри үч чүрдүр (триморф), чох яхшы һистеростилдыр, өз-өзүнү тозламамағ үчүн сүтунчуғу мүхтәлиф узунлугда олур.

Бу фәсиләйә бир дә ади һәна (*Lawsonia inermis*) биткисә дахийдир. Азәрбайчанда бу битки Ләнкәран районунда тәчрүбә үчүн бечәрилмәйә башланмышдыр. Түкә вә дәрйә нарынчы рәнк верән биткидир.

ПУСТӘКИМИЛӘР (*Terebinthales*) СЫРАСЫ

Бу сыра бир чох хусусийәтләрилә бир тәрәфдән *Rosales*, *Malvales* вә *Gerantiales* сыраларына, диқәр тәрәфдән исә *Euphorbiales* сырасына охшашыр. Пустәкимиләр сырасы векегатив органларынын мүәййән ерләриндә әтирли яғ, балзәм вә тәгран мэддәләри олмасы илә фәргләнирләр.

Бунларын чичәкләри адәтән икигәт чылыгы, мүнтәзәм вә 5-даирәлидир. Әркәкчикләри ләчәкләриндән ики дәфә артыгдыр. Әркәкчик саплаглары бәзән бору шәклиндә бирләшмиш олур. Бу сырая бир чох фәсиләләр аиддир. Онлардан бәзиләринин бөйүк тәсәррүфәт әһәмийәти вардыр. Сыранын ән мүһүм фәсиләләри бунлардыр:


Садочичәклиләр (*Rutaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин нүмайәндәләри ағачлар, коллар вә бәзи отлардыр. Азәрбайчанда алышан (*Dictamnus*) вә (*Haplophyllum*) чинсләри ябаны битән отлардыр. Бундан башга сәдо (*Ruta*) вә лимонкимләр (*Citrus*) чинсләринин нөвләри мэдәни үсүлә әкилиб етишдирилир.

Һәмин фәсиләйә мәнсуб олан биткиләрин ярпаглары нөвбәли, бәсит вә я мүрәккәб, адәтән чылпаг, яғла долу, ишыгланан вә үзәри нөгтәлидир. Чичәкләри мүнтәзәм вә я бир аз гейри-мүнтәзәмдир, бешүзүлүдүр, әркәкчикләри ләчәкләриндән ики дәфә артыгдыр. Мейвә ярпаглары 4—5 олуб битишиқдир. Юмурталыгы 4—5 вә я чоювалыдыр, һәр ювасында 1—2 тохумлуғу вардыр. Мейвәләри гутучуғ, чәйирдәк вә я киләмәйвәдир.

Векегатив органларынын юмшағ һиссәсиндә яғ вәзиләри олмасы фәсиләнин бүтүн нүмайәндәләри үчүн әсас хусусийәтдир. Бир сыра нөвләринин ярпаглары тикана чөврилмишдир. Чичәйини дибиндәки һәлгәдән чохла нектар ифраз олунур.

Ән әһәмийәтли чинс лимонкимләрдир (*Citrus*). Бу чинсин һазырда 65-ә гәдәр нөвү вардыр. Онлардан 26-сы ябаны һалда битир, 32-си исә әкилиб етишдирилир, галан 7 нөвүнә һәм ябаны һалда, һәм дә културада тәсадүф әдилир. Лимонкимләр ябаны һалда һималайда, һинди-Чиндә, Чиндә, Япсуняда, Зонд адаларында вә Австралияда битирләр.



Шәкил 227. Ситрус биткиләринин чичәк вә тохуму

1—чинсдин диаграммы; 2—гөңгәси; 3—ачылымш чичәйи; 4—чичәйини узунуна кәсийи; 5—к. рталыгын узунуна кәсийи; 6—юмурталыгын энинә кәсийи; 7—тохумун узунуна кәсийи; 8—тохумун энинә кәсийи.

ССРИ-дә рүтубәтли субтропик ерләрде, Гара дәниз саһилиндә Сочидән башламыш та Түркийә сәрһәддинә гәдәр, Азәрбайчанын Ләнкәран, Астара, Масаллы, Нуха районларында чох вахт ачығ торпагда, башга районларда исә бир дибчәк биткисә кими әвләр-дә (башлыча оларағ лимон) бечәрилир.

Citrus чинсинин лимон, нарынки, портахал вә саир нөвләри ағач вә я коллардыр. Мейвәләринин габыгы гызылы вә я нарынчы-сары рәнкдәдир. Үзәри әтирли яғ вәзиләри илә долу олуб, чопурдур. Мейвәсинин ичи чоювалыдыр, Килә-мейвә шәклиндәдир. Чичәкләри ағ вә чох әтирлидир. Әкилиб бечәрилән мүһүм нөвләри бунлардыр:

Лимон (*C. limonia*). Бүтүн ил бою чичәк ачан ағачдыр! Үзәриндә әйни заманда етишмиш вә етишмәмиш мейвәләр олур. Мейвәси чох хош ийлидир, ичиндә чохла тохум олур. Эт һиссәси чох туршдур, тәркибиндә «В₁» вә «В₂» витаминләри, әлчә дә мейвә вә ярпагларында чохла «С» витамини вардыр. Бундан башга мейвәсинин эт һиссәсиндә 4,14—5,87% лимон туршусу вә 0,06—3,78% шәкәр вардыр. Лимон бир чох гиймәтли ичкиләрә арышдырылыр.

Портахал (*C. sinensis*). һүндүрлүйү 2—10 м-ә гәдәр олан ағачлардыр. Көвдәси тиканлыдыр. Ярпаглары әллипс шәкин-дәдир. Чичәкләри ағ вә әтирлидир. Мейвәләри кирдә олуб, мүхтәлиф бөйүклүкдәдир, бәзән чох ири олур, түнд нарынчы рәнкдәдир, чох ширәлидир. Мейвәсинин габыгында 125 гамма гәдәр каротин вардыр. Ширәсиндә 0,89 гамма «В» витамини, мей-

вәсиндә 66 мг%, ширәсиндә 85 мг%, ярпагларында исә 277—715 мг% «С» витамини олур. Мейвәсинин эт һиссәсиндә 0,65—0,71% лимон туршусу вә 6,01—7,99% шәкәр вардыр. Портахал сийлир вә ондан компот, консерв, мүрәббә һазырланыр. Мейвәсинин габыгы гәннады сәнаеиндә, мүхтәлиф ичкиләрә дад вермәк үчүн ишләдилір.

Нарынки я вә мандарин (*C. reticulata*) Хырда ағачлардыр, чохлу мейвә верир. Мейвәләри бир гәдәр басыг күрәви шәкилдәдир, габыгы асан союлур, эт һиссәси асанлыгга дилмләрә айрылыр, чох ләзәтли вә әтирлидир. Тохумсуз чешидләри вардыр. Һәмин чинсин унша (*C. unshiu*) адланан нөвү жениш бечәрилик.

Бу фәсиләйә аид олан чыр лимон нөвү (*C. trifoliata*, *Poncirus trifoliata*) колдур, чохлу будаг чыхарыр вә сәрт тиканлары олур. Чичәкләри ағ, мейвәләри күрәви, түклү, ачы вә хырдадыр. Ярпаглары үчлү мүрәккәбдир. Шахтая чох давамлыдыр.

Лимонкимиләрин шахтаядавамлылығыны чыр лимона чалаг әтмәк васитәсилә артырмаг мүмкүндүр.

Октябр ингилабынадәк өлкәмиздә лимонкимиләр демәк олар ки, бечәрилмирди. Совет һакимийәти гурулдугдан сонра бу сәһәдә чох бөйүк наилийәт әлдә әдилмиш, жениш плантасиялары вә ени чешидләри ярадылмышдыр.

Чох гәдимдән бәри һәкимләр бир сыра хәстәликләри лимон, портахал ширәси илә мүәличә әдирләр. Портахал вә лимон ширәсинин синга хәстәлийинин мүәличәсинә бөйүк көмәк әтдиш шүбһәсиздир. Лимон, портахал вә нарынки ширәсиндә чохлу мигдарда А, В, С витамини вардыр. Лимон ширәси яранын сагалмасына, сүмүйүн битишмәсинә, маддәләр мүбадиләсинин яхшылашмасына вә дахилдән ган дамарларынын кирәчләшмәси (артерия склерозун) гаршысына алмага чох көмәк әдир. Лимон вә портахалын чичәкләриндән, ярпагларындан вә мейвәсинин габыгындан әтирли яғлар алыныр.

Нарынки ағачы әлверилиш шәраитдә 80 ил өмүр сүрүр. 50 яшындан сонра гочалмага вә 70 яшындан сонра яваш-яваш гурумага башлайыр. Лакин ади шәраитдә әксәрийәти 25—30 яша чатдыгда тәләф олур.

Көркәмли ботаникләрдән Нил Васил'евич Рындин узун тәҗрүбәдән сонра белә бир нәтичәйә кәлмишдир ки, ағачын гочалмасынын гаршысына алмаг мүмкүндүр. О, гочалмыш вә эәифләмиш лимон ағачынын янларына чыр вә чаван лимон ағачлары әкмиш, бир мүддәтдән сонра чыр ағачларын көвдәсинин башыны чәпәки кәсәрәк гочалмыш ағачын көвдәсинин габыгы алтына кечирмиш вә онлар көвдәйә говушдугдан сонра гочалмыш ағачы дибиндән кәсиб көкүндән айырмышдыр. Беләликлә, илк чаван көк үзәриндә даянан гоча ағач чаван ағач кими күлли мигдарда мейвә вермәйә башламышдыр.

Мәлум олдуғу кими нарынки лимона нисбәтән союға даһа чох давамлыдыр. Лимону союғадавамлы әтмәк үчүн И. В. Рындин

лимонун будағыны нарынкинин будағына чаламыш, нәтичәдә һәм нисбәтән союға давамлы олан лимон, һәм дә ики мәһсулу, йә'ни юхарысы лимон, ашағысы исә нарынки верән чох марағлы лимон-нарынки ағачы әлдә әтмишдир.

Алышан (*Dictamnus*) чинсинин Гафгазда яйылмыш гафгаз-алышаны (*D. caucasicus*) нөвү чохиллик от биткисидир. Орта даг гуршағында, мешә кәнарларында вә коллу ямачларда битир. Чох әтирли вә үзәри түклү биткидир. Гырмызы- яшылымтраг рәнкдәдир. Мейвәсиндән ликйор вә араг истәһсалында әтирли маддә кими истифадә әдилир. Яхшы нектар верәндир. Чохлу әтирли яғ алмаг олар.

Сумагчичәклиләр (*Anacardiaceae*) фәсиләси


Чичәкләри мунтәзәм олуб, икичинсли вә я бирчинслидир. Касачыгы 3—5 һиссәдир. Ләчәкләри 3-дән 5-ә гәдәрдир вә я һеч йохдур. Әркәкчикләри дишичиалты һалгасына битишмишдир. Юмурталыгы юхарыдыр. Мейвәләри чәйирдәкмейвә кимидир. Ярпаглары бәсит, нөвбәли вә бә'зән түклүдүр. Ярпагалтлыглары вардыр. Коллар вә я ағачлардыр. Фәсиләнин Азәрбайҗанда үч чинси вардыр. Пүстә вә я саггыз ағачы (*Pistacia*), сараған (*Cotinus*) вә сумаг (*Rhus*). Биринчи чинсин Азәрбайҗанда ики нөвү раст кәлир: саггызағачы (*P. mutica*) вә бечәрилән пүстә (*P. vera*).

Биринчи нөв Азәрбайҗанда ән чох Минкәчевир, Кировабад, Газах, Ағстафа, Шамхор, Тавус районларында, Күр кәнары мешәләриндә, гуру ерләрдә битир. Ярпагларында 6,9 мг% «С» витамини вардыр. Тәркибиндәки гәтрәндән 25%-ә гәдәр әтирли яғ алыныр. Гәтрәни чох йүксәк кейфийәтлидир. Ярпагларында 8—15% ашы маддәси вардыр. Тахтасы чох дәйәрлидир. Саггызағачы горууючу мешә золағлары салмаг вә гураг дағ ямачлара әкмәк үчүн чох ярарлыдыр (шәкил 228).

Бечәрилән пүстәнин (*P. vera*) вәтәни Орта Асиядыр. Азәрбайҗанда она башлыча олараг Абшеронда тәсадүф әдилир. Мейвәсинин тәркибиндә 48,68—65,69% яғ, 18,5—26,19% азотлу маддәләр, 3,93—9,51%-ә гәдәр шәкәр вардыр. Ондан алынан яғ чох гиймәтли вә емәлидир. Бу биткини әкиб естишдирмәк үчүн Азәрбайҗанын гуру субтропик районларында бөйүк имкан вардыр.

Сараған (*Cotinus*) чинсинин Азәрбайҗанда бирчә нөвү вардыр ки, о да сарағандыр. Сараған (*C. coggygia*) 2—4 м һүндүрлүкдә колдур (шәкил 229). Ярпаглары бәсит, тәрс юмуртаваридир. Ләчәкләри яшылымтыл рәнкдәдир. Мейвә верән чичәк саплатлары чичәк ачдыгдан сонра узаныр вә үзәрләри пыртлашмыш узун түкләрлә өртүлүр. Мейвәси тәрсинә әйри юмуртаваридир, гарамтыл рәнкдәдир.

Ән чох Бөйүк Гафгаз сыра дағларынын чәнуб ямачларынын әтәкләриндән орта мешә гуршағына гәдәр әразидә, гуру чайлағларда яйылмышдыр.



Шөкил 228. Пүстә ағачлары (*Pistacia*).
Ю х а р ы д а—ябаны пүстә вә ясагтызарагы (*P. nutica*).
А ш а ғ ы д а—бечәрилән пүстә (*P. vera*) 1—эркәк будагы;
2—диши будагы чичәк ачдым заман

Ярпагларында 91,7 мг% «С» витамини, чичәк вә ярпагларында 0,1% яғ вардыр. Бу яғ әтрийятда ишләдилір. Сараған, ашы маддәси чох олан биткидир. Ашы маддәси башлыча оларак ярпагларындадыр. Одунчағындан юну, ипәйн, дәрини сары вә нарынчы рәнкә боямаг үчүн истифадә эдилір. Көк габыгындан нарынчы рәнк алыныр.



Шөкил 229. Сараған (*Cotinus coggygia*).
колунун мејвәли будагы.

Сумаг чинсинин Азәрбайчанда ябаны һалда анчаг сумаг (*Rhus coriaria*) нөвү вардыр, бағ вә паркларда *Rh. hirta* нөвүндә раст кәлинир. Сумаг 2—3 м һүндүрлүкдә колдур. Чаван зоғлары, ярпаг саплағы, аясынын алт сәтһи вә чичәк групу түклүдүр. Ярпаглары ләләкваридир. Чичәкләри мүхтәлиф чинслидир вә

сүпүркөйө охшар сых чичек групуна топланмышдыр. Онлар чох вахт будагларын тәпәсиндә олур. Мейвәләри күрәви, бөйрәкшәкил-ли, түнд гырмызы вә вәзили түклүдүр. Азәрбайҗанда Бөйүк Гафгаз сыра дағларынын этәклериндә, чай ахарларында, гуру ямачларда, ән чох Гутгашен районундан башламыш вә Балакән районуна гәдәр, һабелә Ләнкәран вә Нахчыванда яйылмышдыр.

Мейвәсинин үзәриндәки гырмызы габыг туршдур, зәринч да-ды верир, тәркибиндә чакыр туршусу вардыр. Тохумуну әздиқдән сонра алынап парын ун мүхтәлиф хәрәкләрә дад вермәк үчүн иш-ләдилир. Ярпагларында 112 мг % «С» витамини вардыр. Сараған кими бу да гиймәтли ашы биткисидир. Көвдәсинин габыгындан сары боя алыныр. Мейвәсиндән—гырмызы, ярпагларындан—гара, көкүнүн габыгындан гәһвәйи боя һазырланыр. Сумаг ағачлары гуру дағ ямачларында мешә салмаг үчүн чох дөйәрлидир.

Ағчагайын (*Aceraceae*) фәсиләси

Ағчагайын фәсиләсинә мәнsub олан биткиләрин чичәкләри мүнтәзәм 5 вә я 4 үзлүдүр. Чичәкяңлыгы икигәтдыр. Чичәкләр аз-аз һалларда тачсыздыр. Эркәкчикләри 4—10, чох вахт 8-дир. Юмурталыгы икиювалы вә юхарыдыр. сүтунчуғлары 2 вә сәр-бәстдир. Мейвәсиндә ики энли ганады вардыр. Ағач вә я кол-лардыр. Ярпаглары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, аясы чохунда бармагшәкилли дилимлидир.

Азәрбайҗанда бу фәсиләнин анчаг ағчагайын (*Acer*) чинсинә тәсадүф әдилир ки, бунун да 8 нөвү вардыр. Онлар Азәр-байҗан мешәләриндә яйылмышдыр. Онлардан дүзәнлик ағчагайыныны (*A. campestre*), көзәл ағчагайыны (*A. laetum*), уча дағ ағчагайыныны (*A. Trautvetteri*) көстәрмәк олар.

Ағчагайын нөвләриндән алынап ширәнин тәркибиндә 1,5—3% шәкәр вардыр. Ағчагайын нөвләринин һамысы бал вә тоз верән биткиләр олдуғундан арычылыг тәсәрруфаты үчүн онларын чох бөйүк әһәмийәти вардыр. Сивриярпаг ағчагайын (*A. platanoides*) нөвүнүн (шәкил 230) ярпагындан гара рәңк алыныр. Онун ширәсиндә 1,1% каучук вардыр. Ағчагайынлар-дан дағ мешәләри салмаг, гураг ямачлары яшыллашдырмаг вә горуючу мешә золағлары яратмаг үчүн истифадә әтмәк мәсләһәт көрүлүр.

МУРДАРЧАЧИЧӘКЛИЛӘР (*RHAMNALES*) СЫРАСЫ

Мурдарчачичәклиләрин тачы сәрбәстләчәклидир. Чичәкләринин һиссәләри дөрд даирә үзрә дүзүлмүшдүр. Дахили даирәнин эр-кәкчикләри ләчәкләрин гаршысындадыр, хариҗи даирәнин эркәк-чикләри ихтисара дүшмүшдүр. Чичәкләриндә һөлгә вардыр ки, ондан да нектар ифраз олунур, һәмин хусусийәтләри илә вә то-хумлуғларынын гурулушуна көрә бу сыра *Terebintales* сырасы-

на охшайыр. Буна көрә дә *Terebintales* сырасындан *Rhamnales* сырасынын төрәйиб инкишаф әтдийини күман әтмәк олар.

Rhamnales сырасынын ән мүһүм фәсиләләри мурдарча вә үзүм фәсиләләридир.



Шәкил 230. Сивриярпаг ағчагайын (*Acer platanoides*)

Мурдарча (*Rhamnaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икичинсли вә я икиэвли биткиләрдир. Касачығы 4—5 бөлүмлүдүр. Ләчәкләри 4—5-дир. Эркәкчикләри дә бир о гәдәр олуб, ләчәкләрин гаршысында даянымышдыр. Юмурталыг-лары юхарыдыр вә 2—4 ювалыдыр. һәр ювада бир тохумлуғ вардыр. Сүтунчуғу бәсит вә я 2—4 бөлүмлүдүр. Мейвәси чәйир-дәквари вә я гурудур. Ағачлар вә я коллардыр. Ярпаглары бә-ситдир, ярпагалтығлары вардыр. Чичәкләри хырда олуб голтуғ-ларда диһазия шәкилли сүпүркәләрә топланмышдыр.

сүпүркөйө охшар сых чичэк групуна топланмышдыр. Онлар чох вахт будагларын тәпәсиндә олур. Мейвәләри күрэви, бөйрөкшәкилли, түнд гырмызы вә вәзили түклүдүр. Азәрбайчанда Бөйүк Гафгаз сыра дагларынын этәкләриндә, чай ахарларында, гуру ямачларда, ән чох Гутгашен районундан башламыш вә Балакән районуна гәдәр, һабелә Ләнкәран вә Нахчыванда яйылмышдыр.

Мейвәсинин үзәриндәки гырмызы габыг туршдур, зәринч дады верир, тәркибиндә чахыр туршусу вардыр. Тохумуну әздикдән сонра алынан карын ун мүхтәләф хәрәкләрә дад вермәк үчүн ишләдилир. Ярпагларында 112 мг % «С» витамини вардыр. Сараған кими бу да гиймәтли ашы биткисидир. Көвдәсинин габыгындан сары боя алыныр. Мейвәсиндән—гырмызы, ярпагларындан—гара, көкүнүн габыгындан гәһвәйи боя һазырланыр. Сумаг ағачлары гуру даг ямачларында мешә салмаг үчүн чох дөйәрлидир.

Ағчагайын (*Aceraceae*) фәсиләси

Ағчагайын фәсиләсинә мәнсуб олан биткиләрин чичәкләри мүнтәзәм 5 вә я 4 үзүлүдүр. Чичәкянлыгы икигатдыр. Чичәкләри аз-аз һалларда тачсыздыр. Эркәкчикләри 4—10, чох вахт 8-дир. Юмурталыгы икиювалы вә юхарыдыр, сүтунчулары 2 вә сәрбәстдир. Мейвәсиндә ики әнли ганады вардыр. Ағач вә я коллардыр. Ярпаглары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, аясы чохунда бармагшәкилли дилимлидир.

Азәрбайчанда бу фәсиләнин анчаг ағчагайын (*Acer*) чинсинә тәсадүф әдилир ки, бунун да 8 нөвү вардыр. Онлар Азәрбайчан мешәләриндә яйылмышдыр. Онлардан дүзәнлик ағчагайыныны (*A. campestre*), көзәл ағчагайыны (*A. laetum*), уча дағ ағчагайыныны (*A. Trautvetteri*) көстәрмәк олар.

Ағчагайын нөвләриндән алынган ширәнин тәркибиндә 1,5—3% шәкәр вардыр. Ағчагайын нөвләринин һамысы бал вә тоз верән биткиләр олдуғундан арычылыг тәсәрруфаты үчүн онларын чох бөйүк әһәмийәти вардыр. Сивриярпаг ағчагайын (*A. platanoides*) нөвүнүн (шәкил 230) ярпагындан гара рәнәк алыныр. Онун ширәсиндә 1,1% каучук вардыр. Ағчагайынлардан дағ мешәләри салмаг, гураг ямачлары яшылашдырмаг вә горуючу мешә золаглары яратмаг үчүн истифадә этмәк мәсләһәт көрүлүр.

МУРДАРЧАЧИЧӘКЛИЛӘР (*RHAMNALES*) СЫРАСЫ

Мурдарчачичәкклиләрин тачы сәрбәстләчәклидир. Чичәкләринин һиссәләри дөрд даирә үзрә дүзүлмүшдүр. Дахили даирәнин эркәкчикләри ләчәкләрин гаршысындадыр, хари́чи даирәнин эркәкчикләри ихтисара дүшмүшдүр. Чичәкләриндә һәлгә вардыр ки, ондан да нектар ифраз олунур, һәмин хүсусийәтләри илә вә тохумлуларынын гурулушуна көрә бу сыра *Terebintales* сырасы-

на охшайыр. Буна көрә дә *Terebintales* сырасындан *Rhamnales* сырасынын төрәйиб инкишаф әтдийини күман этмәк олар.

Rhamnales сырасынын ән мүһүм фәсиләләри мурдарча вә үзүм фәсиләләридир.



Шәкил 230. Сивриярпаг ағчагайын (*Acer platanoides*)

Мурдарча (*Rhamnaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икичинсли вә я икиэвли биткиләрдир. Касачыгы 4—5 бөлүмлүдүр. Ләчәкләри 4—5-дир. Эркәкчикләри дә бир о гәдәр олуб, ләчәкләрин гаршысында даянымшдыр. Юмурталыглары юхарыдыр вә 2—4 ювалыдыр. Һәр ювада бир тохумлу вардыр. Сүтунчуғу бәсит вә я 2—4 бөлүмлүдүр. Мейвәси чәйирдәквари вә я гурудур. Ағачлар вә я коллардыр. Ярпаглары бәситдир, ярпагалтылыгылары вардыр. Чичәкләри хырда олуб голтугларда диҳазия шәкилли сүпүркәләрә топланмышдыр.

Бу фəсилəнин Азəрбайҗанда дəрд чинси вардыр: гаратикан (*Paliurus*), мурдарча (*Frangula*) ишлəтмəаҗачы (*Rhamnus*) вə иннаб (*Zizyphus*).

Бунлардан гаратикан (*Paliurus*) чинсинин биздə бирчə нөвү яйылмышдыр ки, о да гаратикандыр. (*P. spina—Christa*) О, дағ этəклəri вə орта дағ гуршагына гəдər яйылмыш ади коллардыр. Яхшы нектар верən биткидир, буна кərə дə арычылыгын инкишафы үчүн чох əһəмийəтлидир. Ярпагларында 176,2 мг% «С» витамини вардыр.

Ишлəтмəаҗачы чинсинин Азəрбайҗанда 5 нөвү битир. Бунлардан ади ишлəтмəаҗачы (*R. cathartica*) вə кəврəк ишлəтмəаҗачы (*R. frangula*) нөвлəri даһа əһəмийəтлидир. Кəврəк ишлəтмəаҗачынын ярпаглары бурғу үзрə дүзүлмүшдүр, кəнары бүтөвдүр, юмуртавари вə я эллипсшəкиллидир. Чичəклəri икичинсли беш типлидир. Сүтунчуғу сəдə башчыгшəкилли ағызчылыдыр. Чəйирдəкмєйвəsi күрəви вə гарадыр. Гүндүрлүйү 3 м-ə гəдər олан тикансыз коллардыр. Мешəлəрдə битир.

Кəврəк ишлəтмəаҗачынын кəвдəсинин гурудулмуш габыгынын ширəсиндən тəбəбəтдə ишлəтмə дəрманы кими истифадə эдилир. Ярпагларында 98,9 мг% «С» витамини, тохумунда 29,23%-ə гəдər яғ вардыр. Кəвдəсинин габыгында кифайəт гəдər ашы маддəsi олур. Буна кərə дə ондан кəп заводларында истифадə эдилə билər. Кəвдəсинин габыгындан сары боя алыныр, габыгы нар аҗачынын габыгы илə бирликдə гара рəнк верир. Ич габыгы гырмызы-сары, биширилмиш тəзə мєйвəлəri исə яшыл рəнк верир.

Ади ишлəтмəаҗачынын (*R. cathartica*) ярпаглары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, эллипсшəкилли вə я узунсов юмуртаваридир, хырда даирəви, мышар дишлидир, үзəri чылпагдыр дамарларынын янлары исə түклүдүр. Лəчəклəri хырдадыр вə я һеч йохдур. Сүтунчуғу 3. (2—4) бөлүмлүдүр. Мєйвəsi күрəви, гара чəйирдəкмєйвəдир, 3 м гүндүрлүкдə хырда аҗач вə я коллардыр. Мешəлəрдə битир. Ярпагларында 422,75—742,75 мг% «С» витамини вардыр. Буна кərə дə мєйвə консервлəрини, мүрəббəни, чємлəri вə сəйрəнин витаминлəшдирмəк үчүн онун ярпагларындан истифадə эдилир. Тохумунда 40%-ə гəдər яғ вардыр. Кəвдəсинин габыгында чохлу ашы маддəsi вардыр. Тəзə габыгындан сары, гурудулмуш вə зəйдə ислəдылмыш габыгындан исə гырмызы рəнк алыныр, элəчə дə гуру габыгындан гəһ-вəйи рəнк алыныр. Ади мурдарча чылпаг ямачлары яшыллəшдырмаг үчүн элвєришли аҗач нөвүдүр.

Иннаб (*Zizyphus jujuba*) тиканлы колдур вə я хырда аҗачдыр. Ярпаглары юмуртавари узунсов, учу күт, кəнарлары даирəви мышар дишли, чылпагдыр. Чичəклəri тəк-тəк вə я 3—5 бир ердə олмага дəстəлəрə топланмышдыр. Чəйирдəкмєйвəsi əтли, гырмызы-гонур рəнкдə, 20 мм-ə гəдər узунлугдадыр. Бечəрилир вə ябаны һалда мешəлəрдə раст кəлир.

Азəрбайҗанда ən чох Нахчыван МССР-дə, һабелə Кəйҗай, Күрдəмир, Ағсу, Ағдаш вə с. районларда яйылмышдыр.

Мєйвəsi чий вə гурудулмуш һалда ейилир. Мєйвəсиндə 253—400 мг%, ярпагларында 92,3 мг% «С» витамини вардыр. Иннаб ярпагында дилин ачылыг вə ширинлик һисс эдən синирлəрини мүвəггəти кєйлəшдирən маддə вардыр.

Үзүм (*Vitaceae* вə я *Ampelaceae*) фəсилəsi

Лианлардыр. Ярпаглары нөвбəли, бармагшəкилли дилимли вə я бармагшəкилли мүрəккəбдир, ярпагалтлыглары вардыр. Ярпагларынын гаршысындан чыхан будаглы бығчыглары илə даяга илишир. Чичəклəri икичинсли вə я бирчинслидир, 4



Шəкил 231. Үзүм тəнəйи (*Vitis vinifera*)

1—чичəклин будагы; 2—мєйвə салхымлы будагы; 3—ачылмагдə олан чичəйи; 4—чичəкялигын олмаган чичəйи; 5—чичəкдə эркəкчи вə дишичкелəri кəпүнүшү; 6—мєйвəсинин узунуна кəспəн.

вә 5 типлидир. Касачығы чох вахт ихтисар олунмушдур. Юмурталығы әксәрән икиювалыдыр. Мейвәси киләмейвәдир.

Бу фәсиләнин бөйүк тәсәррүфат әһәмийәти оланы үзүм тәһәйи (*Vitis*) чинсидир. Һәмни чинсин Азәрбайчанда уч нөвү вардыр. *V. silvestris*, *V. vinifera* вә *V. labrusca* (шәкил 231). *V. labrusca* вә *V. silvestris* чыр үзүм (гора) олуб, чай вә мешәләрин кәнарларында ябаны һалда битир. Етишмиш мейвәси тәзә икән вә я гудурулмуш һалда ейилр. Тохумунда 10—20%-ә гәдәр яғ вардыр. Бечәрилән үзүмүн (*V. vinifera*) бир чох мәдәни чешидләри вардыр. Азәрбайчанын аран вә дағ диби районларында кениш яйылмышдыр. Онларын чинс башчысы ябаны һалда битән чыр үзүм (*V. silvestris* вә *V. labrusca*) нөвләридир.

ССРИ-дә шахтая вә хәстәлийә давамлы бир чох үзүм сорту әлдә әдилмишдир.

Азәрбайчанда үзүмүн емәли вә чахыр сортлары кениш сурәт-дә әкилиб етишдирилр.

Бечәрилән үзүмүн мейвәсиндә каротиндән башга, «В» вә «С» витаминләри вардыр. Онларын мигдары үзүмүн чешидиндән асылы олага дәйишир. Ярпагларында ашы маддәси орта һесабла 5%, көвдәсинин габығында 5—10%, тохумунда 2—10%-ә гәдәр-дир. Мүхтәлиф нөвләриндә мүхтәлиф мигдарда шәкәр олур.

Бир чох һалларда үзүм салхымларында нормал инкишаф әтмиш вә ичәрисиндә чәйирдәйи олан ири мейвәләрдән башга, хыр-да вә тохумсуз мейвәләр дә олур. Онлара «м е й р у л и» дейилр. Бу ахырынчылар тозланмамыш әмәлә кәлән партенокарп мейвәләрдир. Үзүмләрдә мейрулиния (партенокарпиянын) гаршысыны алмаг вә долу салхымлар әмәлә кәлмәсини тәмин әтмәк үчүн чичәк ачан заман онлары чыр үзүмләрин чичәкләри илә әләвә тозламаг лазымдыр.

1965 илә кими Азәрбайчанда 100 мин һектара гәдәр үзүмлүк салыначагдыр.

КӘРМӘШӨВЧИЧӘКЛИЛӘР (*Celastrales*) СЫРАСЫ

Бу сырая ағачлар, коллар вә лианлар дахилдир. Ярпаглары бәситдир, нөвбә илә вә я гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Чичәкләри мүнтәзәм вә сәрбәст ләчәклидир. Чичәк ятағында нектарлығы һәлгә шәклиндәдир.

Кәрмәшов (*Celastraceae*) фәсиләси

Чичәкләри мүнтәзәм, 4—5 типлидир. Мейвәләри килә вә чәйир-дәкмәйвәдир. Тохумлары бирләпәлидир.

Фәсиләнин әһәмийәтли чинси кәрмәшовдур (*Evolvulus*). Кол биткиләри олан бу чинсин Азәрбайчанда 5 нөвү вардыр. Мешәләрдә вә ән чох мешә кәнарларында яйылмышдыр.

Кәкләриндә гуттаперча маддәси чохдур. Бунлардан зийилли кәрмәшов нөвүнү (*E. verrucosa*) горуочу мешә золагларында әкмәк мәсләһәт көрүлүр.

Ади кәрмәшов (*E. europaea*) мешә кәнарларында битир. Тохумунда 70%-ә гәдәр яғ вардыр. *E. europaea*, *E. verrucosa* вә *E. velutina* нөвләринин мейвәләринә аллүминиум туршусу илә тәсир әтдикдә саманы-сары рәнж верир. Азәрбайчанда битән кәрмәшов нөвләриндән гуттаперча алмаг үчүн тәдгигат апарылмышдыр. Тәдгигат нәтижәсиндә мүййән әдилмишдир ки, ади кәрмәшовун (*E. europaea*) көвдә габығы, көкү вә ярпагларында гуттаперча маддәси чохдур. Гуттаперча, суалты кабелләри вә электрик нагилләрини тәһрид әтмәк, дишә мүвәггәти пломб гоймаг, штемпел вә япышган маддәләри һазырламаг вә саирә үчүн ишләдилр.

ЧӘТИРЧИЧӘКЛИКИМИЛӘР (*Umbelliflorae*) СЫРАСЫ

Чәтирчичәкликимиләр сырасы юмурталыгларынын ярымашағы вә мейвәләринин чүт парчаланан олмасы, ярпагалтлыгларынын исә һеч олмамасилә фәргләнир. Чәтирчичәкликимиләр сырасынын адындан мәлүм олдуғу кими, бурая мәнсуб олан фәсиләләрин чичәк групплары мүрәккәб вә я бәсит чәтир вә чичәкләри икигәт янлыглыдыр. Бир чохунда касачыг йох дәрәчәсинә гәдәр ихтисар олунмушдур. Эркәкчикләри 5 олуб ялныз бир дөврә үзәриндә дүзүлмүшләр. Мейвә ярпаглары әдәтән икидир. Юмурталығы икиювалыдыр. Сүтунчуғу 2-дир, дибдән кениш һәлгәвари нектарлығы бирләшмишдир. Һәр ювасында салланмыш тохумлуғу вардыр. Интегументи бирдир. Мейвәләри тохумча, киләмейвә вә я чәйирдәкмәйвәдир. Тохумлары эндоспермлидир.

Әксәрийәти отлардыр, бәзиләри чох иридир, аз-аз һалларда ағач вә я коллардыр.

Сыранын мүйүм фәсиләләри: зоғалчичәклиләр (*Cornaceae*) вә чәтирчичәклиләр дир (*Umbelliferae*).

Зоғалчичәклиләр (*Cornaceae*) фәсиләси

Зоғалчичәклиләр фәсиләсинин чичәкләри икичинсли, мүнтәзәмдир. Касачығы көрүнмүр вә я чох гыса дишлидир. Ләчәкләри 3—5, сәрбәстдир. Эркәкчикләри ләчәкләринин сайы гәдәрдир. Юмурталығы ашағы вә 1—3 ювалыдыр, һәр ювада 1—2 асылы тохумлуг вардыр. Мейвәси чәйирдәкмәйвә вә я киләмейвәдир. Коллар вә я ағачлардыр.

Бу фәсиләнин Азәрбайчанда ики чинсинә тәсадүф әдилр. Онлардан бири зоғал (*Cornus*) чинсидир. Онун анчаг бир нөвү вардыр ки, о да ади зоғалдыр (*C. mas*).

Фәсиләнин икинчи чинси гара мурдарчадыр.

Онун Азәрбайчанда үч нөвү вардыр. Гара мурдарча, дағ мешәләринин әтәкләриндә битән ағ чичәкли хырда күрәви

гара мейвәли кичик ағачлардыр. Мейвәсиндә 39,6 мг% «С» витамини, мейвәянлыгында 45,3%, тохумунда исә 15,4% яғ вардыр. Бу яғ сабын биширмәк үчүн ярарлыдыр. Биткидән дәмир дузлары васитәсилә гара боя алыныр.

Ади зогал Азәрбайжан районларындан чохунда әкилиб етишдирилән вә ябаны һалда битән хырда ағачлардыр. Онун бир сыра чешидләри вардыр. Ялныз Ләнкәранда битмир.

Мейвәси чох гиймәтлидир. Ондан көзәл мүрәббә, туршу, лаваш, ахта, лимонад чөвһәри, зогал ликйору һазырланыр. Бундан башга гәһвә үчүн истифадә этмәк олар. Яхшы нектар верән биткидир. Мейвәсиндә 55 мг% «С» витамини вардыр. Тохумундан шам истеһсалы үчүн яғ алмағ олар. Ярпагында 7—17,6% таниид (ашы маддәси) вардыр. Одунчагы һәр чәһәтдән гиймәтлидир. Зогал мешәләрдә бағ салмағ вә гуру ямачлары яшыллашдырмағ үчүн чох дәйәрли биткидир.

Чәтирчичәкلیلәр (*Umbelliferae*) фәсиләси

Чохиллик, икииллик вә я бирилликләк отлардыр. Чичәк групу мүрәккәб чәтир аз-аз һалларда исә бәсит чәтирдир. Чәтирчичәкләрин дибиндә өртүчү ярпагчыглардан ибарәт сарғылар вардыр. Бәзән бу сарғылар ялныз үмуми чәтирчин дибиндә, бәзән дә ялныз хусуси чәтирләрин дибиндә олур. Чох вахт һәр ики чәтир сарғысыз олур. Чичәкләри актиноморф вә я кәнардакылар зигморфдур. Адәтән икичинсли олур. Касачыг ярпаглары бешдишлидир, я да ихтисар олунмушдур. Ләчәкләри 5, эркәкчикләри 5. юмурталыгы ашагы вә икиювалыдыр. Һәр ювада гаршы-гаршы асылы тохумлуг вардыр. Сүтүнчуғу икидир вә диб һиссәләри шишәрәк һәлгә әмәлә кәтирир. Мейвәси ики тохумчадан ибарәт олуб, икибөлүмлү саплағ үзәриндә таянмышдыр. Һәр тохумчанын ич тәрәфи һамардыр, архалары бешгабырғалыдыр, габырғаларын арасы чөкәкдир: чох вахт бу чөкәкликләрдә икинчи габырғалар әмәлә кәлир. Чөкәкликләрин алтында вә мейвәнин перекарпиясында бойлама истигамәтдә узанмыш ягла долу каналчыглар олур. Эндоспермләри ичәридән һамар, әйри вә я тирәлидир. Ярпаглары нөвбәли, чох мүрәккәб вә я чох парчаланмышдыр. Ярпагалтлыглары олмур. Саплаглары гын шәклиндә кенәлиб көвдәни гучаглайыр. Көвдәләринин буғумларында бош йоллар вә гәтран йоллары олур. Бәзән мейвәнин үзәриндә мүхтәлиф чыхынтылар әмәлә кәлир.

Бу фәсиләнин систематикасы башлыча олараг мейвәләринә әсасән гурулур (шәкил 232). Онун систематик ваһидләрини тәйин этмәк үчүн һөкмән етишмиш мейвәләри олмалыдыр.

Һәмнин фәсиләйә мәнсуб олан биткиләр арасында чох файдалылары олдуғу кими, мәсәлән, тәрәвәз кими ейиләнләр, әтирли вә яғлы биткиләр, дәрман биткиләри вә с. зәрәрлиләри дә вардыр. Азәрбайжанда бу фәсиләнин 74-дән артыг чинси вә 170-дән артыг

нөвү битир. Фәсиләнин файдалы нүмайәндәләриндән бәзиләри ашағыда кәстәрилир.

Еркөкү (*Daucus*) чинсинин Азәрбайжанда 2 нөвү битир. Ябаны көк (*Daucus carota*) бирилликләк вә я икииллик отлардыр (шәкил 233). Азәрбайжанда коллар дибиндә, мешә кәнарларында, зибилли ерләрдә, тахыл вә тәрәвәз әкинләринин арасында бир алаг оту кими ябаны һалда битир. Онун исә мәдәни чешидинин (*Daucus sativus*) көкү йоғун, рәнки сары, нарынчы, түнд-михәйи, чәһрайы рәнкләрдә олур.

Бәзи тәдгигатчылары вердикләри мәлумата көрә, биткинин ширәсиндә гурдтөкмә габилийәти вардыр. Мәдәни чешидинин көкүндә чохлу «А» провитамини, бир гәдәр «В₁», «В₂» вә нисбәтән чох «С» витамини вә башга витаминләр вардыр. Тохумунда 0,9% мигдарында әтирли яғлар вардыр ки, бу да әтрийятда истифадә эдилир (шәкил 233).

Хырда кәрөвүз вә я чәфәри (*Petroselinum sativum*) әкилиб етишдирилир, бәзән дә ябаны һалда зибилли ерләрдә битир. Тохумунда шиддәтли сидиккәтирмә габилийәти вардыр. Гурумуш ярпагларында 100 гамма «А» витамини, тәзә ярпаглары вә көкүндә чохлу «С» витамини, тохумунда 2—7% әтирли яғ вардыр. Яхшы тәрәвәз биткисидир.

Ири кәрөвүз (*Apium graveolens*) икииллик биткидир. Көкү шагули вә әтлидир, хусуси әтирлидир. Ярпаглары ләләшәкиллидир. Ябаны һалда Гара вә Хәзәр дәнизләри кәнарларында битир. Азәрбайжанда тәрәвәз кими бечәрилир. Биткинин тәркибиндә апини глюкозиди вардыр. Яшыл һиссәләриндә 32—75 гамма «А» провитамини, көкүндә 6 мг % «С» витамини вардыр. Тохумундан 2,5—3%, ярпагларындан исә 0,1% мигдарында һасил эдилән әтирли яғ әтрийятда ишләдилир.

Кешниш (*Coriandrum sativum*) әкилиб бечәрилир, бәзән ябаны һалда тәсадүф олунур. Хусуси ийли олмасынын сәбәби, әтирли яғларла зәнкин олмасыдыр. Көйәрти кими ейилир. Ичкиләрә әтир вермәк үчүн истифадә эдилир. Яхшы нектар верәндир. Тохумундан «кориандр яғы» алыныр.

Караподиум (*Caropodium platycarpum*) Нахчыванын орта дағ гуршағында битир. Тәркибиндә чох гиймәтли әтирли яғ вардыр ки, о да әтрийят вә гәннадиди сәнаеиндә ишләдилир.

Шүйүт (*Anetum graveolens*) чох ердә әкилиб етишдирилир, һабелә ябаны һалда раст кәлир. Кәскин ий вермәси, тәркибиндәки әтирли яғдан асылыдыр. Яшыл һиссәсиндә 64—82 гамма «А» провитамини, ярпагларында 330 мг %-ә гәдәр «С» витамини вардыр. Мейвәсиндә 2,0—4,0% әтирли яғ олур ки, ондан да үз бәзәкләри, ликйор, консерв истеһсалында вә тәбабәтдә истифадә эдилир.

Зирә (*Carum carvi*) Азәрбайжанда мешә гуршағындан башламыш та алп гуршағына гәдәр яйылмыш отдур. Тохумунда «гарвон» адланан яғ вардыр, бу да пендир истеһсалында, гәннадиди сәнаеиндә вә хусуси чөкәк сортларында ишләдилир әләмә дә,


тиймәтлән ичкиләрин этирләшдиримәсіндә истифадә эдилір. Мейвәсіндән 3,1—7,17% зирә яғы алыныр ки, ондан да табәбәтдә мухтәлиф дәрманлар һазырланыр.

Яланчы чирә (*Pimpinella*) чинсинин хейли әһәмийәтлән нөвү этирли чирәдир (*P. aramatica*). Онун чох этирли тохумлары вардыр. Тохумлары долмая, аша, чөрәйә вә саирәйә хош ий вермәк үчүн ишләдилір.


Мәдәни һалда бечәрилән (*P. anisum*) бириллик от биткисидир, тохумунда анетол вардыр; табәбәтдә бәлгәм кәтирән дәрман кими ишләдилір.

Дағ чирәси (*P. saxifraga*) нөвүнүн көк әтрафы ярпаглары салат кими ейилір. Дағ чирәсіндән пивәйә этир вермәк үчүн истифадә эдилір.

Чашыр (*Ferula*). Бу чинсин *F. Szovitsiana* нөвү Нахчыванда битир. Онун ярпаглары саплағы илә бирликдә туршуя гоюлуб ейилір. Көкүндә 20%-ә гәдәр гәтран вардыр. Азәрбайчанда бу нөвдән башга даһа 7 нөвү битир. Онларын һамысының көкүндә гәтран вардыр. Әсас әтибарилә гуру ямачларда вә шоран ерләрдә битир.



А




Шәкил 232. Чәтирчичәклиләрн мейвәләрн:

А—яндан көрүнүшү; Г—узунуна кәсийн; В—әниә кәсикләрн; р—рушәймн; С—сүтүнчүгү; яйә—яғ йоллары; ән—әлдәспермн.

Балдырған (*Heracleum*) Азәрбайчанын сүбалп гуршағында яйылмыш 2 м-ә гәдәр һүндүрлүкдә олан от биткисидир. Авропа балдырғаны (*H. trachyloma*) нөвүнүн ярпаглары

дуза гоюлмуш һалда вә тәзә-тәзә ейилір. Чаван зоғлары бир тәрәвәз кими хорәйә гатылыр.

Сибир балдырғаны (*H. sibiricum*) нөвүнүн ярпағында 150 мг%-дән артыг «С» витамини вардыр. Тохумларындан этирли яғ, көкүндән исә спиртли ички алыныр. Бәзи формалары-



Шәкил 233. Еркөкү (*Daucus carota*)

1—чичәк группунун харичи көрүнүшү; 2—айрыча чичәйн; 3—чүттохумчаның узунуна кәсийн; 4—чүттохумчаның әниә кәсийн.

нын ярпаг вә көвдәләриндә яндырычы маддә ифраз әтмәк габилыйәти вардыр. Бу маддә ачыг дәрйә тохундугда чох вахт яныг әмәлә кәтириләр.

БОЯГОТУКИМИЛӘР (*Rubiales*) СЫРАСЫ

Бу сырада зигоморфлуғун тәдричән инкишаф әтдийн, эркәкчик вә дишичикләрн исә азалдығы көрүнүр. Бояготукимилиләр сырасының чәтирчичәклиләр сырасындан фәрги, бояготукимилиләрдә, битишик ләчәклилик кими алилик әләмәти мүшаһидә әдилмәси вә чичәк группунун башга формада олмасыдыр. Лакин чәтирчичәклиләр сырасы биткиләринин бояготукимилиләрләр бир сыра охшар чәһәтләри дә вардыр. Онларда, мәсәлән, тохумлуғун бирөртүклү, чичәйн 4 даирәви вә 4—5 үзвлү олмасыны, кәсачығын вә ашағы юмурталығын гурулушу әтибарилә бир-биринә охшамасыны көстәрмәк олар.

Бояготукимилиләр сырасының Азәрбайчанда раст кәлән ән мүһүм фәсиләләри: бояготучичәклиләр, маралчичәклиләр, пишикоту вә фырчаоту фәсиләләридир.

Болготучицәкчиләр (Rubiaceae) фәсиләси

Чичәкләри актиноморф олуб, адәтән икичинслидир. Касачы-гын борусу юмурталыгла бирләшмишдир, кәнарлары дишлидир вә я дишләри йох дәрәчәсиндәдир. Тачы тәкәршәкилли вә я тыф-шәкиллидир. 4—5 бөлүмлүдүр. Эркәкчикләри ләчәкләрин сайы гәдәрдир, тачын борусу дахилиндә кизләнмишдир вә тачын һис-сәләрилә нөвбәләшир. Юмур-талыгы ашагы вә икиювалы-дыр, һәм ин ювада бир вә я бир нечә тохумлуг вардыр. Сүтүнчугу бирдир, агазчыгы икибөлүмлүдүр. Мейвәси чүт-дүр, бир-бириндән айрылыр. Ярпаглары гаршы-гаршыя дү-зүлмүшдүр. Азәрбайчанда битән нүмайәндәләриндә яр-пагалтыгларынын инкиша-фы нәтичәсиндә ярпаглар дәстә-дәстәдир.

Бу фәсиләнин Азәрбай-чанда 9 чинси вә 56-я гәдәр нөвүнә раст колинир. Онлар-дан ән мүнүмләри, ашагыда кәстәрилир.

Гырмызы бояг, га-тыготу вә я әткәтирән (*Galium*) чинсинин әсә-нөвләриндән бири шимал-гырмызы боягыдыр (*G. boreale*). О, чәмәнләрдә аз-аз раст кәлән чохиллик-отдур. Тәркибиндә 33,9 мг% «С» витамини вардыр, көкүн-дән гырмызы бояг алыныр (шәкил 234).

Юмшаг гырмызы бояг нөвү (*G. mollugo*) мөшә кәнарларында вә чәмән-ләрдә битәрәк һүндүрлүйү 1 м-ә гәдәр олан чохиллик-отдур. Көвдә вә ярпагла-рындан гәһвәйи бояг алыныр.

Әсәл гырмызы бояг нөвү (*G. verum*) чөлләрдә вә гуру-ямачларда битән, 80 см һүндүрлүкдә чохиллик-отдур. Тәркибин-дә 74 гамма «А» провитамини вардыр. Яшылымтыл-сары бояг ве-рир. Көкүндән юн боямаг үчүн гырмызы бояг алыныр.



Шәкил 234. Шимал гырмызы боягы (*Galium boreale*).

а—биткинин үмүм көрүнүшү; б—чичәк;
в—мейвәси; г—чичәкнин диаграммы.

Бояготу биткиси (*Rubia petiolaris*, *Rubia tinctorum*) чай вә мөшә кәнарларында, коллугларда битән, көвдәләри дыр-манан от биткисидир. Көкүндән нарынчы бояг алыныр.



Шәкил 235. Гәһвә (*Coffea arabica*).

Ортада—мейвәли вә чичәкли будагы; 1—үзәриндә эркәк-чикләри галмыш тачын ачылышы; 2—касачыгла әһәтә олун-муш дишичийи; 3—мейвәси; 4—әһинә кәсилмиш мейвәси.

Гәһвә (*Coffea*) чинси. Һүндүрлүйү 5 м-ә гәдәр олан колдур. Ири ағ вә я ачыг чәһрайы рәнкли әтирли чичәкләри бу-дагларыны бүрүйүр. Мейвәләри ачыг гырмызы чәйирдәкмейвәйә охшардыр, икиювалы вә икитохумлудур. Тохумундан гәһвә һасил-әдилир. Гәһвә чинси тропик өлкәләрдә битир.

Әс л г а й в а (*C. arabica*) нөвүңи (шәкил 235) вәтәни Кә-
бәштиләдир. Һәмшәяшыл ағачдыр. Чичәкләри группара топ-
ланмышдыр, әтирлидир. Тохумунда кафени адланан алкалоид
вардыр. Тропик өлкәләрдә бечәрилик.
Либерия гәйвәсини (*C. liberica*) вәтәни Либериядыр.



Шәкил 236. Кинэ ағачы (*Cinchona*).

1—чичәк; 2—тачы вә эрәкчәкләри; 3—касачыгы вә динничәк;
4—юмурталыгының эңгә кәсийи; 5—мейвәсә; 6—тохумларын кәсийи;
ортада—чичәкни бугагы.

Кинэ ағачы (*Cinchona*) чинси. Ярпагалтлыглары пүл-
чүг шәклиндә, гүтүчүгү чөхтохумлу, ләчәкләри түклү, һәмшә-
яшыл ағач вә коллардыр (шәкил 236). Ағачының габыгындан кинэ

адлы мүрәккәб алкалоид алыныр ки, ондан да гыздырма дәрманы
кими истифадә эдилер.

Бу чинсин 100-ә гәдәр нөвү вардыр, лакин бунлардан сәнае
әһәмиyyətә оланлары *C. Ledgeriana*, *C. succirubra*, *C. officina-
lis* вә *C. calisaya*-дыр. *C. succirubra* нөвү Гара-дәниз саһил-
ләриндә рүтүбәтли субтропик ерләрдә бириллик битки кими
бечәрилик.

Доггуздон, Маралчичәйи (*Caprifoliaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икичинсли, актиноморф вә я зигоморфдур. Касачы-
гын кәнары 2—5 дишлидир. Тачы битишкәчәкли, 4—5 дилим-
лидир. Эрәкчәкләри тачын дилимләринни сайы гәдәрди, аз-аз
һалларда онлардан ики дәфә артыгдыр. Юмурталыгы ашагы, 2—
5 ювалыдыр. Сүтүмүгү 2—5 бөлүмлү вә я бәситдир. Ағызчыгы
башчыг шәклиндәдир. Коллар, лианлар вә тәкбир һалларда ярпаг-
лары гаршы-гаршыя дүзүлмүш отлардыр.

Бу фәсиләнин Азәрбайҗанда 3 чинси вә 11 нөвү вардыр. Он-
лардан ән мүнүмләри бунлардыр:

Кәндәләш (*Sambucus*) чинси. Һүндүрлүйү 150 см-ә гә-
дәр олан чохиллик отлар вә я коллардыр. От кәндәләш (*S. ebulus*)
арандан башлайыб мөшә гуршагына гәдәр рүтүбәтли
ерләрдә битир. Кол кәндәләш (*S. nigra*) мөшәләрдә битән
колдур. Мейвәси тәбәбәтдә вә коняк истәһсалында ишләдилер.
Чичәкләриндән мүрәккәб һазырланыр. Етишмиш мейвәсиндә
2,77% глюкоза, 2,53% фруктоза, 1,1% алма туршусу, 0,31% ашы
мәддәси вардыр. Гурудулмуш чичәйиндән тәрләдичи дәрман кими
истифадә эдилер. Ярпагында 500 гамма «А» провитамины вар-
тыр. Мейвәләриндән ипәйн боямаг үчүн зейтуну бояг алыныр.


Башынағачы (*Viburnum lantana*) 1—2 м Һүндүрлүйүндә
дә колдур. Ярпаглары овал шәклиндә бүтөв, кәнары хырда мышар
дишлидир, алтдан улдузшәкилли түкләрлә өртүлмүш олдугуна
көрә боз рәңкдә көрүнүр. Чичәкләринин һамысы бәрабәрди.
Мейвәси юмурташәкилли, гарадыр. Орта даг гуршагына гәдәр
мөшә кәнарларында вә коллугларда битир. Көвдәсинин габыгындан
япышган, ярпагларындан исә саманы-сары бояг алыныр.

Ади башынағачы (*V. opulus*). Ярпаглары чылпаг,
3—5 дилимлидир. Чичәк группунун кәнар чичәкләри мейвә вер-
мәйән ири вә тәкәршәкилли, ичәридә оланлары исә мейвә верән
зәнкшәкиллидир. Мейвәси гырмызыдыр. 2—4 м Һүндүрлүкдә
колдур. Орта даг гуршагына гәдәр олан мөшәләрдә битир.

Мейвәсиндән лаваш вә сиркә һасил олур, алма илә гарышдыр-
дыгда исә мармалад һазырланыр. Тохумундан гәйвә алмаг олар.
Чичәйи чох яхшы нектар вә тоз верәндир. Көвдәсинин габыгында
вибурнин глюкозиди вардыр. Ширәси тәбәбәтдә дахили ган ахманы
даяндырмаг үчүн ишләдилер. Мейвәсиндә 78—86 мг % «С» вита-
мини вардыр (шәкил 237).



Шәкил 237. Адина башынағачы (*Viburnum opulus*).
1—чичәк булагы; 2—мейвә булагы; 3—орта чичәк; 4—диш-
чийнең ағзын көстөрмәк үчүн тачының бир һиссәсе кәсилмиш
чичәк; 5—чичәк группунун мейвә вермәйән коңар чичәк; 6—чичә-
к диаграммы.



Шәкил. 238 Пишикотун (*Valeriana officinalis*). чичәк вә мейвәсә.

1—чичәк; 2—чичәкниң узунуна кәсий; 3—мейвәсиниң узунуна кәсий.

Пишикоту (*Valerianaceae*) фәсиләсе

Чичәкләри зигоморф олуб, касачыгы яхшы көрүнмүр, бә'зән дишлидир вә мейвәләрин янында уцаған әмәлә кәтирмишдир. Тачы бору шәклиндәдир, 3—5 дилимлидир. Диби габарыг вә я маһмызлыдыр. Эркәкчикләри 3 вә я 1-дир. Сүтунчуғу сап кими олуб 2—3 бөлүмлүдүр. Юмурталыгы ашагы вә үчювалыдыр, онлардан бири мейвә верир, икиси исә бош галыр. Ярпаглары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр.

Азәрбайчанда 5 чинси вә 30-дан артыг нөвү вардыр. Бу чинсләрдән ән әһәмиyyətлисидир пишикоту (*Valeriana*) чинсидир. Онуң 10-дан артыг нөвү вардыр. Тачы ағымтыл-чәһрайыдыр, борусунун диби гыса маһмызлыдыр.

Valeriana officinalis нөвүнүн (шәкил 238) көкләриндә әлирли яглардан ибарәт тәсирәличи маддә вардыр. Ондан әсәбилии, юхусузлугу, үрәк дөйүнмәсини вә бә'зи хәстәликләри муәлицә этмәк үчүн истифадә әдилир.

Фырчаоту, Дараггангал (*Dipsacaceae*) фәсиләсе

Чичәкләри зигоморф, 4—5 үзвүдүр. Касачыгы ихтисар олунмушдур, лакин битишик ярпагалтлыгларындан ибарәт яланчы харичи касачыг әмәлә кәлмишдир. Тачы 4-ләчәклидир, онлардан ики архадакылар битишмишдир. Гөңчәдә чичәкләр кирәмид шәклиндә дүзүлмүшдүр. Эркәкчикләри чох вахт 4-дүр вә я ондан аздыр. Юмурталыгы бирювалы биртөхүмүдүр. Мейвәси тохумчадыр, эндоспермлидир. Ярпаглары гаршы-гаршыядыр. От вә я аз-аз һалларда ярымколлардыр. Азәрбайчанда 4 чинси вә 30-а гәдәр нөвү вардыр. Парчаланмыш фырчаоту 239-чу шәкилдә көсгәрилмишдир.

ФЫСТЫГЧИЧӘКЛИЛӘР (*Fagaceae*) СЫРАСЫ

Фыстыгчичәклиләр сырасынын нүмайәндәләри бирәвли ағачлар вә я коллардыр. Мейвәләриниң әтрафында горуючу чанаг әмәлә кәлир. Чохунда чичәкяңлыгы аз инкишаф әтмишдир. Чичәк групплары мүрәккәб дихазиядан ибарәтдир (шәкил 240). Эркәк чичәкләрдә эркәкчикләр чичәкяңлыгынын ярпаглары илә гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Диши чичәкләрдә дишичик 2—6 мейвәярпағындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталыг ашағыдадыр, 1—6 ювалыдыр вә һәр ювада 1—2 чеврилмиш тохумлуг вардыр. Маяланма халазогамдыр, күләк васитәсилә тозлаңыр. Ярпаглары-ярпагалтлыгы, бәсит вә нөвбә илә дүзүлмүшдүр.

Бу сыраның нүмайәндәләринә тәбашир дөврүнүн галыглары арасында да тәсалүф әдилир. Сыраның башлыча фәсиләләри тозағачыкимиләр (*Betulaceae*) вә фыстыгкимиләр (*Fagaceae*)-дир.

Тозағачыкимиләр (Betulaceae) фәсиләси



Шәкил 239. Парчаланмыш җырчагы (*Dipsacus laciniatus*).

Бу фәсиләнин әсас хусусийәти, һәм әрхәк, һәм дә диши чичәкләринин дихазия шәклиндә олуп, узун охлар үзәриндә дүзүлмәсидир. Әрхәк чичәкләринин өртүчү пулчугларына битишмишдир. Әрхәкчиктәри 2—10-дур. Чохунда тоз кисәләри ики һиссәйә бөлүнмүш олур. Диши чичәкләр, чичәкалтлыгындан әмәлә кәләрәк 2—4-ү бир-биринә бирләшмиш өртүчү ярпагларын голтуғунда ерләшмишдир вә я һәр диши чичәк бир-биринә битишмиш чичәкалтлыгларындан ибарәт чанагчыгла әһәтә олунмушдур. Дишичикләри ики мейвә ярпагындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталыгы ашагы вә икиювалыдыр, һәр ювада тәрсинә отурмуш бир тохумлуг вартыр. Маяланма халазогамдыр. Мейвәләри биртохумлу ганад-кисвә вә я чанаг ичиндә олан фындыгыдыр.

Бу фәсиләнин нүмайәндәләринин ярпаглары ярпагалтлыгы бүтөв вә бөситдир, нөвбә илә дүзүлмүшдур. Ағач вә кол биткиләриш. Күләклә тозланыр. Шималда да яйылмышлар вә бәзи ер-ләрдә мешәләр әмәлә кәтирмишдир.

Фәсиләнин башлыча чинсләриндән бири ғызылағачдыр (*Alnus*). Азәрбайчанда онун 4 нөвү вардыр ки, онлар да дағ-тәңи гуршагларында, рүтүбәтли ерләрдә, чай вә архларын кәнарларында битир. Диши чичәк групу дихазиясында орта чичәк инкишаф әтмир, ялыз яндакы ики чичәк инкишаф әдир ки, онлар да бешдилимли пулчугларын голтуғунда ерләшир.

Ғызылағач нөвләринин тахтасы тез сынан, аз эластик, тез лыбы сөнәндир. Онун көмүрүндән барыт һазырламаг үчүн исти-фадә әдилир. Көвдәләринин һавата тез хараб олмасына бахмая-раг, суда узун мүддәт чүрүмүр вә свалты тикинтиләрдә ишләди-лир. Чичәкләри язда чохлу тоз вә япышган вердийи үчүн, шәкәр вә бала гарышдырылыб ем олараг арылара верилир.


Бу чинсин *A. glutinosa* вә *A. barbata* нөвләриндән хейли исти-фадә әдилир. Онларын гөзәсәндән һазырланан дәм-шәмә, исһала гаршы дәрмандыр.

Боз ғызылағач (*A. incana*) нөвүнүн ярпагларында «С» витамини вардыр. Ғызылағачын башга нөвләринин габыгында 5,54-дән 9,13%-ә гәдәр ашы маддәси олдуғундан ерли даббаха-ларда ишләдилир.

Фәсиләнин әһәмийәтли чинсләриндән бири дә тозағачы (*Betula*) чинсидир. Онун Азәрбайчанда үч нөвү вардыр. Дихазияларында 3 там чичәк инкишаф әдир. Бу чичәкләр үчдилимли пулчугларын голтуғунда ерләшир. Тозағачы чинсинин нөвләри дағ мешәләринин юхары кәнарларында яйылмышдыр. Тахтасындан түфәнк гундагы гайырырлар, көмүрү рәссамлыг-да, дүш тозу һазырладыгда, һабелә спирти вә арагы тәмизләмәк үчүн ишләдилир.

Әйилән тозағачы (*B. pendula*) нөвүнүн ширәсиндән хусуси көпүклү пивә вә тумурчугларындан тозағачы арагы

Һазырланыр. Тозагачынын ширәсиндә 1%-ә гәдәр шәкәр вардыр. Ярпагындан халг арасында сидикәтирән дәрман кими истифадә эдилір. Гурудулмуш ярпагларында 150—500 гамма «А» про-
витамины, 167,9—312 мг %, тумурчугларында исә 70 мг % «С»
витамины вардыр. Ярпаг вә габыгындан боягчылыгда яшыл бояг
алмаг үчүн истифадә эдилір.



Шәкил 240. Фистогчичәклерини чичәк
диаграммлары.

1—гымшлагаачын (Alma) эркәк дихазиясы; 2—онун гыса пулчуғу; 3—диши дихазиясы; 4—тоз ағачынын эркәк дихазиясы; 5—тоз ағачынын диши дихазиясы; 6—фындыгын чичәги; 7—фындыгын диши дихазиясы; 8—шабалыгын диши дихазиясы.


(*C. avellana*), айыфындыгы (*C. iberica*) вә маралфын-
дыгы (*C. corymbosa*) Бунлар (шәкил 241) башлыча олараг
Нуха, Закатала, Балакән, Гах, Варташен, Губа, Гусар, Гутгашен
районларында вә саир районларда ябаны һалда битир вә әкилиб
етишдирилир. Будаглары, үчларда көзәл чадыр әмәлә кәтирир.
Эркәкчикләри сары, нисбәтән назик цилиндр шәклиндә сырғалара
топланмышдыр. Нәр чичәги өртүчүк пулчуғу вә ики чичәкалтығы-
нын голтуғунда отурмушдыр. Эркәкчикләри 4—8 олуб, саплаглары
өртүк пулчуғуна битишмишдыр. Диши чичәк пулчуғлары бөйрәк
шәклиндәдир. Диши чичәкләри дихазия һалында ики-ики ерләшир-

Әһәмиyyətли чинсләрдән
бири дә вәләсдир. (*Car-*
pinus) Онун Азәрбайчанда
6 нөвү яйылмышдыр. Эркәк
чичәкләриндә эркәкчикләр
4—12-дир. Чичәкянлыглары
йохдур. Эркәкчик өртүкчүк
пулчуғларын голтуғунда отур-
мушдыр. Диши чичәкләрини
чичәкянлыгы 6 дишлидир.
Дишичик өртүчүк пулчуғла-
рынын голтуғунда чүт-чүт
дихазия үзрә отурмушдыр.
Юмурталыгы чичәкянлыгы
илә битишикдир. Мейвәси
фындыгчыгдыр.

Гафгаз вәләси
(*C. caucasica*) нөвүнүн кү-
лүндә паташ вардыр. Габы-
гындан юн боямаг үчүн исти-
фадә эдилір. Одунчагы па-
лыд вә фыстығын одунча-
гындан чох бәркдир. Ондан
дөйирман һиссәләри, чәкич,
бурғу, төкнә, балта сапы,
көнд тәсәррүфат аләтләри
гайрылыр.

Гиймәтли чинсләрдән би-
ри дә фындыгдыр (*Cory-*
lus). Азәрбайчанда үч нөвү
битир. мешә фындыгы

Чичәкянлыглары юмурталыгла вә дишли ая илә битишиб чанаг
әмәлә кәтирир. Чанаг, мейвәни бору шәклиндә әһәтә эдир.



Шәкил 241. Фындыг биткисинин будагы.
а—эркәк сырғачыгы; б—диши чичәк групу; в—чанаг ичәрисиндәки
мейвәләри.

Фындыг ән яхшы яғ верән биткиләрдәндир. Чий һалда ейил-
мәкдән башга, мұхтәлиф гәннаты малларына да гатылыр. Фын-
дыг ағачлары дағ вә мешәләрдә бағ салмаг вә чылпаг ямачлары
яшылашдырмаг үчүн чох әлверишлидир.

Фыстыгкимиләр (*Fagaceae*) фәсиләси

Бу фәсилә тозағачыкимиләр фәсиләсинә нисбәтән даһа артыг
тәкамүл этмишдыр. Фәсиләнин нүмайәндәләриндә халазогамия
йохдур, лакин тохумлуғунда чохнүчәйрәли архоспорлар вардыр.
Фыстыгкимиләрин эркәк чичәк групплары турулушча даһа садә-
дир. Бурада чичәкләр дихазияя дейил, садәчә сырғачыглара топ-
ланмышдыр. Онларын чичәкянлыгы вардыр. Чичәкянлыгы көр-
кәмсиз, яшыл рәнкли, 4-ярпаглы вә битишикдир. Эркәкчикләри
чох олуб парчаланмамышдыр. Диши чичәкләри шабалыда 3,

фыстыгда 2, палыда 1-дир. Палыдын ики ян чичэйи ихтисара дүшмүшдүр. Фыстыгкимилерин диши чичеклери чох аздыр вэ бирлэпэлилердеки кими үчэр типлидир.

Палыда дихазия бирчичеклидир. Чанаг ачылмаг габилийиэ-тини итирмишдир вэ ялыз мейвэнин диб хиссэсини эһатэ эдир. Фыстыгкимилэр фэсилэсинин Азербайчанда үч чинсинэ тэсадүф эдилер. Палыд (*Quercus*), фыстыг (*Fagus*) вэ шабалыд (*Castanea*) чинслэри.

Шабалыд чинсинин Азербайчанда бирчэ нөвү вардыр, о да ади шабалыд (*C. sativa*) нөвүдүр. О, арылыг денизи өлкөлөрүндө вэ Загафгазияда кешиш яйылмышдыр. Бэ'зэн халис шабалыд мешэлери эмэлэ кэтирир, лакин чох вахт башга ағачларла гарышыг битир. Азербайчанда башлыча олараг Варташен вэ Гутташен районларында вэ Нуха районунун гэрби дар хиссэсиндэн башлаяраг Гах, Загатала, Балакен районларына гэдэр яйылмышдыр. Орадан Күрчүстан эразисинэ кечэрэк яйылмасыны давам этдирир. Гейд этлийимиз районларын аран хиссэлөрүндө шабалыд битмир. Шабалыд тэхминэн 30 м һүндүрлүкдө олан чох голту-будаглы ағачлардыр.

Говрулмуш дөнэсиндэн гәһвә һазырланыр. Етишмәмиш мейвэсиндә 1500 мг% «С» витамини, яшыл ярпагларында 800, саралмыш ярпагларында 600 ваһид «К» витамини, күлүндө паташ вардыр. Ярпагындан, көвдэсинин габыгындан вэ мейвэлэринин габыгындан гара, гонур бояг алыныр. Мейвэси чий бишмиш вэ говрулмуш һалда ейилер вэ бэ'зи хөрөклэрэ төкүлүр.

Фыстыг (*Fagus*) чинси да бу фэсилэнин мүһүм чинслэриндэн биридир. Онун Азербайчанда бирчэ нөвү вардыр ки, о да Шэрг фыстыгыдыр (*F. orientalis*). Шэрг фыстыгынын чанагында 2 дөнә үчбучагы фындыгыг вардыр вэ чанагы харачи төрөфдөн юмшаг чыхынтыларла өртүлмүшдүр. Чичеклери баччыгшөккәли чичек групуна топланмышдыр. Эркәкчиклери чохдур. Ярпаглары бүртү үзрә дүзүлмүш, салэ вэ эллипсваридир, алт төрөфлери ипәк кими түклүдүр. Шэрг фыстыгы ағачы демәк олар ки, бүтүн Гафгаз мешэлэриндә битир. Онун тәмизләнмиш мейвэсиндэн 34—37% яғ алыныр. Мейвэси говрулмуш вэ чий һалда ейилер, говрулмуш мейвэсиндэн яхшы гәһвә һазырланыр. Мешәни төшкит эдән ағачлардандыр. Яхшы яныр, тикинтиләрдә, кәми нишаатында, ипәк дэзкаһлары, түфәнк гундағы, тахта гутулар вэ саирә һазырланмасында ишләдилер. Бөйүк Гафгаз сыра дағларынын шимал-гәрб ямачларында мешә салмаг үчүн чох әһәмиһәтлидир.

Гиймәтли чинсләрдән бири дә палыд (*Quercus*)-дыр. Азербайчанда 12-йә гэдәр нөвү вардыр. Палыдын чичек групу сейрәк чичекли, ипәк охлу сырғачыг шәклиндәдир. Эркәк чичеклэринин чичекянлығы 6-дыр. Эркәкчиклери 4-дән 12-йә гэдәрдир. Диши чичеклери тәк-тәкдир вэ я бир нечәси бир ердәдир. Дишинчийн үч мейвә ярпагындан эмэлэ кәлмишдир. Мейвэлэри-



Шәкил 242 Саплаглы палыд (*Quercus longipes*).
1—чичек верән зоғу 2—мейвәзи будағы 3—эркәк сырғанын бир хиссәси, 4—тозлу-
ары 5—тозлуғун эһинә кәсийи, 6—диши чичәйи, 7—һәминг чичәйи узунуна кәсийи,
8—тумурчглу зоғу

нин дибиндә хусуси формали чанагы вардыр. Палыд ағачлары менә салмат, чылап ямачлары яшылландырмаг вә горуючу менә золагларында әкмәк үчүн чох дәйәрлидир.

Говрулмуш палыд мейвәсиндән чох гыдалы вә хусусән ушагларара файдалы олан гәһвә һазырланыр. Габыгларындан бүзүшдүрүчү маддә алыныр ки, о да мухтәлиф хәстәликләрин муәличәсиндә ишләдилір. Тахтасындан суалты тикинтиләрдә, кәми иншаатында, инәк дэзкаһлары, түфәнк гундағы, тахта гутулар вә мүрбәчүр дүлкәрлик ишиндә истифадә эдилір. Одунчагы чох яхшы янамагдыр.



Шәкил 243. Пробка палыды (*Quercus suber*)

1—ярпагы; 2—эркәк чичәк группу олан будагы; 3—диши чичәйи; 4—6 диши чичәйинин мухтәлиф вәзийәтләрдә узунуна кәсийи; 7—биткиниң зәрәрверичиси (*Cynips tinctoria*); 8—мей вәсинин занаа кәсийи; 9—ярпагы.

Палыдларын характер нөвләриндән бир нечәсини кәстәрмәк олар.

Саплаглы палыд (*Qu. longipes*). Бу палыд нөвүнүн (шәкил 242) ярпагларында 193,4 мг% «С» витамини вардыр. Мейвәсиндән гәннады сәнаеиндә ишләдилән яхшы нишаста алыныр.

Пробка палыды (*Qu. suber*) (шәкил 243). Габыгындан пробка алыныр. Ялныз рүтубәтли субтропик районларда (Ләнкәранда) битир, лакин бир сыра районларда битә биләчәйи имканыны айдынландырмаг үчүн тәврүбә апарылыр.

ГОЗЧИЧӘКЛИЛӘР (*Juglandales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын ялныз бирчә гозкимләр (*Juglandaceae*) фәсиләси вардыр. Бирәвли биткиләрдир. Чичәкянлыгы бәситдир вә я неч йохдур. Чичәкләри сүнбүлләрә вә я сырғалара топланмышдыр. Эркәк чичәкләрдә эркәкчикләр 3-дән 40-а гәдәрдир. Дишичикләри ики мейвә ярпагындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталыгы ашағыдыр, бирювалы вә я там олмаян икиювалыдыр, биртохумлудур. Маяланма халазогамиядыр, күлөк вәситәсилә тозланыр. Мейвәләри чәйирдәкмейвә я фындыгдыр. Ярпаглары тәкләләшәкилли мүрәккәбдир. Ярпаталтыглары йохдур. Үзәриндә этирли яғ вәзиләри, габыгында гәтран вардыр.

Гозкимиләр (*Juglandaceae*) фәсиләси


Гозкимиләрин эркәк чичәкләри 15 эркәкчиклидир, чичәкянлыгы 2—6 бөлүмлүдүр, тозлуглары икиювалыдыр. Диши чичәкләри өртүчүк пулчугларынын голтуғунда ерләшмишдир, чичәкянлыгы дөрддишдир. Ашағы юмурталыгдыр, ағызчыглары икидилимлидир. Ири ағачлардыр. Ярпаглары ири, тәкләләшәкилли мүрәккәбдир.

Бу фәсиләнин ән әһәмийәтли чинси гоз (*Juglans*) чинсидир. Азәрбайчанда онун бир нөвү битир ки, о да адигоздур (*J. regia*) (шәкил 244). Бу нөвә Азәрбайчанын демәк олар ки, бүтүн районларында раст кәлмәк олар. Гутгашен районундан башланмыш Балакән районуна гәдәр йолун һәр ики тәрәфи гозлудур.

Гозун етишмәмиш мейвәсиндә 1050—3036 мг%, ярпагларында 285,5 мг% «С» витамини, ярпагларында вә мейвәсинин үст габыгында (гәрзәйиндә) бүзүшдүрүчү ашы маддәси, мейвәләриндә 2—3 гамма «В» витамини вардыр. Гоз ләпәсиндә 56%-ә гәдәр гуруян яғ олур ки, онун да ейинти әһәмийәтиндән башга, бөйүк техники әһәмийәти дә вардыр. Гозун гәрзәйи вә ярпагларындан һасил едилән тунд-гәһвәйи боягдан халчачылыгда вә ипәк сәнаеиндә кениш истифадә эдилір. Ярпагларындан, һабелә будаг вә кәк габыгындан алынан ачыг гонур бояг, сачы рәңкләмәк үчүн ишләдилір. Гоз тахтасындан чох гиймәтли мөбел һазырланыр. Гоз ләпәси чий вә бишмиш һалда ейилір вә

ондан бир чох гәннады мәнсуллары һазырланыр. Гоз ағачлары йолларын, архларын вә чайларын кәнарларыны дағылмагдан горуюр, мешә золаглары салмаг вә чылпаг чәнуб ямачларыны яшыллашдырмаг учун чох әлверишли биткидир.

Гозкимиләр фәсиләсинин икинчи әһәмийәтли нүмайәндәси ялангоздур (*Pterocarya pterocarpa*). Азәрбайчанда су кәнарларында вә көлкәли мешәләрдә — Барташен, Гутташен, Нуха, Гах, Загата, Ләнкәран районларында вә саир районларда яйылмышдыр. Гоза чох охшайыр, лакин бунун мейвәси хырда. икиганадлы фындыгчыгдыр. Одунчагы чох юмшагдыр. Ялангоз ағачы арх вә чай кәнарларыны дағылмагдан горудуғу үчүн чох мүһим биткидир.



Шәкил 244. Гоз (*Juglans regia*)

1—чичәкли будаг; а—эркәк сырғачыг; б—диш чичәкләр, 2—эркәк чичәк; с вә в—эркәкчикләр; 3—диш чичәк; 4—мейвә; 5—тоғумун кәсийи.

лары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Бә'зән дә нөвбәлидир.

Биркөзкимиләр сырасынын анчаг зейтунчичәклиләр фәсиләси вардыр.

Зейтунчичәклиләр (*Oleaceae*) фәсиләси

Зейтунчичәклиләр фәсиләсинин чичәкләри актиноморф олуб, икичинсли вә я икиәвли биткиләрдир. Касачыгы дөрдбөлүмлүдүр. Тачы дөрдбөлүмлү битишикләчәклидир, я да 4 сәрбәст ләчәклидир (аз-аз һалларда чичәкянлыгы йохдур). Эркәкчикләр 2, юмурта-

лыгы юхары вә икиювалыдыр, һәр ювасында бир тохумлуг вардыр. Мейвәләри киләмейвә, чәйирдәкмейвә, ганадмейвә, вә гуту-чугмейвәдир. Коллар вә я ағачлардыр.

Фәсиләнин Азәрбайчанда 5 чинси вә 9 нөвү битир. Ән әһәмийәтли чинс вә нөвләри бунлардыр:

Зейтун ағачы (*Olea europaea*). Ағач вә я кол шәклиндә һәмишәяшыл биткидир (шәкил 245). Ябаны һалда тикан-



Шәкил 245. Зейтун ағачынын мейвәли вә чичәкли будагы, мейвәсинин узунуна кәсийи вә чичәйи

лыдыр. Ярпаглары дәривари, узунсов, нештәршәкилли, бүтөв кәнарлы, сиври учлудур, алт тәрәфи ятыг түклүдүр. Чичәкләри гыса саплаглыдыр. Касачыгы чәтин көрүнән дишлидир. Тачы ағ, һиссәләри исә күтдүр. Мейвәләри күрәви, узунсовдур, гара

рэнкдәдир. Яшыллашдырма үчүн чох яхшыдыр. Абшеронда 3000 гектара гәдәр бөйүк зейтун саһәси ярадылмагдадыр. Мейвәсиндән алынган зейтун яғында чохлу каротин, 11,0 мг% «С» витамини.



Шәкил 246. Биркөз (*Ligustrum vulgare*).
1—чичәкли будағы; 2—чичәйи; 3—мейвәли будағы

ни, 20—50 мг% «Д» витамини, 8 мг% «Е» витамини, 52,04% яр олур. Гураглыға давамлы олдуғундан гуру субтропик районларда кениш сурәтдә бечәрилир.

Биркөз вә я гурдбағры (*Ligustrum vulgare*) (шәкил 246). Азәрбайжан мешәләриндә кениш яйылмышдыр. Нүндүрлүйү

3 м-ә гәдәр олан коллардыр. Ярпаглары узунсов, нештәршәкилли, чылпаг вә парлагдыр. Чичәк групу сүпүркә шәкиндә олуб, будагларын учларындадыр, Тачы ағдыр. Мейвәси гара вә овалшәкиллидир. Ярпаглары гышда төкүлмәйәндир. Яшыллашдырма ишләри үчүн чох әлверишли биткидир.

Чичәкләри чох әтирлидир, ондан алынган әтирли яғдан әтрийятда истифадә әдилир. Ярпагларында вә көвдәсинин габығында ашы маддәси вардыр. Одунчағынын вә габығынын сую ипәйи вә юну ал рәнкә бояйыр. Мейвәси глаубер дузу илә чәһрайы зоғалы урина илә гырмызы рәнк верир. Яхшы нектар верән биткидир. Дағ мешә гуршагларында кениш яйылмышдыр. Горуючу мешә золаглары салынанда әкмәк мәсләһәт көрүлүр.

Көйрүш вә я вән (*Fracinus*) чинсинин Азәрбайжанда 5 нөвү вардыр. Онун (*F. excelsior*) нөвүнүн ярпаглары тәкләләк шәкилли, мүрәккәбдир. Мейвәси ганадмейвәдир. Мешәләрдә битир вә мешә золаглары салынанда әкмәк мәсләһәт көрүлүр.

Чаван мейвәләри туршуя гоюлур. Мейвәләриндә 14 гамма «В» витамини, ярпагларында 248 мг% «С» витамини вә әтирли яғ вардыр. Көвдәсинин габығындан көй бояг, ярпаглары вә габығындан гара бояг алыныр.

БУРУГЧИЧӘКЛИЛӘР (*Contortae*) СЫРАСЫ

Сыранын характерик хусусийәти тачләчәкләринин гөнчәдә икән бурулмуш һалда олмасыдыр. Она жерә дә бу сырая буругчичәклиләр дейилир. Онлардан һәтта бир чохунун эркәкчик тозлуғу ачылан заман бурулур. Чичәкләри дөрддаирәви, бештипли вә бәзән дә дөрдтипли, актиноморф, чох аз һалларда зигоморфдур. Юмурталығы юхары вә икиювалыдыр. Тохумлуғунун өртүйү бирдир. Ярпаглары чохунда гаршы-гаршыядыр, от, лиан, кол вә я ағач шәкиндәдиләр.

Ола билсин ки, буругчичәклиләрин вә боручичәклиләрин әдады әйни олуб, үмуми бир мәншәдән әмәлә кәлмишләр. Буругчичәклиләр өз инкишафларында актиноморфлуғу сахламыш, боручичәклиләрин бәзи фәсиләләри исә зигоморфлуға доғру инкишаф әтмишдир.

Ачылыготу (*Gentianaceae*) фәсиләси

Чичәкләри мүнтәзәм, 4—5 (тәкбир һалларда 6—12) үзлүдүр. Касачығын һиссәләри кирәмидвари дүзүлмүшдүр, гөнчә гыфшәкилли, борувари вә я тәкәрәохшар бешдилимлидир, гөнчә икән бурулмуш һалда олур. Эркәкчикләри чох вахт 5-дир. Юмурталығы юхары олуб, адәтән бирювалы вә чохтохумлудур. Мейвәси гутучугдур. Отлар, надир һалларда коллардыр. Ярпаглары адәтән гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, ярпагалтлығы йохдур.

Бу фәсиләнин Азәрбайжанда 5 чинси вә 25-ә гәдәр нөвү вардыр. Ачылыготу (*Gentiana*) вә иситмәоту (*Centaureum*)

чинсләринин даһа бәйүк әһәмиһәти вардыр. Бу ахырынчынын (*Centaurium candelabrum*) нөвү (гыздырма-иситмә оту) гыздырма хәстәлийинин мұаличәсиндә дәрман кими ишләдилір.

Ачылыготу чинсинин Азәрбайҗанда 15 нөвү яйылмышдыр. Онларын һамысы субалп вә алп чәмәнләриндә битир.

Кәндир (*Apocynaceae*) фәсиләси

Касачығы бешбөлүмлү, тачы бешдилимлидир. Эркәкчикләри 5 вә сәрбәстдир. Юмурталығы 2 мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир. 1 вә я 2 ювалыдыр. Мейвәси киләмейвә кимидир вә я гутучугшәкиллидир. Бура я бир сыра лианлар дахилдир. Бу фәсиләнин нұмайәндәләри әсас тропик өлкәләрдә яйылмышдыр. Фәсиләйә дахил олан чинсләрдән кәндир (*Apocynum*), Чәзаир бәнәвшәси (*Vinca*) мешә районларында ачыг ямачларда, вә Аралыг дәнизи өлкәләриндә олеандр вә я сөйүдкүлү (*Nerium*) битир.

Кәндир *Apocynum sibiricum*, (*Trachomitum sarmatiense*) көкүмсов көвдәләри олан, чохиллик биткидир, ярпаглары нештәршәкилли, чичәкләри чәһрайы вә я солгун бәнәвшәйдир. Мейвәси икитайлы гутучугдур. Тохумлары чох, хырда вә кәкиллидир. Нухадан Загатаһа гәдәр, һабелә Хачмаз, Дәвәчи, Ләнкәран районларында, Абшеронда вә башга ерләрдә яйылмышдыр. Кәндирдән мөһкәм, узун лифләр алыныр, бу лифләрдән кәндир тохумаг вә саирә үчүн истифадә эдилір. Тохумларында 32,4—41,45% яғ вардыр, әлиф үчүн истифадәйә ярарлыдыр. Көкү вә көвдәсиндә 6—7% ашы маддәси, ярпагларында 0,5—2,5% каучук вардыр. Сүд ширәси олан коллардыр. Ералты көкүмсов көвдәси кифайәт гәдәр гүввәтлидир. Бу ахырынчыда чохлу нишаста топланыр. Ерүстү көвдәләри тәхминән 2,5 м һүндүрлүкдә вә 1—1,5 см йоғунлугда олур. Чичәкләри икичинсли вә мүнтәзәм олуб, көвдәнин учунда ярымчәтир әмәлә кәтирмиш вә я сүпүркәләрә топланмышдыр. Көвдәсиндә гиймәтли лиф вә 2—3%-ә гәдәр каучук вардыр. Бунлардан башга биткинин тәркибиндә үрәйә тәсир эдичи маддә вардыр.

Олеандр вә я сөйүдкүлү (*Nerium oleander*) кениш бечәрилән бәзәк биткисидир: ярпаглары дәстә һалында үч-үч дүзүлүрләр. Битки зәһәрлидир, тәркибиндә строфантинә охшар маддә вардыр.

Гарангушоту (*Asclepiadaceae*) фәсиләси

Гарангушоту фәсиләсинин касачығы вә тачы бешбөлүмлүдүр. Эркәкчикләри 5-дир. Онлар саплаглары илә битишәрәк бору әмәлә кәтирмиш вә гыса сүтунчуғу әһатә этмишдир. Эркәкчикләрдә харичдән гапаг әмәлә кәтирән чыхынтылар вардыр. Дишикийи ики сәрбәст мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир. Онлар

юхарыда бирләшәрәк бешбучатлы энли ағызчыг әмәлә кәтирмишдир. Мейвәси икиярпаг мейвәдән ибарәт олуб, ачылан заман юхарыда айрылыр. Тохумларында чох мигдарда дәстә-дәстә түк олур.

Һәмин фәсиләнин нұмайәндәләринин чоху тропик өлкәләрдә битән лианлар вә коллардыр. Азәрбайҗанда лиан һалында битән ики чинси вә 7 нөвү вардыр.

Күйәмәоту (*Periploca graeca*) Бу нөвүн көвдәси габығында глюкозид вә периплокумарин адлы әтирли яғ, ярпагларында исә каучук вардыр. Көвдәсинин лифләри тохучулуг үчүн ярарлыдыр. Азәрбайҗанын дағ мешә районларында, хусусән Ләнкәранда кениш яйылмышдыр.

Япышганоту (*Cynanchum acutum*) нөвү арандан башламыш та дағәтәйи гуршагларына гәдәр чайларын, архларын вә мешәләрин кәнарларында битир. Ярпағында 2—7,5%-ә гәдәр каучук вардыр.

БОРУЧИЧӘКЛИЛӘР (*Tubiflorae*) СЫРАСЫ

Бу сыра я мухтәлиф фәсиләләр аиддир. Онларын чохунун чичәйи зигоморфдур, аз бир гисминдә исә актиноморфдур. Әксәрийәтиндә чичәкләр бешүзвү вә дөрд даирәвидир. Эркәкчикләр бир даирә үзәриндә инкишаф этмишдир вә битишик тачын һиссәләри илә нөвбәли сурәтдә ерләшир. Зигоморф чичәклиләрдә беш эркәкчикдән дөрдү, бәзиләриндә исә яһныз икиси галмышдыр.

Юмурталыглары юхары, икиювалы вә я бирювалыдыр. Тохумлуғу бирөртүклүдүр. Чичәйин һиссәләринин дибиндә нектарлыға охшар һәлгәләр олмасы, бәзиләриндә дишикийин чичәк оху ичәрисинә кирмәси вә нәтичәдә дишичикяны чичәк әмәлә кәлмәси вә саир бу кими хусусийәтләр боручичәклиләр сырасыны кениш бундан габаггы сыраларла әлағәләндирир, һәтта күлчичәклиләр сырасына да яхынлашдырыр. Көрүнүр ки, боручичәклиләр типигәдим күлчичәклиләр типиндән инкишаф этмишдир.

Боручичәклиләр сырасынын ибтидан фәсиләләри мүнтәзәм тачлы, 5 эркәкчикли вә 2-дән 5-ә гәдәр мейвә ярпағындан әмәлә кәлмиш дишичикли олур, мәсәлән, сармашыгчичәклиләрдә (*Convolvulaceae*), бадымчанчичәклиләрдә (*Solanaceae*) вә саирәдә олдуғу кими.

Сармашыгчичәклиләр (*Convolvulaceae*) фәсиләси

Чичәкләри актиноморф, касачығы 5 (бәзән 4) бөлүмлү, тачы—5 (бәзән 4) бөлүмлү, гыф вә я зәнкшәкиллидир. Эркәкчикләри 5-дир. Юмурталығы 3—4 ювалы, сүтунчуғу 1-дир, ағызчығы икибөлүмлүдүр, бәзиләринин сүтунчуғу 2-дир. Мейвәләри гутучуг олан от вә я лианлардыр. Чохунун көвдәси сарыһандыр вә онларда сүд ширәси борулары вардыр.



Шәкил 247 Әки сармашы (*Convolvulus arvensis*).

1—Виткисин тохум; 2—чичәк ачынча; 3—мөйвә, 4—чичәк, 5—чичәк диаграммы.

Азәрбайҗанда ябаны һалда 4 чинси вә 15-ә гәдәр нөвү битир. Бечәрилән нөвләриндән бири батат вә яширин картоф-дур (*Ipomoea batatas*). О, Азәрбайҗанын бә'зи районларында чох аз мигдарда бечәрилер. Вәтәни Орта Америкадыр. Ералты юмруларында «А», «В», «С» витаминләри, шәкәр, нишаста, яғ вә протеин вардыр. Ширин картоф говрулмуш вә суда биширилмиш һалда ейилир. Онун уну 1:3 нисбәтиндә бугда унуна гарышдырылдыгда чох ләззәтли вә ярашыглы чөрәк алыныр. О, эйни заманда гиймәтли ем биткисидир. Азәрбайҗанда әкилиб етишдирилмәси үчүн кениш имкан вардыр. Бә'зи нөвләри бәзәк биткисикими бечәрилер.

Сармашыг (*Convolvulus*) чинсинин Азәрбайҗанда 8 нөвү вардыр. Онлардан әкин сармашыгы (*C. arvensis* вә *C. Fischerianus*) нөвләри мәдәни биткиләрин чох зиянкар алағ отларыдыр.

Сары вә ягызыл сармашыг (*Cuscuta*¹), хлорофилсиз сарынан от вә һәтта әмзикләри илә бә'зи ағач—от биткиләринә япышыб, онларын ширәси илә гидаланан паразитдир (шәкил 248). Онун торпагдакы көкүнә о гәдәр эһтиячы йохдур, буна көрә дә көвдәсини көкләриндән айырдыгда, сарындыгы биткинин үзәриндә галан һиссәси нормал яшамагда давам әдир. Онлар әкилиб етишдирилән вә я ябаны битән бир чох файдалы биткиләрин гәддар дүшмәнләридир (шәкил 248, 249, 250 вә 251).


Гызыл сармашыглардан чохунун өзү вә тохумлары зәһәрлидир. Онларын көкүнү чичәк ачынчая гәдәр кәсмәк лазымдыр. Бунун үчүн онлары сарындыглары биткиләрлә йығыб яндырмаг вә енидән әмәлә кәлмәсинә гәтийән имкан вермәмәк лазымдыр. Онларын тохумлары торпагын үзәриндә чүчәрдийинә көрә онлара гаршы мүбаризә мәгсәдилә торпагы дәриндән шумламаг мәсләһәт көрүлүр, чүнки торпагын дәринлийинә дүшән тохумлар инкишаф әдә билмәйиб тәләф олур. Азәрбайҗанда онларын 7 нөвү мәлумдур.



Шәкил 248. Йонча үзәриндә гызыл сармашыг:


1—чичәк; 2—ачылмыш һалда тачы; 3—дишкчийи; 4—мөйвәси.

¹ *Cuscuta* чинсинин сон заманлар *Cuscutaceae* ады илә хусуси фәсиләйә айырылар.



Шәкил 249. Кәтән үзәриндә гызыл сармашыг:

1—чичәк; 2—ачылмыш һалда тачы; 3—дишмичий; 4—мейвәсә.



Шәкил 250.

Солда—кичитканын көвдәси үзәриндә сармашыг; сарда—кичитканын көвдәсиниң әкәсийиниң бир һиссәсиндә гызыл сармашыг әмзи-ләриниң кичиткан көвдәсинә сохулмасын көрүнүшү.

Бадымчанчичәклиләр (*Solanaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә мәнсуб олан биткиләрин чичәкләри мунтәзәм, касачыгы вә тачы бешдилимлидир. Эркәкчикләри 5 олуб, тачы боручуғуна япышмышдыр. Юмурталыгы 2 аз-аз һалларда 3—5 ювалы вә юхарыдыр. Сүтүнчүғу 1-дир, арызчыгы бүтөв башчы шәклиндәдир, я да надир һалларда икийә бөлүнмүшдүр. Чичәкләри тәк-тәкдир вә я дөстәләрә топланмышдыр. Ярпаглары нөв-бәлидир вә ярпагалтлыглары йохдур.

Мейвәләри киләмәйвә вә я гутучугдур, чоху сәһәрлидир. Бәзиләри дәрман биткиси, бәзиләри дә мүһүм тәрәвәз биткиси вә я



Шәкил 251. Үчярпаг йонча үзәриндә гызыл сармашыг.

Солда—гызыл сармашыгның бир көвдә парчасы үзәриндә чичәк групп вә әмзи чыхынтылары; ортада—гызыл сармашыг сарынмыш йонча; сарда—тохумлар вә олардан әмәлә кәлән чавач гызыл сармашыглар.

алағ отудур. Хейли кениш яйылмыш фәсиләдир. Азәрбайчанда 11 чинси вә 19 нөвү вардыр.

Картофкимиләр (*Solanum*) чинси. Касачыгы бешдили-ли вә я бешдилимлидир. Тачы тәкәрвари, бешдилимлидир. Эркәк-чикләри 5 (7) олуб, конус шәклиндә топланмышдыр. Мейвәси ики ювалы вә я чохювалы киләмәйвәдир.

Азәрбайчанда 6 нөвү битир. Булардан ән әһәмийәтлисиз картофдур (*Solanum tuberosum*). Бу биткинин ейинти әһәмийәтиндән башга бөйүк техники әһәмийәти дә вардыр. Айры-айры чешидләри чох мүхтәлиф шәраитдә битиб әмәлә кәл-дийи үчүн демәк олар ки, бүтүн дүняда яйылмышдыр. Русияда ералты юмуруларындан спирт алмағ үчүн 1860-чы илләрдән әти-барән бечәрилмәйә башланмышдыр.

Бөйүк Октябрь сосялист ингилабындан сонра Совет Иттифагы-нын бүтүн районларында, һәтта узағ шимал сәһәддинә вә йүк-сәк дағ туршагларына гәдәр бечәрилән бир чох чешидләри әлдә әдилмишдир. Оун бечәрилмә саһәси күндән-күнә кенишләнмәк-дәдир. Халг тәсәррүфатынын мүхтәлиф саһәләри үчүн картоф биткисинин бөйүк әһәмийәти вардыр. Картоф Азәрбайчанын дағ

районларында (Кәдәбәй, Зувандда) чох бечәрилир. Академик Т. Д. Лясенконун үсулилә чәнубда картофдан илдә ики дәфә мейсул алынмасы мәсәләси һәлләдидикдән сонра, өлкәмиздә картоф мейсулу габагкындан дәфәләрлә артмышдыр.

П а м и д о р (*Solanum lycopersicum* вә я *Lycopersicum esculentum*) бириллик от биткисидир, (лакин сон заманлар онун чохиллик сорту әлдә олунмушдур) үзәри гәтран ифраз әдән сәрт түкләрлә ертүлмүшдур. Ярпаглары бир вә я ики дәрәчәли ләләк-шәкилли бөлүмүшдур. Тачы тәкәрәохшар, сары рәнkdәдир. Мейвәләри етишән заман гырмызы, аз-аз һалларда сарымтыл олур, ири, икиювалы, чохтохумлу киләмейвәдир, мейвәләринин формасы чешидләриндән асылы олараг чох мүхтәлифдир. Русияя памидор XIX әсрин 30-чу илләриндә кәтирилмишдир. Һазырда бир тәрәвәз биткиси кими кет-кәдә даһа кениш бечәрилән мүһүм биткидир. Мейвәсиндә 146—350 гамма «А» провитамины вардыр. Чешидиндән асылы олараг «В» витамининин мигдары орта һесабла 0,8—1,6 гамма, «В₂» витаминин мигдары исә 3,5 гаммадыр, мейвәси етишдикдә бу сонунчу витаминин мигдары азалыр.

Б а д ы м ч а н (*S. melongena*) нөвүнүн вәтәни Һиндистандыр. Чичәкләри харичдән бәнөвшәйи, дахилдән сары рәнkdәдир. Мейвәси ачыг-бәнөвшәйиндән түнд-бәнөвшәйийә (бә'зән гарая чалаң рәнкә) гәдәр мүхтәлиф рәнкләрдә, бә'зән ағ рәнkdә олур, чох ири, узун, тәрсинә юмуртавари, цилиндрик вә я орагшәкилли киләмейвәдир. Азәрбайчанын әксәр районларында кениш сурәтдә бечәрилир вә ири мейвәли олур. Мейвәси бишмиш һалда вә консерв һалында ейилир.

Г у ш ү з ү м ү (*S. nigrum*) бириллик от биткисидир. Тарла-ларда, тәрәвәз әкинләриндә, зибилли ерләрдә битир. Ярпагларында олан соланин алкалоиди зәһәрлидир. Ярпагларында 89 гамма «А» провитамины вә 86,1 мг % «С» витамини, мейвәләриндә исә 16,30 мг % «С» витамини вардыр.

Б и б ә р в ә я г ы р м ы з ы и с т и о т (*Capsicum annuum*) нөвү мәдәни һалда бириллик от кими бечәрилир. Мейвәләриндә кифәйәт гәдәр «А» провитамины аз мигдарда «В» вә «С» витамини вардыр. Чох ачы олдуғуна кәрә, гурудулмушунун уну бир әдвийәт олараг гарә истиот әвәзинә хәрәйә төкүлүр. Онун бир нечә чешиди вардыр. Азәрбайчан районларынын чохунда бечәрилир.

Ш и р и н б и б ә р и н (*C. cydoniforme*) мейвәсиндә 200—350 мг % «С» витамини олур. Бу витамин консервләрдә дә галыр Яхшы чешидләринин уну ерли гычыгландырычы дәрман кими тәбабәтдә ишләдилір.

Е р к и л а с ы (*Physalis alkekengi*) чохиллик от биткисидир. Рүтубәтли ерләрдә, коллар арасында, зибилликләрдә битир. Мейвәси дуза гоюлмуш һалда вә тәзә икән ейилир. Бә'зән гайнадылмыш сую илә чамыш яғыны сары, ипәйи сары вә нарынчы рәнкләрә бояйырлар. Тәркибиндә 40—50 мг % «С» витамини, тохумларында 24—35 % яғ вардыр.

Г а ф г а з х а н ы м о т у (*Atropa caucasica*) мейвәләрдә дашлы ерләрдә битән чохиллик биткидир (шәкил 252), көкүндә вә ярпагларында атропин вардыр ки, о да көз хәстәликләриндә



Шәкил 252. Гафгаз ханымотусу (*Atropa caucasica*).

Ортада—биткинин бир будары; солда—мейвәси; сарда—чичәйинин узунуна кәсийи.

бир дәрман кими ишләдилір. Бундан башга, көкүндә бир сыра Һиосамин, скополамин, белладонин вә саир бу кими алкалоид-ләр вардыр. Тохумунда 34%-гәдәр яғ олур. Бу биткидән гырмызы-яшыл бояг алыныр.

Б а т-б а т (*Datura stramonium*) зибилли ерләрде, аравларда, үмүмийәтлө тәрәвәз әкинләриндә, йол вә арх кәнарларында, һәйәтәни саһәләрде битән бириллик биткидир. Ярпагларында вә даһа чох мигдарда тохумларында атропин вардыр. Ярпагларында 81 гамма «А» провитамины вә 209 мг % «С» витамини, тохумунда 16,7—25% яғ вардыр. Көкүндән та тохумуна гәдәр зәһәрлидир. Хүсусән чаван һейванлар едикдә тәләф олурлар. Буна көрә дә ону һәлә чох чаван икән көкүндән чыхарыб дәрин гуоя басдырмаг вә я яндырмаг лазымдыр.

Дәлибәнк (*Hyoscyamus niger*). Бириллик вә я икииллик биткидир. Ярпагларында 0,1% һиоснамин вардыр ки, тәнк-нәфәсликдә, ағрыны сакитләшдирмәк үчүн вә бәзи хәстәликләрин мүаличәсиндә бир дәрман олараг ишләдилер. Ярпагларында 64 гамма «А» провитамины вә 82,6 мг % «С» витамини, тохумларында исә 35,3% яғ вардыр. Бу да бат-бат кими зәһәрлидир. Яшайыш биналарынын яхынлығында, арх кәнарларында, әкинләрдә вә пейинли ерләрдә битир.

Бунлара гаршы чидди мүбаризә апарылмалыдыр.

Тәмбәки (*Nicotiana ructica*). Бириллик бечәрилән биткидир. Көвдәсиндә вәзили түкләр вардыр. 75—100 см һүндүрлүкдәдир. Ашағы ярпаглары саплаглы, әгли юмурташәкиллидир. Тачы яшылымтылдыр. Тохумунда 46% яғ, 11—12% лимон туршусу, ярпагларында күлли мигдарда никотин вардыр. Азәрбайчанда түгүнә нисбәтән чох мөһдуд мигдарда Губа, Варташен, Гутгашен, Гах, Загатала, Балакән, Газах вә саир районларда бечәрилир.

Түтүн (*Nicotiana tabacum*) Бириллик биткидир. Ашағы ярпагларынын саплагы ганадлы, аясы иридир. Тачы чәһрайыдыр. Азәрбайчанын бир сыра районларында ярпагынын хатиринә бечәрилир. Бир чох йүксәк кейфийәтли чешидләри вардыр. Тохумунда 45% яғ гәдәр яғ олур.

Дурһачичәкшләр (*Borraginaceae*) фәсиләси

Касачығы бешбөлүмлүдүр. Тачы адәтән бешдишлидир. Чох вахт боғазында пулчуг олур. Чичәкләри актиноморф, аз-аз һалларда энгоморфдур. Эркәкчикләри 5-дир. Юмурталыгы юхарыдыр, чохунда дәриндән дөрд парчая, аз-аз һалларда исә ики парчая бөлүнмүшдүр, онларын ортасындан сүтунчуг чыхыр. Мейвәси чохунда чәйирдәкмейвәдән вә я дөрд фындыгчыгдан ибарәтдир. Адәтән от, тәкбир һалларда кол вә я ағач шәклиндә олур. Ярпаглары нөзбә илә дүзүлмүшдүр вә сәрт түклүдүр.

Азәрбайчанда 27 чинси вә 81-дән чох нөвү битир.

Ән әһәмийәтли чинс вә нөвләри бунлардыр:

Торнифорсия (*Tornefortia sibirica*). Хүсусән дәниз кәнарларында вә чох гүмлу ерләрдә битир. Чичәйи зәфәрән ийи верир. Ондан алынан әтирли яғ әтрийятда ишләдилер.

Адиәникоту (*Echium vulgare*). Чох нектар верән биткидир, узун мүддәт чичәк ачыр. Отлу ямачларда вә мешә кәнарларында битир. Ярпагларында 68,1 мг % «С» витамини, тохумларында 27,9% тез гуруян яғ вардыр. Чичәкләриндән гырмызы бояг алыныр.

Гырмызы әникоту (*Echium rubrum*) габыгындан юну боямаг үчүн көзәл гырмызы кармин рәнкли бояг алыныр.

Һүндүр әникоту (*E. altissimum*). Тохумунда зийәрәк ягына охшар яғ вардыр.

Дәрман сүмүркәни (*Anchusa officinalis*). Гуру ямачларда битир. Чаван ярпагларындан бир тәрәвәз кими истифадә эдилер. Көкүндән гырмызы, чичәкләриндән яшыл бояг алыныр. Бундан башга бир чох нөвләри мүхтәлиф боялар истәһсалы үчүн хаммалдыр.

Фәсиләйә дахил олан әһәмийәтли чинсләрдән бири дә сучичәйидир (*Symphytum*) Бу чинсин бириллик вә икииллик нөвләри вардыр, чәмәнләрдә, чәпәр дибләриндә, арх кәнарларында, рүтубәтли ерләрдә битир. Нөвләриндән *S. causa cum* силос үчүн ярарлы яхшы ем биткиси олдуғу һалда *S. officinale* зәһәрлидир.

Сәрчәоту (*Lithospermum*) чинсинин әкин сәрчәоту нөвү (*L. arvense*), човдар вә буғда әкинләринин алағ отларындан олуб һәр ердә яйылмышдыр. Ярпагларында 102,4 мг % «С» витамини, тохумларында 18,6—20,70% яғ вардыр.

Дәрман сәрчәоту (*L. officinale*) нөвү орта дағ гуршагына гәдәр мешә кәнарларында вә кол араларында яйылмышдыр. Тохумларында 17—20% яғ вардыр.

ГУРДАҒЗЫЧИЧӘКЛИЛӘР (*Scrophulariales*) СЫРАСЫ

Һәмин сыранын боручичәклиләр сырасындан фәрғи чичәкләринин гейри-мүнтәзәм вә эркәкчикләринин аз мигдарда олмасыдыр. Юмурталыглары юхарыдыр. Мейвәярпаглары ики вә я бирдир. Тохумлуглары чохдур. Мейвәләри гутучугдур. Бу сыра я мәнсуб олан биткиләрдән бир чохунда чичәкләрин эркәкчик вә дишичикләринин ихтисара дүшдүйү айдын көрүнүр.

Сарчаоту (*Scrophulariaceae*) фәсиләси

Чохунун чичәкләри гейри-мүнтәзәм, аз-аз һалларда исә демәк олар ки, мүнтәзәмдир (шәкил 253). Касачығы аз-чох дәрин бөлүнмүш 4—5 ярпаглы, тәкбир һалларда исә икиярпаглыдыр. Тачы 4—5 дилимли, чох вахт икидодаглыдыр, үст додағы ики, алт додағы исә үч ерә бөлүнмүшдүр. Эркәкчикләри 4, надир һалларда 2 вә я 5-дир. Юмурталыгы юхары олуб, икиювалы, бәзән дә бириювалыдыр. Сүтунчуғу бәсит, там вә я икиағызчыгыдыр. Мейвәси чохтохумлу вә гутучугдур. Отлардыр, аз-аз һалларда коллар вә я ағачлардыр. Азәрбайчанда 21 чинси вә 130-а гәдәр нөвү битир. Энтомофил биткиләрдир. Нектарлыглары юмурталығын алтындадыр.

Фасиләнин чинс вә нөвләринин сайча чох олмасына бахмая-
раг әһәмиyyətлиләри азыр. Олардан ән мүнүмләрәни ашағыда-
кылардыр.



Шәкил 253. Сарачоту (*Scrophulariaceae*) фәсиләсинин
чичәк диаграммалары:
1—сығырычурғучу; 2—маһмәзанын; 3—булаготунин эркәкчиләри-
нин тәдрикән азалдым көрүнүр

Булаготу (*Veronica*) чинси. Касачыг ярпаглары
4—5 бөлүмлүдүр. Тачы дибдә битишәрәк чох гыса бору әмәлә
кәтирмишдир. Эркәкчиләри 2-дир, сүтунчугунун тәпәси (ағыз-
чығы) там башчыг шәкиндәдир. Гутучуглары янлардан басыг-
дыр, я да шишкин вә икитирәлидир. Олар вә я коллардыр. Азәр-
байчанда 40-а гәдәр нөвү битир.

Палыдлыг булаготу (*V. chamaedrys*). Мешәләрдә
битән чохиллик от биткисидир. Ярпагларында 11,4 мг % «С»
витамины вардыр.

Батаглыг булаготу (*V. anagalloides*) Батаглыгларда,
чай кәнарларында, рүтубәтли чәмәнләрдә битән чохиллик от
биткисидир.

Гайнаг булаготу (*V. beccabunga*). Батаглыгларда вә ча-
кәнарларында битән тачы аг, үчү көй биткидир. Ахырынчы ик-
нөвүн ярпаглары вәзәри кими чий һалда ейилir вә шорбая
төкүлүр.

Сығыргуйруғу (*Verbascum*) чинси. Касачығы беш-
бөлүмлү, тачы бешдилимли, гысаборулу, тәкәршәкилли, бир
аз зигәморфдур. Эркәкчиләри 5 олуб, бир бәрәбәрдә дейилдир.
габагдакылар нисбәтән узундур. онларын һамысынын вә я үчү-
нүн саплағы түклүдүр. Тозлуглары бөйрәкшәкилли, бирювалы-
дыр. Ағызчығы санчаг кимидир. Гутучуғу икитайлыдыр. Икиил-
лик вә я аз-аз һалларда чохиллик ири биткиләрдир. Азәрбайчан-
да 19-а гәдәр нөвү вардыр. Башлыча нөвләриндән кечигула-
ғынын (*V. phlomoides*) чичәкләриндән бүзүшдүрүчү вә юмшала-
дычы маддә кими истифадә эдилir. (*V. soongoricum*) нөвүнүн
ярпағында исә 73,8 мг % «С» витамини вардыр.

Үскүкоту (*Digitalis*) чинси. Касачығы бешбөлүмлү, тачы
бир аз гејри-мүнтәзәм борувари-зәнкшәкилли, кәнардан икидо-

даглыдыр. Эркәкчиләри 4-дүр. Сүтунчуғу узун бә'зән гыса, ики-
дилимли, ағызчыгыдыр. Гутучуғу юмурташәкилли икиювалыдыр.
Азәрбайчанда *D. ferruginea* вә *D. purpurea* нөвләри битир; дағ
мешәләриндә чәнкәлликләрдә битән чохиллик отлардыр (шәкил
254).



Шәкил 254. Үскүкоту (*Digitalis*).

Фармакопей тәрәфиндән рәсми гәбул олунмуш нөв *D. purpurea*
дыр. Азәрбайчанда, о, ябаны һалда битмир. Ярпағында чохлу
глюкозидләр вардыр вә бә'зи үрәк хәстәликләринин мұаличә-
синдә ишләдилir. Ону узун мүддәт гәбул этдикдә үмуми зәһәр-
ләnmәйә сәбәб олур.



Шәкил 255. Ади маһмызма
(*Linaria vulgaris*).

1—биткинин үмуми көрүнүшү;
2—чичәйи; 3—мәйәләрә; 4—чи-
чәйинин диаграммы.

D. ferruginea нөвү тәркибчә *D. Purpurea* нөвүнә охшайыр. *D. nervosa* нөвү исә аз кейфийәтлидир.

А д и м а н м ы з ч а (*Linaria vulgaris*) (шәкил 255), гурудулмуш ярпагынын 180 гамма «А» провитамины вә 100—170 мг % «С» витамини вардыр.

Г у р д а г з ы в ә я и т а г з ы (*Antirrhinum majus*) нөвү чохиллик от биткисидир. Чичәкләри будагларын учунда сүнбүл шәкиндәдир. Тачы ири вә икидодаглы олуб, тач богазыны кип өртүр. Чүчүләр нектар алмаг үчүн додагларыны аралайыр. Тачын рәнки чох мүхтәлиф олур. Көзәл бәзәк биткиләриндәдир. Азәрбайчанын бүтүн районларында дибчәкләрдә вә һәйәтләрдә бечәрилир.

Күнчүт (*Pedaliaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икидодаглыдыр, ашағы додагынын алты бир гәдәр кисә кимидир. Чичәкләри голтугларда тәк-тәк вә я үч-үч ерләшмишдир. Ярпаглары бүтөв, нештәршәкилли, дибдәкиләр гаршы-гаршыя, юхарыдакылар нөвбә илә дүзүлмүшдүр. Көвдәси япышганлы вәзили түкләрлә өртүлмүшдүр. Буғумлары чох гысадыр. От биткиләриндир.

К ү н ч ү т (*Sesamum orientale*) нөвүнүн әсл вәтәни Африка вә һиндистандыр. Ябаны һалда мәлум дейилдир. Бириллик әкилиб бечәрилән мэдәни биткидир. Мейвәси узунсов гутучугдур. Тохумлары хырда, ясты, юмуртавари, ағ, гәһвәйи вә я гарадыр, тәркибиндә 55% емәти яғ вардыр. Тохумундан күнчүт һалвасы һазырланыр. Күнчүт яғынын гурумундан (һисиндән) Чин мүрәккәби истәһсал эдилир. Азәрбайчанын гуру субтропик районларында әкилир. Орта Асияда, Загафғазияда, Крымда вә Шимали Гафғазда бечәрилир.

Додагчичәкчиләр (*Labiatae*) фәсиләси

Чичәкләри зигоморфдур, аз-аз һалларда демәк олар ки, актиноморфдур. Касачығы зәнкәохшар вә я борушәкилли, бешдишли, мунтәзәм вә я икидодаглыдыр. Касачығын үст додағы үчдишли, алт додағы икидишлидир. Тачы икидодаглыдыр, онун үст додағы икибөлүмлү, алт додағы үчбөлүмлүдүр, я да тач бешдилимлидир. Эркәкчикләри 4-дүр, онларын икиси узун, икиси исә гысадыр, аз-аз һалларда эркәкчикләрин икиси ихтисар олундуғундан ики-еркәкчилик олур. Юмурталығы юхарыдыр. Дишичийи ики мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, ләкин икинчи аракәсмә әмәлә кәлдийиндән 4 юзәли олур, буна көрә дә мейвә етишәндә дәрлфиндытчыға бөлүнүр. Сүтүнчүгү юмурталығын дилимләри арасындан чыхыр. Ағызчығы икидилимлидир, аз-аз һалларда бүтөвдүр. Көвдәси дәрлтиллидир. Ярпаглары гаршы-гаршыядыр. Чичәкләри ярымчәтир вә я дәстә шәкиндә топланараг сүнбүлвари

вә я салхымвари, аз-чох сых чичәк группу әмәлә кәтирир. Демәк олар ки, һамысы әтирли, яғлы биткиләрдир.

Азәрбайчанда 32 чинси вә 160-а гәдәр нөвү битир.

Башлыча чинс вә нөвләри бунлардыр:

Г а р а г ы н ы г, г а р а о т (*Origanum vulgare*) нөвү Азәрбайчанын дағ гуршагларында кениш яйылмышдыр. Әтирли ярпагларындан квасы яхшылашдырмаг вә дуза гоюлан хияра дад вермәк үчүн истифадә эдилир. Бундан башга араға салыныр. Тәркибиндә 2—7% әтирли тимол яғы, 129,2—258 мг % «С» витамини, тохумларында 29,15% яғ вардыр. Лаклы боялара гатылан бу яғын бөйүк сәнаә әһәмийәти вардыр. Көвдәси, ярпаглары вә чичәкләриндән дәмир дузлары васитәсилә гара бояг алыныр. Яхшы нектар верән биткидир.

К ә к л и к о т у в ә я к ә к о т у (*Thymus*). Бу чинсин нөвләри Азәрбайчанын бүтүн дағ районларында, дашлы-чынғыллы ямачларда чох кениш яйылмышдыр. Ярпаглары әтир вермәк үчүн хөрәйә вә мүхтәлиф спиртли ичкиләрә гатылыр. Чичәкләри чох яхшы нектар верәндир. Бүтүн нөвләриндә мүхтәлиф тәркибли әтирли яғлар вә чохунда тимол вардыр. Бу бәлгәмкәтиричи дәрман кими ишләдилир. Чаван зоғларында 54,5 мг %-ә гәдәр «С» витамини олур.

А р ы о т у, л и м о н о т у в ә я б ә д р ә н ч (*Melissa officinalis*) Азәрбайчанын мешәли ерләриндә битир. Тәркибиндә лимон ийи верән яғ вардыр. Бир сыра гиймәтли спиртли ичкиләрә әтир вермәк үчүн ишләдилир. Чохлу бал верән биткидир. Отунда 150 мг % «С» витамини вардыр. Ярпагларындан әтирли мелис яғы алыныр ки, ондан да әтрийятда вә ейинти сәнаәиндә истифадә эдилир.

Д а г н а н ә с и в ә я б о з к ә к о т у (*Ziziphora*) чинсинин *Z. tenuior* вә башга нөвләри емәйә дад зермәк үчүн ишләдилир.

С ү р в ә в ә я а д а ч а й ы, м ә р й ә м о т у (*Salvia*) чинсинин нөвләри яхшы нектар верән биткиләрдир. Тәркибләриндә хейли әтирли яғ вардыр.

А й ы г у л а г с ү р в ә (*S. aethiopis*) нөвүнүн тохумунда 23% яғ вардыр. Гафғаз сүрвәси (*S. officinalis*) көнчүлүк сәнаәиндә бир ашы материалы кими вә ярпағы дәрман олага ишләдилир. Мешә сүрвәси (*S. nemorosa*) нөвүнүн ярпагларында 47,7 мг % «С» витамини, тохумунда исә 19% яғ вардыр.

П а р л а г с ү р в ә (*S. sclarea*) нөвүнүн ярпағы да дәфнә ағачынын ярпағы кими хөрәйә дад вермәк үчүн ишләдилир. Чичәкләрини шәкәр илә гычгыртдыгда мүшк әтирли, сәрхошәди-чи ички алыныр. Бундан башга, чахыра вә пивәйә мүшк әтри вермәк үчүн ишләдилир. Ярпагларында 14,3 мг % «С» витамини вардыр. Тохумунда 31%-ә гәдәр зәйәрәк яғына охшар яғ вардыр.

Я р п ы з в ә я н а н ә (*Mentha*). Бу чинсә мәнсуб олан нөвләрин һамысында мүхтәлиф әтирли яғлар вардыр. Онлардан

сабын, эстрийт, бээк, гениаты вә дәрман сәнаеиндә истифадә эдилір. Биздә бу биткинин сәнае әтияты бөйүкдүр.

Су ярпызы (*M. aquatica*). Яхшы бал верәндир, ярпағында 73 гамма «А» провитамины вардыр.

Узунярпаг ярпыз (*M. longifolia*). Тәркибиндә ментол, ярпагларында 81,2—147,4 мг % «С» витамини вардыр.

Нанә (*M. piperita*) нөвүнүн яғында 38—65% ментол олду- гундан ментол алмаг үчүн әсас хаммал сайылыр. Ментолун 3—5% спиртлә мәйлулу, икинчи вә үчүнчү дәрәчәли донмаларын мүаличәсиндә ишләдилір.

Рейһан (*Ocimum*) чинси. Бу чинсин камфора рейһаны (*O. canum*) нөвү бириллик отдур. Ярпаглары овалшәкилли, кәнарлары бир гәдәр дишлидир. Чичәкләри хырда вә ағ олуб, тәпәләрдә сых груплара топланмышдыр. Биткинин һәр һансы һиссәсини әлдә овушдурдугда түнд камфора ийи верир. Ябаны һалда Африканын тропик ерләриндә вә Шәрги Һиндистанда би- тир. Соват Иттифағында бу рейһан нөвү камфора истәһсалы үчүн Украинада, Крымда вә Шимали Гафгазда кениш миғясда әкилиб бечәрилыр. Тәркибиндә 80%-ә гәдәр әтирли камфора яғы вардыр. Камфора тәбабәтдә чох ишләдилір. Ондан сәнаеин бәзи сәһлә- риндә дә кениш истифадә эдилір.

(*O. gratissimum*) нөвүнүн ярпагларында михәк яғы вардыр. Бир нөвү дә яхшы тәрәвәз биткисидир.

Тәрәвәз рейһаны (*O. basilicum*) хәрәйә вә шорабалара- дад вермәк үчүн ишләдилір.

Ер сармашығы (*Glechoma hederacea*) нөвү Азәрбай- чанын рүтубәтли районларында чәмәнликләриндә вә зибилли ерләрдә битир. Чаван ярпагларыны шорабая төкүрләр. Яхшы бал верән биткидир. Онда «А» вә «С» витаминләри вә бир дә 0,03—0,06% әтирли яғ вардыр.

Иширган (*Galeopsis bifida*). Тохуму чох әтирлидир. Бир әдвийят кими ишләдилір, яхшы бал верән биткидир. Ярпагларын- да 108 гамма «А» провитамины, тохумунда исә 40—50%-ә гәдәр гуруян яғ вардыр.

Баллыбаба вә ядаламаз (*Lamium*). Онун (*Lamium album*) нөвү (шәкил 256) вә башга нөвләри, хусусән гыр- мызычичәк даламаз (*L. purpureum*) нөвү яхшы бал верән биткиләрдир. Бунларын ярпагларында 137—147 гамма «А» про- витамини вә кифайәт гәдәр «С» витамини вардыр.

Халлы баллыбаба (*L. maculatum*) нөвүнүн чаван ярпаглары шорабая төкүлүр.

Иланбашыоту (*Dracopcephalum moldavicum*) нөвү бәзән зибилли ерләрдә битир. Тәркибиндә лимон ийли әтирли яғ, 70 гамма «А» провитамины вардыр. Ондан ейинти сәнаеиндә вә эстрийтда истифадә эдилір. Тохумунда пий яғлары вардыр.

Поруг вә я гурбағаоту (*Stachys palustris*) нөвү батаглыгларда битир. Көкү унлу вә әтирлидир, бишмиш һалда

чох ләззәтли олур, гышда топлайырлар, унундан чөрәк биширмәк олар. Тохумунда 25,9% яғ вардыр. Онун мешә гурбағаоту (*S. sylvatica*) нөвүнүн тохумунда 28,15% яғ вардыр. Биткидән чыыл бояг алыныр.



Шәкил 256 Ағ баллыбаба (*Lamium album*).

1—биткинин харици көрүнүшү, 2—чичәйинин узунуна кәсәли; 3—әркәкчикләри; 4—чичәйинин диаграммы.

Дәрманбалоту, мәрчаноту (*Betonica officinalis*). Мешәләрдә битир. Тәркибиндә ачы маддә вә ашы маддәси вардыр. Тохумунда 42% пий яғы варды.

Пишикнанәси (*Nepeta*) чинси. Бу чинсин бүтүн нөвлә- риндә мүхтәлиф әтирли яғлар олур. (*N. cataria*) нөвүнүн тәрки- биндәки әтирли яғ ейинти сәнаеиндә ишләдилір.

Әсәл пишикнанәси (*N. transcaucasi*), хәрәкләрә дәд вермәк үчүн ишләдиләр. Ондан алынған әтирли яғдан ликйор вә конякларын дадыны яхшылашдырмағ үчүн истифадә әдиләр. (*N. nuda*) нөвүнүн ярпағларында 124,2 мг % «С» витамини, тохумунда 20,34% пий яғы вардыр.

Ләчәкәтү (*Lycopus europaeus*) батағлығ ерләрдә битир. Көкү, ярпағы вә көвдәси көнү ашыламағ үчүн ярарлыдыр. Ярпағларыннан гара вә гара-гәһвәйи бояғ алыныр.

Сығырдили (*Ajuga pseudo chia*). Алағ отларынандыр. Пиненә охшар әтирли яғы вардыр.

Сүрүнән сығырдили (*A. reptans*) нөвүнүн ярпағлары вә чазан көкләри салат вә көйәрти ки-ми шорабая төкүлүр. Ярпағларында 52 гамма «А» провитамины вардыр.

Итоту (*Marrubium vulgare*). Гуру вә зибилли ерләрдә битир. Бүтүн һиссәләри көнү ашыламағ үчүн ярарлыдыр. Яхшы бал верән биткидир.

Чөдүкәтү, Зопа (*Hyssopus angustifolius*).

Дашлы ерләрдә битир. Ярпағлары дәд вермәк үчүн хәрәйә төкүлүр. Биткинин тәркибиндә кәскин әтирли яғлар вардыр. Һәлә өйрәшилмәмеш дир.

Кәһрә, Сүмүркәноту (*Orobanchaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә дахил олан биткиләрин һамысы хлорофилсиз, ярпағлары пулчугшәкилли, көвдәләри әтли, паразит биткиләрдир. Чичәкләри булаготу фәсиләси типиндәндир. Бунлар көвдәнин тәпәсиндә чичәк групуна топланмыш, аз-аз һалларда тәк-тәкдир, иккинчилидир. Касачығы 2—5 дилимлидир. Тачы зигоморф, икидәдағлы, 2—5 дилимлидир. Эркәкчи-ләри 4-дүр. Юмурталығы юхары вә бирювалыдыр. Сүтунчуғу бирдир. Мейвәси чох вә хырда тохумлу гүтү-чүгдүр. Тохумлары суварма заманы торпаға гарышыб орада чү-чәрир.

Бу фәсиләнин нөвләри чичәкли биткиләрдән бир чохунун паразитләридир. Бунунла белә бәзиләри ядһыз мүййән битки

нөвүнүн паразити олуб, тәкчә һәмин биткинин үзәриндә паразит-лик әдир.

Азәрбайҗанда 4 чинси вә 59-а гәдәр нөвү вардыр. Бунлардан күнәбахан сүмүркәноту (*Orobanche simana*), күнәбаханын, түтүнүн, бә'зән памидорун, йовшанын вә саирәнин көкү үзәриндә паразит һәят кечирир (шәкил 257). Чәтәнә сүмүркәноту (*O. ramosa*) чәтәнәнин, түтүнүн вә тәрәвәз биткиләрини көкләри үзәриндә паразитлик әдир. Бостан сүмүркәноту (*O. aegyptiaca*) әсас әтибарилә бостан биткиләрини үзәриндә яшайыр. Бәзиләри мөшә ағачларынын көкләри үзәринә һаусториялары (әмзикләри) васитәсилә япышарағ, саһибиниң ширәсини сорур вә онларын гурумасына сәбәб олур. Буна көрә дә онлары чичәк ачынчая гәдәр тәләф әтмәк лазымдыр.

Говуглулар (*Lentibulariaceae*) фәсиләси

Бу фәсилә булаготу фәсиләсинә чох охшайыр. Ондан башлыча фәрғи юмурталығынын бирювалы олмасы вә тохумларынын ортада тохумдашына бирләшмәсидир. Мә'лум олдуғу ки, булаготу фәсиләсиниң тохумлары мейвә ярпағынын диварына бирләшмиш олур. Говуглулар фәсиләсиниң тохумлары, эндосперм-сиздир, әксәриййәти суда вә батағлығларда яшәян һәшәрәтәйән биткиләрдир.



Шәкил 258. Ади говугча (*Utricularia vulgaris*).
1—говугунун харичдән көрүнүшү; 2—булағы үзәриндә ярпағлары вә говуглары; 3—говугун кәсийи.

Азәрбайҗанда бу фәсиләнин ялһыз говугча (*Utricularia*) чинсиниң бирчә нөвү вардыр ки, о да ади говугчадан (*U. vulgaris*) ибарәтдир (шәкил 258), ән чох Ләнкәранда дур-ғун суларда битир.

Бағаярпағлылар (*Plantaginaceae*) фәсиләси

Бағаярпағлылар фәсиләсиниң чичәкләри ики вә я бирчин-лидир. Касачығы дөрд вә аз-аз һалларда үчбөлүмлүдүр, галын-дыр. Тачы мүнтәзәм, пәрдәвари, дөрдбөлүмлүдүр. Эркәкчи-ләри 4 вә узунсаплағлыдыр. Юмурталығы бирювалы вә я икиювалы,

Шәкил 257. Үчярпағ йовшанын көкү үзәриндә паразит яшәян кәһрәоту.

аз-аз халларда яланчы дөрдювалыдыр. Мейвəsi фындыгыг вə я гутучугдур.

Бу фəсилəнин ССРИ-дə ялыз бағаярпагы (*Plantago*) чинси битир. Оун Азəрбайчанда 13-ə гəдər нөвү вардыр. Элиярпаг бағаярпагынын (*P. major*) ярпагларында 5—80 гамма «А» провитамины вə 41,2 мг% «С» витамини, тохумларында исə 17—24%-ə гəдər яғ вардыр. Бүтүн битки һиссəлəri ашы маддə-си илə зəнkindир, дəрийə юмшагыг вə мөһкəмлик верир.

Нештəрярпаг бағаярпагы (*P. lanceolata*) вə орта-ярпаг бағаярпагы (*P. media*) нөвлəринин (шəкил 259) ярпагларында «А» провитамины вə «С» витамини вардыр. Ярпаг-лары салат кими ейилир.

ХАШХАШЧИЧƏКЛИЛƏР (*Rhoedales*) СЫРАСЫ

Һəмин сыра филокениясы э'тибарилə *Ranales* сырасына яхындыр. *Ranales* сырасына дахил олан *Berberidaceae* фəсил-лəсинин эи гəдим *Glaucidium* чинсиндə олдуғу кими һəм *Berberidaceae*, һəм *Ranunculaceae*, һəм дə хашхашкимилəр (*Papaveraceae*) фəсилəсинин əламəтлəri вардыр.


Glaucidium чинсинин биткилəриндə хашхашкимилəрдə олдуғу кими, тєзтөкүлən вə рəнкли 4 чичəкянлыгы вə бурғу үзрə дүзүл-мүш чохлу эркəкчик вə *Ranunculaceae* фəсилəсиндə олдуғу кими, ири бармагвари кəсилмиш ярпаглары вардыр.

Гейд эдилмəлидир ки, бə'зи ботаниклəр *Papaveraceae* фəси-лəсиндəки чохəркəкчиклийи икинчи дərəчəли əламəт һесаб эдир-лəр. Лакин онлар өзлəri дə *Rhoedales* вə *Ranales* сыраларыны *Berberidaceae* фəсилəсиндən айырырлар. *Rhoedales* сырасынын *Papaveraceae* фəсилəси *Ranales* сырасына даһа чох яхындыр.

Хашхашчичəклилəр сырасынын чичəклəri тəк-тəк вə я сал-хымвари чичəк групуна топланмыш олуб, икичинслидир, мүнтə-зəм вə я гейри-мүнтəзəмдир. Чичəкянлыгы икигəтдыр, 2—4, аз-аз халларда 5-үзвлүдүр. Эркəкчиклəri чохдур, бə'зən дə бир нечə-дир, сəрбəстдир вə я аз-чох дəстə һалында битишмишдир. Юмур-талыгы ики вə я чохлу мейвə ярпагындан əмəлə кəлмишдир, син-карпдыр, юхарыдыр, бирювалыдыр вə я икинчи аракəсмəлəр əмəлə кəлмəsi нəтичəсиндə чохювалыдыр. Тохумлуглары дивара битишмишдир (париеталдыр) вə икиөртүклүдүр.

Бу сыранын нүмայəндəлəринин чоху, ярпаглары нөвбəли олан отлардыр. Дəмəк олар ки, бүтүн чинслəриндə буғумлу вə ичəри-синдə ағ вə я сарымтыл-нарынчы сүд ширəsi олан сүд борулары вардыр.

Бу сырая ашағыдакы фəсилəлəр дахилдир: х а ш х а ш к и м и л ə р (*Papaveraceae*), к ү в ə р ч и ч ə к л и л ə р (*Capparidaceae*), х а ч ч и ч ə к л и л ə р (*Cruciferae*) вə г у з у о т у к и м и л ə р (*Resedaceae*).



Шəкил 259. Ортаярпаг бағаярпагы (*Plantago media*).

1—биткинин харижи кəрүнүшү; 2 вə 3—протокиней чичəйи; 4—ачылмамыш гуту-чуғу; 5—ачылмыш гутучуғундан тохумларын сəпилмəsi; 6—чичəйинин диаграмы

Хашхашкимиләр (Papaveraceae) фәсиләси

Чичәкләри мунтәзәм вә я гейри-мунтәзәмдир. Қаса ярпаглары 2, ләчәкләр 4, эркәкчиләри адәтән чохдур, бә'зән 4 вә я 2 олур. Юмурталығы 2—16 вә битишиқдир, чох вахт сәрбәст мейвә ярпагларындан әмәлә кәлмишдир, юхарыдыр. Адәтән бириовалыдыр. Тохумлуглары чохдур. Мейвәләри гутучуг, тәқбир һалларда буйнуз вә я фындыгчыгдыр. Ярпаглары бурғу үзрә вә я гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Сүд ширәси олан биткиләрдир.

Ясты эркәкчик (*Platystemon*) (шәкил 260) чинси адәтән *Ranales* сырасына чох яхындыр. Онун бирчә *P. californicus* нөвү вардыр. О, сүд ширәси олан *Ranunculaceae* фәсиләсинин бә'зи нүмайәндәләринә охшаян вә онларын гоһуму сайылап бириллик биткидир. Онда һәм *Papaveraceae*, һәм дә *Ranunculaceae* фәсиләләринә аид хусусийәтләр вардыр.

Ясты эркәкчик биткисинин касачығы 3 ярпагчыглыдыр, ләчәкләри ики даирә үзрә үч-үч дүзүлмүшдүр. Эркәкчиләри чох олур, саплаглары кенәлмишдир, дишичийи узун вә сәрбәст сүтунчуглудур. Дибдән ялныз янлары ыла бирләшиб апокарп кинесей әмәлә кәтирмишдир, онлар мейвә етишән заман бир-бириндән тамамилә айрылыр. Һәр мейвәчийин тохумлары бир сырая дүзүлмүшдүр вә мейвәчийин дивары тохумларын арасында галылашмышдыр. Мейвәчикләри чох вахт биртохумлу һиссәләрә бөлүнүр. ССРИ-дә битмир, онун ялныз филокенетик әһәмийәти вардыр.

Хашхашкимиләр фәсиләнин Азәрбайчанда 7 чинси вә 41 нөвү вардыр. Ән әһәмийәтли чинс вә нөвләри буқлардыр:

Зийилоту вә я дәмровоту (*Chelidonium majus*) көһнә даш диварларда, мешә кәнарларында, әкинләрдә вә зибилли ерләрдә битән вә нарынчы сүд ширәси олан чохиллик отдур. Мейвәси узунуна ики тай ачылан буйнузаохшар гутучугдур. Биткинин тәркибиндә 49—100 гамма «А» провитамины, ярпагларында 83,4—171 мг % «С» витамини, тохумунда 40—60% гуруян яғ вардыр. Биткидән һазырланан уңла металлларын пасы тәмизләнир. Биткинин бүтүн һиссәләри зәһәрлидир.

Хашхашлар (*Papaver*) чинси. Бириллик, икилик вә я чохиллик отлардыр. Сүд ширәләри ағдыр. Азәрбайчанда 20-йә гәдәр нөвү битир.

Ади хашхаш (*Papaver somniferum*) Азәрбайчан районларындан бир чохунда бечәрилмәси мүмкүндүр. Етишмәмиш гутучугундан тирйәк алыныр. Тирйәкин тәркибиндә 26-я гәдәр алколоид вардыр. Онлардан ән мүһүмләри морфин, папаверин, кодеиндир. Бу маддәләр мәркәзи синир системинә тәсир эдир. Тәбабәтдә юху кәтирмәк, ағрыны кәсмәк, тәнәффүсүн позулмасынын вә ган тәзийгинин артмасынын гаршысыны алмаг үчүн, һабелә бир чох бапта хәстәликләрдә ишләдилир. Етишмәмиш гутучугда 24,9 мг % «С» витамини вә тохумунда чохлу яғ вардыр.

Мүстәмләкәчиләр Шәрг өлкәләриндә бөйүк газанч әлдә этмәк мөгсәдилә хашхашын кениш мигяса бечәрилмәсинә вә тирйәк истәһсалына имкан ярадыр, онун ачыг сатышына йол верирәр. Беләликлә, Шәрг өлкәләриндә миллионларла адам тирйәк-



Шәкил 260. Ясты эркәкчик (*Platystemon californicus*).

1—биткинин харичи көрүнүшү; 2—ләчәйи; 3—дишичийи вә дахили эркәкчийи; 4—харичи эркәкчийи; 5—мейвәси; 6—чичәйинин диаграммы.

дән зәрәр чәкмишдир. Инди империализмдән азад олмуш Шәрг өлкәләриндә тирйәк истәһсалы вә сатышы чидди нәзрәт алтына алынмышдыр.

Ири чичәк лалә (*P. orientale*). Чаван чүмәртиләри чий һалда емәлидир, ону туршуя да гоймаг олар. Тәркибиндә 16% мүх-

тәлиф сулу карбонлар вә чохла «С» витамини, көвдә вә ярпагларында исә мұхтәлиф алкалоидлар вардыр. Олар синир системинә стрихнин кими тәсир эдир. Бәзәк биткиси олараг бечәрилмәйә лайигдир. Ябаны һалда Нахчыванын дағ районларында (яйлағларда) яйылмышдыр.

Чөл лаләси (*P. rhoeas*). Тохумунда 44% яғ вардыр. Бәзәк биткиси олараг бечәрилмәйә лайигдир.

Әкин лаләси (*Roemeria refracta*) Тахыл тарлаларынын алағ отудур. Ярпагында 39,6 мг % «С» витамини вардыр.

Шаһтәрә (*Fumaria*) чинсинин чичәкләри гейри-мүнтәзәм, эркәкчикләри 2, мейвәләри күрәви фындыгчыгдыр, сүд ширәси йохдур, бириллик отлардыр. Бәзән бу чинс ярымфәсилә кими айрылыр. Азәрбайчанда бу чинсин 6 нөвү вардыр.

Дәрман шаһтәрәси (*Fumaria officinalis*). Тарлаларда, тәрәвәз әкинләриндә, зибилли ерләрдә битир. Күлүндә поташ вардыр. Эл арасында ондан гыздырманы анағы салмағ үчүн истифадә эдилир.

Fumaria Schleicheri вә *F. Vailantii* нөвләри зибилли ерләрдә битир. Чаван көвдәләри вә ярпаглары бир тәрәвәз кими ейилир. Бунлардан биринчи нөвүн ярпагларында 240—370 мг %, икинчи нөвүнкүндә исә 77,8 мг % «С» витамини вардыр.

Хачичәклиләр (*Cruciferae*) фәсиләси

Хачичәклиләр фәсиләси нөв этибарилә хейли зәнкиндир. Чичәкләринин эркәкчикләри 6 әдәдир, бунлардан харичдәки 2-си узун, дахилдәки 4-ү исә гысадыр. Бу ахырынчылар йәгинки, ики дахили эркәкчикдән һәр биринин икийә парчаланмасы нәтижәсиндә әмәлә кәлмишдир.

Чох вахт ики ян касачыг ярпагынын дибиндә кисәйә бәнзәр чыхынтылар олур вә орая нектар маддәси топланыр. Рүшейм һалындакы маймызаохшар чыхынтылар нисбәтән сабит әламәт олдуғундан, хачичәклиләрин систематикасында онларын хусуси әһәмийәти вардыр.

Мейвәләриндә әдәтән ики сыра тохумлуғу олур. Тохумлуғлары арасында яланчы аракәсмә әмәлә кәлир. Беләликлә, мейвә икниовалы буйнуз вә я буйнузчуг шәклини алыр, аз-аз һалларда мейвәләри фындыгчыгдыр. Тохумлары чохунда эндоспермсиэ, яғлы вә әтирлиндир.

Фәсиләнин нүмайәндәләринин чоху отдур, аз-аз һалларда коллардыр. Ярпаглары нөвбәлидир вә ярпагалтлыглары йохдур. Чоху энтомофилдир. Векетатив органлары чох полиморфдур, мәсәлән, гырмызы вә ағ турп нөвләринин бир чох чешидләриндә ана көк мұхтәлиф шәкилдә йоғунлашмышдыр, кәләм чинсинин мұхтәлиф нөв вә чешидләриндә көвдә, ярпаг вә һәтта чичәк груплары олдуғча мұхтәлиф шәкилләр алмышдыр вә с. Белә мұхтәлифлийә сәбәб онларын мұхтәлиф шәрантдә бечәрилмәсидир.

Бәзиләриндә эркәкчикләрин вә дишичийин дибиндән чичәк ятағы узаныр.

Хачичәклиләрин чоху тәрәвәз, бәзәк вә я дәрман биткәләридир, бәзиләри исә алағ отудур.

Азәрбайчанда 65 чинси вә 205-дән артыг нөвү битир. Ән әһәмийәтли чинс вә нөвләри бунлардыр:

Бозалағ вә я вәзәри (*Lepidium*) чинси. Онун чөл вәзәрис (*L. campestre*) бозалағоту (*L. draba*) вә алағ бозалағоту (*L. rudemale*) нөвләри кениш яйылмышдыр вә тәркибиндә күкүрд олан әтирли яғлар верир.

Әнлиярпаг бозалағын (*L. latifolium*) тохумунда мирозин вардыр. Вәзәринин (*L. sativum*) тохумунда бензол, хардал яғы вә мирозин олур. Вәзәри дадлы көйәртидир вә тохуму мүййән чөрәкләрә гатылыр. (*L. campestre* вә *L. latifolium*) нөвләринин ярпаглары вәзәри ярпағы кими ейилир, (*L. draba*) тохумунда әтирли ачы яғ вардыр, буна көрә дә истиоту әвәз әдә биләр.

Кәләмкимиләр (*Brassica*) чинси. Бу чинсә мәнсуб олан хардал (*B. napus*) вә чөл кәләми (*B. campestris*) нөвләринин тохумунда хардал яғы, эләчә дә пий яғлары вардыр. Ябаны кәләм (*B. elongata*) гуру ямачларда вә чөлләрдә битир. Тохумунда емәк үчүн ярарлы олан 24% яғ вардыр. Баш кәләмдә (*B. oleracea var. capitata*) вә күл кәләмдә (*B. oleracea var. botrytis cauliflorus*) исә 0,32 гамма «В» витамини вардыр. Онларда мұхтәлиф мигдар «С» вә «А» витаминләри дә олур.

Шүвәрән (чығчыға) (*Sisymbrium*) чинси нөвләриндән дәрман шүвәрәни (*Sisymbrium officinale*) зибилли ерләрдә, чәмәнләрдә битир. *S. altissimum* вә *S. Loeselii* нөвләринин ярпаглары бир тәрәвәз вә көйәрти кими ейилир. *S. iri* нөвүнүн ярпагында 38,8—36,2 мг %, Лезелшүвәрәнинын (*S. Loeselii*) көкәтрафы ярпагларында 117—155,3 мг % «С» витамини вардыр. Тохумларында 30%-а гәдәр пий яғлары олур. Шүвәрәнин ярпагларындан сары бояғ алыныр.

Сарымсаготу (*Alliaria officinalis*) мешәлик ерләрдә битән вә 20—100 см һүндүрлүкдә олан икниллик голлу-будаглы биткидир. Ярпагындан кәскин сарымсағ ийи кәлир. Буна көрә дә сарымсағы әвәз әдә биләр. Тохумунда 30% яғ вардыр. Көкүндән алынған яғда мұхтәлиф сульфидләр олур.

Индау (*Eruca sativa*) зибилли ерләрдә, әкинләрдә битир. Ярпаглары салат кими ейилир вә шорабая гоюлур. Тохуму хардалы әвәз эдир, тәркибиндә 33,2% яғ вардыр.

Чөл хардалы (*Sinapis arvensis*) Азәрбайчанда әкинләрин арасында вә отлағларда битән чох яйылмыш алағ отудур (шәкил 261). Чаван ярпагларындан салат вә испанағ кими истифадә эдилир. Тохуму хардал кими ишләдилир. Яхшы бал верән биткидир. Тохумундан алынған яғ емәйә ярарлыдыр.

Ярғаноту вэя гуштэраси (*Thlaspi arvense*) нөвү төпөлөрдө, кол араларында вэ зибилли ерлөрдө битэн бириллик биткидир. Тохумунда 33% емэйэ ярарлы яғ, ярпагларында исэ 154,0 мг % «С» витамини вардыр.



Шәкил 261. Чөл хардалы (*Sinapis arvensis*).
1—биткиниң үмүмү көрүнүшү; 2—жөндөсинин бир ниссәси (мейвәлери илэ)

Гушәппәйи (*Capsella bursa pastoris*) нөвү (шәкил 262) чох кениш яйылмыш алаг отудур. Ону туршәнк вэ кичиткан кими шорбая төкүрләр. Тохуму хардалы эвәз әдир. Ганкәсичи хусусийәти вардыр. Ярпагында 198 мг %-ә гәдәр «С» витамини олур.



Шәкил 262. Гушәппәйи (*Capsella bursa pastoris*).
1—битки, 2—мейвәси


Лаччичәклиләр фәсиләсинә дахил олан бәзәк биткиләриндән бунлары көстөририк:

Сары бәнәвшә вэя шәбкүлү (*Cheiranthus Cheiri*) ачыг-сары, түнд-сары, михәйи, түнд-михәйи рәнкли вэ кәскин хош ийли чохиллик биткидир, бағларда вэ күллүклөрдә бечәрилир.

Сәдбәр вэя михәккүлү (*Matthiola incana*) бириллик бозумтул кечәтүклү, будаглы биткидир. Чох зәриф михәк ийи верән садә вэя топа һалында, ағ, чәһрайы, гырмызы, ал, чил-чил рәнкли чичәкләри вардыр. Парк вэ һәйәтләрдә әкилиб бечәрилир.

Көвәрчичәкلیلәр (*Capparidaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икичинсли, мунтәзәм, аз-аз һалларда бир гәдәр гейри-мунтәзәмдир. Чичәкяңлыгы икигат, сәрбәст ләчәклидир. Эркәкчикләри 4—6 вә я чохдур. Юмурталыглары аз-чох узун саплаг үзәриндә отурмушдур, бириовалы вә я чохювалы олуб чох-тохумлудур. Мейвәси буйнузшакилли гутучуг вә я киләмәйвәдир. Ярпаглары бурғу үзрә дүзүлмүш, отлар вә я коллардыр.



Шәкил 263. Көвәр (*Capparis spinosa*) биткисинин чичәкли вә гөнчәли бир будағы:
1—онун мейвәси.

Азәрбайчанда ики чинси вә ики нөвү битир. Онлардан клеоме (*Cleome ornithopodioides*) чох вахт чынғыллы торпагларда, чайлаг вә гаялыгларда битир. Тохуму хардал әвәзиндә ишләдилір Көвәр (*Capparis spinosa*) гуру ямачларда, ярымсәһраларда битән ярымкол биткидир (шәкил 263). Азәрбайчанын аран районларында, хусусән гуру, килли торпагларда чох битир. Чаван зәғ-

лары вә гөнчәләри туршуя гоюлур. Тохумунда 36% емәли яғ, мейвәсиндә 12% шәкәр вардыр, гарпыз дады верир, гәннады маллары истеһсалында истифадә олуна биләр. Яхшы бал верән биткидир. Мейвәсиндә 23—56,6 мг %, чичәк тумурчугларында 150% «С» витамини вардыр. Көкүндән түнд-яшыл бояг алыныр.

Резеда вә я гузуоту (*Resedaceae*) фәсиләси

Фәсиләнин характер хусусийәти дишичийинин учдан ачыг олмасыдыр. Бу хусусийәт ән ибтидаилик әләмәтидир. Көрүнүрки, резеда фәсиләси көвәрчичәкلیلәр типиндән тәкамүл әтмишдир. Көвәрчичәкلیلәрдә олдуғу кими, резеда фәсиләсиндә дә бал һәлгәси олур вә юмурталыгы хусуси аягчыг үзәриндә отурур, бәзәи һәтта эркәкчикләр дә бу аягчыгла юхарыя галхыр. Беләликлә, көвәрчичәкلیلәрдә олдуғу кими, андрокисефор әмәлә кәлир.

Резеда фәсиләсиндә чичәкләр икичинсли, зигоморфдур. Касачыгы төкүлмәйән, 4—8-бөлүмлүдур. Ләчәкләри 1-дән 8-ә гәдәр олуб сәрбәстдир. Эркәкчикләри 3-дән 40-а гәдәрдир вә дибдән бири-биринә битишмишдир. Юмурталыгы 2—6 мейвәярпағындан әмәлә кәлмиш, сәрбәст вә я битишикидир, лакин учу бир гәдәр ачыгдыр. От вә я коллардыр.

Азәрбайчанда ялныз бир резеда чинси битир ки, онун да 5 ябаны вә бир мәдәни нөвү вардыр. Әһәмийәтли нөвләри бунлардыр:

Сары резеда (*Reseda luteola*) нөвү (шәкил 264). Тохумунда 34,2% яғ вардыр ки, ондан да рәнксазлыгда, әтрийят сәнасиндә вә тәбәбәтдә истифадә әдилір. Мәшһур бояг биткисидир. Ондан ипәк үчүн мүхтәлиф фонда бояг алыныр.

Сары резеданын тохумунда 33,7% тез гуруян, гиймәтли яғ вардыр ки, ондан да лак үчүн истифадә олуна биләр. Көкүндән, көвдәсиндән вә я ярпагларындан әтирли хардал яғы алыныр. Әтирли резеда (*R. odorata*) чох әтирли бечәрилән от биткисидир.



Шәкил 264. Сары Резеда (*Reseda luteola*)

1—биткинин үмуми көрүнүшү; 2—чичәк; 3—мейвәләри; 4—чичәйинин диаграмы.

БӘНӘВШӘЧИЧӘКЛИЛӘР (Parietales) СЫРАСЫ

Хашхашчичәккеләрдә олдуғу кими, бәнәвшәчичәккеләрдә дә тохумлугун мейвәяңлыгы диварына битишмәси вә әркәкчикләрин чохлугу, онларын хашхашчичәккеләре яхынлыгыны көстәбир. Бундан башга векетатив органларында сүд ширәси вә селикли маддә олмасы кими хусусийәтләр дә бу сыраны чохмейвәлиләрә вә хашхашчичәккеләре яхылашдырыр.

Бәнәвшәчичәккеләр сырасынын чичәкләри мүнтәзәм вә я гейри-мүнтәзәм, чичәкяңлыгы исә икигат, бештипилидир. Әркәкчикләри чичәкяңлыгынын сайы гәдәрдир вә я ондан чохдур. Тачы сәрбәстләчәккелидир. Дишичкын 3 мейвә ярпагындан әмәлә кәлмиш вә синкарлдыр. Юмурталыгы бирювалы вә я чохювалы, юхары вә я ашағыдыр.


Бәнәфшә (Violaceae) фәсиләси

Чичәкләри зигоморф вә узунсаптағлы олуб, голтуғларда тек ерләшмишдир. Касачыг ярпағлары 5-дир вә дибдән чыхынтылыдыр. Ләчәкләри 5-дир; бунлардан дөрдү аз-чох бәрәбәрдир, бешинчиси исә нисбәтән иридир вә дибдән маһмыз әмәлә кәтирмишдир. Әркәкчикләри 5-дир; бунлардан габагдакы икиси дибдән тачын маһмызы ичинә кирмишдир. Юмурталыгы 3 мейвә ярпагындан әмәлә кәләрәк юхарыдыр. Тохумлуглары мейвәярпагынын диварына битишмишдир. Мейвәси үчтайлы ачылан гүтүчүдур.

Азәрбайҗанда бу фәсиләнин яһыз бәнәфшә (*Viola*) чинси вә 22-йә гәдәр нөвү битир. Ән мүнүм нөвү әтирли бәнәфшәдир (*V. odorata*) О. мешәләрдә, кол араларында, бағларда, чәмәнләрдә битән чохиллик отдур. Тачы түнд вә я ачыг бәнәфшәйи рәңкдәдир чохәтирлидир. Ярпагында 120 гамма каротин вә 140-369 мг % «С» витамини вардыр. Чичәйиндән, ярпағларындан вә көкүндән алынган әтирли яғлардан әтрийәтдә кениш истифадә әдилдир. Бәзн нөвләринин көкләриндән исһал хәстәлийини мүәличә әтмәк үчүн дәрһан һазырланыр.

Говунағачы (Caricaceae) фәсиләси

Фәсиләнин нүмайәндәләри чох будағланан ағачлардыр. Ярпағлары бармагшәкилли бөлүмлү, ири олуб, будағларын тәпәсиндә ерләшмишдир, ярпағ алтлығлары йохдур. Чичәкләри бирчинсли вә я икичинсли, тачы 5 бөлүмлү, каса ярпағлары битишкдир. Бирчинсли чичәкләри мүхтәлиф формалыдыр, әркәк чичәкләри узунборулү, диши чичәкләри исә ғысаборулү олур. Чичәйи бирчинсли оланларын чичәк групплары да мүхтәлифдир. Диши чичәкләр ғыса дихазиялара, әркәк чичәкләр исә сүпүркәвари узун чичәк группна топланмышдыр. Әркәкчикләри 10-дур. Дишичкын 3—5 мейвә ярпагындан әмәлә кәлиб, юхары юмурта-



3—диши чичәк; 4 вә 5—әркәкчиг; 6—икичинсли чичәйин узунуна кәсий; 9—тохум; 10—тохумун узунуна кәсий; 11—чичәк ятағы.



Шәкил 265. Говунағачы (*Carica papaya*).

С а д а н: 1—ағачын үмүмн көрүнүшү; 2—чичәкли будағы; 3—мөһөсүнүн ачына кәсий; 4—мөһөсүнүн ачына кәсий; 5—мөһөсүнүн ачына кәсий; 6—мөһөсүнүн ачына кәсий; 7—көлдәси үзәриндә кәсий; 8—көлдәси үзәриндә кәсий; 9—көлдәси үзәриндә кәсий; 10—көлдәси үзәриндә кәсий; 11—көлдәси үзәриндә кәсий.

лыглы, бирювалыдыр. Тохумлуглары мейвэянлыгынын дивары узуну битишмишдир. Мейвэлери килэмейвэди; тохумларынын харичи хиссэси этлидир. Биткинин бүтүн органларында сүд ширəsi вардыр.

Фэсилэнин нисбэтэн мэшһур нүмайэндэси говунағачы (*Carica Papaya*) нөвүдүр (шэкил 265). Емэли мейвэсинин хатиринэ говунағачы субтропик өлкөлөрдө бечэрилик. Онун бир-чинсли чичэклери илэ барабар икчинсли чичэклери дө олур. Нэмин чичэклөрдөн мейвэ эмэлэ кэлир. Бэ'зэн мейвэлери парте-нокарп олур.

Юлгун (*Tamaricaceae*) фэсилэси

Пулчуғаохшар яшыл ярпаглы коллар вэ я ағачлардыр. Фэсилэнин эһемийэтли чинси юлгундур (*Tamarix*). Онун Гаф-газда 10 нөвү вардыр. Бундан Азербайжанда гумлу, шоран торпагларда вэ чай кəнарларында 7 нөвү битир. Юлгунун габы-гы вэ ярпагларында ашы маддэси вардыр. Бал верэн биткидир. Яшыллашдырма ишлэриндэ вэ бэзек биткиси кими экилэ билэр.

ГАБАГЧИЧЭКЛИЛЭР (*Cucurbitales*) СЫРАСЫ

Бэ'зи тэснифатчылар габагчичэклилэр сырасынын бəнəфшə-чичэклилэр сырасына яхын олдуғуну иддиə эдир, нəттə габаг-чичэклилэрин габагкимилэр фэсилэсини бəнəфшəчичэклилэр сырасына бир фэсилэ кими дахил эдирлэр. Нəр нəлдə бу сыр-ларын бир-бирилə гəһумлуғу шүбхəсиздир. Бəнəфшəчичэклилэр сырасынын бир тəкамүл будағындан габагчичэклилэр, даһə гүв-вəтли олан дикəр тəкамүл будағындан исə зəнкчичэкликимилэр инкишаф этмишдир.

Габагчичэклилэр сырасына мəнсуб олан биткилэрин чичэк-лери мүнтəзəм, тачлары битишик вэ я бəлүнмүшлəчэклидир. Эркəкчиклери 5 олуб, сəрбəстдир вэ я дəрдү чүт-чүт бирлəшмиш, бири исə сəрбəстдир. Диши чичэклөрдə тачын борусу юмурта-лығə битишмишдир вэ эркəкчиклери нєч йохдур. Эркəк чичэк-лэрин чохундə эркəкчиклэр битишиб бир дəстə эмэлə кəтирир. Тозлуглары инкиовалыдыр. Диши чичэклөрдə юмурталығ ашағы-дыр, чохундə үчювалы вэ чохтохумлудур. Тохумлары ясты вэ эндоспермсиздир. Мейвэлери ири яланчы килəмейвэди. Отлар вэ аз-аз нəллəрдə коллардыр. Көвдэлери дымнан вэ я ятан-дыр, бурғу кими бурулмүш бығчыглары вардыр. Энтомофил бит-килəрдир. Əн чох тропик вэ субтропик өлкөлөрдə яйылмыш бу сыранын 760-ə гəдər нөвү вардыр.

Габагкимилэр (*Cucurbitaceae*) фэсилэси

Бу фэсилэнин үмуми характеристикасы бүтүн сыранын харак-теристикасына уйғундур. Онун Азербайжанда бечэрилən чинс-лери хияр (*Cucumis*), гарпыз (*Citrullus*), габаг (*Cucur-*

bita), сугабағы (*Lagenaria*), ябаны күстүшам (*Bryo-nia*), итхияры (*Ecballium*) вэ саирəдир.

Хияр Азербайжанын аран вə дағ районларында бечэрилик. Нəмин чинсин нөвлэриндən бири олан говун вэ я емиш (*Cucu-mis melo var. cultus*) əн чох Орта Асияда вə Азербайжанда бечэрилик. Яхшы бал верən биткидир. Мейвэсиндə 5—40 мг % «С» витамини вардыр.

Ади хияр (*Cucumis sativus*) яхшы бал верən битки-дир. Мейвэсиндə 0,8 гамма «А» провитамини, 0,87—1,5 гамма «В» витамини 11,3—17,6 мг % «С» витамини вардыр. Азербай-жанын бүтүн районларында бечэрилик.

Гарпыз (*Citrullus edulis*) ябаны нəлдə Индистанда, Əфғаныстанда, Африкада, хусусən сəһрəлардə күлли мигдардə битир. Гарпыз чох баллы биткидир. Мейвэсиндə 10—11,2 гамма каротин, 0,28—0,4 гамма «В₁» витамини, бир гəдər «В₂» витамини, 4—10 мг % «С» витамини вардыр. Азербайжанын аран районла-рында экилик.

Балгабағы вэ я бораны (*Cucurbita maxima*) яхшы баллы биткидир. Тохумларындан кəпəнəк гурдуну тəкмəк үчүн истифадə эдилер. Мейвэсиндə 6,6 гамма «В» витамини вардыр.

Габагча (*Cucurbita pepo*) нөвүнүн мейвəsi нисбэтən хырда вэ тəрсинə юмуртаваридир. Етишмəмиш мейвэлэриндən долмə вэ тохум хиссэсиндən күрү нəзырланыр. Мейвэсиндə «А» провита-мини вэ «В» витамини вардыр.

Сугабағы (*Lagenaria vulgaris*) мейвəянлыгы етишən заман одушлашыр. Онун ичини чыхарыб чүрбəчүр мəтбəх шейлери (бошгаб, гашыг, бутулка, абкəрдən вэ с.) нəзырлайырлар. Етишмə-миш мейвэсиндən бораны адланан хəрəк нəзырланыр.

Тамал вэ я лиф (*Luffa cylindrica var. clevata*) нөвүнүн мейвэсиндən ююлмағ үчүн лиф, баш өртүйү, нəмам аягтабысы нəзырланыр. Азербайжанын Лəнкəран вэ Зағатала вэ Гəрби Күрчүстанын рүтубəтли районларында экилик.

ЗЭНКЧИЧЭКЛИКИМИЛЭР (*Campanulales*) СЫРАСЫ

Бу сырая дахил олан биткилэрин чичэклери мүнтəзəм вэ я гeyри-мүнтəзəм, дəрд даирəви, бешүзвлүдүр. Лəчэклери бити-шик, аз-аз нəллəрдə бəлүнмүшдүр. Эркəкчиклери 5-дир, чəван икən тозлугларилə бирлəшəрəк сүтунчуғун əтрафында бору эмə-лə кəтирир. Тоз кисəsi дəрдювалыдыр. Юмурталығы ашағыдыр, бирювалы вэ я чохювалыдыр, бир тохумлу вэ я чохтохумлудур. Тохумлуғу бирəртүклүдүр. Мейвэлери чох мұхтəлифдир.

Ярпаглары бүтөв, бə'зэн ярылмыш олуб, чохундə бурғу үзрə дузулмүшдүр. Отлар вэ ағачлардыр.

Чох тəкамүл этмиш биткилəрдир вэ башга сыраларын биткилери илə гəһумлуг мұнасибəти айдын дейилдир.

Һәм ин сыранын (*Lo'eliaceae*) фәсиләсинин чичәкләри гейри-мүнтәзәмдир вә тозлуглары тамам битишикләр. Юмурталығы һәм ишә ашағы вә икиювалыдыр.

Сыранын фәсиләләри арасында анатомик вә биокимйәви чәһәтдән мүййән охшайыш вардыр, онларда мәсәлән, инулин олмасы, сүд боруларынын боғумлу олмасы, сүд ширәсиндә каучук олмасы вә и. а. Зәнкчичәкликимләрдән мүрәккәбчичәклиләре доғру тәкамүлү, юмурталығын юваларынын бирә гәдәр азалмасында, әркәкчикләрин тозлугларынын бир-биринә тамам бирләшмәсиндә, чичәк группунун гурулушунда, биткиләрин чографи йыйлмасында вә башга аламәтләрдә көрмәк олар.

Зәнкчичәклиләр (*Campanulaceae*) фәсиләси

Бу сыранын ән садә фәсиләси—зәнкчичәклиләрдыр. Чичәкләри икичинсли, касачығы 5 мүнтәзәм, 5—10 дилимлидыр. Тачы адәтән бәнәфшәйи рәнkdә вә иридыр, битишикләчәкли бору вә я зәнкчичәклилидыр. Әркәкчикләри ләчәкләринин сайы гәдәрдыр вә ләчәкләрлә нөвбәләшир. Әркәкчик саплаглары тачын борусуна битишмишдыр вә я һәлгә үзәриндә бирләшмишдыр. Тозлуглары чаваикән чоҳ вахт япышыг олур, лакин чичәк ачан заман бир-бириндән айрылыр. Тозлуглары икиювалы олуб, етишән заман узунуна ачылыр. Юмурталығы ашағы вә чоҳунда 2—5 ювалыдыр. Тохумлуғу мәркәздәдыр. Мейвәләри чоҳтохумлу гутучуг вә я киләмәйвәдыр, дибләриндә касачығы галандыр. Отлар аз-аз һалларда коллардыр.



Шәкил 266.
Учдән зәнкчичәкли (*Campanula tridentata*).

Фәсиләнин Азәрбайҗанда 5 чинси вардыр. Нөвчә ән зәнкин олан чинс зәнкчичәйи (*Campanula*) чинсидир. Онун бә'зи нүмәндәләринин чичәйи ири вә түнд рәнkdә олдуғуна көрә бәзәк биткиси кими әкилир (шәкил 266).

Лобелләр (*Lobeliaceae*) фәсиләси

Чичәкләри гейри-мүнтәзәм, икичинсли, аз-аз һалларда бирчинслидыр. Касачығы юмурталыға битишмиш олуб, бешдәлимлидыр, тачы бирдодагы вә я икидодагы, көйүмтүл-ағ вә я тәкбир һалларда моруг рәнkindәдыр, дишичийи үстүндән бирләш-

мишдыр. Әркәкчикләри бешдыр вә тачын дилимләрилә нөвбәләшир. Тозлуглары сүтунчуғун әтрафында бору әмәлә кәтирир, саплаглары исә сәрбәстдыр. Юмурталығы ашағы, икиювалы, аз-аз һалларда бир ювалыдыр. Сүтунчуғу садә вә икидилимли ағызчыгыдыр, мүрәккәбчичәклиләрдә олдуғу кими һәлгәви түклүдүр. Мейвәси киләмәйвә вә я мүхтәлиф формаларда ачылан гутучугдур. Тохумлары чоҳ хырдадыр. Отлардыр, аз-аз һалларда ағачлардыр. Башлыча олараг тропик өлкәләрдә битир. Һәшәрәт вә гушлар васитәсилә тозланыр. Тохумунда лобелин вә нифлетин алкалоидләри вардыр ки, ондан да тәнәффүс мәркәзинин ғычыгланмасында, тәнкәнәфәслиkdә, көй өскүрәkdә вә бир сыра башга хәстәликләрин мүәличәсиндә истифадә әдилир.

Азәрбайҗанда ябаны һалда битмир. Бә'зи нөвләри бәзәк биткиси кими әкилир. Онлардан *Lobelia Erinus* нөвүнү кәстәрмәк олар. О, хырда, колланан вә күлли мигдарда көй вә я ағ чичәк ачан биткидыр.

Мүрәккәбчичәклиләр (*Compositales*) сырасы


Мүрәккәбчичәклиләр сырасы чичәкли вә тохумлу биткиләри ичәрисиндә ән кениш сырадыр. Онун нүмәйәндәләри дүнянын бүтүн гит'әләриндә йыйлмышдыр. Бу сыра ялыз бирчә фәсилә дахилдыр ки, о да мүрәккәбчичәклиләр—(*Compositae*) фәсиләсидир. Буна көрә дә сыра илә фәсиләнин характер хүсусийәтләри әйнидыр. Һазырда бу фәсилә там инкишафда олуб ени нөвләр әмәлә кәтирмәkdә давам әдир, одур ки, чоҳ полиморфдур, ахырынчы һесабламалара көрә ер үзәриндә 25000-ә гәдәр нөвү вардыр. Беләликлә, нөвләринин сайына көрә чичәкли биткиләрин онда бириндән артығыны тәшкил әдир. Бунларын бодән гурулушларында маддәйә гәнаәт әдилмәси максимал дәрәжәйә чатдырылмышдыр. Белә бир хүсусийәт онларын бир сыра үзвләринин тамамилә вә я гисмән азалмасы илә изаһ олунур.

Чичәкләри икичинсли вә я бирчинслидыр. Чоҳ хырда олан чичәкләри сәбәтчик вә я башчыг адланан чичәк группунун габырыг, дүз вә я чөкәк олан әсас оху үзәриндә саплагсыз отурмуш вә әтрафы, бир вә я бир нечә чәркә дүзүлмүш, сарғы адланан сәрбәст вә я битишик өртүчү яргагларла әһатә олунмушдур. Чичәк групплары илк бахышда бир ири чичәйә охшайыр (бу да өзләрини һәшәрәтә кәстәрмәк үчүн бир уйғунлашмадыр). Чичәкләринин касачығы билинмир. Тачын боручуғу дибдән юмурталыгла битишмишдыр. Чоҳ вахт азлыг тәшкил әдән ибтидаи нүмәйәндәләриндә пәрдәшәкилли беш касачыг көрмәк олар, лакин чоҳунда касачығын дишләри әвәзиндә түкләрдән вә я ғыллардан ибарәт «таччыг» вә я кәкилчик вардыр. Бу чүр уйғунлашмалар тохумун күләк васитәсилә йыйлмасыны тә'мин әдир. Бә'зиләриндә мейвәнин юхарысында узун даяг әмәлә кәлир ки, түкләр онун учунда топланараг парашүт шәклини алыр. Үмумийәтлә, кәкилләри

әмәлә кәтирән түкләр бәсит вә я ләләкшәкилли, мүрәккәб, ғыса вә я узун олур, я да бир мейвәдә эйни бәрабәрдә олмур

Тачы битишәкләчәкли, мүнтәзәм вә я гейри-мүнтәзәмдир. Мүнтәзәм тачлар зәнк вә я бору шәклиндә, гейри-мүнтәзәмләр исә дил шәклиндә олур. Боры шәклиндәки тач 5 дишли олур, бу да онун бир-биринә битишмиш 5 ләчәкдән әмәлә кәлдийини кәстәрир. Дилшәкилли тачын да учу бәрабәр 5-дишлидир, лакин о, бир тәрәфдән узунуна чырылмыш кими көрүнүр вә узун ясты дилә охшайыр.

Мүрәккәбчичәклиләрдә бу ики чүр чичәкдән башга даһа ики чүр чичәк дә олур. Онлардан бири яланчы дилшәкилли, икиниси ғыфшәкилли чичәкдир. Беләликлә, мүрәккәбчичәклиләрдә дөрд чүр чичәйә тәсадүф әдилір (шәкил 267).



Шәкил 267. Мүрәккәбчичәклиләр фәсиләсиндә тәсадүф әдилән әсас чичәк вә мейвә формалары

Яланчы дилшәкилли чичәк ики додагшәкилли чичәкдән әмәлә кәлмишдир. Бурада үст додаг ихтисар олунмуш, алт додаг исә үч ләчәйин бирләшмәсиндән әмәлә кәлдийи үчүн үчдишли олмуш вә дил шәклинн алмышдыр. Белә чичәкләр һәмишә бирчинсли диши чичәк олур.

Ғыфшәкилли чичәкләр дә зигоморфдур вә онларда эркәкчик вә дишичик үзләри йохдур. Ғыфшәкилли чичәкләрин вәзифәси чичәк группуна ярашыг вермәкдир. Мүрәккәбчичәклиләрин чичәк группунун чохунда дилшәкилли вә борушәкилли чичәкләр бир ердә олур. Белә һалларда дилшәкилли чичәкләр чичәк группунун кәнарында, борушәкилли чичәкләр исә ортасында ерләшир. Аз-аз һалларда чичәк группу я дилшәкилли, (зәнчиротунда олдуғу кими) я да ялныз борушәкилли (чобанястығында олдуғу кими) олур.

Һәгиги дилшәкилли вә борушәкилли чичәкләр һәмишә ики-чинсли олур. Яланчы дилшәкилли вә ғыфшәкилли чичәкләр нисбәтән ири олуб, сәбәтчийин кәнарында ерләшир вә чичәк группуна ярашыг верир, борушәкилли чичәкләр исә ортада олур. Сәбәтчийинин кәнарында яланчы дилшәкилли чичәкләри оланлара күнәбаханы (*Helianthus cultus*), сәбәтчийинин кәнарын-

да ғыфшәкилли чичәкләри оланлара исә күләвәри (*Centaurea*) мисал кәстәрмәк олар.

Мүрәккәбчичәклиләрдә эркәкчик 5 олуб, ләчәкләрлә нөвбә илә дүзүлмүшдүр. Эркәкчикләрин саплағлары сәрбәстдир, тозлуғлары дишичийин сүтунчуғу әтрафында бору шәклиндә бирләшмишдир вә етишән заман узунуна партлайыр. Тозлары һамар вә я ғабарчығлыдыр. Юмурталығы ашағы, ики мейвә ярпағындан әмәлә кәлмиш биривалыдыр. Сүтунчуғу сапшәкилли ағызчығы икидилимли, аз-аз һалларда бүтөвдүр, таччығы түкләрдән ибарәтдир. Тохумлуғу бирдир. Мейвәси ачылмаян биртохумлу, тохумча вә я фындыгычгмейвәдир. Тохумлары пәрдәвари ғабығлы олуб, чох вахт мейвәнин ич сәтһинә аз-чох битишмиш олур. Рүшейминдә алейрон вә яғ вардыр. Сәбәтчикләри һәр биткидә бир-ики, бәзиләриндә чох ири, бәзиләриндә исә чох хырда (0,1 см) олур. Бу ахырынчылар да өз нөвбәсиндә ғалханчыг сүпүркә кими мүрәккәб чичәк группуна топланмыш олур.

Сәбәтчикләрин ятағы (ох һиссәси) ғабарыг, дүз вә я чөкәк олур. Онлар я чылпаг олур, я да үзәрләри пәрдәшәкилли пулчуғларла вә я түкчүкләрлә, я да ялныз чохлу оюғчуғла өртүлмүш олур. Сәбәтчикләрин ятағынын үзәри оюғчуғлу исә, һәмин оюғчуғларын һәр бириндә бир чичәк отурмуш олур. Сәбәтчикләри әһәтә әдән сарғы ярпагығлары айры-айры битки нөвләриндә мүхтәлиф олур, о чүмләдән бәзиләриндә яшыл, бәзиләриндә пәрдәвари, чылпаг, түклү, гәтранлы, тиканлы, ғармағлы вә и. а. ола биләр.

Мүрәккәбчичәклиләр отлар, коллар, аз-аз һалларда ағач вә я лианлардыр, бәзән дә көвдә вә ярпағлары әтли олан сүккулент ксерофит биткиләрдир. Ярпағлары чохунда нөвбәли, аз-аз һалларда ғаршылығлы, бәзән чох ири, ғынлы чылпаг я да ики тәрәфдән аз-чох түклү олур. Бу түкләр я садә, я да әтирли яғлар ифраз әдән вәзили, бәзән тез гәтранлашан вә мүхтәлиф рәнкли ола биләр. Бир чохунун ярпағларында аз-чох инкишаф әтмиш тикан вә я ғармағ олур.

Мүрәккәбчичәклиләр үмумийәтлә харичи көрүнүшү вә гурулушларына көрә чох мүхтәлифдир. Лакин онлары сәбәтчик вә чичәкләри илә асанлығла танываг олар.

Анатомик хүсусийәтләри онларда чох вахт гәтран йоллары вә я гәтран һүчәйрәләри, әксәрийәтиндә исә каучук әһтиягы, инулин маддәси вә буғумлу сүд борулары олмасыдыр.

Мүрәккәбчичәклиләр фәсиләсинин Азәрбайҗанда 120-йә гәләр чинси вә 450-дән артыг нөвү битир. Фәсиләнин чох бөйүк олмасына бахмаяраг, халг тәсәррүфаты үчүн әһәмийәтли нөвләри аздыр.

Мүрәккәбчичәклиләр фәсиләси нөвләринин чохлуғу вә бу нөвләрдән бәзиләринин нисбәтән чаван олмасы һәмин фәсиләнин систематикасыны чәтинләшдирмишдир. Буна көрә дә индийәдәк мүрәккәбчичәклиләрин филокенетик системини яратмағ мүмкүн олмамышдыр.

Бәзи ботаниклар һәм фәсиләниң филокениясыны, тоз кисә-
ләрннн битишк олмасына көрә зәңкччәклиләрлә алагәлән-
дирләр. Бәзиләри исә бу фәсиләниң чәтирччәклиләрлә вә
һәтта хашхаңччәклиләрлә алагәдәр олдуғуну иддә әдирләр.

Мүрәкәбччәклиләр фәсиләси ашағыдакы ики ярымфәсиләйә
бөлүнәр:

- 1) Боруччәклиләр (*Tubiflorae*)
- 2) Дилччәклиләр (*Liguliflorae*).

1. Боруччәклиләр (*Tubiflorae*) ярымфәсиләси

Сәбәтчикләк чичәкләрнн һамысы боруччәклиләр вә я ортада-
кылары боруччәклиләр, кәнардакылары дилчәклиләр, я да бүтүн
чичәкләр икидоагыдыр. Бу ярымфәсилә бир нечә трибәлә бөлү-
нәр. Ашағыда оларын һагында ғыса мәлумат вериләр:

1. Дүймәччәклиләр (*Asterea*) трибәси: чичәкләрннн һа-
мысы икичинәли вә я бирчинәлидир. Чичәк ятағы пулчугсуздыр.
Азәрбайҗанда битән мүһүм нөвләри бунлардыр:

Ғызылчубуготу (*Solidago virgaurea*). Мешәли ерләрдә
битир. Яхшы бал биткисидир. Ярпағларында 96 гамма «А»
провитамини, 47,5—73,3 мг% «С» витамини, тохумларында
14,4% яғ вардыр. Көздәләри, ярпағлары вә чичәкләриндән сары
бояг алыныр.

Хырдаләчәк (*Erigeron acer*). Зибилликләрдә, рүтубәт-
ли ерләрдә битир. Көздәләри вә ярпағларында чохлу ашш
мәдәси вардыр.

Канада хырдаләчәйи (*Erigeron canadensis*) нөвүнү
ярпағында 18,9 мг% «С» витамини вардыр. «Эрикерон яғы» алы-
ныр ки, онун да тәркибиндә сәнаәдә ишләдилән 0,5% лимоник
вардыр.

Астра, шоранкөвәни (*Tripolium vulgare*). Чаван
ярпағларында 64,4 мг% «С» витамини вардыр.

2. Андызччәклиләр (*Inuleae*) трибәси: Тачы иридир, то-
лугунун дибиндә чыхынты вардыр. Әһәмиyyətли нөвләри бу-
лардыр.

Ғаноту (*Gnaphalium rossicum*). Нәм ерләрдә, су кәнарла-
рында, әкилләрнн арасында вә зибилли ерләрдә битән бз-
риллик биткидир. Отундан ған дамарларыны кенәлтмәк, ған
тәзийгини азәлтмәк, яралары, бронхити, янығы мүәличә әтмәк
үчүн дәрман алыныр. Тәркибиндә 60 гамма каротин вардыр.

Андыз (*Inula helenium*) Азәрбайҗанын аран районла-
рындан башламыш мешәли даг өтәкләриндә гәдәр яйылаң вә
ири диб ярпағлары олан чохиллик һүндүр отлардыр. Ералты зә-
күмсов көвдәсиндә 44% инулин, 1—2% көскин әтирли яғлар,
«алант яғы», лактон түршүсу вә сәирә вардыр. Тәбәбәтдә ишлә-
диләр. Көкүмсов көвдәсиндән ликйор вә араг истеһсалында ис-
тифадә әдиләр. Ондан шәкәр һасил әтмәк олар. Көкүндән кө-
бояг алыныр.

3. Күнәбаханччәклиләр (*Heliantheae*) трибәси: чичәк группу
юхарыда көстәрилдийи кимидир, чичәк ятағы пулчуглудур.
Тохуму кәкилсиздир. Ән мүһүм нүмайәндәләри бунлардыр.

Күнәбахан (*Helianthus cultus*) вә я (*H. annuus*). Азәр-
байҗанын бүтүн районларында аз-чох әкилир. Әсәс әтибарилә
тохумундан яғ алындығы үчүн сәнаә әһәмиyyətи вардыр. Габыглы
тохумундан 22—25% яғ алыныр. Яхшы бал верәндир. Арычылыг
тәсәррүфатлары үчүн әһәмиyyətи чохдур. Ярпаг вә көвдәсиндә
26,4 мг% «А» провитамини, 55—153 мг% «С» витамини, яғында
20—50 гамма «Д» витамини, тохумунда 10 биоложи вәһид «К»
витамини вардыр.

Ералмасы (*Helianthus tyberosus*). Ер алтында картофа-
охшар юмрулар әмәлә кәтирән чохиллик биткидир. ССРИ-дә
Шимали Ғафғазда, Украинада, Орта Волгада, Белорусияда чох
мүвәффәгийәтлә битир. Юмруларында 12—15%-ә гәдәр инулин
вардыр ки, ондан да асанлыгла шәкәр һасил әтмәк олар; бундан
башга, юмруларында 2% азотлу мәддә, сулу карбонлар вә пек-
тин мәддәси, 15% яғ вә 1,3%-ә гәдәр селлүлоза вардыр. Бөйүк
әйинти вә малгара үчүн ем әһәмиyyətи вардыр. От һиссәсиндән
яхшы силос һазырланыр. Азәрбайҗанын хусусән аран районла-
рында чох бечәрилә биләр.

Ғваюла (*Parthenium argentatum*). Һүндүрлүйү 1 м-ә
гәдәр олан ярымколдур, бүтүн битки ғыса, ағ түкләрлә өртүл-
дүйүндән боз рәңкдәдир. Ярпағлары нештәршәкилли вә дилим-
лидир. Сәбәтчикләри хырда олуб сүпүркәләрә топланмышдыр.
Сәбәтчийнн кәнар чичәкләри дилшәкиллидир, ортадакыларда
эркәкчик вардыр. Сүд ширәсиндә 7-дән 14%-ә гәдәр гәтранла га-
рышыг каучук вардыр. ССРИ-дә Түркмәнистанда вә аз мигдарда
Азәрбайҗанын Мардакерт районунда әкилир.

Көркүкүлү (*Dahlia variabilis*). Ералты юмрулары олан
чохиллик от биткисидир. Көвдәсиннн ичи бош, ярпағлары ири
дәтәкшәкилли, ярпагчығлары бөлүнмүш, саплағы ғынлыдыр.
Сәбәтчикләри ири вә дилшәкилли чичәкләри дишичиклидир, чох
захт стаминодиялыдыр. Топа чичәкли вә мүхтәлиф рәңклидир.
1000-ә гәдәр чешиди вардыр. Чох яхшы бәзәк биткисидир. Ералты
юмруларында чохлу мигдарда сферокристал инулин вардыр.

4. Иовшанччәклиләр (*Artemideae*) трибәси: чичәк ятағы
зылпаг, я да пулчуглудур. Чичәкяңлығы вардыр. Сарғы
ярпагчығларынын кәнарлары гурудур.

Зирәччәйи (*Chrysanthemum*). Чохиллик бәзәк битки-
дир.

Һинд зирәччәйи (*Chrysanthemum indicum*) вә Чи-
н зирәччәйи (*Ch. sinensis*) нөвләрннн һибридиндән бир чох
мәдәни чешидләр әлдә әдилмишдир.

Иовшан (*Artemisia*). Ән чох ярымсәһраларда яйылмыш
мүхтәлиф нөвлү әтирли биткиләрдир. Бәзи нөвләриндә сап-

танин вардыр. Чох полиморфдур. Эһәмийәтли нөвләри бунлардыр:

Ачы йовшан (*A. absinthium*). Тәркибиндә бир нечә чүрәтирли яғ олдуғундан, бә'зи араглар гатылыр. Онда абсинтин адлы ачы глюкозид, анабситин, әтирли яғлар, гәтран, ашы маддәләри, алма вә кәһрәба туршулары вә «С» витамини вардыр. Иштаһ дәрманы кими ишләдилір. Ярпагларында 56—120 мг % «С» витамини вардыр. Ашы маддәси чох олдуғундан бә'зи ерләрдә дәрини ашыламаг үчүн ишләдилір.

Гарапүрән вә я сиркән (*A. annua*). Аран районларында чох кениш яйылмышдыр, ән чох нәм ерләрдә битир. Тәркибиндә әтирли яғлар вә 79,9 мг % «С» витамини вардыр.

Тәрхун (*A. dracuncululus*) чәлләрдә вә чай саһилләриндә битән чохиллик биткидир. Әкилиб етишдирилир. Азәрбайҗанын мәшһур тәрәвәзләриндәндир. Салата гарышдырылыр, чий ейилир, говурмая вә консервләрә гатылыр. Әтирли яғында эстрагон, ярпагларында 150 гамма «А» провитамини вардыр.

Боз йовшан (*A. Meyeriana*). Азәрбайҗанын ярымсәһраларыны бүрүмүш әсас биткидир. Яхшы ғыш емидир. Көкүндә вә көвдәсиндә 6—7% ашы маддәси олдуғундан, бә'зи ерләрдә ондан көнү ашыламаг үчүн истифадә әдилір. Пайызда ярпагларында 11,4 мг % «С» витамини олур.

Ағ йовшан (*A. scoparioides*). Азәрбайҗанда ярымсәһраларда вә гумсал ерләрдә битир. Әтирли яғында әвкенол адланан антисептик маддә вардыр.

Гарабаш йовшан (*A. vulgaris*). Азәрбайҗанда мешә гуршағындан башламыш субалп гуршағына гәдәр мешәләрин кәнарларында вә коллугларда битир. Әтирли яғында әтрийәт һесаб олунан синеол вә туйон, ярпагларында 130 мг % «С» витамини вардыр.

5. Канареяотукимиләр вә я хачкүлүкимиләр (*Senecioideae*) трибасы. Тохумлары кәкилли түклү, чичәк ятағы чылпаг сарғысы бир-ици чәркәлидир. Эһәмийәтли нөвләри бунлардыр:

Канареяоту вә я ади хачкүлү (*Senecio vulgaris*). Мешәнин юхары кәнары илә субалп гуршағы арасында яйылмыш һүндүрлүйү 80—150 см-ә гәдәр олан чохиллик от биткисидир. Тәркибиндә платифиллин вә сенасифиллин алколоидләри вардыр ки, ган тәзийгинин азалмасына тә'сир әдир. Көкүндә вә ярпагларындагы платифиллин маддә өз тә'сири әтибарилә атропинә охшайыр. Бу да бәбәйн чох кенәлдир вә ганда шәкәрин мигдарыны азалдыр. Гарын хәстәликләринин мүаличәсиндә истифадә әдилір.

Өскүрәкоту (*Tussilago farfara*). Азәрбайҗан районларындан бир чохунда килли торпагы, рүтубәтли дәрәләрдә, учгунларда вә саһилләрдә битән чохиллик от биткисидир. Тәркибиндә селик, түссилакин адлы ачы глюкозид вә ашы маддә

си вардыр. Синәни юмшалтмаг вә бәлғәм кәтирмәк үчүн ишләдилір. Чичәкләйәндән сонра ярпағында 57 гамма «А» провитамини вә 4,9—44,2 мг % «С» витамини олур.

6. Күлүнбаһарчичәклиләр (*Calenduleae*) трибасы. Сәбәтчийин орта чичәкләри борушәкилли вә мейвә вермәйән, кәнар чичәкләри дилшәкилли, дишчикли вә мейвә верәндир. Тозчугунун диби шишдир, мейвәләри кәкилсиздир.

Эһәмийәтли нөвләри бунлардыр:

Дәрман күлүнбаһары (*Calendula officinalis*). Бириллик биткидир, бағларда әкилир, бә'зән ябаны һалда битир. Тәбабәтдә өд ифразыны артырмаг үчүн ишләдилір. Чичәк групуна 31—32 гамма, ярпагларында 35—38 гамма «А» провитамини, тохумларында 19% яғ вардыр. Ябаны һалда битән нөвү (*C. persica*)-дыр.

7. Гаңгалчичәклиләр (*Cynareae*) трибасы. Сәбәтчийинин ян чичәкләри мейвә вермәйән, ортадакылар борушәкилли вә икичинслидир. Чичәк ятағы ғыллыдыр. Сарғысы тиканлы вә я пәрдә ярпагчыгыдыр.

Башлыча нөвләри бунлардыр:

Топпузтикан (*Echinops sphaerocephalus*). Орта дағ гуршағына гәдәр коллуглар вә зибилли ерләрдә битән чохиллик от биткисидир. Яхшы бал верәндир. Тохумунда 25,7% яғ вардыр.

Ғывырыггаңгал (*Carduus crispus*) Чаван көвдәси, ярпаглары вә сәбәтчийи бир тәрәвәз кими ишләдилір. Тохумунда 20,8—29,29% яғ вардыр.

Гармаглыгаңгал (*Carduus hamulosus*). Бу гаңгал нөвүнүн тохумунда 30% яғ вардыр.

Әшшәкгаңгалы (*Cirsium arvensis*). Азәрбайҗанын һәр ериндә, хүсусән ашағы вә орта дағ гуршағында битир. Тохумунда 21,17% яғ вардыр.

Пытраг (*Arctium lappa*). Азәрбайҗанын орта дағ гуршағына гәдәр коллугларда вә зибилли ерләрдә битән икииллик отлардыр. Көкүндә 19% инулин вардыр. Чаван көкләри чий һалда вә дузлу суда бишириләрәк яғ вә сиркә илә ейилир. Ондан ширин әзмә һазырланыр. Чаван көвдәси вә ярпаглары салат кими ейилир вә шорабая гоюлур. Көкүндән гәһвәйә охшар ички һазырланыр. Көкүндә 69% сулу карбонлар вардыр. Гурудулуб нарын үйүдүлмүш көкүндән нишаста һазырланыр. Пытрағын нөвләри яхшы бал верәндир. Ярпагларында 20—17 мг % «С» витамини вардыр. Көкүнүн дәмләмәсиндән ишләтмә дәрманы кими истифадә әдилір. Тохумунда 17% яғ вардыр.

Кечәпытраг (*A. tomentosum*) Юхарыдакындан даһа ғыса бойлу вә сәбәтчикләри нисбәтән хырдадыр. Зибилли ерләрдә битән икииллик отдур. Көкүндә 27%-ә гәдәр инулин вардыр. Яхшы бал верән биткидир. Бундан бир ишләтмә дәрманы кими истифадә әдилірмиш. Тохумунда 14,8—17,2% яғ вардыр.

II. Дилчичәкلیلәр (*Liguliflorae*) ярымфәсиләси

Чичәк группундакы чичәкләрин һамысы дилшәкиллидир. Векетатив һиссәләриндә (хүсусән көкләриндә) сүд борулары вардыр. Мейвәләри, аз-чох аягыг үзәриндә дуран садә түклүдүр.

Әһәмиyyətли чинс вә нөвләри булардыр:

Зәнчироту вә ачыговуг (*Taraxacum*). Чохиллик, икииллик вә я бириллик отлардыр. Көк әтрафы ярпаглары садә, нештәршәкиллидир. Ярпаглары чох вахт ләләкшәкилли, диллими, кәсилмиш я да бөлүмүшдүр, учу үчбучаг шәклиндәдир. Чичәк верән көвдәси ярпагсыз олуп, көк әтрафы ярпагларынын ортасындан чыхмышдыр, будагланмаян чичәк ох шәклиндәдир. Чылпаг вә я аз-чох һөрүмчәк тору кими түкләнмишдир. Һәмин чичәк охларынын һәр биринин төпәсиндә бир әдәд ири сәбәтчик олуп. Сәбәтчийин саргычыг ярпагларынын кәнарлары пәрдәваридир. Чичәк ятагы дүз вә чылпагдыр. Чичәкләрин һамысы дилшәкилли вә сарыдыр. Тохумлары чәтиршәкилли кәкилли түклүдүр. Түкләр садә дишлидир. Көкләриндә сүд ширәси чох олуп. Көкләри йоғунлашмыш вә типик шагулидир. Азәрбайчанда ябаны һалда 12-йә гәдәр нөвү вардыр.

Чаван ярпаглары чий һалда дуза батырылып вә испанаг кими биширилиб ейилир. Яхшы бал верән биткиләрдир. Сүд ширәсинин тәркибиндә чохлу инулин вә ачы тараксасин глүкозиди вардыр. Иштаһы артырмаға көмәк эдир. Нөвләри арандан башлайыб алп гуршагына гәдәр яйылмышдыр. Мүһүм нөвләриндән буналары кәстәрмәк олар:

Ади ачыговуг вә ади зәнчироту (*T. vulgare*) Онун вә башга нөвләринин говрулмуш көкүндән гәһвә һазырлана биләр. Пайызда көкүндә 7% азотлу маддәләр, 16,89% инулин вә фруктоза, 2% ашы маддәси, 0,25% алма туршусу вардыр. Көкләриндә кифайәт гәдәр инулин олдуғундан ачыговугдан шәкәр алына биләр. Тәзә ярпагларында 50 гамма «А» провитамины вә 61,8—70 мг% «С» витамини, тохумунда 19,9% яғ вардыр.

Көксаггыз (*T. kok-saghyz*) Чохиллик от биткисидир, ачыговуга охшайыр. Көкү шагулидир, пробкасы гарадыр; пробкадан сонракы тәбәгәнин алтында лахталашмыш каучуглу тәбәгә вардыр. Ярпаглары көк әтрафында топланмыш розет һалында, чылпаг, әтли, көйүмтүл, яшыл, нештәршәкилли, кәнарлары кәсилмиш вә я бүтөвдүр. Саплагы ашағыдан сәрт түклүдүр. Чичәк охлары бир нечә я да тәкдир, ичи бошдур, юхары һиссәси хырда түклүдүр. Саргысынын ярпагыглары юмшаг вә юхарыдан чыхынтылыдыр. Чичәкләри лимону-сарыдыр. Тохуму ағ кәкиллидир.

Көксаггыз ябаны һалда Тяньшанын шәрғи дағ дәрәләриндә вә Җазахстанын Алма-Ата районунда битир. Көкләринин габыгында 25%, одунчаг һиссәсиндә 8%-ә гәдәр кейфийәтли каучук вар-

дыр. ССРИ-нин бә'зи мешә гуршагларында әкилир. Азәрбайчанда әкилиб етишдирилмәси имканыны айдынлашдырмаг үчүн тәчрүбә апарылып. Һазырда ССРИ-дә әсас каучук биткисидир.

Крымсаггыз (*T. megalorrhizon*). Чохиллик отдур. Көкү шагулидир. Лахталашмыш каучук көкүн габыгында вә сүд боруларындадыр. Ярпаглары розет шәклиндәдир, яйын әввәлләриндә гуруюр вә битки пайыза гәдәр сакитлик дөвру кечирир. Ярпаглары дик дуран, нештәршәкиллидир, дибә доғру даралмыш вә ләләквари бөлүмүшдүр. Чичәк оху әввәлчә ховлу түклү олуп, сонралар чылпаглашыр. Сәбәтчикләри хырда, ләчәкләри лимону—сарыдыр. Кәкили ағ вә я гәһвәйидир. Ябаны һалда Крымда вә Шимали Гафгазын бә'зи ерләриндә битир. Көкүндә 4—9% каучук вардыр. Мәдәни һалда бечәрилмәси үчүн тәчрүбә апарылып.

Чобанчичәйи (*Crepis sibirica*) Һүндүрлүйү 1 м-ә гәдәр олан чохиллик отдур. Субалп чәмәнләриндә битир. Ярпагында 279,5 гамма «С» витамини вардыр.

Гырғыоту (*Hieracium umbellatum*). Һүндүрлүйү 100 см-ә гәдәр олан вә Азәрбайчанда субалп чәмәнләринә гәдәр һәр ердә яйылмыш чохиллик отлардыр. Бә'зи нөвләриндән юну вә ипәйи сары рәнкә боямаг үчүн истифадә эдилир.

Каһы (*Lactuca sativa*). Һүндүрлүйү 30—80 см олан икииллик тәрәвәз биткисидир. Ярпагларында 125 гамма «А» провитамины, 1,8—2,3 гамма «В» витамини, 10—60 мг% «С» витамини вә «Е» витамини вардыр. Чох витаминли олан бу гиймәтли битки. Азәрбайчанда яхшы битсә дә, чох аз әкилир.

Чөл сүдоту (*Sonchus arvensis*) (шәкил 268). Зибилли ерләрдә битән чохиллик отдур. Һүндүрлүйү 60—80 см-дир. Бундан башга, тәрәвәз сүдоту (*S. oleraceus*) вә тиканлы сүдоту (*S. asper*) нөвләри чох кениш яйылмышдыр. Онларын чаван ярпаглары каһы кими ейилир. Көвдәләринин габыгыны союб ейирләр. Яхшы бал верәндир. Чөл сүдотунун ярпагларында 29,6 мг%, тәрәвәз сүдотунда исә 56,2—67,3 мг% «С» витамини вардыр. Чөл сүдотунун тохумунда 31,5% яғ олуп.

Касны (*Cichorium intybus*). Азәрбайчанын орта дағ гуршагына гәдәр һәр ериндә, гуру, зибилли ерләрдә, мешә кәнарларында битән вә Һүндүрлүйү 1,5 м-ә гәдәр олан чохиллик отдур. Чаван ярпаглары каһы кими ейилир, бундан башга гышын әввәлләриндә топланыб гаранлыг зирзәмидә гоюлмуш көкләриндә әмәлә кәлән сары зоғлар да гышда каһы кими ейилә биләр. Тәркибиндә 1,12% азот бирләшмәләри, 0,12% яғ, 2,83% экстрактив маддәләр вардыр. Говрулмуш көкүндән яхшы гәһвә һазырланыр вә әтир вермәк үчүн башга гәһвәләрә гарышдырыла биләр. Гурумуш көкләриндә 31,71—59,72 мг% инулин, 2,23—4,25% фруктоза вә ачы интибин глүкозиди вардыр. Говрулан заман бу ахырынчы маддә парчаланыб сикориол адлы әтирли яғ әмәлә кәтирир. О да чох яхшы ий верир вә бәдән үчүн зәрәрсиздир. Көкүндә инулин олдуғундан ондан шәкәр алмаг үчүн истифадә олуна би-

ләр. Яхшы бал биткисидир: Көкүндә 2,5 гамма «В» витамини, ярпагларында 78,9 мг % «С» витамини вардыр. Бу биткиниң Азербайчанда әтият чох бөйүкдүр.



Шәкил 268. Чөл сүдотү (*Sonchus arvensis*).

1—биткиниң үмүм көрүнүшү; 2—ичкинсели чичәйи; 3—көкүлли тохуму.

Ири емлик (*Tragopogon major*) вә шәргемлийи (*T. orientalis*). Азербайчанда чәмәнләрдә вә кол араларында битән кениш яйылмыш биткиләрдир. Бириллик биткиниң көкү пайызда чыхарылыб ачылыгы кетсин дейә дузлу суда бишириләрәк ейилир.

Габыгы тәмизләнмиш чаван көвдәләри дә чий-чий ейилир. Көкүндән яхшы гәһвә һазырланыр. Шәрг емлийи нөвүңүн тохумунда 6,17% яғ вардыр.

Таусаггыз (*Scorzonera Tau-saghuz*). Чохиллик, йоғун, кобуд көкләри олан вә көк бичләри верән биткидир. Көвдәләри вә ярпаглары дибдән сых дәстә илә ерләшдийиндән балынча охшайыр, зоғлары чох гыса олуб, кечән илләрдән галан ярпагларла өртүлмүшдүр. Көкүнүн габыг һиссәсиндә лахталашмыш каучук вар. Чох йүксәк кейфийәтли олан каучукун мигдары 40% чатыр. Таусаггыз ябаны һалда Орта Асияның Каратау сырадағларында битир.

ЧАЙЧИЧӘКЛИКИМИЛӘР (*Guttiferales*) СЫРАСЫ

Һәмин сыра бундан габагкы бәнөвшәчичәклиләр вә ән ибтидан олан чохмөйвәлиләр сырасы илә яхындыр. Она көрә күман әтмәк олар ки, һәм чайчичәкликимиләр, һәм дә бәнөвшәчичәклиләр сырасы чохмөйвәлиләрдән инкишаф әтмишдир. Мәсәлән, чайчичәкликимиләр сырасының тропик өлкәләрдә битән *Dilleniaceae* фәсиләсиндә касачыг ярпагларының 3—5, ләчәкләрин 3—5-ә гәдәр, эркәкчикләрин чох вә геһри-мүәйиәнлийи, дишичийин бир вә я чох мигдарда, апокарп вә синкарп олмасы чайчичәкликимиләрин чохмөйвәлиләрлә әлагәдар вә яхын олдуғуну сүбүт әдир.

Чайчичәкликимиләрдә дә тохумлуг икиөртүклүдүр, тохумдашыяны мәркәздәдир, анчаг аз-аз һалларда янда олур.

Бу сыраның Азербайчанда ики фәсиләси вардыр: 1) чай фәсиләси, 2) бойчичәйи фәсиләси.

Чай (*Theaceae*) фәсиләси

Фәсиләнин нүмайәндәләри ағач вә кол биткиләридир. Ярпаглары нөвбәли дүзүлмүшдүр, бүтөв вә бир вахтда төкүлмәйәндир, һәмишәяшыл биткидир. Касачыг ярпаглары 5—7, ләчәкләри 4—9 вә я даһа чохдур. Ләчәкләри бә'зән дибдән бир гәдәр битишиқдир. Эркәкчикләри чохунда геһри-мүәйиән мигдардадыр, дибләри илә битишиб 5 дәстә әмәлә кәтирмишдир. Юмурталыгы 2 вә я чохювалыдыр. Мөйвәси гутучуг, бә'зән фындыгчыг вә аз-аз һалларда киләмөйвәдир.


Чай фәсиләси биткиләринин вәтәни Шәрги Асияның тропик вә субтропик ерләридир. Бу фәсиләнин ән мұһүм чинси чайдыр.

Чайын (*Thea*) әсас ики нөвү әкилир: Чин чайы (*Thea sinensis*) вә Һиндистан чайы (*Thea assamica*).

Бу ахырынчы чай нөвү Һиндистаның Ассама вилайәтиндә битдийинә көрә, нөвүн ады һәмин ерин ады илә адландырылмышдыр. Бу нөв, кейфийәт әтибарилә биринчидән даһа йүксәқдир, ССРИ-дә кениш әкилән нөв Чин чайыдыр.

Чин чайы (шәкил 269) кол вә я ағачдыр. Ярпаглары гышда төкүлмәйән, дәривари, эллипсшәкилли учдан даралмыш, кәнарлары ити мышар дишли, үстдән түнд яшылыдыр. Чичәкләри

икийинсли, тәк-тәк вә я дәстә илә голтуглардадыр. Чичәкалтлыгы тез төкүлүр. Касачыгы 5—9 ярпагыдыр вә ялныз диб һиссәси битишикдир. Эркәкчикләри чохдур, дибдән ләчәкләрә битишмишләр, ләчәкләрә бирликдә төкүлүр. Юмурталыгы юхары, 3—4



Шәкил 269. Чин чайн (*Thea sinensis*).

Юхарыда—чичәкн вә мейвәли будагы; солда—чичәйи; сәрдә—мейвәсинин эничә кәсийи.

ювалы вә түклүдүр. Сүтунчуғу чылпаг, узун вә үчбөлүмлүдүр. Мейвәси буғумлу, гутучугдур. Тохумлары габырғалы, ләпәләри яғлыдыр.

Чайын ябаны нөвләри Гинд-Чиндә, Чиндә вә Гиндистанда битир. Чиндә чайын бечәрилмәсинә бизим эрадан чох габаг башланмышдыр. Чайла бизим илк танышылыгымыз 1638-чи илдә чинлиләр васитәсилә олмушдур.

ССРИ-дә анчаг Гәрби Күрчүстанда (хүсусән Ачарыстанда) Азәрбайчанда (Ләнкәран, Гах, Загәтала, Балакән районларында) әкилир. Азәрбайчанда чай 1936-чы илдән әкилмәйә башланмышдыр. 1955-чи илдә 6880 гектара гәдәр әкилмиш вә 3361 тон мәнсул алынмышдыр.

Чайын ярпагында синир системини гычыгландыран 2,79% кофеин вә 12,35% ашы маддәси вардыр. Чайын яшыл ярпагында 640 гамма гәдәр, һазыр чайда исә 1.570 гамма «А» провитамины вардыр. Чай ярпагындан алынган ширәдә 300—500 биоложи вәһид «К» витамини олур.

Япон гызыл күлү вә я япон камелиясы (*Camellia japonica*). Ағач вә я колдур, ябаны һалда Асиянын чәнуб-шәрг һиссәсиндә битир. Бәзи тәснифатчылар чайы *Camellia* чинсинә дахил әдирләр. Бәзән бағларда вә эвләрдә бечәрилән һәмәшә-яшыл вә рәнкарәнк чичәкләр ачан бәзәк биткисидир. Онуи башга нөвләринин тохумундан пийли яғлар алыныр.

Дазы, бойчичәйи (*Guttiferae*) фәсиләсин

Бойчичәйи фәсиләсинин чичәкләри икийинсли, мүнтәзәм, касачыг ярпаглары вә ләчәкләри 4—5-дир. Ләчәкләри гөнчәдә икән узунуна татланмышдыр. Эркәкчикләри чохдур. Онлар сәрбәстдир вә я дибдән бирләшиб үч-беш дәстә әмәлә кәтирмишдир. Юмурталыгы юхарыдыр, 3—5 мейвәярпагындан әмәлә кәлмишдир вә 1—3—5 ювалыдыр. Тохумлары эндоспермсииздир. Бүтүн органларында ифразат тохумалары вардыр.

Бу фәсиләнин биздә ялныз дазы, бойчичәйи (*Hypericum*) чинси битир. Онуи Азәрбайчанда 8-дән чох нөвү вардыр.

Онлар башлыча олараг чохиллик отлардыр. Ярпаглары гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, үзәрләри парлаг нөгтәлидир. Чичәкләри сары, мейвәләри гутучуг вә я киләмәйвәдир. Нөвләринин һамысы гәтран ийи верир. Әсас нөвү:


Дәлибойчичәйи (*Hypericum perforatum*) (шәкил 270). Ярымсәһралардан вә алп гуршагындан башга һәр ердә битир. Онда 95—135 гамма «А» провитамины, 101,3—120 мг% «С» витамини вә биткинин бүтүн һиссәләриндә 10%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр. Көвдә вә ярпагларындан юн, ипәк вә памбыг парчалары гырмызы рәнкә боямаг үчүн истифадә олунур.

ГАРАКИЛӘЧИЧӘКЛИЛӘР (*Ericales*) СЫРАСЫ

Бәзи систематикләр бу сырая мәнсуб олан биткиләрин тоз кисәсинин буйнуз шәклиндә юхары доғру чыхынты вердийини нәзәрә алараг һәмин сыраны икибуйнузулар (*Bicornes*) сырасы адландырырлар. Бу чыхынтыларын учунда чохлу дешик вардыр вә тоз кисәси чеврилән заман тозчуғлар бу дешикләрдән төкүлүр.

Гаракиләчичәклиләрин үмуми чичәк гурулушунуи чайчичәк-лиләр сырасынынкына охшамасы, о чүмләдән юмурталыгыи та-

мамилә ювалара бөлүнмәси мәркәзи тохум даяначагы олмасы, тоз кисәсинин тәпәдән ачылмасы, тохумлуғун гурулушу вә и. а. бу ики, сыранын бир-биринә яхынлығыны көстәрир.



Шәкил 270. Дәлибойчичәйи (*Hypericum perforatum*)

1—биткиннә үмүми көсүнүшү;
2—чичәйи; 3—мейвәси; 4—һин диаграмы

(*Rhododendron*) чинсләри, онларын да һәр биринин ики нөвү битир.

Сарычичәк ағыағачы (*Rhododendron flavum*) (шәкил 271). Чичәкләри сары рәнkdә олан 2 м һүндүрлүkdә коллардыр. Загатала районунун субалп чәмәнләриндә вә мешәләрин кәнарла-

Гаракиләчичәклиләр сырасында чичәкләр мүнtәзәм вә я гейри-мүнtәзәм олур. Тачы битишик вә сәрбәстләчәклидир. Эркәкчикләр ики даирә үзрә дүзүлмүшдүр. Бәзән һәммин даирәләрдән биринин эркәкчикләри ихтисар олундуғу үчүн онларын яһиыз изләри галыр. Дишичийи 2—4 вә я 5 мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, юхары вә я ашағы юмурталытлыдыр. Тохумлуғу бирөртүклүдүр.

Гаракиләкимиләр (*Ericaceae*) фәсиләси

Чичәкләри икичинсли, мүнtәзәм вә я бир аз гейри-мүнtәзәмдир. Касачығы мейвә яһиыз галандыр. Тачы битишикләчәклидир, 4—5 һиссәйә бөлүнмүшдүр, бәзән о гәдәр дәрин бөлүнүр ки, сәрбәстләчәкли кими көрүнүр. Эркәкчикләри ләчәкләринин сайы гәдәрләр вә я онлардан ики дәфә артыгдыр. Эркәкчик саплары сәрбәст вә аз-аз һалларда битишикдир. Тозлуғлары икиювалыдыр вә чох вахт буйнуз шәклиндә хусуси чыхынтысы вардыр. Дешикләр васитәсилә ачылыр. Юмурталыгы 4—5 ювалы, ашағы вә я юхарыдыр. Мейвәләри киләмәйвә, гутучуг вә я чәйирдәкмейвәдир. Коллар, ярым коллар вә аз-аз һалларда ағачлардыр. Ярпаглар чохунда бәсит вә нөвбәлидир, ярпаг алтыглары йохдур, гышда төкүлмәйәндир. Азәрбайҗанда гаракилә (*Vaccinium*) вә ағыағачы

рында битир. Ярпаг вә чичәкләриндә 0,15—0,17%-ә гәдәр әтирли яғ вардыр. Зәһәрли биткидир. Бәзәк биткиси кими әкилмәйә лаһингдир.

Гафгаз ағыағачы (*R. caucasicum*) һүндүрлүйү 1 м-ә гәдәр олан алчаг коллардыр. Бөйүк Гафгаз сырадағларынын субалп гуршағында битир. Чичәкләри ири, гырмызы, зәһәрли биткидир. Чичәкләринин көзәллийи хатиринә бәзәк биткиси кими әкилиб бечәрилмәйә лаһингдир.

Гаракилә (*Vaccinium myrtillus*); һүндүрлүйү 20—40 см олан хырда коллардыр (шәкил 272). Киләмәйвәси күрәви вә гаракейүмтүлдүр. Субалп вә алп гуршағында битир. Мейвәси чий һалда ейилир вә мүрәббә үчүн ярарлыдыр. Ширәсиндә 2,78% клүкоза, 3,77% фруктоза, 0,9% сахароза, 0,97% лимон вә алма туршулары вардыр. Ширәси ичкиләри түнд гырмызы рәнkdә боямаг үчүн ишләдилир. Яхшы бал верән биткидир. Ондан алыннан бал чох яхшы әтирли вә гырмызы рәнkdә олур. Мейвәсиндә 7%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр. Тәбәбәттә ушаг мәдә хәстәликләринин (ишәл, патар вә с.) мүәличәсиндә ишләдилир. Мейвәсиндә 6 мг% «С» витамини, тохумунда зәйәрәк яғына охшар гуруян 31% яғ вардыр. Мейвәси гырмызы вә бәнәвшәйи бояг верир.

Гарашаггалы вә я Дағыстан чайы, я да «Гафгаз чайы» (*Vaccinium arctostaphylos*). Нисбәтән һүндүр коллардыр. Азәрбайҗанын гәрб һиссәсиндә вә Ләнкәранда алп гуршағында битир. Киләмәйвәси күрәви вә гара рәнkdәдир. Мейвәси гаракилә кими емәлидир. Ярпағыны чай кими дәмләмәк олар, анчаг дәмләнмиши ағызы бүзүшдүрүр. Тәркибиндә 3,39—12,71%-ә гәдәр ашы маддәси вардыр.

МӘРКӘЗТОХУМЛУЛАР (*Centrospermae*) СЫРАСЫ

Мәркәзтохумлулар сырасынын нүмайәндәләри отлар, коллар вә я ярымколлардыр. Чичәкләри биргат вә я икигат яһиызлы, бирчинсли вә я икичинслидир. Эркәкчикләри чичәкяһиызлығынын сайы гәдәрләр, лакин ондан аз вә я чох да ола биләр. Дишичийи бир вә я бир нечә мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталыгы бирювалы, юхары вә я ашағыдыр. Характер хусусийәтләриндән бири рүшеймин мүхтәлиф формада гыврылмасыдыр. Тохумларында эндосперм йохдур.

Сыранын ән бәсит гурулушлу нүмайәндәләри пәрпәтөйүт вә уһиу чә фәсиләсидир.



Шәкил 271. Сарычичәк ағыағачы (*Rhododendron flavum*)

1—чичәйи будағы; 2—биткиннә узунуна көсийи.

Уннуча фәсиләсинин чичәкләри көркәмсиз, 5-типли, биргат янлыгы, касашәкиллидир. Чичәкләр юмағаохшар чичәк группларына топланмышдыр. Юмағаохшар чичәк групплары да сүпүркә-вари групплар эмәлә кәтирмишдир. Уннуча чинсиндә дишичик ики, аз-аз һалларда 3—5—ағызчыгылдыр күләк васитәсилә тоз-паныр. Бүтүн чинсләриндә эркәкчикләр чичәкянлыгы һиссәләри илә гаршы-гаршыя дурур.



Шәкил 272. Гаракилә (*Vaccinium myrtillus*).
1 вә 2—чичәкни будагы; 3—мейвәли будагы; 4—чичәйинни
үзүчүна кәсийи; 5—эркәкчикләри

Сыранын ән бөйүк фәсиләси гәрәнфилчичәклиләр (*Caryophyllaceae*)-дир. Онун нүмайәндәләринин чохунда чичә-йин тачы рәнклидир, һәшәрәт васитәсилә тозланмаға уйғулаш-

мышдыр вә харичдән касачыгла әһәтә олунмушдур. Касачыг чохунда битишикярпагы олур. Чичәк үмүмийәтлә бештипидир.

Чичәк группу дихазияшәкилли олуб, уннуча фәсиләсинин чичәк группларындан тамамилә фәртләнир. Лакин гәрәнфилчичәк-лиләрин бәсит формалары, чичәйинин биргат янлыгы олмасы вә күләк васитәсилә тозланмасы илә уннуча охшайыр. Уннуча вә гәрәнфилчичәклиләр харичи көрүнүшләри илә бир-бирләриндән кәскин сурәтдә фәртләнсәләр дә тохумларында перисперм адла-нан һиссә илә әһәтә олунмуш рүшәймин ортадан әйилмиш вәзийәтдә ерләшмәси, һәмин фәсиләләри мәркәзитохум-лулар (*Centrospermae*) ады алтында вәһид бир сырая бирләш-дирмәйә имкан верир.

Пәрпәтөйүн (*Portulacaceae*) фәсиләси

Пәрпәтөйүн фәсиләси бириллик вә я чохилик отлардыр. Ярпаглары әтли вә сулудур. Чичәкләри тәк-тәк олуб, ярпаглары-нын голтуғунда саплагсыз ерләшмишдир, икичинсли вә я бир-чинслидир. Чичәкянлыгы икигатдыр. Мейвәләри гапагла ачылаш чохтохумлу гутучугдур.

Бу фәсиләнин ән мүнүм чинси гәрәвәз пәрпәтөйүнү-дүр (*Portulaca oleracea*). О, торпаг үзәринә сәрилән вә әтли көв-дәләри әтрафа дағылан бириллик от биткисидир. Ярпаглары кү-рәкшәкилли, әтлидир. Чичәкләри хырда, сары рәнкләдир. Әкин-ләрдә, хусусән тәрәвәз саһәләриндә кениш яйылмыш алаг отудур. Бә'зән бир тәрәвәз биткиси кими әкилир. Тәркибиндә чохлу «С» витамини вардыр. Довға, шорба, гутаб үчүн тәзә-тәзә вә гурумуш һалда ишләдилир.

Portulaca grandiflora нөвүнүн чичәкләри даһа иридир, гыр-мызы, мәһрайы, сары, нарынчы, ағ вә саир рәнкләрдә олур. Ярпаг-лары әтли цилиндр шәклиндәдир. Көвдәләри сәриләндир. Бәзәк биткисидир, кениш бечәрилир.

Гәрәнфилчичәклиләр (*Caryophyllaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин нүмайәндәләриндә бир сыра нисбәтән икинчи дәрәчәли алилик әләмәтләри олдуғундан, мәркәзитохумлулар сы-расынын ән тәкамүл әтмишидир. Чохунда кәса ярпаглары мейвә янында галандыр, дөрд-беш дишли вә бору шәклиндәдир. Ләчәк-ләри чохунда инкишаф әтмишдир, аз-аз һалларда ләчәксиздир, касачығын дишләрилә нөвбәли сурәтдә дүзүлмүшдүр вә онларын сайы гәдәрди. Чохунун ләчәкләриндә дырнагчыг эмәлә кәлмиш-дир. Эркәкчикләри тамамилә инкишаф әтмишдир, ләчәкләринин сайындан аздыр вә я онлара бәрабәрди, я да онлардан ики дөфә артыгдыр. Харичи даирәнин эркәкчикләри ләчәкләрлә гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, дахили даирәдәкиләр исә ләчәкләрлә нөв-

бэләшир. Дишичийи бир вә я бир нечә олуб, сәрбәст сүтунчуглудур, ағызчыглары бүтөвдүр. Чичәкләри чохунда әлван олуб дихазия чичәк группна топланмышдыр. Мейвәләри чохтохумлу, бирювалы вә я чохювалыдыр. Юмурталыгы юхарыдыр вә ортасында тохумдашыяны вардыр. Ярпаглары бәсит вә гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, аз-аз һалларда дәстә илә дүзүлмүш олур, ярпагалтыглары адәтән йохдур. От вә ярымкол һалында битир.

Бу фәсиләнин нүмайәндәләри дүнянын һәр ериндә кениш яйылмышдыр. Азәрбайчанда 30 чинси вә 70-дән артыг нөвүнә раст кәлинир.

Фәсиләнин бүтүн дүняда вә о чүмләдән Азәрбайчанда кениш яйылмыш нөвү чинчилиmdir (*Stellaria media*). Чинчилимин көвдәси сүрүнән, әйилиб-галхан вә цилиндрикдир. Ярпаглары ромбшәкилли вә саплаглыдыр. Қасачыг ярпаглары вә ләчәкләри беш-бешдир вә 4—5 мм узунлуғундадыр. Эркәкчикләри 3—5, бәзән 10-дур. Азәрбайчанын субалп гуршағына гәдәр һәр ериндә, зибилликләрдә, тәрәвәз әкинләринин арасында вә нәм ерләрдә яйылмышдыр. Язда һәлә чаван икән шорба, гутаб вә саирә биширилир. Ярпагларында 43—44 гамма «А» провитамины вә чаван от һиссәсиндә 45,8 мг% «С» витамини вардыр. Әв гушлары чинчилими һәвәслә ейир. Буна көрә әв гушлары үчүн яшыл ем олараг бечәрилмәлидир.

Әсл гәрәнфил (*Dianthus caryophyllus*). Онун бәзәк үчүн бечәрилән бир чох чешидләри вардыр.

Түклү гәрәнфил вә я әкин гәрәнфили (*Agrostemma gitago*). Тахыллар арасында битән алаг отудур, тохумлары зәһәрлидир.

Сабыноту (*Saponaria officinalis*). Зәһәрли биткидир, көкүндә сапонин вардыр.

Көпүкөту (*Gypsophila bicolor*). Көкүндә сапонин олдуғундан көпүк верән бир маддә кими фышылдаян ичкиләр вә пивә истәһсалында ишләдилир. Ондан бир дә һалвалара парлаглыг вермәк үчүн истифадә эдилир.

Тәрәчичәклиләр, Уннучакимиләр (*Chenopodiaceae*) фәсиләси

Тәрәчичәклиләр фәсиләсинин Азәрбайчанда 32 чинси вә 100-дән артыг нөвү вардыр. Әксәриййәти отлардыр. Чичәкләри бирчинсли вә я икичинслидир, мүнғәзәмдир, чохунда чичәк группу юмаг шәкиндәдир. Чичәк явлығы йохдур, я лә 1—5 ярпагчыгдан ибарәтдир, көркәмсиздир. Эркәкчикләри чичәкявлығынын сайы гәдәрдир вә онларла гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Мейвә ярпаглары 3-дән 5-ә гәдәрдир. Юмурталыгы бирювалы вә юхарыдыр, биртохумлуғлудур, рүшәйми әйилмиш вә я гывырлымышдыр. Эндоспермәсиздир. Мейвәси фындыгыдыр. Ярпагалтыглары йохдур. Демәк олар ки, нүмайәндәләринин чоху гураглыг биткиләри олуб, шоранлыгларда, сәһра вә ярымсәһраларда яйылмышдыр, бир чо-

ху да алаг отудур. Фәсилә чохнөвлү олса да, бечәрилән мэдәни нөвләри аздыр.

Чуғундур (*Beta*) чинсинин нөвләри чохиллик, икииллик вә я бириллик от биткиләридир. Чичәкләри юмагшәкилли чичәк группларына топланмышдыр. Һәр чичәк группна 2-дән 8-ә гәдәр чичәк олур, онлар бир-биринә битишмишдир. Чичәкявлығы 5-дир, садәдир, хырда вә яшыл рәнkdә олуб, ашағыдан битишикидир. Мейвә етишән заман чичәкявлығы одунлашыр. Эркәкчикләри 5-дир. Дишичикләри 2-дән 5-ә гәдәр мейвәярпагларындан ибарәтдир. Мейвәләри гапаг васитәсилә ачылан гутучугдур, етишән заман мейвәявлығындан айрыча бир гапаг әмәлә кәлир вә онун васитәсилә гутучуг ачылыр. Мейвәләри 2—8 олуб, бәркдир, яланчы мейвә группу әмәлә кәтирир.

Ади чуғундур (*Beta vulgaris*) нөвү бириллик вә икииллик от биткисидир. Икииллик формасы биринчи ил торпағын алтында ири турп вә я әһтият маддәләри чох олан ий шәкилли йоғун көк, торпағын үстүндә исә, гывырм аялы вә йоғун саплаглы ири көкәтрафы розет әмәлә кәтирир, икинчи ил көкдә топланан әһтият маддәләри һесабына ерүстү көвдә, онун да үзәриндә ярпаг вә чичәкләр әмәлә кәлир.

Ади чуғундурун бир нечә формасы вардыр. Мәсәлән, зылх (*Beta vulgaris var. cicla*), шәкәр чуғундуру (*Beta vulgaris var. saccharifera*), ем чуғундуру вә с. Бу формалардан башга Абшеронун шоранлыгларында ябаны һалда чохиллик чуғундур (*Beta perennis*), Ләнкәран районунун гуру ямачларында битән парча мейвәли чуғундур (*Beta lomatogona*). Губа районунун дашлы-гаялы ямачларында битән ирикөк чуғундур (*Beta macrorrhiza*). Кировабад районунун орта дағ гуршағында вә отлу ямачларында битән үчағызчыглы чуғундур (*Beta trigyna*) нөвләри вә саирә дә кениш яйылмышдыр.

Шәкәр чуғундуру шәкәр истәһсалы чәһәтдән ССРИ дүняда биринчи ери тутур. Чохиллик чуғундурун көкү ейилир, ярпагларындан тәрәвәз кими истифадә олунур. Ади чуғундурун ярпагларында кифайәт гәдәр «А» провитамины вә «С» витаминләри вә көкләриндә «В» витамини вардыр.

Фәсиләнин бечәрилән чинсләриндән бири дә испанаг вә я шомудур (*Spinacia oleracea*). Испанаг бириллик, аз-аз һалларда икииллик от биткисидир. Ярпаглары, көк әтрафы розет һалында икән, тәрәвәз олараг ишләдилир. Икиәвли биткидир. Чичәкявлығы вә эркәкчикләри дөрд-дөрддүр. Дишичийи 2-дән 5-ә гәдәрдир, сапшәкилли ағызчыглыдыр. Мейвәси етишән заман диши чичәйинин чичәкявлығы одунлашыр, бунун дишләри битишәрәк тиканлы габыг әмәлә кәтирир. Мейвәләри группмейвәдир. Ярпагларындан иштаһ дәрманы һазырланыр. Испанагда «А», «В», «С», «Д», «К» витаминләри чохдур. *S. tetrandra* нөвү Азәрбайчанын Кировабад, Бақы районларында вә Нахчыван МССР-ин

бә'зи районларында гуру ямачларда ябаны һалда битир. Онда испанаг кими истифадә эдилір.

Ярпагланынын тәркибиндә «К» витамини олдуғундан ган кәсән дәрман кими ишләдилә биләр. «А» провитамини 134—400 гамма олмагла «С» витамини дә аз дейилдир. Тохумларында 16-дан 22%-ә гәдәр яғ вардыр. Биткинин күлүндә поташ чохдур. Көкләриндән сары, ярпагларындан исә яшыл бояг алыныр.

Пәнчәрләр (*Amaranthaceae*) фәсиләси

Әксәрийәти бириллик, аз-аз һалларда чохиллик от биткиләридир. Ярпаглари бүтөв, нөвбәли вә я гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр, яшыл, түнд гырмызы вә я алабәзәк рәнkdәдир. Чичәкләри хырда, бирчинсли вә я икичинслидир, харичдән өртүчү ярпаг вә чичәкалтлығы илә әһәтә олунмушдур. Чичәк групплары чох вахт сүнбүлшәкилли олуб, чох сыхдыр. Чичәкянлыглары садә, пәрдәвари, 3—5 бөлүмлү, яшылымтыл вә я гонур-гырмызы рәнkdәдир. Эркәкчикләри 5-дир, чичәкянлығы ярпагларла гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Юмурталыгы бирювалы вә юхарыдыр. Мейвәси кисәчик вә я гутучугдур.

Фәсиләнин ССРИ-дә 5 чинси вардыр. Бунлардан 3 чинсинин нүмайәндәләри Азәрбайчанда яйылмышдыр. Һәммин чинсләрдән әһәмийәтлисидир вә нөвү чох оланы пәнчәр (*Amaranthus*) чинсидир ки, бунун да Азәрбайчанда 9 нөвү вардыр. Бунлар бириллик, бирәвли вә икиәвли отлардыр.

Ярпаглари дибдән чив шәклиндәдир. Голтуг чичәк групплары исә сүнбүл шәклиндәдир. Юмурталыгы биртохумлуғлудур. Бә'зиләри әкилиб бечәрилир, чоху исә алаг отудур.

Онлардан гуйруглупәнчәр (*A. caudatus*) бирилликдир. Чичәк группу сүнбүл шәклиндә, сых, узун вә салланандыр. Тохумлары хырда, нишасталыдыр, бә'зән хәрәйә төкүлүр. Бәзәк биткисидир.

Афпәнчәр (*A. albus*) бириллик отдур, ярпаг вә чичәк групплары ачыг яшыл рәнkdәдир. Кисәчикләри ачылмыр, тохумлары ишыгда чүчәрир, Азәрбайчананын бүтүн районларында кениш яйылмышдыр.

Ади пәнчәр, гырмызы балдыр вә саирә нөвләри кениш яйылмыш алаг отларыдыр, чох зәрәрли олуб, асанлыгла артыб яйылыр. Көвдәләри цилиндр шәклиндәдир вә дибдән чохла будаг чыхарыр. Ярпаглари тәпәдән оюг тиканлы вә хырдадыр.

КИЧИТКАНЧИЧӘКЛИЛӘР (*Urticales*) СЫРАСЫ

Кичитканчичәклиләр сырасы, фыстыгчичәклиләр (*Fagales*) сырасынын филокенетик йолла тәкамүл әдиб мүрәккәбләшмәси нәтижәсиндә әмәлә кәлмишдир. Фыстыгчичәклиләр сырасында халазогамия әвәзиндә прогамия вә мезогамия кечид һаллары

вардыр; мәсәләч, гарагачларда күлөк васитәсилә тозланма фыстыга нисбәтән даһа мүкәммәлдир, кичитканкимиләр фәсиләсиндә эркәкчийин саплағы тоз кисәләри партлаян заман бирдән-бирә әйиллийин тән һәммин тозла тозланыр ки, бу да фыстыгчичәклиләрдәкинә нисбәтән бир гәдәр әлвәришлидир вә с. Кичитканда кичишдиричи зәһәрли түкләрин олмасы биткинин өзүнү горумасына көмәк әдән йүксәк тәкамүл әләмәтидир.

Кичитканкимиләр отлар вә ағачлардыр. Чичәкләри мүхтәлиф чичәк группларына топланмышдыр, даирәви, чоху бирчинслидир. Чичәкянлығы касашәкилли, чохунда 4 (ики чәркәдә) вә я 6-дыр, аз-аз һалларда чичәкянлығы олмур. Эркәкчикләри 4-дән 6-я гәдәр олуб, чичәкянлығы илә гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Мейвә-ярпағы 1 вә я 2-дир. Юмурталыгы бирювалы вә юхарыдыр. Тохумлуғу 1-дир вә 1-интегументлидир. Мейвәләри чәйирдәкмәйвә вә я фындыгчыгдыр. Тохуму эндоспермлидир.

Бурая дахил олан биткиләр группу бир-биринә о гәдәр яхындыр ки, бә'зи систематикләр онлары кичитканкимиләр фәсиләси ады илә үмуми бир фәсиләйә бирләшдирир, диқәрләри исә бу сыраны ашағыдакы дөрд мүстәгил фәсиләйә айырыр: туткимиләр, чәтәнәкимиләр, кичитканкимиләр вә гарагачкимиләр.

Туткимиләр (*Moraceae*) фәсиләси

Фәсиләнин бүтүн нүмайәндәләри ағачлардыр, аз-аз һалларда отлардыр. Бә'зиләриндә сүд ширәси борулары вардыр. Чичәк групплары гейри-мүәййәндир. Чичәкләри бирәвлидир, чичәкянлығы үзвләри даирәви дүзүлмүшдүр. Чичәкянлығы бәсит, касачыг шәкилли, көркәмсивдир, 2—6 үзлүдүр. Эркәкчикләри дә о гәдәрди Дишичийи ики ағызчыглы, бирювалы вә юхары юмурталыглыдыр (шәкил 273). Мейвәләри чохунда чәйирдәкмәйвәдир. Әксәрийәти тропик вә субтропик биткиләрдир, сүд ширәләриндә каучук вардыр.

Бу фәсиләнин әһәмийәтли чинси тутдур (*Morus*). Тут чивсинин Азәрбайчанда әсас үч нөвү битир: аф тут (*M. alba*), хар тут (*M. nigra*) вә гырмызы тут вә я чәкил *M. rubra*). Онларын да һәр биринин бир нечә форма вә чәшиди вардыр.

Аф тут һәм әкилир, һәм дә ябаны һалда битир. Мейвәсиндә 10,91% мүхтәлиф шәкәрләр, 0,62% алма туршусу, тохумларында 24—33% мүхтәлиф пийли яғлар вардыр. Мейвәләри чий вә гурудулмуш һалда ейилир. Ондан бәһмәз (дошаб), лаваш, ирчал газырланыр, тутун һәр үч нөвүндән чох яхшы тут арағы чәклир. Чәкил (*M. rubra*) адланан нөвүнүн етишмәмиш гырмызы мейвәсиндә 1,5—4% гәдәр лимон туршусу вардыр. Бунун ярпаглари чох зәриф олуб, ипәк гурдунун еминин әсасыны тәшкил әдир.

Гара тутун ярпагында 240—370 мг%-э гэдэр «С» витамини вардыр. Тутун лифлэриндэн тохучулугда истифадэ этмэк олар.



Шәкил 273. Аг тут агачы (*M. alba*) будағы.

1—диши чичәкләрдән ибарәт олан сырғачылы будаг; 2—диши чичәйи; 3—диши чичәйи диаграммы; 4—эркәк чичәкләрдән ибарәт олан сырғачылы будаг; 5—эркәк чичәйи; 6—эркәк чичәйини диаграммы.

Тутун вәтәни Шәрги Асиядыр. Тут Азәрбайчанын бир чох районларында вә хусусән Абшеронда мешә золағлары салмаг вә яшыллашдырма үчүн чох ярарлыдыр.

Бу фәсиләнин әһәмиyyətли числәриндән бири дө әнчирдир (*Ficus*). Әнчир чинсинин 600-э гэдәр нөвү вардыр. Онлар башлыча олараг Асиянын вә Африканын субтропик өлкәләриндә яйылмышдыр.

Ади әнчир (*F. carica*) бирәвли вә я икиәвлидир—кол вә я агачлардыр. Ярпағлары нөвбәли вә я гаршы-гаршыядыр, ири, бүтөв вә я бармапшәкилли дилимли, я да кәсилмишдир. Чичәкләри армуда вә я габағаохшар гапалы чичәк групна топланмышдыр, учларындакы дешик васитәсилә ачылыр. Эркәк чичәкләр чичәк групунун дешийи әтрафында топланмышдыр Эркәк-чикләр 2-дән 6-я гэдәрдир, чичәкянлыгы 2—6 бөлүмлүдүр. Диши чичәкләри чичәк группу бошлуғунун галан һиссәсини тутур, 5 дилимлидир. Диши чичәкләри мейвә верән вә мейвә вермәйән олур. Мейвә вермәйәнләрә гысыр чичәкләр дейилир. Онларын дишичийини сүтүнчүгү, мейвә верәнләринкинә нисбәтән гыса олур. Юмургалыгы бирювалы, юхарыдыр Мейвәси фындыгчыгдыр. Энтомофилдир. Әнчирин етишмиш тәзә мейвәсиндә 0,2 гамма, гурусунда 2,0—2,12 гамма «В» витамини, ярпағларында 40,9—333,4 мг% «С» витамини вардыр. Витаминин мигдары яз вә пайыз айларында аз, яй айларында исә чох олур.

Азәрбайчанын гуру субтропик районларында бир чох әнчир чешиди вардыр. Әнчирин гиймәтли чешидләриндән бир чохуну Азәрбайчанда әкиб етишдирмәк үчүн бөйүк имкан вардыр. Әнчир ябаны вә мэдәни һалда Азәрбайчанын Абшерон. Ләнкәран Шамахи, Кировабад, Көйчай, Загатала, Гах, Нуха, Варташен, Агдаш районларында, Нахчыван Мухтар Республикасында вә саирәдә битир. Бундан башга Орта Асияда, Крымда, Күрчүстан вә Эрмәнистанда кениш яйылмышдыр. Әнчир гурағлыг районларда, гуру ямачларда мешә бағлары салмаг үчүн кениш мигяда әкилә биләр.



Шәкил 274 *Ficus elastica*

Әңгир чинсинин бир чох нөвләри тропик өлкәләрдә яшаян вә каучук верән биткиләрдир. Мәсәлән *Ficus elastica* *F. bengaliensis* (шәкил 274), вә с. гушлар бә'зән онларын тохумуну башга ағачларын көвдәләринин үзәринә салыр вә тохумундан әмәлә жәлән чүчәртиләр бир мүддәт орада эпифит һалда яшайыр. Бу мүддәт әрзиндә онун әмәлә кәтирдийи һава көкләри торпаға чатыб чадыр шәклини алмасына сәбәб олур. Сонра битки бу һава көкләри васитәсилә мүстәгил яшайыр.

(*Ficus*) чинсинин бә'зи нөвләри тропик өлкәләрдә битән лианлар вә эпифитләрдир, бә'зи нөвләри дә бәзәк биткиси кими



Шәкил 275. Чөрәкағачы (*Artocarpus incisa*).

1—бир будағы; 2—етиммәһиш мейвә группу; 3—мейвә группунун бир һиссәсини кәсийи; 4—бир дишичийини узунуна кәсийи; 5—етиммәһиш бир мейвәчийи; 6—әркәк чичәк группу; 7—әркәк чичәйи; 8—әркәкчийини пулчуу (чичәкянылығы).

өвләрдә бечәрилир, мәсәлән *Ficus elastica*, *F. macrophylla*, *F. magnifica*, *F. australis*, *F. tristis* вә с., һәмнин нөвләрин сүд ширәсиндән каучук истәһсал олунур.

Тропик өлкәләрин әһалиси үчүн һинд гозундан сонра икинчи чөрәк биткиси чөрәк ағачы (*Artocarpus*) чинсинин нөвләридир. Онун *A. incisa* вә *A. intermedia* нөвләри Зонд адаларында ябаны һалда битир. Инди онларын бә'зиләри демәк олар ки, бүтүн субтропик өлкәләрдә әкилиб етишдирилир. Бә'зи чөрәкағачы нөвләринин мейвәси 12 кг-а гәдәр олур. Ону дилим-дилим доғрайыб чөрәк кими бишириб ейирләр (шәкил 275).

Чәтәнәкимиләр, Кәнаф (*Cannabaceae*) фәсиләси

Бу фәсилә туткимиләр (*Moraceae*) фәсиләсиндән сүд ширәсинин олмамасы, мейвәләринин гуру фындыгычыг формада олмасы вә тохумунда рүшәймин гывырмлылығы илә кәскин сурәтдә фәргләнир. Икиәвли биткиләрдир. Чичәк групплары мүрәккәб дишазия чичәк группуна топланмышлар. Әркәк чичәкләри 5 әркәк чичәкянылығы битишикдир. Диши чичәйини Дишичик ики мейвәярпағындан әмәлә кәлмишдир, икиағызчыгыдыр, тохумлуғу әйри вә асылыдыр. Отлардыр. Күләклә тозланыр. Авропа вә Асиянын иети вә мүлайим өлкәләриндә битир. Ики чинси вардыр.


Хамырмая (*Humulus*) чинсинин биздә бирчә хамырмая, гарасармашыг вә ямая сармашыгы (*H. lupulus*) адланан нөвү вардыр (шәкил 276), икиәвли, сарынан көвдәли от биткисидир. Диши чичәкләри готаз кими башчыға топланмышдыр. Әркәк чичәкләри сүпүркәйәохшар чичәк группуна топланмышдыр. Ярпағлары 3—5 бармагвари дилимлидир, диб һиссәси



Шәкил 276. Хамырмая оту (*Humulus lupulus*).

үрәкваридир. Көвдәләри үчбучагшәкилли кәлә-көтүрдүр. Гызылағачлы, рүтубәтли мөшәләрдә, дағ этәкләриндә, чай вә архларын кәнарларында, чәпәр дибләриндә битир. Чаван көвдәләри каны вә гуланчар кими ейилир. Гозаларындан (диши чичәк группундан)

шәфафлыг, хүсуси дад вермәк үчүн пивә истәһсалында истифадә эдилир. Гурудулмуш гозасында 4,4 гамма «В» витамини, ярпагларында 30—233 мг % «С» витамини вардыр. Гозаларында 0,33-дән 0,5%-ә гәдәр алынан яғ, ликйор вә пивә истәһсалында истифадә эдилир. Онлардан 16%-ә гәдәр гәтран алыныр. Көвдәсиндә олан мөһкәм вә узун лифләрден габа парчалар вә кәндир истәһсалында истифадә олуна биләр.



Шәкил 277. Чәтәнә (*Cannabis*).

1—эркәк чичәйи, 2—диши чичәйи, 3—узунуна кәсилмиш диши чичәйи, 4—мейвәси
Солда—эркәк чичәкли, сағда—диши чичәкли будаглары.

Чәтәнә (*Cannabis*) чинси икиэвли от биткиләридир (шәкил 277). Эркәк чичәкләр дихазия салхымлара топланараг сүпүркәләр әмәлә кәтирмишдир. Чичәкянлығы вә эркәкчикләри беш-бешдир. Диши чичәкләр дәстә-дәстә сүнбүлләрә топланмыш кидыр. Чичәкянлығы демәк олар ки, көрүнмүр вә юмурталыг кидыр. Чичәкянлығы охшар өртүчү ярпагла өртүлмүшдүр. Ағызчыгы ики, сап кимидир. Мейвәси тохумча вә я фындыгыгдыр. Ики нөвү вардыр: алаг чәтәнәси (*C. ruderalis*) вә әкилән чәтәнә (*C. sativa*).

Алаг чәтәнәси (*Cannabis ruderalis*) Азәрбайҗанда әкинләрин арасында битән алаг отудур. Ярпағында 249,7—385,3 мг % «С» витамини вардыр. Тохумунда 30—35% яваш гуруян яғ вардыр ки, ондан техникада истифадә олуна биләр. Лифиндән габа парчалар вә кисәлик парча тохумаг үчүн истифадә әтмәк олар.

Әкилән чәтәнәнин (*C. sativa*) тохумларында аз мигдарда «Д» витамини, 40 ваһидә гәдәр «К» витамини, 30—35% яғ вардыр. Бу яғдан әлиф яғы вә сабун истәһсалында истифадә эдилир. Тохуму говрулмуш һалда ейилир.

Кичитканкимиләр (*Urticaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин нүмайәндәләриндә сүд ширәси йохдур. Ярпаглары бәситдир вә ярпагалтлыглары йохдур. Чоху отдур, аз-аз һалларда ағачлардыр. Әксәрийәтинин ярпаг вә көвдәләриндә яндырычы түкләр вардыр. Икиэвли биткләрдир. Эркәк вә диши чичәкләри чохчичәкли чичәк группларына топланараг ярпагларын голтугунда ерләшмишдир. Эркәк чичәкләриндә чичәкянлығы ярпаглары 4-дүр. Онларын ичиндә саплаглары гыврылмыш 4 эркәкчик вардыр. Чичәйи ачылан заман саплаглар бирдән-бирә ачылараг зәрблә тоз кисәсинә дәйиб онун тозчугларынын яйылмасына сәбәб олур. Диши чичәйиндә дә чичәкянлығы дөрддүр. Дишичик ики мейвәярпағындан әмәлә кәлмишдир, бирювалы вә биртохумлуғлудур, рүшейм дүздүр.

Фәсиләнин нүмайәндәләринин чоху тропик вә субтропик өлкәләрдә яйылмышдыр. Онлардан бәзиләринин яндырычы түкләриндә шиддәтли тәсирәдичи маддәләр вардыр ки, даладыгда мүййән вәзиләрин шишмәсинә вә һәтта өлүмә сәбәб олур. Бунлара тропик биткиләрдән *Laportea* вә *Urera* чинсләринин нөвләри мисал ола биләр.


Сон заманлар Совет Иттифагында әкилән Чин кичитканы (*Bhoemeria nivea*) биткисиндән ипәк кими парлаг лифләр алыныр ки, ондан да тохумулуг сәнаеиндә истифадә олуноур. Районларымызын һамысында яшайыш мәнәтәгәләринин яхынлығында, мал вә гоюн ятагларынын вә архачларын әтрафында, чай вә архларын кәнарларында, чәпәрләрин дибиндә вә саирәдә битән икиэвли кичиткан (*Urtica dioica*) (шәкил 278) вә хырда кичиткан (*Urtica urens*) нөвләридир. Ярпагларында 17% зүлал вә 10% нишаста вардыр. Чаван будаглары хөрәйә гатылыр.

Гарағачкимиләр (*Ulmaceae*) фәсиләси

Гарағачкимиләр фәсиләсинин нүмайәндәләри ағачлардыр. Чичәкләри ики вә я тәк-тәкдир. Чичәкянлығы 4—5 үзлү вә битишкдир. Эркәкчикләри чичәкянлығынын сайы гәдәрдир. Чичәкянлығы ярпаглары илә гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Чичәкләри

гөнчә һалында икән эркәкчикләри дүз олур. Дишичийин ағызчыгы икидир. Тохумлуғу тәрсинәдир. Мейвәләри ганад мейвә вә я чәйирдәкмейвәдир. Ярпағларынын диби чәп, кәнарлары мишар дишли вә түклүдүр. Мүлайим вә тропик өлкәләрдә яйылмыш биткиләрдир.

Азәрбайҗанда үч чинси вардыр: гарағач (*Ulmus*), дагдаҗан (*Celtis*) вә азатағачы (*Zelkova*).



Шәкил 278. Икисәли кичиткан (*Urtica dioica*).

1—битканын хари-и көрүнүшү; 2—эркәк гөнчә; 3—эркәк чичәкдә толуглар ачылмыш вә эркәкчикләр дүз вәзыйғәт алмышлар; 4 вә 5—фырчашәкилли ағызчыгы, сәлән дини чичәк; 6—чичәк алдыгылы дини чичәк; 7—эркәк чичәкни диаграммы.

Гарағач чинсинин 6, дагдаҗанын 3, азатағачынын 2 нөвү вардыр. Бунларын һамысы гиймәтли ағачлардыр.

Гарағачын (*Ulmus laevis*) ярпағында 223,7 мг%-ә гәдәр «С» витамини вардыр. Дагдаҗанын одунчаг һиссәси чох сәрт олдуғундан дүлкәрлик ишләриндә ондан кениш истифадә әдилир. Ондан бычаг сапы, әлағачы, сүмбә вә саир бу кими шейләр гайрылыр. Мейвәси ширин вә өмәлидир. Көвдәсинин габығындан ашы маддәси алмаг олар. Гарағач вә дагдаҗан нөвләри горуючу мешә золағлары салмаг вә гуру чылпаг ямачлара әкмәк үчүн чох әлверишли ағачлардыр.

Азатағачы чох гиймәтли вә давамлы ағачдыр. Ләнкәранда вә Дағлыг Гарабағда битир.

ӘВӘЛИКЧИЧӘКЛИЛӘР (*Polygonales*) СЫРАСЫ

Әвәликчичәкклиләр сырасынын кичитканкимиләр фәсиләси илә гоһумлуғу вардыр, чүнки әвәликчичәкклиләр сырасына дахил олан биткиләрин эркәкчикләри дә кичитканкимиләрдә олдуғу кими чичәкянлығынын һиссәләри илә гаршы-гаршыя ерләшмишдир. Ярпагалтыгы бирләшәрәк саплағын дибиндә мүдафиәдичи өртүк әмәлә кәтирмишдир.

Әвәликчичәкклиләр сырасынын чичәкянлығы бәсит вә тачваридир. Юмурталыгы юхарыдыр. Тохумлуғу бир олуб икиөртүклүдүр. Чохунун ярпағлары бәситдир вә боручуғу вардыр. Һәшәрәт вә күләк васитәсилә тозланан биткиләрдир.

Бу сыранын ялныз бирчә әвәликкимиләр фәсиләси вардыр.


Әвәликкимиләр (*Polygonaceae*) фәсиләси

Фәсиләнин Азәрбайҗандакы нүмайәндәләри отлар вә аз-аз һалларда коллардыр (шәкил 279). Карвангыран (*Atraphaxis*) вә чузғун (*Calligonum*) кими чинсләр бу фәсиләйә бир мисалдыр. Чичәкянлығлары тач вә я касашәкилли, биргатдыр, 3—6 сәрбәст ярпагчыгдан ибарәтдир. Эркәкчикләри 3—9-дур, дишичийн 3 мейвәярпағындан әмәлә кәлиб, бирювалы вә үч-сүтунчуғлудур. Мейвәләри әдәтән хырда фындыгчыгдыр. Чичәкләри сүпүркәйә вә я сүнбүләохшар чичәк группларына топланмышдыр. Рүшейми эндоспермин ичәрисиндә дүз вә я әйилмиш һалдадыр.

Бу фәсиләнин ән әһәмиыйәтли чинси гарабашагдыр (*Fagopyrum*). Оун нөвләри бириллик вә чохиллик отлардыр. Чичәкләринин чичәкянлығы тачшәкиллидир, 5—8 эркәкчиклидир. Мейвәләри үчбучаглыдыр. Һәшәрәт васитәсилә тозланыр. Бал верән биткиләрдир.

Әкилиб бечәрилән нөвләриндән мәдәни гарабашаг *Fagopyrum esculentum* вә я *F. sagittatum* нөвү (шәкил 280) бириллик, чох да һүндүр олмаян гырмызы көвдәли вә аз будагланан от биткисидир. Ярпағлары охшәкилли, узун саплаг-

лыдыр. Чичәкләри ағ, гырмызы, әтирлидир; голтуғлардакылар группара топланмышдыр. Әркәкчикләри 8-дир, дишичийи 3 сүтунчуглудур. ССРИ-нин Авропа һиссәсинин орта гуршағында ярма вә ун верән тахыл биткиси кими әкилир. Азәрбайҗанда әкил-мир.



Шәкил 279. Әвәлиққимиләр.

1—*Rumex scutellatus* нөвүнүн чичәк группунун бир һиссәси; 2—гузугулағынын *R. acetosa* чичәйи; 3—*Дарманәзәлки*—*R. officinale* нөвүнүн чичәйи; 4—Гарабашаг—*Fagopyrum sagittatum* нөвүнүн чичәйинин кәсийи; 5—*Rumex scutellatus* нөвүнүн мейвәси; 6—*Polygonum confusum* нөвүнүн көвдәсиндән бир һиссә вә боручуғлу ярпағы; 7—11 диаграммлар, о чүмләдән 7—*Pterostegia*, 8—*Rheum*; 9—*Rumex*; 10—*Polygonum lapathifolium* вә 11—*P. amphibium* көвдәринин диаграммлары


Әвәлиқк вә я гузугулағы (*Rumex*) чинсинин 17-ә гәдәр нөвү вардыр. Онларын чичәкләри көркәмсиздир, касачығаохшар чичәкяңлыгы вардыр, әркәкчикләри 6-дыр.

Ән мүһүм нөвләри хырда гузугулағы (*Rumex acetosella*) вә әсл гузугулағыдыр (*Rumex acetosa*). Бунларын һәр ики синин ярпағы тәрәвәз кими довғая, гутаба, шорбая вә саир хәрәкләрә гатылыр. Ярпағларында «С» витамини вардыр. Көк-ләриндә ашы маддәси олдугундан, онлардан көн ашыламаг, бояг һазырламаг вә саирә үчүн истифадә олуна биләр. Әвәлиқкләрин бүгүн нөвләриндә ган кәсмәк габилиийәти вардыр.

МАЛДИЛИЧИЧӘКЛИЛӘР (*Cactales*) СЫРАСЫ

Малдиличичәклиләр сырасынын хусусийәтләри малдили-ләр (*Cactaceae*) фәсиләсинин хусусийәтләринин эйни олдугун-дан фәсиләнин хусусийәтләри үзәриндә даяначайыг.

Фәсиләнин нүмайәндәләринин әксәрийәтиндә көвдә ясты, күрәви дилимли вә саир формаларда олур. Үзәрләриндә ярпаг әвәзинә тикан вардыр. Көвдәләринин әтли олмасынын сәбәби, әһтият су тохумаларынын инкишаф этмәсидир. Һәмин тохума-



Шәкил 280. Гарабашаг (*Fagopyrum esculentum*).

1—биткинин үмуми көрүнүшү, 2—мейвәли вә чичәкли будағы, 3—чичәйи; 4—нектарлыгы, әркәкчик вә дишичийи, 5 вә 6—каса-чыг вә мейвәчийи; 7—мейвәнин эйинә кәсийи


ларда топланан сую битки чох гәнаәтлә сәрф әдир. Буна көвдә-ләрин галын кутикула вә мум тәбәгәси илә өртүлмәси вә ағыз-чығларын сайча аз олмасы көмәк әдир. Белә бир уйғунлашма сайәсиндә биткиләр узун сүрән гураглыг дөврүнү яхшы кечирә билир. Ярпағларын вәзифәсини көвдәләринин яшыл һиссәси көрүр.

Малдилиләр башлыча олараг гураглыг ерләрдә, ярымсәһра вә сәһраларда битир. Рүтубәтлә аз-чох тәмин олуңмуш ерләрдә битәнләр ағачларын көвдә вә будағлары үзәриндә эпифит һәят кечирир

Тез элава көк чыхармалары сусузлуға чох давамлы олмалары ила сых элагедардыр. Бэ'зилеринин ян будаглары көвдә үзәриндә икән көк эмәлә кәтириб мүстәгил битки кими яшайыр.

Малдилиләрин чичәкләри тәк-тәк вә я группа эмәлә кәлир. Онларын диаметрләри бир нечә миллиметрден башлайыб 15 см-ә гәдәр вә даһа артыг олур. Чичәкянлыглары бир чох ярпагчыгдан ибарәтдир. Ашағыдакылар яшыл рәнкләдир, лакин юхарыя (ичәрийә) доғру кетдикчә тәдричән ләчәк шәклини алыр. Ләчәкләри бәнәвшәйи, гырмызы, сары вә аг рәнклә олур. Чичәкянлыглары дибдән битишмиш олур. Эркәкчикләри чохдур. Юмурталыглары ашағы олуб, бир нечә мейвәярпагларындан эмәлә кәлмишдир; бириовалы, чохтохумлудур. Узун сүтунчуғу мүхтәлиф рәнкләрдә олуб, чох ерә бөлүнмүш ағызчығы вардыр. Чоху һәшәрәт васитәсилә тозланыр. Мейвәләри әтли киләмейвә шәклиндә олур. Тохумлары чох тез, һәтта бә'зән мейвәләрин ичиндә чүчәрир.

Малдилиләрин бә'зиләри чох бөйүк олур. Мәсәлән, *Cereus giganteus* нөвүнүн һүндүрлүйү 20 м-ә чатыр, йоғунлуғу исә бир метрдән артыг олур. Малдилиләрден бә'зисинин мейвәләри емәлидир, мәсәлән, *Cereus triangularis* адланан малдили бир мейвә биткисин кими кениш сурәтдә әкилир. Малдилиләрден *Opuntia*



Шәкил 281. Мексиканын даг дүзәнликләриндә ясты көвдәли малдили—опунсия (*Opuntia*).

чинсинин нөвләри нәинки тропик өлкәләрдә, һәтта Аралыг дәнизи әтрафында, Асия вә Австралияда кениш ййылмыш алаг отудур вә гоюнчулуға чох бөйүк зәрәр стирир (шәкил 281).

Малдилиләрин көвдәләриндә бөйүк су әһтияты олдуғундан сусуз сәһраларда һейванларын сусузлуғунун гаршысыны алмаг

үчүн әкилир. Һейванлар онларын тиканларыны дырнаглары ила гопарыб өзүнү ейир.

Лүтер Бербанг азтиканлы малдилиләри бир-бирилә тозландырмагла етирдийи биткиләрин тохумларыны әкмиш вә нәтичәдә о, бу йолла тамамилә тикансыз опунсия адлы малдили әлдә этмишдир.

Бербанг бунула кифайәтләнмәйиб, һәмин малдилиләрден дадына көрә портахалла рәгабәт әдә биләчәк тикансыз мейвәләри олан малдили формалары да әлдә этмәйә наил олмушдур. Бундан башга белә тикансыз малдилиләрлә мәнсулсуз сәһралары ем базасына чевирмәк үчүн мүәййән тәчрүбәләр апарылмышдыр. Ән яхшы ем отларындан бири һесаб олунан гарайонча бир һектардан 50 тона гәдәр яш мәнсул вердийи һалда, тикансыз малдили дәмйә ерләрдә 200 тон, суварылан торпагларда исә 1500 тона гәдәр мәнсул верир, беләликлә, уңсуз-бучагсыз сәһралара тикансыз малдили әкиләрсә, һәмин сәһралар малгара үчүн әла кейфийәтли отлага чеврилә биләр.

Опунсия малдилинин мейвәсиндән пастила вә пендир, ширәсиндән исә шәрбәт, патка, шәраб һазырланыр, етишмиш мейвәси гурудулмуш һалда вә тәзә икән бә'зи хәрәкләрдә ишләдилир.

Тиканлы малдилиләрден чанлы чәпәр чәкмәк үчүн истифадә эдилир.

Эхинокактус адланан малдилинин көвдәсиндән мүрәббә вә сурагат һазырланыр. Сераус адлы малдилинин мейвәси чийәләк, рус үзүмү, портахал дады верир. Бә'зи малдилиләрден каучук истәһсал олунур. Әвләрдә бәзәк биткисин кими сахланан малдилиләрден ярпаг шәкилли малдили филлокактус, кактус-эпифиллумдур. Бу ахырынчы тропик мешә ағачларынын үзәриндә эпифит һалда яшайыр вә онун гырылыб ағачын чатларына вә я ерә дүшән парчалары тәдричән бөйүйәрәк мүстәгил битки олур. Бә'зилеринин көвдәсиндән һава көкләри эмәлә кәлир.

Кактусларын 1500-ә гәдәр нөвү мә'лумдур.

Бә'зи малдили нөвләри Азәрбайжан ССР Элмләр Академиясынын Ботаника бағынын битки айнабәндиндә, һабелә бир бәзәк биткисин кими әвләрдә бечәрилир. Эксәрийәти векетатив сурәтдә чохалыр.

КӘРМӘКЧИЧӘКЛИЛӘР, ГУРШУНЧИЧӘКЛИЛӘР (*Plumbaginales*) СЫРАСЫ

Кәрмәкчичәклиләр сырасы филокениясы әтибарилә мәркәзитохумлуларла элагедардыр. Мәсәлән, кәрмәкчичәклиләр фәсиләсиндән олан *Armeria* чинсинин нүмайәндәләри мәркәзи тохумлулар сырасынын гәрәнфилчичәклиләр фәсиләсиндән олан гәрәнфил чинсинин нүмайәндәләринә охшайыр. Гәрәнфил чинсиндә олдуғу кими, *Armeria* чинсиндә дә рәнкли чичәкләрдән ибарәт башчыг шәкилли чичәк группу вардыр. Кәрмәкчичәклиләр сырасы даһа чох тәкамүл этмишдир.

Кəрмəкчичəклилəр сырасына ялынз кəрмəк кимилəр (*Plumbaginaceae*) фəсилəси аиддир. Кəрмəкчичəклилəрдə дə, мəркəзитохумлулардə олдуғу кими чичəклəр 5-типли вə мейвə ярпаглары 5-дир, юмурталығы бирəвлидир, ярпагалтлығы, тохуму вə мейвəлəри дə бир-биринə охшардыр. Нəр ики сыранын ашаго-мик гурулушлары вə чичəклəринин нектарлыглары дə бир-биринə чох охшайыр. Серодиагностик үсулла исбат əдилмишдир ки, бунлар бир-бирилə яхын гоһумдур. Чичəклəри нəр икисиндə мунтəзəмдир. Кəрмəкчичəклилəрдə эркəкчиклəр лəчəклəрлə гаршы-гаршыя даянымышдыр вə лəчəклəри битишиkdir. Мəркəзи тохумлулардан, тропикадакы *Basellaceae* фəсилəсинин нумайəндəлəринин тачы битишикшəкилли олуб, эркəкчиклəри лəчəклəрлə гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр.

Кəрмəк кимилəр (*Plumbaginaceae*) фəсилəси

Кəрмəк кимилəр фəсилəсинин Азəрбайҗандə 3 чинси вə 15-гəдəр нөвү вардыр. Дашлыг, гумлуг, гуру, бə'зəн дə шоран ерлəрдə битəн ксерофит биткилəрдир. Кол вə я от шəклиндə битир. Ярпаглары бəсит, чохундə бугəв кəнарлыдыр. Касачығы битишик, пəрдəвари, бəшярпагчыгы вə бəшдишлидир. Тачы бəш дəрин һиссəйə бөлүмүшдүр. Эркəкчиклəри 5 олуб тачын һиссəлəри илə гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Юмурталығы бир-ювалы вə биртохумлудур. Сүтунчуғлары 5 олуб, сəрбəстдир вə я дибдəн битишиkdir. Мейвəлəри тохумча мейвəдир вə касачығын ичəрисиндə галандыр.

Фəсилəнин кəрмəк (*Limonium*) чинсинин Азəрбайҗандə 5 нөвү вардыр. Башлыча олараг аран районларында гуру шоран ерлəрдə битир. Кениш яйылмыш нөвү жəй сүпүркəдир (*L. scoparium*). О, əсəс э'тибарилə шоранлыглардə битир, яхшы бал верəндир. биткинин тəркибинтə сода вардыр. Көкүндəн чохлу мигдардə гиймəтли ашы маддəси һазырланыр, сары вə гара боя алыныр. Чичəк групу илə бирликдə көвдəлəриндəн сүпүркə баламагда кениш истифадə əдилир.

Əһмийəтли нөвлəриндəн бири дə гуршуноту (*Plumbago europaea*) дыр О, һүндүрлүйү 30—60 см олан чох будаглы биткидир. Ярпаглары юмуртавари вə узунсов дибдəн гулагчыгы вə көвдəни гучаглаяндыр; кəнарлары вəзили дишлидир, ашагы дакыларын диби саплаг шəклиндə даралмышдыр, галанлары оту рандыр. Чичəк групу аз-чох сых сүнбүлшəкиллидир, тачы бəнəвшəйи вə чəһрайыдыр, касачығын борусундан 1,5—2 дəфə узундур. Орта даг гуршагында гаялыглардə битир. Биткинин бүтүн һиссəлəриндə ашы маддəси вардыр.

НОВРУЗЧИЧƏКЛИЛƏР (*Primulales*) СЫРАСЫ

Кəрмəкчичəклилəрдə олдуғу кими, бу сыранын дə нумайəндəлəринин тачы вə эркəкчиклəри эйни рүшəймдəн инкишаф əдир. Тохумлуғун эйни гурулушдə олмасы вə икиөртүклүлүйү новруз-

чичəклилəр сырасынын кəрмəкчичəклилəр вə мəркəзитохумлулар сырасына гоһум олдуғуну исбат əдир.

Новрузчичəклилəр сырасынын əсəс фəсилəлəриндəн бири новрузчичəйи (*Primulaceae*) фəсилəсидир.

Новрузчичəйи (*Primulaceae*) фəсилəси

Бу фəсилəнин Азəрбайҗандə 8 чинси вə 28-гəдəр нөвү вардыр. Онларын һамысы ярпаглары көк əтрафына топланмыш оглардыр. Чичəклəри мунтəзəм вə икичинслидир. Эркəкчиклəри бир даирə үзрə олуб лəчəклəрлə гаршы-гаршыя битишмишдир. Юмурталығы юхары вə аз-аз һаллардə ярым ашагыдыр. Сүтунчуғу бирдир, ағызчығы башчыг шəклиндəдир. Мейвəси гутучугдур. Энтомофил биткилəрдир (шəкил 282).

Фəсилəнин ən чох мұхтəлиф нөвлү чинси новрузчичəкдир (*Primula*). Онун Азəрбайҗандə 8 нөвү вардыр. Бу нөвлəр мөшəлəрдə, субалп вə алп гуршагларында яйылмышдыр. Чохиллик отлардыр. Ярпаглары һамысы көк əтрафында топланмышдыр. Чичəк көвдəси ярпагсыз вə чичəк оху шəклиндəдир. Чичəклəри тəк-тəкдир вə я садə чəтир шəклиндə чичəк групуна топланмышдыр. Гетеростилдир. Чичəкянлыглары аз-чох узун бору шəклиндəдир. Тачын сəрбəст кəнары үфүги вəзийəтдəдир, сары, михəйи, чəһрайы, бəнəвшəйи вə я ағ рəнкдə олур. Гутучуғу бəшдишлидир.

Онларын, дəмəк олар, һамысы көзəл чичəкли олдуғу үчүн бəзəк биткилəридир. Язын əввəлиндə чичəк ачырлар.

Ирикасачыгы новрузчичəйи (*Primula macrocalyx*) нөвү Азəрбайҗанын даг мөшəлəринин кəнарларында, субалп чəмəнлəриндə яйылмышдыр. Ярпагыны шорабая тəkүрлəр, ярпагында сапонин вə глүкозид вардыр, ишлəтмə дəрманы кими тə'сир əдир. Азəрбайҗанын новрузчичəйи нөвлəринин һамысында кифайəт гəдəр «С» витамини. *Primula Sibthorpii* нөвүнүн көкүндə исə əтирли яғлар вардыр.

Тəбии сечмə йолу илə мұһитə уйғунлашан чинслəрдəн бири дə мөшə новрузчичəйидир (*Cyclamen*). Онун лəпəалты дичийи юмруя чеврилмиш вə орая эһтияг гидə маддəси топланмышдыр. Бу чинсин лəпəлəриндəн бири гыса мүддəтдə инкишаф əдэрək биринчи яшыл ярпага чеврилиз. Бу чинсə дахил олан биткилəр чарпаз үсулла тозланыр. Чичəклəнмə дөврүнүн ахырында чарпаз тозланма үчүн əлвəришли шəраит олмадыгда битки өз-өзүнү тозлайыр. Бир чох мəдəни нөвлəри вардыр ки, бəзəк биткиси олараг əкилиб бəчəрилиз. Азəрбайҗанын даг мөшəлəриндə *C. elegans* вə *C. cernuum* нөвлəри битир. Бунлардан биринчинин юмрусу чий һалда зəһəрлидир, лакин гурудулдугдан сонра зиянсыз олур. Күлдə биширилəрək ейилир. Тəзə ярпагларында витамин вардыр.



Шəкил 282.

A—*Primula Pallasii*, B—*Primula macrocalyx*, а вə б—һетерастия чичəклəрин узунуна кəсипи; 3—етинишмə гүтүчү; В—касачығы араланышы олан етинишмə гүтүчү.

ХУРНИКЧИЧƏКЛИЛƏР (Ebenales) СЫРАСЫ

Чичəклəри мүнтəзəм, икичинсли вə я бирчинсли, икиэвли бит-килəрдир. Тачы битишик лəчəклидир. Эркəкчиклəри чох олуб, 2 вə я чохлу даирəдə дүзүлмүшдүр. Мейвəярпаглары 5-дир. Ярпаглары бəситдир, ярпагалтыгы йохдур. Чоху тропик вə суб-тропик ағачлар вə коллардыр, 10-а гəдər чинси, 300-ə гəдər нөвү вəрдир. Сыраның филокенетик вəзиййети айдын дейилдир.

Чичəклəри мүнтəзəм, адəтəн икиэвли, аз-аз һалларда ики-чинсли, 3 - 7 үзлүдүр. Касачығы мейвə янында галандыр, чох заман мейвəни эһитə эдир. Тачы битишиклəчəкли төкүлөндир. Эркəкчиклəри лəчəклəринин сайы гəдəрдир, онлардан ики дəфə артыгдыр, я да хейли чохдур. Юмурталыгы юхарыдыр. Мейвəsi сулу вə я дəривари килəмейвəдир. Коллар вə я ағачлардыр. Бу фəсилəдəн Азəрбайҗанда ялныз хурник (*Diospyros*) чин-сини бəзи нөвлəри битир.

Гафгаз хурники (*D. lotus*). Һүндүрлүйү 25 м-ə гəдər олан ағачлардыр. Ярпаглары нөвбəли, юмурташəкилли, узун-сов учу сиври, алтдан солгун яшыл вə зəиф түклүдүр. Чичəклəри тək-тəкдир вə я дəстə илə гултурлара топланмышдыр. Касачығы даяз бешбөлүмлү, һиссəлəри учбучаг шəклиндəдир. Тачы чəһрайы, сарымтыл, һиссəлəри даирəвидир. Мейвəsi етишəн заман кəйүмтүл гонур рəнкдə олур. Мешəлəрдə яйылмышдыр, бағларда бечəрилир. Мейвəsi һələ кал икən чох бүзүшдүрүчү вə боғучудур, пайызын ахырында етишир чох ширин вə емəли олур, ондан бəһмəз һазырланыр. Мейвəсиндə 61,0 мг % «С» витамини вəрдир.

Шəрг хурники (*D. kaki*). Ярпаглары һисбəтəн сəрт олан голлу-будаглы ағачдыр. Тачы вə касачығы 4-дигимлидир. Мейвəsi алма бəйүклүкдə, конусвари күрəви олур, рəнки нарын-чы, түнд нарынчы вə я гырмызымтылдыр, етишəн заман чох юмшаг вə ширин олур. Тəркибиндə чохлу каротин, ширəсиндə «С» витамини, яхшы чешидлəриндə 14,16—17,17% шəкəр вəрдир. Азəр-байҗан районларындан бир чохунда, Күрчүстанда вə Крымда кə-виш миғясда экилир. Чешидлəри чохдур. Чиндə ябаны һалда битир.

СӨЙҮДЧИЧƏКЛИЛƏР (Salicales) СЫРАСЫ

Сыраның филокенетик хусусиййəтлəри яхшы мүййөн эдил-мəмишдир. Бəзи систематиклəр буну сырғачичəклилəр (*Amentiflorae*) сырасына, бəзилəри дə юлгун (*Tamaricaceae*) фəсилəси-тə дахил эдирлəр. Лакин сөйүдчичəклилəри чичəклəринин вə чи-тəк группарынын гурулушу, тохумлары үзəриндə кəкил олмасы вə башга хусусиййəтлəри сөйүдчичəклилəри сырғачичəклилəр сырасындан вə юлгун фəсилəсиндəн кəскин сүрəгдə фəрслəн-ди-р.

Сөйүдчичəклилəрдə редукция даһа чох кəтмишдир. Онларын чичəклəринин тəбиəти, бирчинсли, чыһаг вə икнəкли дейилдир. Чичəклəриндəки сэдəтик иһтисар аһмəтидир. Говəркимилəр-дəки вə сөйүдлəрдəки пектарлығлар 3 - 6 үзлү олан чичəклəри-нə чичəкяһлыгынын чох иһтисар аһмəти кəтмишдир. Онларын аһмəт кəтмиш иһтисар чичəклəрдə дə мейвə вə ярпаглары икнəн аһмəт аһмашдыр.

Сөйүдкимиләр (Salicaceae) фәсиләси

Сөйүдкимиләр (*Salicaceae*) фәсиләсинин чичәкләринин чичәкяңлыгы я һеч йохдур, я да чох ихтисар олунараг касачыг вә я бир нечә пулчуг шәклиндәдир. Бә'зи мулаһизәләрә жәрә, онлар чичәк ятагынын чыхынтыларыдыр. Икиэвли ағач вә я коллардыр. Ярпагдан әввәл чичәк ачыр. Эркәкчикләри ики вә я чохдур. Дишичикләри ики мейвә ярпагындан әмәлә кәлмишдир. Бириовалыдыр. Мейвәси ики яна ачылан чохлахумлу гутучугдур. Тохумлары дибдән дәстә һалында, түкту вә чох хырдадыр, эндоспермләри йохдур, чүчәрмә габилийәтләрини чох тез итирир. Бә'зи нөвләри союг шималда, бә'зиләр дә юмшаг иглимли гуршагларда яйылмышдыр. Ярпаглары бүтөв кәнарлы вә я бармагвари дилим-лидир, ярпагалтыгылары вардыр. Ики чинси вардыр: говагкимиләр (*Populus*) вә сөйүдләр (*Salix*). Һәр ики чинсин чичәк групплары сырғашәкиллидир.

Говагкимиләр (*Populus*) чинсинин Азәрбайҗанда 11 нөвү вардыр. Ярпагларынын кәнары кәсилмиш вә я дишлидир. Эркәкчикләри чохдур вә саплаглары гысадыр. Дишичийи вә эркәкчикләри дибдән пулчуға бүрүнмүшдүр. Говагкимиләрин чоху һүндүр бойлу, яхшы будагланан ағачлардыр.

Говагкимиләр (*Populus*) чинсинин гара говаг (*Populus nigra*) нөвүнүн ярпагында 150—285,7 мг % «С» витамини вардыр. Ағачынын габыгындан бояг алыныр.


Ағчаговаг, әсмәговаг вә я титрәкговаг (*P. tremula*) нөвүнүн ярпагында 260 мг % «С» витамини вә тумурчугларында 0,5 мг % әтирли яғ вардыр. Бу ярдан әтрийәтдә истифадә эдилир. Габыгында 3—5% ашы маддәси олдуғундан кән ашыламаг үчүн ишләдилир. Говаг нөвләринин чохундан горуючу мешә золаглары салынмасында истифадә әтмәк мәсләһәт кәрүлүр.

Сөйүд (*Salix*) чинсинин Азәрбайҗанда 14-ә гәдәр нөвү вардыр. Әксәрийәти коллардыр, аз-аз һалларда ири ағачлардыр. Архларын вә чайларын кәнарларында битир. Чичәкяңлыгы бүтөв кәнарлыдыр. Эркәк чичәкләрдә эркәкчикләр чох вахт 2-дир, аз-аз һалларда 3-дән 12-йә гәдәр олур. Һәр ики чичәк типинин дибдәндә хырда нектарлыглар вардыр. Һәшәрәт васитәсилә тозланыр.

Сөйүдләрдән чох мүхтәлиф мәгсәдләр үчүн истифадә эдилир. Онларын будагларындан сәбәт вә мебел тохунур, үзүмчүлүкдә тәнәкләри бағламаг үчүн истифадә эдилир. Кағыз һазырламаг үчүн яхшы хаммалдыр.

Бәдмүш вә я пишпишә (*Salix caprea*) нөвүнүн ярпагында 194 мг %, *S. cinerea* нөвүнүн сырғаларында исә 120,3 мг % «С» витамини вардыр. Сөйүдләрин һамысынын габыгында аз-чоха ашы маддәси олур. Сөйүдкимиләр фәсиләсинин бүтүн нүмайәндә:

ләри чох асанлыгга гәләм васитәсилә артыб чохлаыр. Чай вә архларын кәнарларынын вә гумлаг ерләри бәркитмәк үчүн әкилир. Чох ердә горуючу мешә золаглары салынмасында истифадә әтмәк мәсләһәт кәрүлүр. (шәкил 283).



Шәкил 283. Сөйүдкимиләрин чичәк гурулушу:

1—гара говагын (*Populus nigra*) эркәк чичәйи; 2—диши чичәйи; 3—титрәкговагын (*Populus tremula*) дишичийинин узунуна кәсийи; 4 вә 5—ағ сөйүдүн (*Salix alba*) эркәк чичәкләри; 6 вә 7—үчәр эркәкчикли сөйүдүн (*Salix triandra*) эркәк чичәкләри; 8—ағ сөйүдүн диши чичәйи; 9—бәдмүш вә я пишпишәнин (*Salix caprea*) диши-чийинин узунуна кәсийи; 10—беуеркәкчикли сөйүдүн (*Salix pentandra*) тохуму.

БИРЛЭПЭЛИЛЭР (*Monocotyledoneae*) СИНФИ

Бу синфин хүсусийтлэри юхарыда верилмишдир.

СУБЭЗЭЙНИКИМИЛЭР (*Helobiae*) СЫРАСЫ

Субэзэйи сырасы, чох энтимал ки, су замбагы (*Nymphaeaceae*) фэсилэсинин эчадаындан төрэйиб эмэлэ кэлмиш вэ нүмайэндэлэри су мүнхитиндэ кениш яйылмышдыр. Субэзэйи сырасынын бэ'зи нүмайэндэлэриндэ апокарп кенисейин вэ эркэкчиклэрин бургу үзрэ дүзүлмэси һемин сыранын *Ranales* илэ гоһумлуг элагэси олдугуну тэсдиг эдир. Чичэйинин бэсит янлыгы вэ үчэр типли олмасы илэ сүсән чичэклилэрэ охшайыр.

Багавар (*Alismataceae*) фэсилэси

Фэсилэнин нүмайэндэлэри батаглыгларда, көллөрдэ вэ архларын кэнарларында яйылмышдыр. Чичэйинин формуласы: $P_3, 3, A_3+3$ я да $P_3+3, A \sim g$, вэ я $g \sim$ дир. Мейвэси мүрэккэб фындыгчыгдыр. Энтомофил вэ чохиллик биткилэрдир.

Бу фэсилэнин бир чинси охярпагдыр (*Sagittaria*). Бурая дахил олаиларын чичэклэри бирчинсли олуб, бирэвли биткилэрдир. Азэрбайчанын аран районларынын батаглыг ерлэриндэ битэн нөвү *S. trifolia*-дыр. Ярпаглары охваридир. Көкүмсов көвдэсиндэн юмрулар чыхыр. Юмруларын таркибиндэ 53% нишаста, 6,2% шэкар, Зүлал 10%-э гэдэрдир. Һэр биткидэ орта һесабла 10—15 юмру эмэлэ кэлир. Һэр юмрунун чөкшө 10—15 г-а гэдэрдир. Дузлу суда биширилмиш юмрулар ноху дады, говрулмушу исэ шабалыд дады верир. Картоф илэ мүгәйисэ эдилөрсэ, сую 1,5 дэфэ аздыр, нишастасы 1,5 дэфэ, зүлал малдэлэри исэ 5 дэфэ чохдур. Говрулуб үйүдүлмүш унундан яхшы гәһвә һазырланыр.

Бу фэсилэнин мүнүм чинслэриндэн бири дэ сүсәнбэрдир (*Alisma*). Азэрбайчанда онун *A. plantago-aquatica*, *A. lanceolatum* вэ *A. arcuatum* нөвлэри битир. Онларын чичэклэри икичинсли, каса ярпаглары 3, лөчөклэри 3, эркэкчиклэри 6, дишиччлэри 20-йэ гэдэрдир, кенисей апокарпдыр. Чичэк ятагы бир агабарыгдыр. Мейвэси башчыгшэкиллидир. Чохиллик биткилэрдир. Ярпаглары ири олуб көкүн этрафына топланмышдыр. Чичэкгрупу ири сүпүркэваридир.


Суоху (*Butomaceae*) фэсилэси

Суоху фэсилэсинин Азэрбайчанда ялныз суоху чинси (*Butomus*) вэ онун чэтирчичэк суоху (*B. umbellatus*) вардыр. О, (шэкил 284) батаглыгларда яйылмышдыр. Чичэк групу чэтир шэклиндэди. Гыса көкүмсов көвдэсиндэн дикинэ ярпагсыз чичэк оху галхыр вэ хэтвари—новшэкилли ярпаглары көкүн этрафында розет эмэлэ кэтирмишдир. Чичөкянлыгы үч үзв-

лү олуб, ики даирэ үзрэ дүзүлмүшдүр вэ чәһрайы рәнкләдир. Эркәкчикләри 9-дур. Мейвәси 6 әдәд чохтохумлу, мүрәккәб ярпаг-мейвәдән ибарәтдир, онлар даирә үзрә дүзүлмүшдүр вә демәк олар ки, апокарп кенисәйдән әмәлә кәлмишдир. Һәшәрат васитәсилә тозланыр, чичәкләри протандрейди. Ярпагларындан һәсир, сәбәт, зәмбил тохумаг үчүн истифадә эдилир. Көкүмсов көвдәси бишмиш вә говрулмуш һалда ейилир. Тәркибиндә 59,45% нишаста вә шәкар, 13,9% зүлал, 3,92% яғ вардыр. Говрулмуш хырда һиссәләриндә сарымтыл-ағ рәнкли ун һазырланыр. Ярпагларында 3,7 мг % «С» витамини вардыр.

СҮСӘНКИМИЛЭР (*Liliiflorae*) СЫРАСЫ

Бу сыранын нүмайэндэлэринин чичэклэри 5 даирәли олуб, һәр давродә үзвләр үч-үч дүзүлмүшдүр. Үмуми формуласы $P_3+3, A_3+3, g(3)$. Сыранын ашағыдакы 5 фэсиләси даһа характерикдир: Сүсәнчичәклиләр (*Liliaceae*), нәркизчичәклиләр (*Amaryllidaceae*), диоскорей (*Dioscoreaceae*), замбагчичәклиләр (*Iridaceae*) вэ чыготу (*Juncaceae*) фэсиләлэри. Һемин сыра бирләпәлиләр ичәрисиндә әсас ер тутур. Онун бүтүн нүмайэндэләри демәк олар ки, гуру биткиләридир. Әсас хүсусийәтләри ералты көвдәләринин соғанавә я көкүмсов көвдә шәклиндә олмасы вә ярпагларынын кәнарлары ярылмыш олмамасыдыр. Бунларда юхары юмурталыгдан ашағы юмурталыға кечид мүшәһидә эдилир. Бу сыранын бә'зи фэсиләләри энтомофил, бә'зиләри исә анемофилдир.



Шәкил 284. Чэтирчичэк суоху (*Butamus umbellatus*).

1—битки; 2—чичәйи; 3—чичәйинин диаграмы

Сүсәнчичәклиләр (*Liliaceae*) фэсиләси

Бейүк фәсилә олуб 3000-дән артыг нөвү вардыр. Әксәрийәти соғаналы вә көкүмсов көвдәли чохиллик отлардыр. Бә'зиләри ағачвари лианлардыр. Чичәкләри икичинсли, мүнтәзәмдир. Чи-

чөкянлыглары үчүзлү олуб, ики даирә үзрә дүзүлмүшдүр. Эчкөкчүлүкү 6-дыр, дишичүлүкү 3 мейвәярпагындан әмәлә күлмәш синкарп кинесей тәшкил әтмишдир, юхары юмурталыгылыдыр. Чохунун мейвәси гутучуг, аз-аз һалларда киләмейвәдир. Соғанаглары вә көкүмсов көвдәләри вәситәсилә вәкетатив чохлыр. Һәмийн фәсиләһиниң бәзи группалары бир сыра хусусийәтләр билә бир-бириндән фәргләндиһиндән, айры-айры ботаникләр бу фәсиләһи 11 ярымфәсиләйә бөлүрләр. Биз бурада һәмийн ярымфәсиләһәрин даһа әһәмийәтлӣ сайылан бир нечәсини нәзәр әл кечирәчәйик.

Данагыран (*Melanthoideae*) ярымфәсиләси

Көкүмсов вә я соғанаглы ералты көвдәләри олан оглардыр.



Шәкил 285 Вахтсызчичәк (*Cotchinum speciosum*)

Чичәкләри садә вә я мүрәккәб салхымлара, сүпүркәләре топланмышдыр. Юмурталыгы бәзән ярымашағыдыр. Дишичүлүкү үчсүтүнчүглүдүр. Мейвәләри гутучугдур.

Мүһүм чинсләриндән бири асыргалдыр (*Veratrum*). Оңун Азәрбайчанда *Veratrum Lobelianum* нөвү битир. О, тәһиз сәвийәсиндән 1800—2400 м йүксәкдә ерләшән рүтубәтлӣ дағ отлагларында яйылмыш от биткисидир. Бою 2,5 м-ә гәдәр олур, ярпаглары иридир, ашағыдакы ярпаглары эллипсшә килли, юхарыдакылар неш тәршәкиллидир. Чичәкләри сүпүркәвари группалар топланмышдыр. Чичәкянлыгы яшылымтыл-сары олуб, кәнарлары сачагвари кирпиклидир. Зәһәрли биткиләрдир. Тәркибиндә табәбәтдә ишләдилән вератроидин вардыр.

Мүһүм чинсләриндән бири вахтсызчичәкдир (*Cotchinum*). Азәрбайчанда оңун баштагыча оларак ики нөвү *C. speciosum* вә *C. speciosum* битир. Оңтар зәһәрли биткиләрдир. Нейван сүңкдә зәһәрләшәр (шәкил 285). Чичәкләриниң арылары ширә топланыр.

Әзвәиччәклиләр (*Asphodeloideae*) ярымфәсиләси

От вә я ағачлардыр. Чохунун ярпаглары көвдәсиниң учларына топланмышдыр. Бу ярымфәсиләйә бир чох шимал вә чәнуб тропик биткиләри аиддир. Чәнуб биткиләриндән бурая дәрман вә бәзәк әһәмийәти олан әзвәй биткиси (*Aloe*) аиддир. О, әтли, кәнарлары дишли, чыхынтылы, яшылымтыл, боз рәнкли.



Шәкил 286 Әзвәй вә я алое биткиси
Сотла-чинчәк биткисиниң көчүшү
Сотла-чинчәк групп

Ярпаглары олан вә өзүндә хенли сү топлан биткидир. Әларасы табәбәтдә мәдә вә бағырсағ ярасынын муалачәсә үчүн ишләдиләр (шәкил 286). Әзвәй биткисиниң ярпагларында дәрман әһәмийәти олан вә алоин адланан чох гүһәмәтлӣ мәддә вардыр. Б, мәддәдән табәбәтдә бир сыра мәгсәдләр үчүн кениш истифадә эдилир.

Эзвай биткисинин ярпагларындан алынган ширәни гурутдугда яшылымтраг-гонур күтлә алыныр. Она эзвай дейлир.

Эзвай чинсинин 90-а гәдәр нөвү мә'лумдур. Онун бә'зи нөвләри Азәрбайчан ССР Элмләр Академиясынын Ботаника бағынын оранжереясында вә эвләрдә бечәрилир, лакин чох заман чичәк ачмыр. Бунун сәбәби, чичәк ачмаг үчүн لازими шәраит олмамасыдыр. Эзвай нөвләриндән бир чоху лиф верән биткиләрдир. Онлардан габа парчалар тохумаг вә кәндир һазырламаг үчүн лиф алыныр.

Соғанчичәклиләр (*Allioideae*) ярымфәсиләси

Соғанаг вә я ералты көкүмсов көвдәләри олан биткиләрдир. Чичәкләри бәсит чәтирләре топланмыш вә онларын дибиндә, юхары ярпагларын дәйишмәсиндән әмәлә кәлмиш ики өртүк вардыр. Чичәкянлығы 6 олуб ләчәйә охшайыр, ашағыдан битишикдир, эркәкчийи дә 6-дыр, буда ашағыдан битишикдир. Дишичийи 3 вә я 1 ювалыдыр. Мейвәси гутучугдур.

Бу ярымфәсиләйә әкилән соған (*Allium cepa*), с а р ы м с а г (*Allium sativum*) вә саирә аиддир. Азәрбайчанда олан 47 нөвүн 3-ү култура я кечирилмишдир. Бөйүк практикә әһәмиyyətләри вардыр.

Сүсәнкимиләр (*Lilioideae*) ярымфәсиләси

Ералты көвдәләри соғанага охшайыр. Чичәкләри ири олуб тәк-тәкдир вә я кичик салхымлара топланмышдыр. Чичәкянлыглары 6-дыр, бә'зән битишик олуб. Юмурталыглары юхары вә мейвәләри гутучугдур. Бура я ири чичәкләри олан сүсәнләр (*Lilium*), с ү н б ү л ч и ч ә к л ә р (*Hyacinthus*) вә бир сыра алағ отлары дахилдир. Бәзиләри бәзәк биткиси кими әкилир.

Ярымфәсиләнин әһәмиyyətли чинсләриндән бири хорузкүлү (*Tulipa*) дүр. Онун ябаны нөвләри Орта Асияда, Крымда, Гафгазда, о чүмләдән Азәрбайчанын Губа, Нуха вә саир районларында, Гарабагда, Нахчыванда вә саирәдә битир. Онларын һамысы көзәл бәзәк биткиләридир. Хорузкүлүнүн орижинал вә көзәл ени чешидләрини әлдә етмәк үчүн Азәрбайчанда кениш имкан вардыр.

Эндамчичәклиләр (*Dracaenoideae*) ярымфәсиләси

Ағач типли биткиләрдир. Ярпаглары будагларын тәпәсинә топланмышдыр, хәтвари вә новшәкиллидир. Бәзиләри, мәсәлән, югга (*Jucca*) бәзәк биткиләридир. Чичәкләри ири вә мүнтәзәм олуб, сүпүркәйәохшар групара топланыр. Чичәкянлығы сәрбәст мейвәләри гутучуг вә я киләмейвәдир. Бәзиләри бәзәк биткиси кими әкилир (шәкил 287).

Гуланчарчичәклиләр (*Asparagoideae*) ярымфәсиләси


Көкүмсов көвдәси, бә'зән дә юмру көкләри олан биткиләрдир. Чичәкләри голтугларда тәк-тәкдир вә я салхымлара топланмышдыр. Чичәкянлығы битишикдир. Мейвәләри киләмейвәдир. Әсл ярпаглары пулчуг вә я тикан шәклини алмышдыр. Онларын голтугунда дестә-дестә сапаохшар вә я әнли кладодиялар инкишаф әдир. Бу хусусийәт анчаг *Asparagi* чинсинә аиддир. Гуланчар нөвләри шимал ярымкүрәсиндә вә гисмән Чәнуби Африкада яйылмышдыр. Онун Азәрбайчанда ябаны һалда *A. verticillatus*, *A. Breslerianus*, *A. officinalis*, *A. caspicus*, *A. Ledebourii*, *A. persicus*, *A. verticillatum* кими нөвләри вардыр. *A. officinalis* вә *A. polyphyllus* нөвләринин чаван зог вә көвдәләри мүййән хәрәкләргә гатылыр. *A. officinalis* нөвүнүн көкүмсов көвдәсиндә сидиккәтирмә габилийәти вардыр. Көвдәсиндә 12,5 гамма каротин вә 25—61 мг % «С» витамини, тохумунда 15,3—16 % яғ вардыр. *A. pulmosus*, *A. Sprengerii* вә бә'зи башга нөвләри бәзәк биткисидир.

Инчичичәйи (*Convallaria*) чинсинин *C. transcaucasica* нөвү Азәрбайчанда Кировабад вә Загаталанын дағ мешәләриндә яйылмышдыр. Хош ийли бәзәк биткисидир.

Инчичичәйинә охшар сүләймәһрү (*Polygonatum*) чинсинин Азәрбайчанын гаранлыг мешәләриндә битән 7 нөвү вардыр. Онлардан *P. multiflorum* вә *P. polyanthemum* нөвләринин чаван көвдәләри, гуланчар кими, яхшы тәрәвәз сайылыр. Язда йығылан көкүмсов көвдәләринин ширәси дәрийә зәрифлик верир, күн яндырмагдан горуюр вә янагы гызардыр.

Шинкилә (*Smilaxoideae*) ярымфәсиләси

Бығчыглары васитәсилә дырманан лиан биткиләрдир. Чичәкләри хырда вә чох вахт бирчинсли олуб, чәтир вә я салхымлара топланмышдыр. Мейвәләри киләмейвәдир. Ярпаглары тордарлыдыр. Көвдәләри тиканлыдыр. Бу ярымфәсиләнин шинкилә (*Smilax*) чинсинин һүндүр шинкилә (*S. excelsa*) нөвү Азәрбайчанын аран вә әксәрән дағ мешәләриндә битир. Онун чаван гырмызы зоглары «гызылча зогу» ады илә гуланчар кими ейлир.



Шәкил 287. Югга (*Jucca gloriosa*).

1—чичәк ачмыш битки; 2—эркәкчийи үзәринә һүнү гонмуш чичәк; 3—үзәринә һүнү гонмуш сүтучуг.

Нәркизчичәклиләр (*Amaryllidaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә дахил олан биткиләрин чичәкләри үчтиплидир вә бир чох хусусийәтләри илә сүсәнчичәклиләр (*Liliaceae*) фәсиләсинин чичәкләринә охшаса да, һәр һалда бир нечә әсас әламәт нәркизчичәклиләри сүсәнчичәклиләрдән фәргләндирир. Нәркизчичәклиләрин чичәкләринин юмурталығы ашағы вә я ярымашағыдыр, тач чыхынтылары аз-чох инкишаф этмишдир. Чичәк групплары сүсәнчичәклиләрдә учларда олдуғу һалда, бурада янларда, ярпаглары галтуғунда әмәлә кәлир, даһа артыг зигморфлуға мейл әдир вә беләликлә энтомофилияя, йәни һәшәрәт васитәсилә чарпаз тозланмаға чох уйғунлашмышдыр, мейвәләри гутучугдур.

Фәсиләнин әксәр нүмайәндәләләри субтропик ерләрдә вә Гафгазда яйылмышдыр. Әксәрийәти бәзәк биткисидир. Характер чинсләри: хәди чәкүлү (*Galanthus*), штернбергкүл (*Sternbergia*), агава (*Agave*)-дыр, Агаванын (шәкил 288) ярпагларынын узунлуғу нормал шәраитдә 3 м-ә гәдәр олур, көвдәси исә 8—10 иллик биткиләрдә 12 м-ә чатыр. Чичәк группу бөйүк вә чох олур. Һәр чичәйинин узунлуғу 8 см-ә гәдәрдир.

Көк әтрафы розети ярпагларынын ортасындан тумурчуг инкишаф этмәйә башладығы заман тумурчуғу кәсиб жөтүрүрләр. Беләликлә, әмәлә кәлән чухура, тәркибиндә 10% шәкәр олан ширә топланыр. Она «бал сую» дейирләр. Бу гайда илә һәр биткидән күндә бәзән 5 литрә гәдәр ширә топланыр. Ширә топланмасы 8—10 ай давам әдир. Бу мүддәтдә һәр биткидән тәхминән

1000 литр ширә алыныр. Һәмин ширәдән 3 күн мүддәтиндә гыгыртма йолилә «пулкә» адланан кейфләндиричи ички һазырланыр.

Агаванын көвдәси биширилмиш һалда, ярпагларынын туршмәзә дады олан әт һиссәси исә һәм чий, һәм дә биширилмиш һалда ейилir. Ярпаглары, көкү вә көвдәләриндән спирт истеһсал

олунур. Ярпагларынын учунда сәрт тиканлары олур. Һиндлиләр бу тиканлары сындырыб ийнә әвәзинә ишләдирләр. Һәмин тиканлардан мисмар, биз вә санчаг кими дә истифадә олунур. Агаванын лифләриндән вич, кәндир, һәсир, аяггабы вә саирә һазырланыр. Ярпагларынын юмшаг һиссәсиндән хусуси сабун биширилир.

Агава ән чох тохумлары илә дейил, пөһрә вә ералты көвдәләри илә чохалыр. Әлверишли шәраитдә 8 илдән сонра чичәк ачыр, Мейвәси етишдикдә чичәк көвдәси гуруюр, диб ярпаглары зәифләйир вә битки тәләф олур, лакин һәмин ярпагларынын яхынлығындакы көкләриндән чохлу пөһрә верир.

Агава Мексикада, Шәрги Африкада, Филиппин вә Ява адларында лиф истеһсал етмәк мөгсдилә әкилир. Бу, бүтүн Азәрбайҗанда Чохиллик Биткиләр Институтунун Мәрдәкәндакы бағында вә Әлмләр Академиясынын Ботаника бағында вардыр. О, бир бәзәк биткиси кими әкилир.

Нәркизчичәйи (*Narcissus*) чинси. Соғанаглы от биткисидир. Ярпаглары хәтвариدير вә көкүн әтрафында чохлу мигдарда топланмышдыр. Чичәкоху узундур, учунда бир вә я бир нечә чичәйи олур. Чичәкләри иридир. Чичәкянлығы үч-үч олмагла ики даирәйә дүзүлмүшдүр. Сәрбәсткәнарлы ләчәкләри дибдән бирләшиб узун бору әмәлә кәтирмишдир. Чичәкянлығынын мәркәзиндә папағаохшар аз-чох ири чыхынты әмәлә кәлир. Эркәкчикләри сәрбәстдир. Нөвләриндән бир чоху бәзәк биткиси кими әкилиб етишдирилир.

Бу чинсин яланчы нәркизчичәйи (*N. pseudonarcissus*) нөвүнүн чичәкянлығы сары олуб, ири вә тәдәһә охшар папагчығы вардыр. Ябаны һалда шәрги Гафгазда яйылмышдыр. Чичәкчиликдә жениш мигяда әкилиб етишдирилир.

Шаири нәркизчичәйи (*N. poeticus*) нөвүнүн чичәкянлығы ағ, бир гәдәр әйилмиш, ири, зәриф ийли, папагчығы нисбәтән гыса, кәнары ал нахышлыдыр. Союға чох давамлы олан вә язда чичәк ачан биткидир. (шәкил 289).



Шәкил 289.

1—яланчы нәркизчичәйи
(*Narcissus pseudonarcissus*)
2—шаири нәркизчичәйи
(*Narcissus poeticus*).


Диоскорейя (*Dioscoreaceae*) фәсиләси

Фәсиләнин бүтүн нүмайәндәләри чохиллик отлардыр. Көвдәләри сарынандыр, көвдәләрин үзәриндә бә'зән гүввәтли көкләр вә я юмулар әмәлә кәлир. Чичәкләри икичинсли вә я бирчинслидир, я да икиэвли биткиләрдир. Ярпагларынын дүзүлүшү мұхтәлиф олур. Чичәкянлыгы сәрбәстдир, яшыл рәнkdәдир вә хырдадыр. Нәркизчичәклиләрдә олдуғу кими, бурада да диши чичәкләрин юмурталыгы ашағы олуб үчювалыдыр. Мейвәси гутучуг вә я киләдир. Бүтүн дүняда 170-ә гәдәр нөвү вардыр.

Бу фәсиләнин дискорейя вә я Чинкартофу (*Dioscorea*) чинсинин әһәмиyyətли нөвү *Dioscorea batatas* -дыр. О, инди бүтүн тропик өлкәләрдә нишасталы көк юмуларынын хатиринә күлли мигдарда әкилир. Азәрбайчанда Ләнкәран, Көйчай, Балакән, Загатала районларында вә Бақы әтрафында бечәрилир. Вәтәни Чиндир.

Замбаг (*Iridaceae*) фәсиләси

Бу фәсилә, нәркизчичәклиләр фәсиләсиндән эркәкчикләринин үч әдәд олмасы илә фәргләнир. Бунларда дахили даирәдәки 3 эркәкчи ихтисар олунмушдур (шәкил 290, 291). Чичәкләри икичинсли вә иридир. Чичәкянлыгы тачәохшар вә рәнклидир. Энтотофил, актиноморф вә я бир гәдәр зигоморфдур. Юмурталыгы ашағы, үчювалы вә үч ерә бөлүмүш бирсүтунчуглудур. Бәзиләриндә сүтунчуглар ләчәк шәклиндәдир. Мейвәси үч ян тайла ачылан чохтохумлу гутучугдур.



Шәкил 290.

1—сүсән чичәйинин диаграммы; 2—үч дахили эркәкчийин учу редукция уграмыш замбаг чичәйинин диаграммы.



Шәкил 291. Замбаг (*Iris*) биткисинин чичәйи


ч—ләчәкләри; р—дишичийин ағзы

Ералты үфүги көкүмсов көвдәси олан, юмурулу вә я соғанаглы чохиллик биткиләрдир.

Әһәмиyyətли чинсләриндән бири зә'фәрандыр (*Crocus*). Онун 75-ә гәдәр нөвү вардыр. Бунлардан Азәрбайчанда 5-и ябаны вә 1-и мәдәни һалда битир.

Бечәрилән зә'фәран (*Crocus sativus*). О, ябаныһалда мә'лум дейилдир вә чох гәдимдән бечәрилмәкдәдир. Азәр-

байчанда башлыча олараг Абшеронда әкилир. Чичәйи мүнтәзәм, бәнәвшәйи рәнkdә вә иридир. Дишичийин ағызчыглары чичәкянлыгы узунлуғундадыр, нарынчы рәнkdәдир, учлары буйнуз кими бир гәдәр әйилмишдир, мөһз дишичик ағызчыгларынын хатиринә әкилир. Октябр айында чичәк ачыр. Мәишәтдә зә'фәран адланан бу ағызчыглар йығылыб гурудулараг сатылыр, чох кәскин хош ийи вардыр. Гәннады маллары, хусуси чөрәк нөвләри вә ликйор һазырладыгда вә бә'зи хөрәкләрә лад вә әтир вермәк



Шәкил 292. Бечәрилән зә'фәран (*Crocus sativus*).

1—чичәк ачымыш битки; 2—биткинин узунуна кәсийин; 3—юмурталығы; 4—үч ағызчыглы сүтунчуғу.



Шәкил 293. Гарғасоғаны—Гладиолус (*Gladiolus*).

1—чичәкләмиш битки; 2—көвдәнин юхары һиссәси, мейвәләри илә.

үчүн ишләдилир. Пайызда ярпагларында 247,8 мг % «С» витамини олур (шәкил 292).

Замбаг (*Iris*) чинсинин 200-ә гәдәр нөвү вардыр. Онлардан Азәрбайчанда 26 нөвү яйылмышдыр. Чичәйи актиноморфдур. Дишичийинин үч ерә бөлүмүш сүтунчугларынын һәр ди-

лими бир эркәкчийин үзәрини өртмүшдүр, беләликлә, онлар тоз-
һүчәйрәләрини яғышдан горуюр. Сүтунчуғун һәр дилиминин алт
тәрәфиндә кичик бир лөвһә вардыр. О, дишичийин ағызчығы
олуб, түкәохшар эмзикләрлә өртүлмүшдүр. Замбагларын чох ири,
көзәл вә мүхтәлиф рәнкли чичәкләри онлардан бир чохунун әки-
либ етишдирилмәсинә сәбәб олмушдур. Бә'зи нөвләринин ярпа-
ларында мүййән мигдарда «С» витамини вардыр. Бә'зиләринин
дә көкүмсов көвдәләриндә: алынан әтирли яглар тәбабәтдә вә
әтрийятда «бә нөв шә көкү» ады илә ишләдилир.

Гаргасоганы-Гладиолус (*Gladiolus*) чинсинин нүма-
йәндәләри сүсән фәсиләсинин башга чинсләриндән, чичәкләринин
зиготоморфлуғу илә фәргләнир. Онларын да чичәйи үчтипли вә
мейвәләри гутучугдур. Ғылынчаохшар хәтвари ярпаглары вә
соғанаохшар ералты юмру көвдәләри олан чохиллик отлардыр.
Азәрбайчанда ябаны һалда 6 нөвү яйылмышдыр. Онлардан бә'зи-
ләри дағ районларында әкиләрин арасында битән алаг отлары-
дыр. Чичәкләри ири вә мүхтәлиф рәнкли олдуғу үчүн яхшы бәзәк
биткиләри сайылыр. *G. atrovioaceus* нөвүнүн ярпагларында
чичәкләнмә дөврүнүн ахырында 700—1000 мг% «С» витамини
олур. (шәкил 293).

Чығкимиләр (*Juncaceae*) фәсиләси

Чығкимиләр фәсиләси, замбагчичәклиләр сырасындан 3
типли көркәмсиз чичәйи илә күләк васитәсилә тозланмая гайыт-
мыш фәсиләдир. О, бә'зи чәһәтләрдән замбагчичәклиләрә, бә'зи
чәһәтләрдән дә чилкимиләрә вә гисмән тахыллара охшайыр.
Чичәкләри мүнтәзәм вә сәрбәстләчәкли олуб, эркәкчиклә бир-
ликдә 2 даирәдә үч-үч дүзүлмүшдүр. Тәкбир һалларда 3 эркәк-
чийи олур. Юмурталығы юхары, бир ювалы вә я үчювалыдыр
Мейвәси гутучугдур. Ярпаглары энсиз, ясты вә я цилиндрикдир.


Фәсиләнин ики чинси вардыр: чығ (*Juncus*) вә ишыготу
(*Luzula*).

Чығ (*Juncus*) чинсинин Азәрбайчанда 15-ә гәдәр нөвү вар-
дыр. Әксәрийәти нәм ерләрдә битир. Ярпаглары чох мөһкәм
олдуғундан, онлардан тәрәвәз дәстәләрини бағламаг үчүн сап
әвәзинә истифадә әдилир.

Ишыготу (*Luzula*) чинсинин Азәрбайчанда 6 нөвү
вардыр. Онларын бә'зиләри мешәләрдә, бә'зиләри дә чәмәнләрдә
битир (шәкил 294 вә 295).

ХЫРДАТОХУМЛУЛАР (*Microspermae*) ВӘ Я ӘРАРВАДЛЫЛАР (*Gynandruae*) СЫРАСЫ

Бу сырая 460 чинси вә 1500 гәдәр нөвү олан тәкчә сәһләб-
кимиләр фәсиләси аиддир. Азәрбайчанда онун 19 чинсә мән-
суб олан 48 нөвү битир. Нөвләринин чоху тропик мешәләрдә яйыл-
мышдыр. Бүтүн гитәләрдә нүмайәндәләринә раст кәлмәк олар.



Шәкил 294. Ишыготу (*Luzula*)
1—биткинин үмуми көрүнүшү; 2—чичәйинин
диаграммы; 3—мейвәси.

Шәкил 295. Чығ (*Juncus acutus*)

Чичәкянлыглары тозланмаларына көмәк әдән мүййән һәшәра-
тын бәдәнләринә вә ағызларына уйғунлашдығы үчүн чох гәрибә
шәкилләр алмышдыр.

Сәһләбкимиләр (*Orchidaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләнин нүмайәндәләриндә эркәкчикләрин сайы хейли
азалмышдыр вә икиси стаминодия һалында олур. Һәшәрат васи-
тәсилә тозланманы тәмин этмәк үчүн ән бөйүк уйғунлашма,
чичәкянлығында баш вермишдир. Фәсиләнин бүтүн нүмайәндә-
ләри отлардыр. Онлар мүхтәлиф шәраитдә битмәк үчүн уйғун-
лашмышдыр. Чоху бәзәк биткисидир. Чичәкләри гәлтугларда
тәк-тәкдир вә я чичәк группларына топланмышдыр. Чичәкләринин
әни 0,2-дән 25 см-ә гәдәр олур. Чоху икичинсли вә зиготоморфдур.

Чичәкянлыгы ики даирәдә үч-үчдүр. Онлардан бири чох ири олур, она до да г дейилир. Бә'зән додаг маһмызлы олур вә онун ичиндә бал ширәси топланыр. Юмурталыглары ашагы вә узундур; юмурталыг гывырларак үст додагын ашагыя чеврилмәсинә сәбәб олур. Юмурталыгын үстүндә сүтунчуг олур; бу сүтунчуг бирләшмиш эркәкчикдир. Сүтунчуғун габаг учуна д и м д и к дейилир.


Чичәкдә ялныз бир эркәкчик олдугда, сүтунчуғун төпәсиндә икяювалы тозлуг отуруп, һәр юванын тозлары битишик олур тоз күтләси әмәлә кәтирир ки, она да п о л л и н и я дейилир. Поллиниянын аягы, дибиндәки ястыгы илә бирликдә поллинария адланыр. Карандашын учу илә поллиниянын дибине тохундугда поллинария япышганлы ястыгы васитәсилә карандаша япышыр.



Шәкил 296. Ванил (*Vanilla planifolia*).


1—чичәйини диаграммы; 2—исктарлығы; 3—эркәкчийи; 4—тозлуғу; 5—юмурталыгынын эһинә кәсийи; 6—мейвәси.

Сәһләбкимиләрин векетатив органлары чох мухтәлифдир. Торпагда битәнләрин һамысынын я хусуси ералты юмурулары, я да көкүмсов көвдәләри олур. Тропик өлкәләрдә битән эпифит сәһләбкимиләрин көвдәләри чох вахт шишәрәк ерүстү юмурулар әмәлә кәтирир: Бә'зи эпифитләрдә хлорофилли һава көкләри әмәлә кәлир ки, битки ялныз онларын васитәсилә һавадан пидаланыр, я да үзәри хусуси өлү һүчәйрәләрдән ибарәт үзлүклә өртүлүр ки, онун васитәсилә ягыш суюну сорараг биткини су илә тәмин әдир.



Шәкил 297. Сәһләбкимиләрин мухтәлиф чичәкләрини диаграмлары: 1—бирэркәкчikli чичәйин бурулуңчая гәдәр диаграммы; 2—һәмйи чичәйин бурулдуңдан сонра диаграммы; 3—икиэркәкчikli чичәйини диаграммы.

Әһәмийәтли нүмайәндәләриндән бири в а н и л д и р (*Vanilla planifolia*). Тропик өлкәләрдә бечәрилән бу биткинин (шәкил 296, мейвәләриндән әдвийят кими ишләдилән ванил алыныр.



Шәкил 298. Сәһләб (*Orchis*) биткисини чичәйи

1—һаршыдан үмуми көрүнүшү; пл—чичәкянлыгынын хариңи яргаглары; дя—дахили яргагыглары; т—тозлуғлары; д—димдикчийи; к—онун ашагы һиссәсини кисәчийи; а—дһинчийин арызчыгы; м—маһмызчыға кириш; 2—поллиния; т—тозчуғ; аг—аягчыг; яд—япышганлы диск; 3—поллинияларын ики япышганлы дискә дирәнмиш кисәчийи; яд—ястыг.



Шәкил 299. Үзәринә һәшәрәт гонмуш сәһләб чичәйи.

сәһләб адланыр. Онларда 50%-ә гәдәр селикли маддә олур ки, о да юмшалдычы тә'сир жәстәрир. Бундан башга онларда 27%-ә гәдәр нишаста, 5%-ә гәдәр зүлалы маддә, 1% шәкәр олур. Бу биткиләр дағ этәкләриндән башлайыб орта дағ гуршагларына гәдәр хырда мешәликләрдә, чәмәнләрдә, отлу батаглыгларда яйылмышдыр. Тәбабәтдә бир дәрман олараг ишләдилән сәһләбин Азәрбайчанда бөйүк хаммал әһтияты вардыр.

Бу фәсиләнин нүмайәндәләриндән бир чохунун чичәйи чох көзәл вә гәрибә олур. Буна көрә дә онлар бир бәзәк биткиси ким чох әкилир. Бәзиләри ябаны һалда битир (шәкил 297, 298 вә 299).

ЧИЛЛӘР (*Cyperales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын 85 чинсинә аид 3500-дән артыг нөвү вардыр. Бунлардан Азәрбайчанда 19 чинсинә аид 115 нөвү батаглыг ерләрдә, сулу чәмәнләрдә, арх вә чайларын кәнарларында, мешәләрдә, аз-аз һалларда гуру ерләрдә битир.

Чилләр сырасы нүмайәндәләринин демәк олар ки, һамысы чохиллик отлардыр вә илк бахышда тахыллара охшайыр, лакин бунларын көвдәләри учбучаглы, ярпаглары гапалы, гынлы вә дилчиксиздир. Чилләр сырасы *Liliflorae* сырасынын чығ (*Juncaceae*) фәсиләсинә чох охшардыр, һәтта бәзи систематикләр чилләр сырасыны чығ (*Cyperaceae*) фәсиләси ады илә *Liliflorae* сырасына дахил этмәйи тәклиф эдирләр, чилләр сырасыны *Liliflorae* сырасындан аз-чох фәргләндирән биринчиләрдә мейвәнин биртохумлу олмасыдыр.

Чилләр сырасынын ялныз бирчә чил (*Cyperaceae*) фәсиләси вардыр.

Чил (*Cyperaceae*) фәсиләси


Чохиллик вә аз-аз һалларда бириллик отлардыр. Көвдәләри дүйүнсүз, учбучаглыдыр. Ярпаглары хәтвари, аз-чох әнсиз, нөв-шәкилли, кәнарлары итидир. Аясынын ашағы һиссәси гапалы гынлы, демәк олар ки, дилчиксиздир. Чичәкләри икичинсли вә бирчинсли. аз-аз һалларда икиәвлидир. Чичәкянлыглары йохдур, я да түкләр вә гылларла әвәз эдилмишдир. Бәзи чинсләриндә дишичик өртүчү пулчугла әһатә олунмушдур ки, о да кисәчик шәклини алмышдыр. Эркәкчикләри 2—3-дүр. Дишичийи 1—3 мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, сапа охшар сүтунчуглудур. Юмурталыгы юхарыдыр. Мейвәси учбучаг шәкилли вә я юварлаг фындыгчыгдыр. Чичәк групу сүнбүл, башчыг вә я сүпүркә шәклиндә олур.

Чох нүмайәндәли вә полиморф олмасына бахмаяраг бу фәсиләнин истифадә эдилчәк нүмайәндәләри чох аздыр. Габа вә

гида маддәләри аз олдуғундан һейванлар тәрәфиндән чох һәвәс-сиз ейилир, я да һеч ейилмир.

Әһәмиyyətли чинсләриндән бири чилдир (*Carex*). Чилин 2000-ә гәдәр нөвү олуб, ер күрәсинин һәр ериндә яйылмышдыр. Азәрбайчанда 61 нөвү мә'лумдур. Онлар сулу чәмәнләрдә вә батаглыгларда яйылараг чох вахт торпаг комалары әмәлә жәтирир. Чил (*C. supina*) нөвүнүн отунда 135,9 мг % «С» витамини вардыр.

Саламәләйкүм (*Cyperus*) чинсинин ер үзүндә 279-а гәдәр нөвү вардыр. Онлардан ербадамы вә я гызылы саламәләйкүм (*C. aureus*) нөвүнүн торпаг алтында әмәлә кәтирдийи ербадамы адланан юмуруларынын тәркибиндә 19—22% яғ, 2,9% зүлал, 30% нишаста вә шәкәр вардыр. Бириллик отдур. Шимали Гафгазда әкилир.



Шәкил 300.

Юхарыда солда—һәсироту (*Scirpus*) гылаохшар 6 чичәк янлыгы олан чичәйи.

Ашағыда солда—чил (*Carex*) чичәйинин диаграммалары: 1—эркәк чичәйин диаграммы; 2—диши чичәйин диаграммы; 3—диши чичәк группунун схеми; 4—*Elyna* биткисинин икичинсли чичәк группунун схеми; 5—өртүк ярпаглары.

Ашағыда сағда—гумлаг чили (*Carex arenaria*) 1 вә 2—чичәклә-мәдә олан көкүмсов көвдәли биткинин һиссәләри; 3—чичәкалтыгы пулчуғу олан эркәк чичәйи; 4—кисәчикдән ики ағызчыгы чыхмыш олан диши чичәйи; 5—дишичийи; 6—чичәкалтыгы пулчуғу.

Папирус (*C. papyrus*) адланан нөвдөн кечмишдә кағыз хазырланырды, хазырда бәзәк биткиси кими эвләрдә сахланылыр. Бәтәни Нил чайы әтрафыдыр. Онларын көкүмсов көвдәси ейилир.

Һәсироту вә ялығ (*Scirpus*) чинсинин ер үзүндә 10-а гәдәр нөвү вардыр. Азәрбайҗанда 1 нөвү мә'лумдур, о да мешәлыгыдыр (*C. silvaticus*) (шәкил 300). Чохиллик биткидир. Сүрүнән көвдәләри вардыр. Көвдә ярпаглары 3 типли, чылпаг, 30—120 см һүндүрлүйүндәдир. Орта вә юхары дағ гуршагларында битир. Әсасән көлкәли вә нәм ерләрдә яйылмышдыр. Һәсир, зәнбил вә саирә тохумаг үчүн әлверишлидир.

БАНАНЧИЧӘКЛИЛӘР (*Scitaminales*) СЫРАСЫ

Бу сырая бананкимиләр, зәнчәфилчичәкклиләр вә канна фәсиләси аиддир. Чохунун чичәкләри икичинсли гейри-мүнтәзәм вә я асимметрикдир. Чичәкянлыгы вә эркәкчикләри үч-үч олмага ики даирәдә дүзүлмүшдүр. Икинчи даирәдәки эркәкчийин учу ләчәк шәклиндә стаминодиядыр. Юмурталыгы бир вә я үчювалы олуб, ашағыдадыр. Бурая аид олан нүмайәндәләрин һамысы субтропик биткиләрдир.


Банан (*Musaceae*) фәсиләси

Фәсиләнин нүмайәндәләри нәһәнк отлар вә я ағачлардыр. От шәклиндә оланларын көвдәләри, ярпагларын бир-бири ичәрисинә кирмәсиндән әмәлә кәлмиш яланчы көвдәләрдир. Чичәкләри тачшәкилли биргатянлыгыдыр, я да касачыгла тачы айрылмышдыр, актиноморф, я да зигоморфдур. Чохунун чичәйи икичинслидир, эркәкчикләри 6-дыр, ики даирәйә дүзүлмүшдүр, бә'зән дахили даирәдәкиләрдән бири пулчуг шәклиндә стаминодиядыр.

Мадагаскарда битән сәйяһ ағачынын (*Ravenala madagascariensis*) чичәйиндә эркәкчикләрин 6-сы да нормал инкишаф этмишдир. Юмурталыгы үчювалыдыр, ашағыдыр, тохумлары чохдур. Мейвәләри чохунда хияршәкилли киләмәйвә вә я гутучугдур. Перисперми вә әксәрән эндосперми, тохумларда ун кими нишасталыдыр, һәшәрәт вә я гушларын васитәсилә тозланыр. Чичәк грулу сүнбүлшәкиллидир.

Бу фәсиләдә нисбәтән әһәмийәтли чинс банандыр (*Musa*). Онлар тропик биткиләрдир, бә'зи нөвләри субтропик өлкәләрдә бечәрилиз. Бу чинсин бир сыра нөвләринин мейвәләри ейилир, бә'зи нөвләринин етишмәйән мейвәләриндән нишаста алыныр. Бә'зи нөвләриндән мәсәлән, Филиппин адаларында битән *Musa textilis* нөвүндән тохума лифи, истәһсал эдилир, бә'зи нөв-

ләри исә бир бәзәк биткиси кими әкилиз. Мәдәни үсулла бечәрилән бананларын чохунун мейвәләри (партенокарпия) тохумсуздур (шәкил 301).



Шәкил 301.

С о л д а — банан (*Musa sapientum*), с а р д а — сәйяһ ағачы (*Ravenala madagascariensis*).

Зәнчәфилчичәкклиләр (*Zingiberaceae*) фәсиләси

Чох мүһүм фәсиләдир. Нүмайәндәләри башлыча олараг, көһнә дүнянын тропик өлкәләриндә яйылмышдыр, хазырда 350-йә гәдәр нөвү вардыр. Көкүмсов көвдәләри олан отлардыр, ярпаглары хәтвари, аялы вә иригинылыдыр, гын илә ая арасында дилчик вардыр. Чичәкянлыглары икигат олуб, үчтипидир. Эркәкчикләри үч-үч олмага ики даирәйә дүзүлмүшдүр. Дахили даирәдә оланлардан ялыз бири нормал инкишаф эдир, галан 5-и я инкишаф этмир, я да стаминодия шәклини алыр. Харичи даирәдә стаминодия шәклини алмыш ики эркәкчик ләчәк шәклиндә олур, я да һеч олмур, дахили даирәдә оланлар бир-бирилә бирләшәрәк рәнкли додат әмәлә кәтирир. Юмурталыглары ашағы олуб, бирювалы вә я үчювалыдыр. Сүтунчуғу нормал эркәкчийә сөйкәнмишдир. Мейвәләри гутучугмәйвә, аз-аз һалларда исә киләмәйвәдир. Энтомофилдир. Бүтүн нүмайәндәләриндә дахили әтирли яғ вәзиләри вардыр.


Бу фәсиләнин әһәмиyyətли нөвләриндән бири зәнчәфил (*Zingiber officinale*)-дир. (шәкил 302). Онун ири көкүмсов көвдәләри бир әдвийят кими вә тәбәәтдә дәрман олараг ишләдилир.



Шәкил 302. Зәнчәфил (*Zingiber officinale*)

1—чичәнин узунуна кәсийи 2—эркәкчикләрин узунуна кәсийи
3—чичәнин диаграмы, 4—юмурталығын әнинә кәсийи

Әһәмиyyətли нөвләриндән бири дә сарыкөк (*Curcuma longa*)-тир. Ондан бир әдвийят кими вә боягчылыгдә истифатә эдилир. Ыл вә якардамон (*Elettaria cardamomum*) нөвүнү (шәкил 303) субтропик өлкәләрдән бир чохунда мейвәси хатирчә бечәрирләр. Онун мейвәләри Ыл адланан яхшы әдвийяттыр. Фәсиләнин бәзи нүмайәндәләри бәзәк биткиси кими әкилир.



Шәкил 303. Ыл (*Elettaria cardamomum*)

1—биткисини үмуми көрүнүшү; 2—ярпағы; 3—чичәкли вә мейвәли будағы; 4—чичәйин узунуна кәсийи; 5—юмурталығын әнинә кәсийи; 6—мейвәнин әнинә кәсийи; 7—мүхтәлиф формада мейвәләри; 8—юваларда тохумларын дүзүлүшү.

Качна (*Canaceae*) фәсиләси

Бунун ялныз бир к а н н а (*Canna*) чинси зардыр. Чәнуби Американын субтропик өлкәләриндә 60-а гәдәр нөвү яйылмышдыр. Зәнчәфилчичәклиләрден фәрги билән ибарәтдир ки, эркәкчикләринин һамысы ләчәкшәкилли стаминодия һалындадыр, эркәкчийин бир тозлуғу нормал инкишаф этмиш, дикәри исә ләчәк шәклини алмышдыр. Чичәянлыгы садә вә тамамилә асимметрик слуб, түнд рәнкләдир. Юмурталығы ашагы вә үчювалыдыр. Ири отлардыр.

Бейүмө чөхөрдөн бананлара охшайыр. Ярпаглары иридир. Этирли яғ везилери йохдур. Гибридлешдирмә нәтижәсиндә әлдә әдилмиш иричичәк нөвләри бәзәк биткиси кими әкилир. Азәрбайчан районларыннан бир чохунда бечәрилмәкдәдир. Ейилән канна (*Canna edulis*) нөвүнүн көкүмсов көвдәсиндә гиймәтли нишаста вардыр.


ТАХЫЛЧИЧӘКЛИЛӘР (*Graminales*) СЫРАСЫ

Бу сыра бир чох хусусийәтләрилә чилкимиләрә охшайыр, әксәрийәти хәтвари узун аясы олан гынлы ярпаглы отлардыр. Чичәк верән көвдәләри дәстә һалында олан диб ярпагларынын ортасындан чыхыр. Чилләр вә тахылчичәкклиләр сыраларынын чичәкләри гурулушча бир-бириндән чох аз фәргли олуб, сүсәнчичәкклиләрин чичәйи типинә чох яхындыр. Тахылчичәкклиләрдә ярпағын гыны илә аясы арасында дилчик олмасы бу сыранын нүмайәндәләрини чилләрден фәргләндирир. Һәр ики сыранын чичәйи әйни истигамәтдә тәкамүл әдәрәк садәләшмиш вә энтемофилиядан аномофилияя кечмишдир, лакин онларын башланғычлары мүстәгил олуб, ялныз бәзи хусусийәтләри илә фәргләндикләриндән, онлара мүстәгил бахылмалыдыр. Тахылчичәкклиләрдә күлөк васитәсилә тозланма чилкимиләрдән даһа мүкәмәлдир. Тахылчичәкклиләр сырасына ялныз тахыллар (*Gramineae*) фәсиләси аиддир.

Тахыллар (*Gramineae*) фәсиләси


6000-дән артыг нөвү олан вә бүтүн дүняда кениш яйылмыш фәсиләдир. Нөвләринин әксәрийәти субтропик өлкәләрдәдир. Тахылларда чичәкләр сүнбүлчүкләрә, сүнбүлчүкләр дә мүрәккәб сүнбүлләрә вә я сүпүркәләрә топланмышдыр. Сүнбүлчүкләр әксәрән чохчичәкли, икичичәкли вә бирчичәкли олур. Һәр сүнбүлчүйүн дибиндә ики бош пулчуг олур, онлардан бири ашағы сүнбүл пулчуғу, дикәри исә юхары сүнбүл пулчуғу адланыр. Һәр чичәйин дибиндә дә ики пулчуг вардыр, онлардан биринә ашағы чичәк пулчуғу, дикәринә исә юхары чичәк пулчуғу дейилир (шәкил 304). Чох вахт ашағы чичәк пулчуғунда чыхынты олур ки, о да гылчыг адланыр. Юхары чичәк пулчуғунда гылчыг олмур. Гылчыг ашағы чичәк пулчуғунун дибиндән, ортасындан вә тәпәсиндән чыха биләр. Гылчыг мәншә әтибарилә, редуксия әтмиш ярпаг аясыдыр, пулчуг исә гындыр. Чичәк пулчуғларындан ичәридә 2, аз-аз һалларда 3 зәриф пәрдәчик олур. Пәрдәчикләрдә шишмәк габилийәти олдуғундан, чичәк ачан заман чичәк пулчуғларыны аралайыр. Бу заман чичәкдә адәтән 3 әдәд олан әркәкчийин вә түклү сүтунчуғу олан ләләкшәкилли 2 дишичийин үстү ачылыр, беләликлә, дишичийин сүтунчуғу чичәкдән кәнәра чыхыр (шәкил 307). Чәлтиклә,

шәкәр гамышында, бамбугда әркәкчикләрин 6, бир чох башга тахыл нөвләриндә исә 3 олмасы, бу ахырынчыларын биринчиләрә нисбәтән даһа чох тәкамүл әтдийини кәстәрир. Бамбугда дишичийин үчағызчыглы олмасы, онун үч мейвә ярпағындан әмәлә кәлдийини тәсдиг әдир (шәкил 305).



Шәкил 304. Тахыл сүнбүлләринин схеми вә чичәкләринин диаграммы:

асп—ашағы чичәк пулчуғу; ючп—юхары чичәк пулчуғу, п—пәрдәчик; э—әркәкчикләр; д—икиағызчыглы дишичик; юсп—юхары сүнбүл пулчуғу; асп—ашағы сүнбүл пулчуғу.



Шәкил 305. Тахыл чичәкләринин диаграммлары:


1—алтыәркәкчikli вә үчпәрдәчikli тахыл чичәйинин диаграммы; 2—алтыәркәкчikli вә үчпәрдәчikli бамбуг (*Bambusa*) чичәйинин диаграммы; 3—алтыәркәкчikli вә икипулчуғлу чәлтик (*Oryza*) чичәйинин диаграммы; 4—пәрдәчикләри вә әркәкчикләри икийә гәдәр редуксия әтмиш әтирлисүнбүл (*Anthoxanthum*) биткисинин чичәйинин диаграммы.

Чәнуби Америка тахылларындан *Streptochaeta* биткисинин тәдигаты кәстәрмишдир ки, онун дишичийинин әмәлә кәлмәсиндә үч мейвә ярпағы иштирак әдир. Бу биткидән башга, троник тахыл биткиләриндән бир чохунда да 3 әдәд пәрдәчик олур вә үчүнчү пәрдәчик дишичиклә сүнбүл оху арасында ерләшир.

304-чү шәкилдәки сүнбүлүн схеми илә 305-чи шәкилдәки диаграммы мүгайисә әтдикдә көрүрүк ки, ашағы чичәк пулчуғу чичәйин өртүк ярпағыдыр, юхары чичәк пулчуғу—чичәйин өртүйүнү тәшкил әдән ики харици даирә ярпағынын битишмәсиндән әмәлә кәлмишдир, үчүнчү чичәк пулчуғу исә—адәтән, инкишаф әтмир.


Беләликлә, бә'зи тахылларын чичәк диаграмларыны сүсәнчичәк-лиләрин диаграмы илә мугайисә этдикдә һәр ики сыранын гоһум-луғуну көрүрүк.

Тахылларын мейвәси адәтән дәндр. Тахылларын әксәрий-йәти бириллик вә я чохиллик отлардыр. Инкишаф әтмиш көкүм-сов көвдәләри вардыр, онлардан да торпағын сәтһиндә дәстә илә ярпат әмәлә кәлир. Ярпаглары ири хәтвари, бә'зән бүкүлмүш аялыдыр. Көвдәләринин һүндүрлүйү чох мүхтәлиф олур. Бә'зи нөвләрин көвдәсинин һүндүрлүйү анчаг 1—2 см олдуғу һалда, бә'зи нөвләринки (мәсәлән, бамбугунку) 15—20 м һүндүрлүкдә вә 25—30 см йоғунлугда олур. Көвдәләриндә буғумларын ичи бошдур, дүйүнләри исә бир гәдәр габарыг олуб, йоғунлашмыш-дыр вә ичәридән аракәсмәләри вардыр. Тәкбир һалларда, мәсә-лән чәлтикдә, шәкәр гамышында, буғумларын ичи паранхим һүчәйрәләрлә долу олур. Тахылларын чохунда көвдә будаглан-мыр, лакин көкүмсов көвдәдән вә ерүстү көвдәнин дибиндән чох вахт әлавә будаглар әмәлә кәлир. Һәр дүйүнә гын васитәсилә бир ярпаг бирләшир, лакин аз-аз һалларда дүйүн гапалы олур. Гын аз-чох узун вә дар ярпаг аясына кечир, чох вахт гын илә ая ара-сында пәрдәшәкилли, я түкшәкилли дилчик олур. Тахылларын көкләри сачаглы әлавә көкләрдир (шәкил 306).



Шәкил 306. Тахылларын көвдәләри вә ярпаглары:

1—харичдән көвдәнин дүйүнү; 2—дүйүнүн узунуна кәсийн; 3—гынлы, дилчикли (я), аялы ярпаг; 4—дилчик вә аянын башлан-гычы; 5—ашағы чичәкпулчуғу вә (о) гылчыг.



Шәкил 307. Топал оту-нун (*Festuca*) чичәйи.

Буғда, дүйү, гарғыдалы, човдар, дары вә саира инсан вә һей-ванларын әсас гидасыны тәшкил әдир. Бундан башга, тахыл-лардан кағыз, партлайычы маддәләр, нишаста, әтрийят вә саира һазырланыр, шәкәр истәһсалында вә сәнаәин бир чох башга са-һәләриндә ондан кениш истифадә әдилир. Онлардан тәйярә мей-данларыны вә стадионлары юмшаг яшыл өртүклә өртмәк, яшыл чәмәнликләр дүзәлтмәк, гумлуглары, дәрәләри, учгунлары вә

саирәни мөһкәмләтмәк үчүн дә истифадә әдилир. Бунунла бәра-бәр, тахылларын арасында гыяготу, чайыр, калыш, сулуф, һинд-дарысы, тулатуан вә саир бу кими чох зиянкар алаг оту нөвләри дә вардыр.

Тахылларын систематикасы чох чәтиндир. Онлар башлыча олагаг сүнбүл вә чичәкләринин гурулушуна әсасән ашағыдакы гайдада системләшдирилир.

1. Сүпүркәшәкилли чичәк групу оланлар. Бунларда һәр сүн-бүлчүк узун саплаг үзәриндә отуруп (мәсәлән, чәлтик, юлаф, дары, шәкәр гамышы вә саирә).

2. Сүнбүлшәкилли чичәк групу оланлар. Бунларда сүнбүл-чүкләрин саплагы олмадығындан чичәк групу, охун чухурларын-да отуруп (мәсәлән, буғда, арпа, човдар вә саирә).

3. Чичәк групу султан шәклиндә оланлар. Бунларда сүнбүл-чүкләрин саплагы чох гыса олдуғундан, сүнбүлчүкләр чичәк гру-пунун әсас охуна гысылмыш олур вә илк бахышда сүнбүлә ох-шайыр (мәсәлән, тулатутан, түлкүгуйруғу вә саирә).

Тахыл фәсиләсинин тәсәррүфат әһәмийәти олан ашағыдакы 10 ярымфәсиләси вардыр.

Гарғыдалы (*Maydeae*) ярымфәсиләси

Бирәвли биткиләрдир. Эркәк чичәкләри көвдәнин учунда сү-пүркә шәклиндәдир, диши чичәкләр исә орта ярпагларын голту-ғунда гыча (тохмаг) чичәк групуна топланмышдыр. Чичәк пул-чуглары юмшаг вә пәрдәшәкилли, сүнбүлчүк пулчуглары исә, әк-синә, чох сәртдир. Бу ярымфәсиләнин 7 чинси, 24-ә гәдәр нөвү вардыр, тропик вә субтропик өлкәләрдә яйылмышдыр (шә-кил 308).

Гарғыдалы (*Zea mays*) нөвүнүн бир чох чешиди вардыр. Гар-ғыдалынын әсас нөвләри бунлардыр:

Диш в а р и гарғыдалы (*Zea mays indentata*). Дәнәләри-нин әзичиси вардыр. Һүндүрбойлу, кечетишән вә чохмәһсуллу биткидир.

Н а б а т ы гарғыдалы (*Zea mays indurata*). Дәнәләри-нин тәпәси даирәвидир, эндосперми сәрт вә шүшә кимидир. Тор-паға гаршы аз тәләбкар олуб, гураглыға давамлыдыр.

Ю м ш а г гарғыдалы (*Zea mays amylaceae*). Дәнәси ағ, юмшаг, унлу, эндоспермлидир. Бә'зи чешидләринин дәнәси 2 см эниндә олур.

П а р т л а я н гарғыдалы (*Zea mays everta*). Гычалары хырда, дәнәләри чох балача, сәрт вә шүшә кимидир.

Ш ә к ә р л и гарғыдалы (*Zea mays saccharata*). Дәнәләри шүшә кими олуб, гырышыгдыр, етишән заман дәнәләриндә ни-шаста әвәзинә декстрин әмәлә кәлир. Көвдәси вә чаван гычала-ры шәкәр верир. Чох бечәләйир.

М у м гарғыдалы (*Zea mays ceratina*). Эндосперминин кәсийи мум кимидир, Шәрғи Асияда әмәлә кәлмишдир.

Пәрдәвари гарғыдалы (*Zea mays tunicata*). Дәнәләри етишдикдән сонра чичәк пулчугларында галыр. Аз бечәрилир.



«Яла» алланан гарғыдалы чешидинин көвдәси 6 м һүндүрлүкләдир. Гычасы, адәтән 35 см йоғунлугда вә 50 см-ә гәдәр узунлугда олур.

Дуняда гарғыдалынын үмуми мәнсулу буғда мәнсулундан артыгдыр. Гарғыдалынын ейинги әһәмийәтиндән башга бир дә сәнәә әһәмийәти вардыр. Ондан 150-йә гәдәр мүхтәлиф мәнсул нөвү, о чүмләдән, нишаста, шәкәр, спирт, ем, яғ, резин, лиф, кағыз, фурфурол, һәтта тохумдан тәмизләнмиш гычасындан аяггабы дабаны, поташ вә саирә алыныр. Гарғыдалы сачағында «К» витамини вардыр. Ондан ганы кәсмәк, бә’зи бөйрәк вә гара чийәр хәстәликләрини муәличә этмәк үчүн истифадә олунур. Гарғыдалынын ярпагы, көвдәси вә мейвәсиндә (тохумунда), демәк олар ки, бүтүн

витаминләр аз вә я чох мигдарда вардыр. Гарғыдалы эйни заманда чох дәйәрли силос биткисидир. ССРИ-дә гарғыдалы кениш сурәтдә әкилмәйә башланмышдыр.

Дашдәйәнкимиләр вә я балағоту (*Andropogonea*) ярымфәсиләси

Гарғыдалыкимиләр ярымфәсиләсинә охшайыр, лакин бунларын сүнбүлләри икичинслидир. Ән мүһүм нүмайәндәси шәкәр гамышыдыр (*Saccharum officinarum*), о да тропик, субтропик өлкәләрдә битән чохиллик отдур (шәкил 309). Көкүмсов көвдәси сүрүнәндир, ерүстү көвдәси һүндүр вә чох шәкәрлидир. Чичәк групу сүпүркәдир. Көвдәсиндән шәкәр алыныр, бу ахырынчынын чечәсиндән ром ичкиси һасил әдитир.

Шәкәр гамышы мәдәни биткиләрдәндир. Бә’зи алимләрә кәрә о, *Saccharum spontaneum* нөвүндән әмәлә кәлмишдир. Бу ахырынчы да Чәнуби Асияда тәләф әдилән зәрәрли алаг отларындандыр. Шәкәр гамышы гәләм васитәсилә чохалдылыр. Азәрбайжанын Загатала, Балакән, Ләнкәран кими районларынын аран ерләриндә әкилиб етишдирилә биләр.

Бу ярымфәсиләнин *Sorghum* чинсинин ән мүһүм нөвү һинд дарысы (*Sorghum vulgare*) дыр. О, Африкада әсас тахыл биткиси кими бечәрилир. Совет Иттифагында Шимали Гафгазда, Орта Асияда әкилиб етишдирилән ем отудур.



Шәкил 309. Шәкәр гамышы (*Saccharum officinarum*)

Ортада—биткинин үмуми көрүнүшү; солдан юхарыда—ачылмыш чичәги, ашағыда—чичәк группунун бир һиссәси; сардан ашағыда—кәсилмиш көвдәсинин бир һиссәси.

Азәрбайжанда бу ярымфәсиләйә мәнсуб олан калыш (*Sorghum halepense*) нөвү дә (шәкил 310) битир. О, памбығын вә башга әкинләрин чох зиянкар алаг отларындандыр. Ка-

лышын көкүмсов көвдөсүндө 27% нишаста ва 13% шө-
көр вардыр, яхшы ем отудур, чичөклөдөдөн сонра габалашды-
гындан һейван ону һөвәслә емир. Силос басдырмаг үчүн яхшы
емдир. Ондан габа кағыз һазырлана биләр.



Шәкил 310 Кәләш (*Sorghum halepense*)

Техники һинд дарысынын (*S. technicum*) шөк-
группундан туғ ва сүпүркә кими истифадә әдиләр Суданоту
(*S. sudanense*) да яхшы ем отларындыр. Азәрбайчанда
бечәрилмәйә башланмышдыр (шәкил 311).



Шәкил 311. Судан оту (*Sorghum sudanense*).
1—биткинин үмуми көрүнүшү; 2—көвдөсүнүн чичәкли бир һиссәси;
3—сүнбүлчүйү; 4—бир чичәйи; 5—дишичийи; 6—чичәк пулчугу;
7—сүнбүл пулчугу; 8—мейвәси.

Дарыкимиләр (*Panicaceae*) ярымфәсиләси

Сүнбүл пулчуглары чичәк пулчугларына нисбәтән юмшагдыр.
Ярымфәсиләнин әсас нүмайәндәсини дары (*Panicum*) тәшкил
әдир. Бурая бир чох дары нөвү аиддир. Әсәл дары (*P. miliace-*
um) буғда гәдәр гәдим биткиләрдәндир (шәкил 312). Онун
тохумларындан ярма, унундан да чөрәк һазырланыр.

Вәтәни Монголустан ва Чиндир. Азәрбайчанын бир чох дар
районларында бечәриләр. Чичәк групу сүпүркәдир. Тула ту-
тан-гыллыча (*Setaria*) чинсинин Италия гыллычасы
(*S. italica*) нөвү әкилиб етишдириләр. Онун чичәк групу баш-
чыг шәклиндә олуб, гыллыдыр, тохумлары дары бөйүклүкләдир.
Бу чинсин Азәрбайчанда *S. verticillata*, *S. glauca*, *S. viridis*
кими нөвләри тахыллар ва бағ-бостан биткиләри арасында
битән алаг отларындыр.



Шәкил 312.

Сағда чәлтик (*Oryza sativa*)
Ортада—чичәкли көздәси; 1—ачылмыш чичәйи; 2—чичәйи;
эркәкчикли вә дишичикли һиссәси.
Солда—бечәрилән дары; юхарида—онун чичәкли бир
һиссәси;
Ашағыда—бир чичәйи, юхарида—сарда—мейвәси

Чәлтикки миләр (*Oryzeae*) ярымфәсиләси

Суда яшаян чохиллик вә я бириллик отлардыр. Сүнбүлләри бирчичәкли, чичәкләри иклинслидир, бә'зән бирчинсли дә олур. Сүнбүл пулчуглары йохдур, эркәкчикләри чохунда 6-дыр. Сүнбүлчүкләри янлардан аз-чох басыгдыр.

Бу ярымфәсиләйә дахил олан чинсләрдән бири чәлтикдир (*Oryza*). Онун әсас нөвү әкилән чәлтикдир (*O. sativa*).

Чәлтик (шәкил 312) исти вә тропик әлкәләрдә әкилир, бириллик биткидир. Чичәк пулчуглары ири олуб, етишән заман габарыр. Ашағы чичәк пулчугу гылыгы вә гылыгысыз олур. Өз-өзүнү тозландырыр. Әһәмийәти әтибарилә дүняда икинчи ери тутан тахылдыр. ССРИ-дә Узаг Шәргдә, Орта Асияда, Шимали Гафгазда, Азәрбайчанын бир чох аран районларында, хусусән Ләнкәран, Губадлы вә Зәнкилан районларында чох әкилир, бир чох чешиди вардыр. Ябаны нөвләри 20-йә гәдәрдыр. Асия, Африка вә Австралиянын тропик ерләриндә битир. Дүйүдә А, В, С, Е витаминләри вардыр.

Бүлбүлотуки миләр (*Phalarideae*) ярымфәсиләси

Бириллик вә чохиллик отлардыр. Сүнбүлчүкләри бирчичәкли вә я икичичәклидир. Эркәкчикләри 2—3-дүр.

Ярымфәсиләнин чинсләриндән бири бүлбүлотудур (*Phalaris*) ки, онунда Азәрбайчанда 4 нөвү вардыр. Ем отларындандыр.

Дикәр чинси әтирли сүнбүл (*Anthoxanthum*) чинсидир. Азәрбайчанда онун әтирли сүнбүл (*A. odoratum*) нөвү (шәкил 313) вардыр. Тәркибиндә кумарин олдуғундан гуру ота хусуси әтир верир. Гарамал ичиндә әтирли сүнбүл олан оту пис ейир вә я һеч емир.



Шәкил 313. Әтирли сүнбүл (*Anthoxanthum odoratum*)

Түлкүгуйруғуки миләр (*Agrostideae*) ярымфәсиләси

Бириллик вә чохиллик отлардыр. Чичәк групу сейрәк вә я сых сүпүркәшәкиллидир. Сүнбүлчүкләри бирчичәкли вә я икичичәклидир. Бу ахырынчы һалда чичәкләрдән бири инкишаф этмиш олур. Сүнбүлчүкләри вә чичәк пулчуглары бир бойда олур. Ярымфәсиләнин нүмайәндәләри чайлағларда вә дағ чәмәнләриндә битән яхшы ем отларыдыр.


Башлыча чинсләри тарлаоту (*Agrostis*), пишигуйру-

фу (*Phleum*), түлкүгуйругу (*Alopecurus*), шияв (*Stipa*)
вэ саиредир. Яхшы ем отларыдыр. Азербайчанын мүхтәлиф ер-
лериндә яйылмышдыр.

Юлаф, вәләмир вә я начагуйруг (*Avena*) ярымфәсиләси

Бириллик вә чохиллик отлардыр. Сүнбүлләри чохчичәкли вә
я икичичәклидир. Сүнбүл пулчуглары сүнбүл бөйүклүкдәдир.
Аз-аз һалларда ондан ири вә я хырдадыр. Чичәк пулчуглары-
нын архасында гылчыг олур. О, диз
кими гатланмышдыр вә диб һиссәси
бурғу шәклиндә гыврылмышдыр.

Мүһүм тахыл вә ем биткиләриндән
олан юлаф (*Avena*) чинсинин харак-
тер нөвү әкилән юлафдыр (*A. sa-
tiva*). Юлафын Азербайчанда 11-ә
гәдәр ябаны нөвү вардыр. Онларын
һамысынын ем әһәмийәти олмагла
бәрабәр, бәзиләри дә алаг оту кими
яйылмышдыр (шәкил 314).



Топалотукумиләр (*Festucaceae*) ярымфәсиләси

Бириллик вә чохиллик отлардыр.
Сүнбүлчүкләри бирчичәкли вә я чохчи-
чәклидир. Сүнбүлчүк пулчуглары чичәк
пулчугларындан хырдадыр. Ашағы чи-
чәк пулчугундакы гылчыг дүздүр. Бу
ярымфәсилә өз чинс вә нөвләринин
хейли чох олмасы илә фәргләнәрәк
ССРИ-дә кениш яйылмышдыр.

Башлыча чинсләриндән бири гар-
ғыдыр (*Arundo*). Бу чинсә мәнсуб
оланлар тәхминән 4 м һүндүрлүкдә вә
3—4 см йоғунлугда олан чохиллик бит-
киләрдир. Чай вә арх кәнарларында
битир. Көвдәләриндән бәзи мусиги
аләтләри һазырланыр, яхшы кағыз
истеһсал әдилир, бир иикинти матери-
алы кими истифадә олунур.

Гамыш (*Phragmites communis*)

Һүндүр бойлу алаг отларындан биридир. Ерүстү көвдәсинин һүн-
дүрлүйү 4 м-ә йоғунлугу 1,5 см-ә гәдәрдир, ералты көкүмсов көв-
дәси узун вә гүввәтлидир. Батаглыгларда, су кәнарларында, сува-
рылан әкин ерлериндә битир. Гурумуш көвдәләриндән тәрәчә
тохунур, дамланын үстүнә дөшәнир, чәпәр чәкилир вә с. Чаван

Шәкил 314 Юлаф (*Avena
Bruhnsiana*)

1—үмүли көрүнүшү 2—сүнбүл
чүйү, 3—бәндин изи 4—*Avena
pilosa* нөвүнүн бәндинин изи;
5—*Avena sativa* нөвүнүн
бәндинин изи

көвдәләри силос үчүн әлверили емдир. Тәркибиндә 15%-ә гәдәр
мүхтәлиф сулу карбонлар, көкүмсов көвдәләриндә исә 16—18%
мигдарында гиймәти нишаста вардыр. Ярпагларында 200 мг %
«С» витамини олур. Кағыз истеһсалы үчүн ярарлы биткидир.

Бу ярымфәсиләнин ашағыдакы характер чинсләрини кәстәр-
мәк олар: ширин гамыш (*Eragrostis*), дишә, гыртыч
(*Poa*), назикбалдыр (*Koeleria*), чобантоппузу (*Dac-
tylis*), топалюлафча (*Festuca*), гурамит (*Lolium*), тон-
галоту (*Bromus*) вә с. Бунларын әксәрийәти яхшы ем отла-
рыдыр.

Арпакимиләр (*Hordeae*) ярымфәсиләси

Чичәк групу мүрәккәб вә я бәсит сүнбүллүдүр. Сүнбүлчүкләр
ики (аз-аз һалларда чохлу) сырая дүзүлмүшдүр. Бириллик вә я
чохиллик отлардыр. Бурая мүлайим өлкәләрдә әкилән мүһүм та-
хыл нөвләри дахилдир. Ярымфәсиләнин 20 чинси вә 250-йә гәдәр
нөвү вардыр.

Башлыча чинсләриндән бири буғда (*Triticum*)-дур. Онун
бир чох нөвү вардыр. Характер нөвләри юмшагбуғда (*T.
vulgare*), сәртбуғда (*T. durum*), икидәнәлибуғда (*T.
dicoccum*) вә саиредир. Буғда өз үмуми мәнсулу әтибарилә
мәдәни тахыллар арасында бүтүн дүняда икинчи ери тутур.
Буғда гәдимдән бәри әкилиб етишдирилән тахыл биткиләрдән-
дир. Совет Иттифагында буғда чәнүби степ вә мешәстеп районла-
рында, хусусән Украйнада вә Газакстанда күлли мигдарда әки-
лир, сон заманлар буғда хейли шимала еридилмишдир вә орада
мүвәффәгийәтлә әкилир. Азербайчанын аран вә дағ районла-
рында кениш мигяда әкилән тахыл нөвүдүр. Сон заманлар апа-
рылан әлми-тәдгигат ишләри нәтичәсиндә Азербайчанын район-
ларында мүвәффәгийәтлә бечәрилән буғда чешидләри әлдә
әдилмишдир, онларын академик И. Д. Мустафәвин «Севинч»,
«Чәфәри», Грамачевскинин «Арандәни», «Шәрг» вә с. чешидлә-
рини кәстәрмәк олар.

Әсас тахылардан бири дә човдар (*Secale cereale*)-дыр.
О, башлыча олараг Шимали Гафгазда вә Орта Асияда әкилир.
Үмумийәтлә човдар гараторпаг гуршағындан харичдә әкилир.
Човдарын юхарыда кәстәрилән нөвүндән башга, Азербайчанда
ябаны һалда битән 3 нөвү мәлумдур.

Буғда вә човдар гәдәр әһәмийәтли олан тахыллардан бири
дә арпадыр (*Hordeum vulgare*). Арпа да буғда гәдәр гәдим-
дир. Ону һәлә гәдим юнанлар вә мисиртиләр әкиб етишдирир-
миш. Вәтәни Һәбәшистан вә Асиянын тропик һиссәсидир. Арпа
сәрт иглимә давамлы биткидир. Азербайчанын бүтүн аран вә
дағ районларында әкилир. Азербайчанда онун 8 ябаны нөвү
вардыр. Арпадан чәрәк, пивә, ярма вә саирә һазырланыр.

Бамбукимиләр (Bambusoideae) яримфәсиләси

Чохиллик, аз-аз һалларда бириллик биткиләрдир. Чох вахт будагланан көвдәсинин һүндүрлүгү 40 м-ә вә йоғунлуғу 20 см-ә гәдәр чатыр. Һәмишәяшылдыр. Сүнбүлләри икичичәкли, чохчичәкли вә я бирчичәкли олур. Эркәкчикләр адәтән 6, бә'зән 3, бә'зән дә 20-йә гәдәр олур. Сүтунчуғу 3—2, мейвәси киләмәйвә (әт-ли вә я гуру), я да дәнәчикмәйвәдир. Тропик, субтропик, аз-аз һалларда мулайим иглимли өлкәләрдә битир.

Бүтүн дүняда 33 чинси вә 500-ә гәдәр нөвү вардыр. ССРИ-дә *Phyllostachys* вә *Arundinaria* чинсләринин бә'зи нөвләри Гәрби Зағафғазияда әкилиб етишдирилир. Бәзәк биткиләридир. Бәзиләри чох эластик олдуғундан мухтәлиф эв шейләри—стул, чарпайы, стол, этажерка вә саирә һазырламаға сәрф әдилир. *Phyllostachys* чинсинин нөвләри язда бир күндә бир метрә гәдәр узаныр, беләкликлә 5—6 һәфтәдә 20 м бой атыр.

ПАЛМАЧИЧӘКЛИЛӘР (Palmales) СЫРАСЫ

Палмалар (Palmaceae) фәсиләси

Фәсиләнин нүмайәндәләри ялныз ағачлардыр. Көк системн алавә сачаглы көкләрдән ибарәтдир. Чохунун көвдәси сүтун кими олуб, будагланмаян, аз-аз һалларда исә будагланандыр. Чох вахт ералты көкүмсов көвдәси будагланыр. Бә'зи һалларда лианлардыр. Ярпағлары иридир, чохунун ярпағы бармагшәкилли вә я ләләкшәкилли парчаланыр, аз-аз һалларда бүтөв олур. Ярпағы ләләкшәкилли оланлара ләләкярпағлы палма, бармагшәкилли оланлара исә елпикярпағлы палма дейлир. Чичәк группу бәсит вә я будагланан тохмагчыгдыр, чичәк ачмаздан габаг чох вахт одулашан, горуючу ири өртүйү ону бүрүмүш олур. Чичәкләри бирчинсли, хырда вә көркәмсиздир. Палмаларын бәзиләри, мәсәлән хурма ағачы икиэвли, бәзиләри исә мәсәлән, һиндгозу (*Cocos*) бирэвли олур.

Палмаларын чичәкянлығы зәиф икишаф әдәрәк, яшылым-тыл вә я сарымтыл олур. Чичәкянлығы бәсит олдуғда, онун ярпагчығлары 2 даирә үзрә үч-үч дүзүлмүш олур, икигәтәянлығы олдуғда исә, касачығы үчярпағлы вә тачы үчләчәкли олур. Эркәк чичәкләрдә эркәкчик 3—9, я да чох олур. Онлар битишик вә я сәрбәст олур. Дишичийи 3 мейвә ярпағларындан әмәлә кәлмиш олур. Юмурталығы 1—3 ювалы, мейвәләри киләмәйвә, чәйирдәкмәйвә вә я фындыгчыгдыр. Чичәйинин типн бирләпәлиләрдәки кимидир, бә'зән чичәйин һиссәләриндә ихтисар вә парчаланма әламәтләри ола билир.

Палмалар адәтән рүтубәтли тропик вә субтропик мешәләрдә, бәзиләри исә Бөйүк Сәһра вә Әрәбистан сәһрасы кими гураг гумлу ерләрдә битир. Палмаларын бир бәзәк биткисн кими бөйүк

әһәмиийәти олмагдан башга, бөйүк тәсәрруфат әһәмиийәти дә вардыр. Мәсәлән, хурма (*Phoenix dactylifera*) Бөйүк Сәһранын, Әрәбистанын, Һиндистанын, Чинин тропик районларынын мейвә ағачларындандыр. Хурманын 12 нөвү вардыр. Әрәбләрин бүтүн һәяты хурма ағачы адланан палма илә сых әлағәдардыр. Онлар яшайыш биналарынын тирләрини, сүтунларыны, гапы вә пәнчәрәләрини хурма ағачларынын көвдәсиндән һазырлайыр, биналарын үстүнү хурманын ярпағлары илә өртүрләр. Хурма ярпағларынын дамарларындан вә көвдәләринин лифләриндән кәндир, кисә, зәнбил вә саирә һазырланыр.


Хурманын ән бөйүк әһәмиийәти онун вердийи ейинти мәһсулларыдыр. Хурманын төпә тумурчугларындан вә чичәк сарғысындан «хурма сәһләми» һасил әдилир. Бунлары туршуя гойдуғда «хурма пәндири» алыныр.

Чаван хурма көвдәсинин өзәйи бадам дады вердийи үчүн һөвәслә ейилир.

Хурманын чичәк группуну вә көвдәсини чәртдикдә ширин ширә ахыр. Бир күндә һәр ағачдан 3 литрә гәдәр ширә топланыр. Дәрин чәртилмиш ерләрдән 3 ая гәдәр ширә ахыр. Бу мүддәтдә 270 литрә гәдәр ширә әлдә әдилир. Чох гәдимдән бәри хурма ағачынын ширәсиндән шәкәр вә «ләкби» адланан хүсуси чахыр истәһсал әдирләр. Хурма чий, һабелә гурудулмүш вә бишмиш һалда ейилир. Хурма илә арпа унуу гарышдырыб чөрәк биширилир. Она бә'зән дәвә яғы, суд вә әт дә гатырлар. Хурманын тәзә мейвәсини ширәсини гычгыртдығда хурма чахыры алыныр. Гурудулуб үйүдүлмүш хурма чәйирдәйиндән гәһвә һазырланыр.

Әрәбләр хурмадан нөвбәнөв хөрәк һазырлайырлар.

Әрәбистанда хурма мәһсулунун аз олмасы, башга өлкәләрдә тахылын тәләф олмасы гәдәр тәһлүкәли һал сайылыб, әһалинин ачлығына вә гырылмасына сәбәб олур. Хурма ағачларынын мәһсулсузлуғу чәйирткәнин һүчуму вә я узун мүддәт күчлү яғыш яғмасы нәтижәсиндә баш верир.



Шәкил 315. Хурма ағачы, мейвәләри вә чичәйинин диаграммы.

Хурма ағачынын көвдәсинин һүндүрлүйү вәтәниндә 20 м-ә, бә'зән 40 м-ә чатыр. Назик олдуғу үчүн шиддәтлї күләк әсдик-дә әйилїр. Тәпәсиндә топа һалында түнд яшыл, ләләкшәкилли вә һәр биринин узунлуғу 2—3 м олан 40—80 ярпаг олур.

Хурма ағачы икиәвли биткидир. Һәр әркәк биткидә 1200-ә гәдәр әркәкчик олур, онлар да 6—9 чичәк группуна топланыр. Һәр диши биткидә диши чичәкләрин сайы 2.500 гәдәр олур, онлар да күләк васитәсилә тозландыгдан сонра мейвә верир.

Диши чичәкләрин тамам тозланмасыны тә'мин әтмәк үчүн гәдимдә олдуғу кими инди дә әркәк чичәк группуну кәсиб диши чичәк группуна бағлайырлар. Тозлама үчүн һәр 100 диши биткийә бир әркәк битки тамамилә кифайәт әдир. Хурманын тоз һүмәйрә-


ләри 10 илә гәдәр өз чүчәрмә габилыйәтини итирмир. Одур ки, әрәбләр әркәк чичәк группарыны кәсиб әһтият үчүн сахлайырлар. Тәбии шәраит тозланма үчүн әлверишли олмадыгда, хусусән яғышдан сонра диши чичәкләри әһтият әркәк чичәк группу илә тозландырырлар.

Хурманын мейвәси август айында етишир вә һәр ағач 100—250 кг-а гәдәр мейвә верир. Хурма мейвәсини узун мүддәт сахламаг үчүн гума басдырырлар, бурада мейвә ики илә гәдәр гала биләр.

Хурма ағачы чох гидалы мейвә вермәкдән башга, кениш яшыл чәтири илә дә торпагы кәлкәлән-дирир, бунунла о тахыл тәрәвәз, ситрус, зейтун, үзүм вә бадам кими биткиләри әкиб етишдирмәйә им-кан ярадыр.

1935-чи илдән ә'тибарән Түрк-мәнистанын чәнуб-гәрб һиссәсиндә, Ғызы Әтрәк совхозунда хурма ағачлары әкилир. Һәмин сәһәдә 1949-чу илдән нормал мәһсул алынмаға башланмышдыр.

Әвләрдә бәзәк үчүн бечәрилән ләләкярпаглы палма, хурма чәйир-



Шәкил 316. Һинд гозу ағачы вә мейвәләри.

Һинд гозу (*Cocos nucifera*) (шәкил 316) вә зейтун хурмасы (*Elaeis guineensis*) кими палмалардан гиймәтлї яғ алыныр. Совет Иттифагында палмалар ябаны һалда битмир. Онларын бә'зиләриндән бәзәк биткиси кими истифадә әдир. Бәзәк мәгсәдилә отагда сахланан ләләкярпаглы хур-

ма (*Phoenix dactylifera*) да (шәкил 317) бурая аиддир. Биздә палмалардан чох яйыланы—әвләрдә, һәйәтләрдә вә паркларда бечәрилән елпикярпаглы палмадыр (*Chaetopteryx humilis*).



Шәкил 317. Мисирдә пирамидалары (әһрамлары) янында битмиш хурма ағачлары (*Phoenix dactylifera*)


ГАРА ИСТИОТЧИЧӘКЛИЛӘР (*Piperales*) СЫРАСЫ

Чичәкянлыглары йохдур. Әркәкчикләри 3—6 вә я ихтисар нәтичәсиндә даһа аздыр. Дишичийи, 2—3 мейвә ярпагындан әмәлә кәлмишдир. Юмурталығы бирювалы вә биртохумлудур. Отлар, лианлар, я да коллардыр. Ярпаглары бәсит вә бүтөвдүр, нөвбәли вә я гаршы-гаршыя дүзүлмүшдүр. Дахилиндә әтирли яғ вәзиләри вардыр. Мейвәләри чәйирдәкмейвә вә я киләмейвәдир. Тохумларынын эндосперми вә перисперми вардыр. Сыранын башлыча фәсиләси гара истиотдур.

Гара истиот (*Piperaceae*) фәсиләси

Чичәкянлыглары йохдур. *Peperomia* чинсиндә су вә гида борусу топалары бирләпәлиләрдәки кими дүзүлмүшдүр, лакин ачыгдыр, бә'зи нөвләриндә, мәсәлән (*Peperomia pellucida*)

нөвүндө тохум чүчөрөн заман лөпөлөри торпагын үзүнө чыхыр, дикерлериндө исә тохум чүчөрөн заман лөпөлөрин анчаг бири ерин үзүнө чыхыр, о бири исә торпагда галыб бирлөпөлилөрдө олдуғу кими, эндоспермдөн гита маддәсини соран органын ишини көрүр. Истиот (*Piper*) чинсинин гара истиот (*Piper nigrum*) нөвү чәнуби-шәрғи Асиянын тропик өлкөлөриндө вә Малай адаларын- да битән сармашан биткидир. Ярпаглары юмуртавари, учу сиври- дир. Чичәйинин янлыгы айпарашәкилли ярпаг өртүйүндөн ибарәт- дир. Пулчуға охшар 2 чичәкалтлыгы вардыр, онлар чичәкгрупу охунун чыхынтылары һесаб әдилир. Нормал эркәкчикләри ики га- багдакылардыр, архадакы- лар исә инкишаф әтмәмиш- дир. Юмурталыгы бириовалы вә биртохумлудур. Сүтунчуғу тыса, ағызчыгы ири вә 3—4 дилимлидир. Мейвәси бир- тохумлу икилөпәли әтли- дир. Мейвәси әтли олан гара истиот нөвүнүн чичәкләри мүййән дәрәчәдә тохмагшә- килли узун чичәк охунун ичинә кирмишдир (шәкил 318 вә 319).



Шәкил 318. Гара истиот (*Piper nigrum*)
1—етишмиш мейвәләри; 2—чичәйинин диаграмы

ри үчтипли олуб, тохмагшәкилли чичәк групуна топланмышдыр. Чичәк группунун өртүкләри бә'зән әлван рәнkdә олур вә чичәкян- лыгына охшайыр. Чичәкләри хырда, көркәмсиз, мүнтәзәм, ики- әвли вә я бирәвлидир. Чичәкянлыглары я һеч йохдур, я да пулчуг шәклиндәдир. Юмурталыгы үчювалы вә юхарыдыр. Бу сырая бир нечә фәсилә дахилдир.

Данааяғы (*Araceae*) фәсиләси

Фәсилә тохмагчичәклиләр сырасынын башга фәсиләләринә нисбәтән гара истиоткимиләрә даһа чох яхындыр.

Данааяғы фәсиләсинин чичәкянлыгы көркәмсиз вә үчүзвлү олуб, ики даирәдә дүзүлмүшдүр. Чичәк үзвләри бә'зән тамамилә ихтисар әдилмишдир. Эркәкчикләри 4—6-дыр, ики даирәдә дү- зүлмүшдүр, я да ихтисар нәтичәсиндә анчаг бири галмышдыр. Мейвәярпаглары 3—4-дүр. Мейвәләри киләмәйвәдир. Фәсиләнин Азәрбайчанда ики чинси вардыр. Бунлардан бири данааяғы (*Arum*), дикәри ийирдир (*Acorus*).

Данааяғы (*Arum*) чинсинә мәнсуб олан биткиләрин чичәк- ләри бирчинслидир, чичәкянлыглары йохдур, тохмагшәкилли чичәк охунун ашағысында һәлгә үзрә дүзүлмүшдүр. Ашағыдакы диши



Шәкил 319.

Солда ашағыда—гара истиот биткисинин чичәкли вә мей- вәли будары; 1—чапан чичәк групу; 2—дишичийинин ағзы; 3—етишмиш мейвәли будары; 4—мейвәнин узунуна кәсилиши


чичәкләр бирдишичиклидир. Онлардан юхарыда бир нечә даирә үзрә дүзүлмүш мейвә вермәйән сапшәкилли чичәкләр, онлардан да юхарыда ялныз тозлуглардан ибарәт олан саплагсыз эркәк чичәкләр групу ерләшмишдир. Чичәк группунун дибиндә ярпаг- шәкилли мұхтәлиф рәнкли ири өртүк вардыр. Мейвәләри килә- мейвәдир. Азәрбайчанда үч нөвү вардыр. Бунларын юмру көкүм- сов көвдәләри чох зәһәрлидир, лакин онлары бишириб гурут- дугда зәһәрлилийи итир вә бә'зән хәрәйә төкүлүр. Тәркибиндә

18—20% нишаста олур. Дағларда, рутубәтли ерләрде вә кол араларында битир (шәкил 320).

Ийир (*Acorus*) чинсинин ийир (*A. calamus*) нөвү (шәкил 321) сүрүнән көкүмсов көвдәли биткидир. Онун ерүстү көвдәси 60 см һүндүрлүкдә олур. Ярпаглары энсиз, лентвари, гылынчшәкиллидир. Чичәк верән көвдәси үчбучаглыдыр. Тохмаг чичәк групу көвдәсинин ян тәрәфиндә әмәлә кәлир. 4—5 см узунлугда, 5—8 мм эниндә олур. Чичәкләри яшылым-тыл-сары олуб, тохмағын һәр тәрә-



Шәкил 320. Данааяғы (*Arum orientale*)



Шәкил 321. Ийир (*Acorus calamus*) биткисинин чичәк групу вә көкүмсов көвдәси

фини тутур. Көкләриндә әтирли яғ вардыр. Азәрбайчанын шәрг һиссәсиндә битир.

Бу фәсиләнин мүнүм нүмайәндәләриндән бири дә эвләрдә бәзәк биткиси кими сахланан филодендрон (*Monstera deliciosa*) биткисидир (шәкил 322).

О, тропик мешәләрдә яйылмышдыр. Гушларын кәтириб мамырла өртүлмүш ағачларын көвдәси үзәринә салдыглары тохумлар орада чүчәриб эпифит һалда бөйүйүр вә ашағыя доғру узатдыглары эләвә көкләр васитәсилә торпағдан гита алмаға башлайыр. Бундан сонра битки сүрәтлә бой атыб инкишаф эдәрәк чичәк әмәлә кәтирир. Эвдә сахландыгда әлверишли шәраит ол-




Шәкил 322. Үзәриндә мейвәси олан филодендрон биткиси.

мадығына көрә, чичәк ачмыр, вәтәниндә исә чичәк ачыр вә мейвә верир. Мейвәси 20 см узунлугда олуб, тохмаға охшайыр, чох әтирлидир вә ананас дады верир. Азәрбайчанда ботаника бағы шүшәбәндлийиндә вә бәзи эвләрдә мейвә вермәси мүшәһидә олунур.

Сүкүлүкимиләр (*Lemnaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә дахил олан биткиләрдә о гәдәр кәскин ихтисар кетмишдир ки, организмләринин векетатив һиссәси һәтта ярпаг вә көвдәйә белә айрылмайыб, хырда ярпаг шәклиндәдир. Онлар суюн ичиндә ашағыя доғру инчә көк әмәлә кәтирир. галан һиссәләри исә, суюн үзүндә галыр. Бу фәсиләнин чинсләриндән бири сүкүлү (*Lemna*)-дүр. Азәрбайчанда онун ашағыдакы үч нөвү вардыр. (*L. trisulca*, *L. minor* S. *L. gibba*) (шәкил 323). Онлар Азәрбайчанын әксәр районларынын дүрғун суларында битир.



Шәкил 323. Хырда сүкүлү (*L. minor*)

Сукүлү (*Lemna*) чох надир һалларда вә ялныз әлверишли шәраитдә чичәк ачыр. Чичәк группу чох ихтисар олунмушдур. Эркәк чичәк группу 1—2 эркәк чичәкдән ибарәтдир. Һәр чичәйиндә бир эркәкчик олур. Диши чичәк группу бир-ики чылпаг диши чичәкдән ибарәт олур. Онларын да һәр бириндә дишичик бир мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир вә биртохумлуглудур. Бунларын һамысы пәрдәшәкилли өртүчү ярпагла әһәтә олунмушдур.

ПАНДАНЧИЧӘКЛИЛӘР (*Pandanales*) СЫРАСЫ

Бу сыранын нүмайәндәләри Асиянын тропик өлкәләриндә дәниз кәнарларында яйылмышдыр, бә'зи нүмайәндәләри тропикадан хариждә яйылмышдыр. Сыранын башлыча фәсиләләри панданлар (*Pandanales*), Гурбагаоту (*Sparganiaceae*) вә чийәндир (*Typhaceae*).

Һәр үч фәсилә реликт, йә'ни гәдимдир. Ики ахырынчы фәсилә бу сыра үчүн даһа характердир.

Гурбагаоту (*Sparganiaceae*) фәсиләси



Шәкил 324. Гурбагаоту (*Sparganium*)

1—биткинин харвчи көрүнүшү;
2—диши чичәк; 3—эркәк чичәк;
4—мейвә группу; 5—тохуму.

Фәсиләнин Азәрбайҗанда бирчә Гурбагаоту (*Sparganium*) чинси битир (шәкил 324). Онун *S. polycarum*, *S. neglectum*, *S. microcarpum*, *S. simplex* нөвләри Азәрбайҗанын мухтәлиф районларында яйылмышдыр. Арх вә көлләрин кәнарларында битир, отлардыр, көвдәләри будагланандыр. Ярпаглары дәнли биткиләрин ярпаглары кими әнсиз, хәтвари олуб, ики чәркә дүзүлмүшдүр. Чичәкләри бирчинслидир. Бирәвли биткиләрдир. Чичәкләри күрәви чичәк группундандыр. Чичәк зоғларынын юхарысында эркәк чичәк групплары, ашағысында исә диши чичәк групплары топланмыш олур.

Чичәкләрин чичәкянлыгы пулчуг-шәкилли 3—6 сәрт ярпагыгдан ибарәтдир, бә'зән чичәкянлыгы һеч олмур. Эркәкчикләри 3—6-дыр, дишичийи 3 мейвә ярпағындан әмәлә кәлмишдир, 1—3 ювалыдыр, юмурталыгы юхары вә отуран ағызчыгыдыр. Күлөк васитәсилә тозланыр. Мейвәләри чәйирдәкмейвә вә я фындыгчыгыдыр.

Чийән (*Typhaceae*) фәсиләси

Бу фәсиләйә ялныз бирчә чийән (*Typha*) чинси аиддир. Ер үзәриндә онун 16 нөвү яйылмышдыр. Азәрбайҗанда исә 5 нөвү мә'лумдур. Онлар сулу ерләрдә, арх вә көлләрин кәнарларында битир. Сүрүнән ералты көкүмсов көвдәләри вардыр, ерүстү көвдәләри дүйүнсүздүр. Ярпаглары узун, хәтвариدير. Эркәк чичәкләри көвдәнин тәпәсиндә цилиндршәкилли сых тохмаг шәклиндә топланмышдыр, гонур вә я гара рәнkdәдир. Диши чичәкләри онлардан ашағыда топланмышдыр. Эркәк чичәкләрдә үч эркәкчик вардыр, онлар дибдән саплаглары васитәсилә бирләшмишдир. Диши чичәйи ялныз бир дишичикдән ибарәт олуб, дибдән саплаг үзәриндә даянмышдыр, сүтунчуғу узундур. Мейвәси фындыгчыгыдыр вә түклү олдуғуна көрә күлөк васитәсилә яйылыр. Күлөк васитәсилә тозланан биткиләрдир.

Азәрбайҗанда яйылмыш дарьярпаг чийән (*Typha angustifolia*) һабелә *T. angustata*, *T. Laxmannii*, *T. latifolia* нөвләри яхшы лифли биткиләрдир (шәкил 325). Онларын ярпаг вә гынларындакы узун лифләрден кисә вә кәндир тохумаг үчүн истифадә эдилир. Бундан башга сәбәт вә зәнбил тохунур, биналарын үстү өртүлүр вә көкүмсов көвдәләриндән шораба һазырланыр вә я биширилмиш һалда ейлир. Тәркибиндә 44,2—57,5% нишаста вә шәкәр вардыр. Гурудулуб үйүдүлдүкдә нишаста алына биләр. Ярпагларында 150—210 мг % «С» витамини вардыр.



Шәкил 325. Әлиярпаг чийән (*Typha latifolia*)

1—чичәк группу; 2—ярпагы;
3—диши; 4—эркәк чичәйи;
5—мейвәси.

Гуру мейвэлэр	155
Яш мейвэлэр	158
Мейвэ вэ тохумларын яйылмаға уйгулашмалары	161
Биткилерин яйылмасы вэ ени нөвлерин әмәлә кәлмәсиндә инса- нын ролу	165
Тохум	166
Инсан вэ һейванларын һаятында мейвэ вэ тохумларын әһәмий- һәти	168
Тохумларын чүчәрмә шәранти	168

МҮНДӘРИЧАТ

Мүгәддима	3
Кириш	5

Биткилерин морфологиясы

Битки морфологиясынын тәрифи, вәзифәси вэ өйрәнилмә методлары	13
Битки организмлеринин формача мурәккәпләшмәси вэ инкишафы . .	14
Әсас морфологик аңлайышлар	17
Метаморфоз, һомолокия, аналогия, редукция вэ атавизм һадисәләри .	22
Векетатив органлар	28
Көк	28
Көвдә	45
Ярпаг	58
Трихомалар в әмиркенсиялар	82
Организм вә мүнит	84
Бөйүмә вә инкишаф	94
Һибридләшмә	96
Биткиләрдә чохалма	96
Векетатив чохалма	97
Чилик вәсәтәсилә чохалма	99
Чалаглар	101
Көтүк илә гәләмин бир-биринә гыршылыклы тәсири	103
Гейри-чинси чохалма	103
Чинси чохалма, нәсилләрин нөвбәләнмәси вә нүвә	105
Фазаларынын дәйишмәси	106
Чыплагтохумлуларда нәслин нөвбәләнмәси	114
Өртүлүтохумлу биткиләрдә чинси чохалма	116
Чичәк вә онун һиссәләри	117
Топа чичәкләр	122
Әркәкчикләрин гурулушу вә тозчугларын инкишафы (микро- спорокөнез)	123
Дишичик	126
Нектарлыглар вә онларын әһәмийәти	131
Чичәк һиссәләринин дүзүлүшү	131
Чичәкләрин формулалары вә диаграмлары	132
Чичәкләмә (чичәкачма)	135
Чичәк группу	136
Тозланма	139
Өз-өзүнү тозлаан биткиләрдә әйни чешиддән олан башга битки тозчугларынын әһәмийәти	143
Маяланма	147
Мейвә	154
Мейвәлерин типләри	155

Али биткилерин систематикасы

Сүн'и системләр	177
Филокөнетик систем	177

1 шәбә

Архегониялы биткиләр (Archegoniatae) туну

Мамыржимиләр (Bryophyta) синфи	181
Чрийәротлаы вә я ясты мамырлар (Hepatica) ярымсинфи . . .	181
Маршансиякимиләр (Marchantiales) сырасы	182
Юнкерманлар (Jungermaniales) сырасы	185
Күрәмәйвәлиләр (Sphaerocarpaceae) фәсиләси	185
Антосеротлар (Anthocerotales) сырасы	187
Ярпаглы мамырлар (Musci) ярымсинфи	188
Һәгиги мамырлар (Bryales) сырасы	189
Торф вә я аг мамырлар (Sphagnales) сырасы	192
Архидиялар (Archidiales) сырасы	195
Тайгапаг мейвәли вә я гара мамырлар (Andreales) сырасы . .	195
Ярпаглы мамырларын мәншәи вә такамүлү	195
Псилофиткимиләр (Psilopsida) синфи	196
Плаункимиләр (Lycopside) синфи	198
Кибритоту вә я чанаварпәнчәси (Lycopodiales) сырасы . . .	199
Селакинедлар (Selaginellales) сырасы	201
Лепидодендронлар (Lepidodendrales) сырасы	204
Буғумлулар (Sphenopsida) синфи	205
Гатыргуйруғукимиләр (Equisetales) сырасы	205
Гатыргуйруғу (Equisetaceae) фәсиләси	206
Каламитләр (Calamitaecae) фәсиләси	209
Гыжылар (Pteropsida) синфи	210
Корамал отлары (Ophioglossales) сырасы	210
Корамал оту (Ophioglossaceae) фәсиләси	211
Мараттиләр (Marattiales) сырасы	212
Һәгиги гыжылар (Filicales) сырасы	213
Хүсуси гыжылар (Eufilicales) ярымсырасы	213
Су гыжылары вә я мухтәлиф спорлу гыжылар (Hydropt- erides) ярымсырасы	218
Салвиниялар (Salviniaecae) фәсиләси	218
Марсиллия (Marsiliaceae) фәсиләси	220
Чыплагтохумлулар (Gymnospermae) синфи	222
Саговникләр (Cycadales) сырасы	225
Беннеттитләр (Bennettitales) сырасы	230
Кинкголар (Ginkgoales) сырасы	232

Кордаитлар (<i>Cordaitales</i>) сырасы	234
Ийнэярпаглылар (<i>Coniferales</i>) сырасы	235
Гарачөһрә (<i>Taxaceae</i>) фәсиләси	239
Подокарп (<i>Podocarpaceae</i>) фәсиләси	239
Араукариялар (<i>Araucariaceae</i>) фәсиләси	241
Шамлар (<i>Pinaceae</i>) фәсиләси	241
Таксоидлар (<i>Gahodiaceae</i>) фәсиләси	242
Сөрвләр (<i>Cupressaceae</i>) фәсиләси	242
Гырхбугумкимләр (<i>Gnetales</i>) сырасы	244
Ачылыг (гырхбугумлар) (<i>Ephedraceae</i>) фәсиләси	244
Архегониялыларын мәншәләри вә төкәмүлү	245

II шөбә

Чичәкли вә я өртүлүтохумлу биткилар (*Anthophyta*) вә я (*Angiospermae*) туну

Чичәкли биткиларын филокениясы	251
Гроссһеймин системиянин графика ифадәсинин бә'зи хусусийәтләри һаггында өзүнүн изаһаты	254
Өртүлүтохумлулар (<i>Angiospermae</i>) вә ядишчичкиләр (<i>Gyneciatæ</i>) ярымтипи	256
Икиләпәлиләр (<i>Dicotyledonae</i>) синфи	257
Чохмәйвәлиләр (<i>Polycarpiceae</i>) сырасы	257
Магнолия (<i>Magnoliaceae</i>) фәсиләси	257
Мүшкгозу (<i>Myristicaceae</i>) фәсиләси	259
Ананас (<i>Anonaceae</i>) фәсиләси	259
Дәфнәкимләр (<i>Lauraceae</i>) фәсиләси	261
Гурдбоғанкимләр (<i>Ranales</i>) сырасы	262
Зәринчичәклиләр (<i>Berberidaceae</i>) фәсиләси	262
Гурдбоған (<i>Ranunculaceae</i>) фәсиләси	264
Су замбағы (<i>Nymphaeaceae</i>) фәсиләси	268
Дәмирағаччичәклиләр (<i>Hamamelidales</i>) сырасы	269
Дәмирағач (<i>Hamamelidaceae</i>) фәсиләси	269
Чинар я Лапан (<i>Platanaceae</i>) фәсиләси	269
Күлчичәклиләр (<i>Rosales</i>) сырасы	269
Довшанкәләми вә я гаягоруғ (<i>Crassulaceae</i>) фәсиләси	271
Дашдәлән (<i>Saxifragaceae</i>) фәсиләси	271
Күлчичәклиләр (<i>Rosaceae</i>) фәсиләси	273
Топулгалар (<i>Spiraeolideae</i>) ярымфәсиләси	274
Итбурнукимләр (<i>Rosoidae</i>) ярымфәсиләси	275
Алмакимләр (<i>Pomoideae</i>) ярымфәсиләси	279
Юмурталығынын дивары пәрдә кими гығырдаг һалында олуд, мейвәси киләмейвәйә охшайлар	279
Юмурталығынын дивары дашлашыш вә мейвәси чәйирдәкмәйвә кими оланлар	282
Кавалыкимләр (<i>Prunoideae</i>) ярымфәсиләси	284
Пахламейвәликимләр (<i>Leguminosales</i>) фәсиләси	289
Пахламылар (<i>Leguminosaceae</i>) сырасы	289
Күстүмотукимләр (<i>Mimosoideae</i>) ярымфәсиләси	290
Сезалпинлар (<i>Caesalpinioideae</i>) ярымфәсиләси	292
Кәпәнәкчичәклиләр (<i>Papilionatae</i>) ярымфәсиләси	294
Әмәкәмәччичәклиләр (<i>Malvales</i>) сырасы	299
Чөкәкчичәклиләр (<i>Teliaceae</i>) фәсиләси	299
Әмәкәмәчи (<i>Malvaceae</i>) фәсиләси	301
Баобаблар (<i>Bomvacaceae</i>) фәсиләси	306

Какао (<i>Sterculiaceae</i>) фәсиләси	306
Әтиршәһчичәклиләр (<i>Geraniales</i>) сырасы	308
Кәтан (<i>Linaceae</i>) фәсиләси	309
Туршәһк (<i>Oxalidaceae</i>) фәсиләси	309
Әтиршәһ (<i>Geraniaceae</i>) фәсиләси	310
Какаин (<i>Erythroxylaceae</i>) фәсиләси	311
Әриккүлү вә я нәстәрән (замандагаффар) (<i>Tropaeolaceae</i>) фәсиләси	311
Үзәррикчичәклиләр (<i>Zygophyllaceae</i>) фәсиләси	311
Сүдләйәнчичәклиләр (<i>Euphorbiales</i>) вә я үчфындыгчыглылар (<i>Tricoccales</i>) сырасы	316
Сүдләйәнкимләр (<i>Euphorbiaceae</i>) фәсиләси	316
Шүмшәт (<i>Buxaceae</i>) фәсиләси	319
Михәкчичәклиләр (<i>Myrtales</i>) сырасы	320
Ийдә (<i>Elaeagnaceae</i>) фәсиләси	320
Михәккимләр (<i>Myrtaceae</i>) фәсиләси	321
Нар (<i>Punicaceae</i>) фәсиләси	323
Ағларот (<i>Lythraceae</i>) фәсиләси	323
Пүстәкимләр (<i>Terebinthales</i>) сырасы	324
Сәдочичәклиләр (<i>Rytaceae</i>) фәсиләси	324
Сумагчичәклиләр (<i>Anacardiaceae</i>) фәсиләси	327
Ағчагайын (<i>Aceraceae</i>) фәсиләси	330
Мурдарча чичәклиләр (<i>Rhamnales</i>) сырасы	330
Мурдарча (<i>Rhamnaceae</i>) фәсиләси	331
Үзүм (<i>Vitaceae</i> вә я <i>Ampelidaceae</i>) фәсиләси	333
Кәрмәшовчичәклиләр (<i>Celastrales</i>) сырасы	334
Кәрмәшов (<i>Celastraceae</i>) фәсиләси	334
Чәтирчичәкликимләр (<i>Umbelliflorae</i>) сырасы	335
Зоғалчичәклиләр (<i>Cornaceae</i>) фәсиләси	335
Чәтирчичәклиләр (<i>Umbelliferae</i>) фәсиләси	336
Бояготукимләр (<i>Rubialeae</i>) сырасы	339
Бояготучичәклиләр (<i>Rubiaceae</i>) фәсиләси	340
Доггуздон (<i>Caprifoliaceae</i>) фәсиләси	343
Пишикоту (<i>Valerianaceae</i>) фәсиләси	345
Фырчаоту (<i>Dipsacaceae</i>) фәсиләси	345
Фыстыгчичәклиләр (<i>Fagales</i>) сырасы	345
Тозағачыкимләр (<i>Betulaceae</i>) фәсиләси	347
Фыстыгкимләр (<i>Fagaceae</i>) фәсиләси	349
Гозчичәклиләр (<i>Juglandales</i>) сырасы	353
Гозкимләр (<i>Juglandaceae</i>) фәсиләси	353
Биркөзкимләр (<i>Ligustrales</i>) сырасы	354
Зейтунчичәклиләр (<i>Oleaceae</i>) фәсиләси	354
Буругчичәклиләр (<i>Contortae</i>) сырасы	357
Ачылыготу (<i>Gentianaceae</i>) фәсиләси	357
Кәндир (<i>Aprocynaceae</i>) фәсиләси	358
Гарангушоту (<i>Asclepiadaceae</i>) фәсиләси	358
Боручичәклиләр (<i>Tubiflorae</i>) сырасы	359
Сармашыгчичәклиләр (<i>Convolvulaceae</i>) фәсиләси	359
Бадымчанчичәклиләр (<i>Solanaceae</i>) фәсиләси	362
Дурначичәклиләр (<i>Borraginaceae</i>) фәсиләси	366
Гурдағзычичәклиләр (<i>Scrophulariales</i>) сырасы	367
Сарагаоту (<i>Scrophulariaceae</i>) фәсиләси	367
Күнчүт (<i>Pedaliaceae</i>) фәсиләси	370
Догагчичәклиләр (<i>Labiatae</i>) фәсиләси	370
Кәһрә, сүмүркәноту (<i>Orobanchaceae</i>) фәсиләси	374
Говуглулар (<i>Lentibulariaceae</i>) фәсиләси	375
Бағаярпаглылар (<i>Plantaginaceae</i>) фәсиләси	375
Хашхашчичәклиләр (<i>Rhoedales</i>) сырасы	377

Хашхашкимилер (<i>Papaveraceae</i>) фәсиләси	378
Хаччичәклиләр (<i>Cruciferae</i>) фәсиләси	380
Көвәрчичәклиләр (<i>Capparidaceae</i>) фәсиләси	384
Резеда вә ја гуауоту (<i>Resedaceae</i>) фәсиләси	385
Бөнөвшәчичәклиләр (<i>Parcetales</i> сырасы	386
Бөнөвшә (<i>Violaceae</i>) фәсиләси	385
Говунағачы (<i>Caricaceae</i>) фәсиләси	386
Юлғун (<i>Tamaricaceae</i>) фәсиләси	388
Габагчичәклиләр (<i>Cucurbitales</i>) сырасы	388
Габагкимиләр (<i>Cucurbitaceae</i>) фәсиләси	388
Зәнкичәклиләр (<i>Campanulales</i>) сырасы	389
Зәнкичәклиләр (<i>Campanulaceae</i>) фәсиләси	390
Лобелләр (<i>Lobeliaceae</i>) фәсиләси	390
Мүрәккәбчичәклиләр (<i>Compositae</i>) сырасы	391
Боручичәклиләр (<i>Tubiflorae</i>) ярым фәсиләси	394
Дилчичәклиләр (<i>Leguliflorae</i>) ярым фәсиләси	398
Чайчичәклиләр (<i>Guttiferales</i>) сырасы	401
Чай (<i>Theaceae</i>) фәсиләси	401
Дазы, бойчичәйи (<i>Guttiferae</i>) фәсиләси	403
Гаракиләчичәклиләр (<i>Ericales</i>) сырасы	403
Гаракиләнимиләр (<i>Ericaceae</i>) фәсиләси	404
Мәркәзтохумлулар (<i>Centrospermae</i>) сырасы	405
Пәрпәтөйүн (<i>Portulacaceae</i>) фәсиләси	407
Гәрәнфилчичәклиләр (<i>Caryophyllaceae</i>) фәсиләси	407
Тәрәчичәклиләр. Уннучакимиләр (<i>Chenopodiaceae</i>) фәсиләси	408
Пәнчәрләр (<i>Amara-thaceae</i>) фәсиләси	410
Кичитканчичәклиләр (<i>Urticales</i>) сырасы	410
Туткимиләр (<i>Moraceae</i>) фәсиләси	411
Чәтәнәкимиләр (<i>Gannabaceae</i>) фәсиләси	415
Кичитканкимиләр (<i>Urticaceae</i>) фәсиләси	417
Гарагачкимиләр (<i>Ulmaceae</i>) фәсиләси	417
Әвәлчичәклиләр (<i>Polygonales</i>) сырасы	419
Әвәлиққимиләр (<i>Polygonaceae</i>) фәсиләси	419
Мәддиличичәклиләр (<i>Cactales</i>) сырасы	420
Көрмәкчичәклиләр (<i>Plumbagiates</i>) сырасы	423
Көрмәккимиләр (<i>Plumbaginaceae</i>) фәсиләси	424
Новрузчичәклиләр (<i>Primulales</i>) фәсиләси	424
Новрузчичәйи (<i>Primulaceae</i>) фәсиләси	425
Хурникчичәклиләр (<i>Ebenales</i>) сырасы	426
Хурникләр (<i>Ebenaceae</i>) фәсиләси	427
Сөйүдчичәклиләр (<i>Sabicales</i>) сырасы	427
Сөйүдкимиләр (<i>Salicaceae</i>) фәсиләси	428
Бирләпәлиләр (<i>Monocotyledonae</i>) синфи	430
Субәзәйикимиләр (<i>Helobiae</i>) сырасы	430
Багәвәр (<i>Alismataceae</i>) фәсиләси	430
Суоху (<i>Butomaceae</i>) фәсиләси	430
Сүсәнкимиләр (<i>Liliflorae</i>) сырасы	431
Сүсәнчичәклиләр (<i>Liliaceae</i>) фәсиләси	431
Данагыран (<i>Melanthoidae</i>) ярымфәсиләси	432
Әзвәйчичәклиләр (<i>Asphoideloideae</i>) ярымфәсиләси	433
Соғанчичәклиләр (<i>Allioideae</i>) ярымфәсиләси	434
Сүсәнкимиләр (<i>Lilioideae</i>) ярымфәсиләси	434
Әндамчичәклиләр (<i>Dracynedoiae</i>) ярымфәсиләси	434
Гуланчарчичәкләр (<i>Asparagoideae</i>) ярымфәсиләси	435
Шинкилә (<i>Smilaxoideae</i>) ярымфәсиләси	435
Нәркизчичәклиләр (<i>Amaryllidaceae</i>) фәсиләси	436
Диоскорейя (<i>Dioscoreaceae</i>) фәсиләси	438

Замбар (<i>Iridaceae</i>) фәсиләси	438
Чығкимиләр (<i>Juncaceae</i>) фәсиләси	440
Хырдатохумлулар (<i>Microspermae</i>) вә я әрарвадлылар (<i>Gynandrae</i>) сырасы	440
Сәһләбкимиләр (<i>Orcidaceae</i>) фәсиләси	441
Чилләр (<i>Cypherales</i>) сырасы	444
Чил (<i>Cyperaceae</i>) фәсиләси	444
Бананчичәклиләр (<i>Scitaminales</i>) сырасы	446
Банан (<i>Musaceae</i>) фәсиләси	446
Зәңгәфилчичәклиләр (<i>Zingiberaceae</i>) фәсиләси	447
Канна (<i>Cannaceae</i>) фәсиләси	449
Тахылчичәклиләр (<i>Graminales</i>) сырасы	450
Тахыллар (<i>Gramineae</i>) фәсиләси	450
Гарғыдалы (<i>Maydeae</i>) ярымфәсиләси	453
Дашдәйәнкимиләр вә я балаг-оту (<i>Andropoyonea</i>) ярым фәсиләси	454
Дарыкимиләр (<i>Panicaceae</i>) ярымфәсиләси	457
Чәлтиққимиләр (<i>Oryzeae</i>) ярымфәсиләси	458
Бүлбүлотуқимиләр (<i>Phalarideae</i>) ярымфәсиләси	459
Түлкүгуйругкимиләр (<i>Agrostideae</i>) ярымфәсиләси	459
Юлаф, вәләмир вә һачагуйруг (<i>Aveneae</i>) ярым фәсиләси	460
Топалотуқимиләр (<i>Festucaceae</i>) ярымфәсиләси	460
Арпақимиләр (<i>Hordeae</i>) ярымфәсиләси	461
Бамбугкимиләр (<i>Bambusoideae</i>) ярымфәсиләси	462
Палмачичәклиләр (<i>Palmales</i>) сырасы	462
Палмалар (<i>Palmaceae</i>) фәсиләси	462
Гаар истиотчичәклиләр (<i>Piperates</i>) сырасы	465
Гара истиот (<i>Piperaceae</i>) фәсиләси	465
Тохмагчичәклиләр (<i>Spadiciflorae</i>) сырасы	466
Данааяғы (<i>Araceae</i>) фәсиләси	466
Сукүләүкимиләр (<i>Lemnaceae</i>) фәсиләси	469
Панданчичәклиләр (<i>Pandanales</i>) сырасы	470
Гурбагаоту (<i>Sparganiaceae</i>) фәсиләси	470
Чийән (<i>Typhaceae</i>) фәсиләси	471

Нәшрийят редактору: М. Мирзәбабали
 Техники редактору: С. Әһмәдов
 Корректорлары А. Әббасов ва Ч. Сайылов
 Чапа имзаланмыш 18/III-59. Кағыз форматы 60×92¹/₁₆.
 Чап варағи 30. Нәс-нәшрийят варағи 30. ФГ 10022.
 Сифарини № 523. Тиражи 3000.

Азәрбајҹан ССР Мәдәнијәт Назирлијинин
 «Гызыл Шәрг» мәтбәәси
 Бақы, Нәзи Асламов күчәси, 80.

ДҮЗӘЛИШ

Сәһ.	Сәтир	Җазылымышдыр	Охунмалыдыр
24	ашағыдан	чыхынгылары	чыхынтылары
33	" 2	Асеч	Асег
33	" 17	типи	тели
46	" 9	h	q
46	јухарыдан 18	ишарә	ишарә ⊙ ①
46	" 28	ишарәләри	ишарәләри ⊙ ②
47	" 5	белә	ḡ белә
48	" 7	(ḡ)	(ḡ)
113	шәкмл 83	Нөвбәләшмәси схеми	Нәслин нөвбәләш- мәси схеми
121	јухарыдан 21	()	(Q)
132	ашағыдан 5	A ₂₊₂	A ₂₊₄
132	" 6	lg	G
134	" 23	диарәләри	диарәләри
223	ашағыдан 3	Zyginopteris	Lyginopteris
242	јухарыдан 4	Zarix	Larix
242	" 5	Zsibirica	L. sibirica
284	ашағыдан 9	P. spibosa	P. spinosa
371	ашағыдан 12	Sofficinalis	S. officinalis
407	ашағыдан 12	Coryophyllaceae	Caryophyllaceae
470	ашағыдан 23	S. Polyerum	S. Polyedrum
474	ашағыдан 1	(Bomvacaceae)	(Bombacaceae)
476	јухарыдан 5	Parcetales	Parietales
476	" 14	Compositae	Compositales
476	ашағыдан 21	Фәсиләси	Сырасы
477	ашағыдан 8	Гаар	Гара

Сифарини 523

МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

(на азербайджанском языке)

Издательство Азербайджанского Университета

Баку — 1959